

# MEDICINAE EXERCITAMENTA,

EX SELECTIS LINGVÆ  
VTRIVSQUE AVTHORIBVS,  
GVLIELMO RHEGINO  
LVGDVNÆO  
ILLVSTRATA.

*Exemplum ad Bibliothecam: Basilicam: manuscripti.*

AD LECTOREM.

*Hæc Deus adscribat, Lectores credite, si fas  
Profore, sed gratis, vos volo Pæonios.  
Cuncta, nephas, nostro velle inseruisse labori:  
Huic uni tantum confiteretur opus.*



LVGDVNI,

Apud Bartholomæum Molinæum,

M. D. L X I I I I.

CVM PRIVILEGIO REGIS.



## QVIBVS VTITTR AVTHORIBVS.

M. Trimegiftus,  
 Hippocrates Coūs,  
 Pythagoras,  
 Aristoteles,  
 Theophrastus,  
 Cornelius Celsus,  
 Cornelius Tacitus,  
 Strabo historiogr.  
 & geographus,  
 Dioscorides,  
 Galenus,  
 Scrib. Largus,  
 Aphrodisæus,  
 Trallianus,  
 Garyopontus,  
 L. Apuleius,  
 Cælius Aurelianus,  
 Plinius vterque,  
 Ægyneta,  
 Aëtius Amidenus,  
 Actuarius,  
 Ausonius,  
 Oribasius,  
 Ruellius,  
 Gillius,  
 Angestus,

Leoniceus,  
 H. Barbarus,  
 Th. Gaza,  
 B. Alexander,  
 I. Manardus,  
 Melancthon,  
 Fuchsius,  
 Gesnerus,  
 I. Agricola,  
 Brassauolus,  
 I. Syluius,  
 G. Copus,  
 Guinterius, *anatom.*  
 Acakia,  
 Belonus,  
 Vassæus,  
 Scholiastes,  
 Ælianus,  
 Riuius,  
 Thylesius,  
 Georg. Valla,  
 C. Stephanus,  
 Lucanus,  
 Gellius,  
 Macrobius,  
 Psellus.



# IVRIS VTRIVSQUE

DOCTORI CONSULTISSIMO, ET

VRBIS ROMANENSIVM IVDICI

*aquissimo Carolo Velleio, Gulielmus*

*Rheginus. Lugdunus.*

S. P. D.



ET ERES olim probationis vitæ viri (Vellei ludex æquissime) inter philosophâtes qui excellere, certo quodâ vineti trophæo; aut coronyde, inter famæ maximæ regionis suæ illustres, honos cui deberetur candidè certabant: ut si quod incipiendum molis arduæ opus, antè diceretur, sacrumque haberetur, quàm vel perfectum, vel inceptum esset, operis nomen apud neminem usurparetur. Vtique adeò honestum visum est, rara autho-

ritate & gravitate viros delegere, quos in favorem operis suscipiendi pro Mœcœnatibus sibi patronos gloria populari immunes comparabant: quod sicuti factitatum antiquitus, hæcenus eò diligenter observatum est. Mihi quoque rei tantæ conscio, atque excellenti fastu, non mediocriter impedito, cui hūc nostrum laborem patrono eximio offerrem, quo gnauiter tueretur: cogitavi mecum cum esse te eruditorum fraude simplicissimum, & singulari mansuetudine clarum, & doctrina haudquaquam vulgari, morum necnon probitate observantissimum: neque ideo alterum eligendum duxi, qui vel strenuius, vel promptius nostras foueret partes. Neque cupiebam profectò in tantos fluctus circumagi tua nisi confusus ope, minùs quoque vires nostras committebam ventis, sed benignitate animi tui promptus nimirum accurristi, te mihi secuta ancora præstiteris. Nam anno ab hinc plusminùs quarto (Vellei vel mortalium humanis.) Medicinæ Exercitamenta à me illustrata, sed ne-dum quidem edita, aut in lucem emissâ, verùm tui nominis auspicio emittenda decreui, nulla alia sanè sententia ut id facerem motus, nisi sperans, ut multorum rei medicæ candidatorum Medicina ipsa clariùs intueretur. Dum enim mecum reputo quantum à prisca, atque adeo recta medendi ratione nostræ ætatis recentiores medici desciscant, quòd quisque fermè peculiarem habet quem imitetur auctorem, eumque plerumque indoctum sibi proponat, quòdque in vniuersum omnes, simplicium penitus neglecta cognitione, remedia falsa

## EPISTOLA.

pro veris, & ægritudines accipiant: operæ precium me facturum existi-  
maui, vt in legēdis peritioribus Medicinæ scriptoribus delectum aliquem  
accipiant, monerem. Proinde quod id ipsum commodè afficerem non gra-  
uatus sum selectiores Medicinæ totius partes simplices, quas ante nos  
Leoniceus, Manardus, Ruellius, Fuchsius, Brissortus, Syluius, Fernellusq;  
viri longè doctissimi, memoriæ prodiderunt: quæque ex assidua veterum  
authorum lectione animaduvertebam in vnum corpus redigere, formulisq;  
excudenda proponebā. Quem quidem laborem eo gratiorem fore putavi,  
quòd singula cuius lectori candido complacent. Nam quæ ego interdum  
in transcurso attingi tantum, succinctèque adnotaui, ea copiosius diligens  
lector apud citatos autores inueniet. Multa denique quæ nudis solùm  
verbis citra omnem fucum produximus. Atque adeo bona spes superest  
conatum hunc nostrum à nullo non amplectendum, præsertim cum per  
ea in studiis lectionis variæ incidat quibus bonus lector. His ergo rationi-  
bus adductus, vigilias hæc meas, quas noctibus longioribus in hoc corpus  
perbreue congesti non ingratis medicinæ Tyronibus fore confido: quòd  
non paucis vt ad meliora aspirent calcaria addere posse sperem. Neque  
spes illa me planè fallit, ita enim constant ea nostra tempora, vt correctri-  
cem manum non respuant: quapropter mox publicato hoc nostro labore  
reperientur, qui me alia nulla causa in hanc descendisse partem dicent, nisi  
vt bonis prosum viris: mihiq; nomen & famam apud posteros concilia-  
bunt, quos scio eo animo non futuros alienos, vt obrectationis immunes  
existimē. Non deerunt tamen qui damnent, quòd omnia ex aliorum com-  
mentariis in librum hunc cōferam, atque adeo alienis plumis superbiā  
quasi summi olim autores id ipsum non fecerint. Vtunque tamen refe-  
rendis aliorum sententiis tantum operam omnem impenderit, nemo ta-  
men aduersariorum repertus est, qui factum hoc vitio illis dederit. Neque  
mirum itaque si non reprehendar, quòd in magnis authoribus Græcis &  
Latinis nequicquam similitum vigiliarum reprehensum est. Nihil attinet  
ergo factum hoc meum, magnorum virorum exemplo, tueri, qui ingenuè  
fateor nominibus, & locis authorum semper recitatis adiutum esse, neque  
vnquam quicquam ex illorum monumentis in vsum meum transtulisse,  
vbi non simul eorundem honorificās mentionem fecerim. Satis enim con-  
stat benignum & plenum ingenij candoris esse, fateri per quos profeceri-  
mus. Insuper neque deerunt quibus operis huius quoque inscriptio rece-  
prior futura est, tam faciles erunt illorum aures, vt hunc titulum minimè  
insolentem facile patientur. Nulla autem, mea quidem sententia, com-  
modiore inscriptione, quàm Medicinæ Exercitamenta, insigniri potuit:  
singula namque quæ hîc traduntur, præter vulgarium Medicorum iudi-  
cium, opinionem-vè dicta videntur. Et vt planè nouam faciem opus hoc  
indueret, longè aliter, quàm qui dictionaria inscribunt, egimus, vt con-  
feratur authoribus perferutandis titulus. Quare hoc quicquid est ingenij,  
(Vellei Iudicum prudentissime) cur clementiæ, ac humanitati tuæ nuncu-  
pare



## EPISTOLA.

pare non dubitauerim: in primis tuum recens ac nouum, sed maximum, & propensissimum erga me studium, amorque incredibilis: cū quod nesciō quid magni de te animus mihi semper præfagebat: qui etiam interim dum quorundam aduersariorum improbis afficiebar contumeliis, patientius resistere haud-quaquam dedignatus-es, prudētia tua illorum calūnias reprimens. Hinc neque temerē, neque sine tuo magno iudicio in hos pestilentes impetus te opposueris, quos tibi modis omnibus abiectos uolueris, persuasum mihi iam pridem habebam: quod scirem Deum optimū maximum suorum sibi curæ semper esse, ne in id genus hostium miseras incurrant: ut illorum tandem declinatis affectibus errorem per te suum agnoscant. Nunc iterum tandem præter omnium expectationem, actutum & maiore cum animi tui dexteritate, & constantia me ipsum ab infortuniis repululantibus eripuisti, quando mecum audes configere cum professione nostræ uiris imperitis: quos neque vigere diutius isto suo in errore obstinato Deus patietur. Tu certē ex paucis cæterorum urbis nostræ præfectis, cum palma laudem æquitatis administrandæ promereris: qui magistratum, religionem ipsam Christianam, veram pietatem, atque adeo recta studia regendo, imiteris. Quæ quū per te sint hæc cuncta & piē, & sanctē in pristinum suum morem restituta: superest modō bonarum literarum, & pietatis studia quæ penes te sunt, tua in inclita Rhomanæ urbe, renascantur, quemadmodum cordatum, & verē Christianum spectatissimum patronum, & æquissimum ludicem, oportet. Prudenter scilicet facturus, quod in hac re peragenda, non tuis tantum inniteris consiliis, verum ordinis tum prætorij, tum magistratuum, experientia claros imitaris: quibus cum de Repub. administranda, & pace restituenda, consilium tuum haud adspernis: maximē quidem quū imperitorum facultatis nostræ turba pestilens à proborum cœtu explodenda, atque mox releganda est. Difficillimum namque nosti turbulento seculo isto, præsertim in tanta imperitorum multitudinem, seligere eum, qui Medicinæ exactam methodum, candidē, & syncrē exerceat. Nam, ut artis expertos taceam, quot sunt hodie qui impostorum pestilentissimorum veneno imbuti passim obambulant, artēque pulchrē dissimulantes, inficiunt? In iis itaque dignoscendis quanta sit opus prudentia, ipse facilē conijcere potes. Laudo itaque, in adsciscendis urbi tuæ periculis, istam tuam singularem prudentiam, qui adusq; non es passus, nisi similes curationē certam attingerēt: vitæ quoq; integritate probati, quos nulla medendi ignorantia vltus obscurauit. Hoc quoq; ne impostoribus quidē, hominibus tantum-modō deditis mendacio, medendi locū permittis, quod hoc vnū conaris efficere, ut apud oppidanos tuos confestim sanitas integra redeat. At si hoc ipsum, ut perficias, consequaris, pericundum non est, quod deinceps ab huiusmodi plebs tecum decipiat pseudomedicis: & si tanto es animo, à peritorum palestra propulsabis, ac veram medendi artē ex sententia tueberis. Accipe igitur

# EPISTOLA.

(Vellei præclarissime) nostros hos Medicinæ Exercitamentorum libros, eosque a dentibus vitulentis tueate: celsi defuturi non sunt, qui nominis tui laude, ac vitæ integritate patientius iacturam ferent, sese pro defensione nostra ultro offerentes, conuerterentur: id quod præclarissimo nomine tuo ab eis facile consequar. Tu itaque dierum tuorum felicem ætatem strenua animi tui prouidencia hilariter in finem xui tui ducturus

Dei optimi maximi, nutu, vt cupio, sic & aueo: & Rheginum tuum amare vt adsoles, ama, Cura vt sanus

benè valeas. Ex ædibus nostris Rhoma-

nis, decimo Cal. Apriles à Chri-

sto orbe redempto.

1560.





# MEDICINÆ CANDIDATO, ET NATVRÆ

HVMANÆ PIENTISSIMO VIRO,

Ioanni Valentiano, Gulielmus

Rhëginus. S. P. D.



*VT AB A* Snamque aliquid meas esse nugas (*Valentiane Medicorum candidissime*) et si mecum iam pridem hoc habebam, medicina scilicet Exercitamenti in multorum gratiam luci exponenda: Vtuit tamen opum auara parcitas, quæ egentem à Theoricis ad methodicæ artis curationem coëgit, quò subesset liberior ad perficiendum opus institutum voluntas. Nec quisquam sanè mortaliū seculo isto est, nisi vel rarissimus, vel qui dignissimus doctorum patronus vigiliū inseratur, vt nephas putari posse existimet, illustrari literatorum librū. Hoc animo dum satis superque reuoluo, liuoris suspitione ipsum me protinus discutio, tutiorem congratulationem cuius Medicina candidato arbitratus: cui si non ex voto haberem, frustratum iri accusarer. Et ne aris alieni vinētus deprehender, alienum quoque opus hoc iure optimo dici posset, nostra ope, quæ neque opera peperimus, neque bonorum authorum industriam negleximus, deinceps ne alterius cuiusquam vt dicatur, ingenij dexterritate, ac animi candore perfecimus, tradidimusque, quale nunc hoc est, merito tuo, omnibus legendum Medicina amatoribus: vt à librorum farragine vel subleuentur, vel excutiantur: & promptitudine quadam in authorum perquirendos locos per voces Indiciarias fuerint introducti: & penu hoc refertum sanora congratulabuntur, mihi quoque nonnunquam gratiam impartituros minus negabunt. Bene Vale, ex Conclauis nostro Calendis Aprilis, 1560.



# AD GVLIELMVM

RHEGINVM, INSIGNEM

MEDICINÆ ET PHYSEOS

DOCTOREM, P. MARTINI

Carmen lam-  
bicum.



*Argentum, ebur, Corinthium as, gemma Indica,  
Sigilla Tyrrhena, renitens marmor Paphi,  
Solers, tabella, protulit quas & Scopas,  
Parthasius incidit quod & saxum notis,  
Et præmium Graiarum tripodes sortium,  
Et tibi Pyropus, & Smaragdus, Sardonix,  
Tincta toga Tyrio darentur murice:  
Sed fors rota quæ capitur orbe volubili,  
Gaudens & illudere tyrannus hominibus,  
Crudelior quàm nullus est in nos Deus,  
Hoc abnuat mihi. Quid? caput nonne exerens  
Iu altius, contemnit hanc furû, salû,  
Flammæq; prædam, fomitem, hydram quoque mali?  
Nudare res duci sinistra animum ut solent,  
Celant secunda: robur Herculeum indicas  
Sic mentis inuicta arduis rebus tua.  
Donabo sed carmina, redit per quæ boni  
Post fata vita & spiritus, quibus palam  
Fiat vacare noxia Martinum, ob id  
Quod obrutus negotiis fluctu velut,  
Inuisit haud te, sine qui dempto tuas  
Praconio laudes (licet paruo) canet:  
Modò respicias leuidentem non munus, licet  
Tenuis acerra sapius: Laudabilem.  
Prohibet canora virum mori vatum chelys.*



MEDICINAE

# EXERCITAMENTA.

EX SELECTIS LINGVAE VTRI-  
VSQVE AVTHORIBVS, GVLIEL-

MO RHEGINO LVGDVNÆO

ILLVSTRATA.



*Delitera A.*



*Abdomen*, siue *Sumen* *Ἰσχυρὸς* Græcis: Arabibus, *Mirach*, pars ventris circa vmbilicum, octo composita musculis: quatuor obliquis, duobus transversis, ac cæteris item duobus rectis.

*Abdomini* adiacet *Peritonæon*, hoc est circumtensa tunica, siue membrana inferioribus partibus ventris, apparet: cuius functiones, eius quodque suendi rationem enarrat Gal. libro v. de anar. administrationibus: & quarto de vsu part. Celsus lib. quart. cap. primo.

*Abdominis* præterea musculis inflammati pulsus qui fiant: atque ipsorum cognitio, docet Galen. de præsa-  
gatio. ex musculis, libro iiii. cap. de Menyngibus affectis.

*Abdominis* quoque vulnerati curatio petenda ab eodem Gal. Meth. medendi lib. vj. A. Egynetà lib. vi. cap. liij.

*Abdominus* musculi tum ad reddendam vrinam, tum ad alui deiectionem quomodo nobis sunt auxilio, atque ad fœtum expellendum Natur. facultatum libr. iij. fusissimè docet Gal. Sed quid sit *Abdomen*, de Sectione arteriarum idem explana- tor est Gal. Item vulneratum *Abdomen*, & eius dissectio, atque commoda ipsius suē- di ratio: & quæ porro parua eius vulnera tractatu difficilia: ipso quoque vulnerato quatuor ordine agenda: quæ Meth. med. Gal. tractat lib. vj. Insuper vulnerato *Abdo- mini*, medicamenta quæ, & qualia expédiant: atque deligatio, ibidem sunt petenda.

*Abditæ* causæ vocantur in quibus requiritur, ex quibus principis nostra corpo- ra sint, quid secundam, quid aduersam valetudinem faciat. Celsus libr. primo Artiũ.

*Abietis*, *Ἰακκὶ* nostris *Sapinus* dicitur: proceræ arbor & recta, semper virens, Pi- nodusimilis. E' semine nascitur: cuius flos croci colorem similem profert, & semen Vergiliarum post occasum: exiguamque resinam illachrimat. Verum quod hæc ha- ætenus. medicaminibus, & vnguentis inusitata fuerit, nec Diosc. nec Gal. vquam prodiderunt.

*Abietis* duo sunt genera, mas & femina: mas resinam fundit, odoratam, passim celebratam: ob idque passim pro terebinthina vsurpatur. Emollit ventrem coquen- do tussim vntentibus in: totum compefcit. Vuluæ dneti, & renu in calculis remedio est, vrinamque mouet ac foras propellit. Hæc nascitur copiosa in Segusianorum & Ar- uernorum montibus, à qua estate liquor erumpit vulnerata, venique pro liquida terebinthina ad quotidianos vsus. Suspiciat i sunt mediei, etiam docti, Galenum *Abietis*, aut eius lachrimæ meminisse sub hac locutione, *Iniciēs & pinæ resinæ.* &c.

libro iiii. Sanitatis tuendæ: quæ non ex Abietæ, sed Pinu erumpitur. Vide Plinium Nat. histor. lib. xvi. cap. x. Theophrastum de Historia stirpium, lib. primo, capit. xv. apud Aegyptiam, sub nomine Elate, libro vij.

*Abrotanum* ἀβροτάν, duum est generum Dioscoride cap. xxv. libri tertij: & Gal. simpl. facultatum lib. vi. testibus. Vtrunque facultate secundo ordine calidum & siccum. Aegyptia verò, ex Aëcio tertio.

*Abrotanum* cū absinthio marino, vel Seripho videtur Gal. facultatibus inter se confundere. Abrotani herbæ ex Pl. lib. xxj. cap. xj. descriptionem habes: ex Ruellio lib. iij. cap. xxij. Abrotani præcipua facultas ex Aëcio lib. Simpl. medicamen petenda est. Aegyptia lib. sexto Simpl.

*Abortus* ἐμβρυον, infans in utero nondum perfectus, & apte maturum nascendi tempus extinctus. Hippocrates libro sexto Epidemiarum, cap. xij. sic refert: Constat autem abortum hoc diu circuitu fieri: & ut plurimum labores tertio, quinto, septimo, nono, quarto, sexto, & octauo mensibus sunt. Gal. lib. de Symptom. causis ij. Corruptum verò foetum eiicit aut tertio, aut quarto, aut alio quolibet mense, non aliter quàm instante pariendi tempore fauces aperiens. Quære Hippocratem in lib. de foetus natura: & Gal. de foetus natura ex educatione xv. lib. vsus partium. Abortus quo prouocatur, atque eiusdem triplex causa: aut pondus immodicum, aut moles nimia, aut morsus, ut recitat Gal. lib. Facultat. nat. iij. Aëtius verò, Abortus signa, causas, indicationes, & curationem docet lib. xvi. cap. xix, xx. & xxj. Celsus quoque bonus Hippocratis interpretis lib. artium ij. cap. ij. sic ait: Si Austri, pluuiæque hyemem occuparint, ver autem frigidum & siccum est, grauidæ quidem scirminæ, quibus tum adest partus, abortu periclitantur: hæc verò quæ gignunt, imbecillos, vixque vitales ædunt: cæteros lippitudo arida, & si seniores sunt, grauedines, atque destillationes malè habent.

*Absinthium* ἀψίνθιον, ordine primo calidum, & tertio versus finem siccum: propterea adstrictorium, & amaram, acrem simul qualitates possidet. Itaque biliosos ventris humores per egestionem infernam propellit, aut urinas euacuat, pituitosos autem ventres per inferna nihil iuuat. Hæc Aegyptia libro vij. medendi artis. Requiritur quoque Gal. in Simplicium facult. libris, super descriptione Abrotani. Aëtius autem Gal. secutus, Abrotanum vtrunque cū absinthio miscet, & facultate parum differre videtur annuere. Quære Abrotani descriptionem apud Diosc. lib. iij. cap. xxvj. de Seripho, & Absinthio. Quot autem nominibus pollat Absinthiū, ab authoribus petenda ratio est, quod tam varia videatur confundi nomenclatura. Nam Absinthium Romanum, marinum videtur, quod Seriphum fortasse deprehenderetur. Santonicum autem, & Centonita, semen sauton, semen lumbricorum, semen Cynæ, idem simplex esse medicamentum asseritur à Manardo libr. Epistolarum x. Absinthij denique vires, & materiam fusè docet Diosc. lib. iij. cap. i. xxij. & xxij. Gal. autem medicamina in medendi Methodo, lib. vij. Itaque absinthij potio - quando danda, & eius potus ex mulla, quid faciat, & cum cappar, & cum oximelite cataplasma lenit: & quanam vis, & facultas, & quod duplex, & quando vtendum, quoniam ventriculo corroborando idoneum, & iocineri medicamentum excellens, ex eodem Galeni libro persequendum est. Absinthium Ponticum Santonico, & vulgari vires mitiores habere contendit Galenus libro vndecimo Methodi medendi, ubique in integrum describitur.

*Abcessus* ἀπόστημα, ἄλγος ἀποστροφῆς, est affectus, in quo abinuicè distant quæ prius se cōtingebant corpora. Gal. autem sic finit, Abcessus, est mutatio corporis ex inflammatione in materiam purulentam. Excoriat enim circumposita corpora, spacium sibi videlicet molens, vel inrer duas tunicas, vel sub certis membranis, Excoriat autem omnino ipsa copia distendens. Inveniuntur etiam in huiusmodi abscessibus, ubi aliquandiu perdurauerint, vngues, pili, ossa, testæ,amenta, lapides, carbonēs, ligna, & nonnunquam amurca, veluti olei fex. Curandi rationem & methodum docet Galenus, libro secundo, ad Glauconem, & Methodi medendi libro decimoquarto, in quo

quo summaria consideratio, tria abscessuum frequentissima genera, quorum quidem diuisio, curatio nō est. Hippocrates similiter Abscessus triplices, atque ipsorum ad bonitatem, aut malitiam cum cognitione explanat Prædictionum libr. iij. atque ibidem ex eo Galenus. Sed Manardus lib. Epistolarum viij. abscessus triplici via curari posse sic scribit. Melicerida non tam vlceris nomen esse iuxta Gal. & AEgyptetam, quàm abscessus: cuius curatio triplici via compleri potest, putrefactione scilicet, dissectione, & sectione. Celsus verò abscessus minuti in vrinæ fistula quomodo sanitati redduntur, tradit libro Artium secundo. Sed abscessus foris imperentia ex AEgyptetâ querenda est Artis medendi libro quarto. Quando autem fiant, & in qua parte membrorum corporis minùs periculosi, ex Hippocr. libro sexto Epidemia. explanat eius interpretes Fuchsius. Qui tandem febres omnes finire consueverunt diuturnas, & quando, terminanturque, aperit Gal. libro tertio de Crisibus. At abscessus eas dispositiones nominamus, in quibus inuicem distant, quæ priùs se cōtingebant corpora: vt author Gal. est libro secundo ad Glauconem, & in libro de oculis, Theoremate sexto, cap. primo, secundo, & tertio. Abscessuum ergo tria frequentissima genera apud authores medicos habentur: Atheromata, Statheomata & Meliceris, à similitudine in his contentorum dicta: vt author est Gale. Method. libro decimo quarto.

*Abscessus* in vulua, est quando dolor intensus sentitur, & pulsus fiunt, & cruciatus ad genua vsque, & lumbos perrendit, febres accidunt. Sed qui occultus est, interiorum corporum, aut intestinossi mutatio in purulentam materiam facta. Post Gal. lib. xiiij. Meth. quære Vigonem, & Cauliacum proprio cap. Apost. Iterum Gal. lib. ij. ad Glauconem Akakia interprete.

*Abstinencia*, est cibi, potùsque in ægrotantibus detractio, quæ duplex ex Celso libro secundo, cap. xvi. sic inquit. Abstinenciæ verò duo genera sunt, alterum vbi nihil assumit æger: alterum, vbi non nisi quod oportet. Initia morborum primùm famem, sitimque desiderant: ipsi deinde morbi, moderationem vt neque aliud quàm expedit, neque eius ipsius nimium sumatur. Neque enim conuenit iuxta mediā protinus satietatem esse. Præterea abstinencia qualis, si morbus cum leuibus indiciiis timetur, & si cum grauioribus, ab eodem Celso docetur libro tertio. Nam abstinencia magis morbum leuari, quàm cibi satietate: & si nimia inutilis, tamen tempestiua laborantibus vtilis: sanè vbi metus est morbi, abstinencia sola siue villo periculo mederi idem affirmat Celsus eodem libro. Cætera peres in dictione, Inedia.

*Abundantia* ἀλυσία, duplex est, vna qualitatis, in qua nuda qualitas citra humorem excedit: altera est quantitatis, cibi scilicet, & humorum. Abundantia cibi ἀλυσια est, quæ satietas quoque nominatur. Ambarum Gal. docet vacationem lib. xi. Meth. medendi: & vno libello inscripto de Plenitudine. Quære dict. Plethora, & Plenitudo suo loco repositas.

*Acalidis* ἀκαλιδος AEgyptetâ Acalidem appellauit, fruticis cuiusdam in AEgypto fructus est Diosc. pariter & AEgyptetæ descriptione: cuius quidem dilutū claritati oculorum prodest. Itaque adstrictoriæ facultatis esse conicitur. Galenus, Aëtius, & Plinius hanc plantam tanquàm minimè necessariam præterierunt: quam tamen non neglexit Diosc. refert lib. j. cap. c. verum ei vnde sortitum nomen scribit Ruellius.

*Acaria* ἀκαρία, tertij desiccantium ordinis est, sed refrigerantium secundū: est enim peracetera terrosa que, scribente AEgyptetâ. Galenus verò, & Aëtius Acaciæ plantam ipsam esse acerbam, tum siccum, tum etiam succum affirmant. Fruticis descriptionem peres ex Dioscoride libro primo, capite centesimo decimo quinto. Eius loco ex prunellis agrestibus costis succum expressum & insolarum vsurpamus.

*Acanus*, acanus, seminalis, seu acanica spina, ὁ ἀκανὸς ἢ ἡ ἔχνη ἀκανθα, ἢ ἡ ἀκανθὴ ἀκανθα: quæ hæc nomina omnia Calcitrapam Plinij, hoc est Carduum spinis, stellarum modo ordinatis aculeatum, interpretari videntur: & si



Gefnerus diuerſas plantas interpretatus eſt Dioſcoridis leſione libro tertio, capit. decimoſexto, & decimoſeptimo. Nam Io. Agricola ſuſpicatur *Acanthium*, aut *Acanthum*, *Carduum benediſtum*, non tamen eſſe affirmat, dum interpretatur Dioſcoridis, cap. xvi. libri iij. & Plinii cap. xv. libri xxi.

*Acanthus*, & eius diminutiuum *Acanthiū*, ἀκανθα, καὶ ἀκανθίον, Brancha vrfina herbariorū eſt. Gefnerus diſcriminatim plantam verāque depingit: additque tertiam, quam ſylueſtem facit Dioſc. imitatione libri iij. cap. xvi. & xvij. Manardus duplicem *Acanthum* pro Brancha vrfina memorat lib. ix. *Epistoliarum medic. Facultates* docet Gal. lib. Simpl. xi. *AEgyneta Artis medendi* lib. vij. Aëtius libro primo rei medices, *Acanthum Pæderotam*, ſive *Melamphylon* eſſe teſert: cuius folia mediocrem excutiendi vim habent: radix verò exalta & toria parum: ſed excitatoria, tenuiſque ſubſtantia eſt.

*Acantha* leuce Dioſcoridis, & Galeni, videtur bedegar *Setapionis*: quæ diſſert à Spina *AEgyptia*, ſeu *Atabica*, quas nunquam viſiſſe ſe ſatetur Manardus. Hūc quidem ſcrupulū ut diſſilem diſcutit Syluius libro primo de medicament. ſimpli. narura. Quære diſt. Spina alba, & *Lencacautha*.

*Acanthiaruicula*, *Carduellis* noſtras eſt: nomen retinens à carduorum granis, quibus paſcitur: indeque calculo, & inteſtinorū tormentibz vexatis bene facere vel eſa, vel torrefacta in poliſinēque ſubaſta ac bibita cum quopiam diluto, creditur.

*Acerbum*, ἀσπερδόν, Græcis, qui quidem ſapor eſt linguam vehementer aſtringens, & veluti ligans: qualem glandes maximè præ ſe ferunt. Hunc ſaporem Arabes Ponticum vocant, eos *acerbum*. Acerbus ſiquidem ſapor linguæ noſtræ ad motus, validè deſiccatur, contrahit, & in multā profunditatem uſque exaſperat ſicut *αγροαπ*, hoc eſt, pyrum ſylueſtre immaturum. Gal. locorum affect. libro ſecundo.

*Acidus* ſapor, ut pote tenuitate corporis pollens, incidit, diuidit, & extenuat obſtuctiones auſert, & expurgat.

*Auſternus* ſapor, in profundum etiam ſubire videtur, atque aſperum quandam inæqualēmque ſenſum mouere. tanquam reſiccans, & humorem omnem corporum ſenſuum depaſcens. Galeni lib. quarto Meth. medendi, & iij. lib. de Temperamentis.

*Amarus* ſapor, calidus & ſiccus eſt: hinc eſt quod ea quæ amaro ſapore ſunt prædita, omnium minimè putreſcant. Itaque amara ſapote meatus expurgant, abſtergunt, extenuant, & incidunt craſſos humores. Salſa itidem calida & ſicca ſunt, linguam dum contingunt, neque contrahunt, neque conſtipant: imò contra planè agere apparent, nempe detergent & abluunt.

*Acridus* ſapor, cum valida quadam qualitate mordicat, & erodit, cui contrarius ſapor dulcis temperata ſua eſt: nam dulce onine calidum eſt, & laxat, emollit, concoquit, & rarefacit.

*Acer* autem ſapor, eſt igneus, calidus, tenuis: ob id caſcit, tenuat, incidit, trahit, digerit, purgat: menſes, vrinas & ſudores mouet: vrit, exedit, liquat, cruſtam facit. Horum ſaporum diuerſitas petenda eſt lib. iij. Gal. de Simpl. med. facultatibus. Sed ſaporum nomina ad odores tranſferri docet Ariſtoteles, non contra quod commendauit diligenter Manardus lib. viij. *Epist. medicinalium*.

*Accessio* febrilis τὰ ποσὶν ὄντος, eſt cuius principium, quod extremis partibus reſtigationis ſenſum præbet. Incrementum, eſt vbi ſtigit ſtigit, corpus verò incaleſcit, non tamen exquiſito calore. Vigor, vbi æqualiter calor in totum inſunditur corpus, minimāque eius particulas obſidet. Declinatio, eſt vbi calor diminuitur. Quarum partium perſcrutandarum, Gal. author eſt lib. ij. de Differen. febr. cap. decimoſexto decimoſeptimo, & decimoſexto. Verum in acceſſione ipſa quosdam nutriri debere aduertendum eſt, teſtante eodem Galen. Method. medendi libro decimo: at in acceſſionis principij more quæ notanda, aut ante acceſſionem quando pernicioſiſſimum cibare, ipſo eodem Galen. per diſcendum libro vnderimo. Mei hodi med. Accessus enim duo ſunt, ut ſcribit Gal. in commentariis libri tertij Ptædicti Hippoc. temporum in morbis, ut aut acuti, aut diutini nomenclatur. & c. Ob idque

in morbi



in morbi augmento accessiones contemplari iubet Hippocr. & si ceteris fiant, an tardius, Gal. de Crisibus lib. i. Quare accessione prima, quotidianam, tertianam, quartanam, ardentem quoque, & non paucas alias febres prænouit Gal. lib. de Crisibus ij. Accessionis repentine quæ occasio, & quæ accidentia, & quæ ad integritatem desinentis accessione causa, docetur à Gal. lib. ij. de Differen. febrilium. Atque accessio æqualis quid, cuiusque discrimina habentur de Diff. febr. lib. primo.

*Acetabula* Κοτυλιδῶν, oscula vasotum ad vterum venientium nuncupantur quòd scilicet eminentias ad concauarum in cirrhīs polyporum partium similitudinem innascentes habeant. Praxagoras, vt retulit Gal. Aphorismo xlv. libri v. Aphor. Hippocratī, sic finiuit: Acetabula sunt ora vasorum arteriarum, & venarum quæ se tunc ad vterum: quæ si plena fuerint pituita, menstrua fiunt pauciora: quæ si clausa, menstrua deficiunt. Gal. lib. xvj. de vsu partium apertè docet Acetabula officia esse venarum, quæ ad matricem perueniunt, non posse ipsa Embryonem portare cum mucilaginis facta fuerint, sed præ pondere permittere abumpi. Idem ipse libro primo de Semine, & in quinto libro de Hippocr. dissectione, vuluæ acetabula, & ipsorum functiones, atque vtilitates ad conceptum getendum, & alendum, scriptum reliquit: non minus porro fuisse in lib. de fœtus formatione, quem ocyus perleges plurimum concipiendi causa studios.

*Acetabulum*, quod vocant oxibaphon, sextantem complet, est & acetabulum, hoc est, cotyle, quod aliquibus appellatur, & in superficie ossis grandioris situm, ab ocularis sinus similitudine. Rursus acetabulum, quod genus mensuræ est, sesquicyathum implet, & quarta heminx pars est: olei drachmas habet octodecim: pondere denarij quindocim: vini sextantem vncias duas, & scrupula duodecim: mellis quadrantem, & scrupula nouem, vel selibram capit.

*Acetabulum*, seu veneris vmbilicus, Κοτυλιδῶν est: solio in acetabuli formā tortuato, cōcauo, breui in medio cauliculo, in quo semen inest: radice oliuæ modo rotunda. Dioscorides libro quarto, de re medica, cap. lxxvij. Gale. de Simpl. facultat. medicina, libro septimo. Cotyledon, siue vmbilicus veneris, est mistæ facultatis, parum adstringentis, & leniter amaræ. Credisur folia cum radice manducata calculos confringere, & vrinam mouere.

*Acetum*, crassis partibus, & fecibus, seu feci propotione respondentibus, calidum videtur, non tamen causticum: tenuibus partibus frigidum, idque magis, quàm calidum, aut fortè frigidum per se, calidum per accidens. Nam substantia modicè calidum est, plurima parte frigidum, & tenuium partium, si est acre admodum & vini qualitatē nihil representans: vt author est Galenus, libro i. Simplic. Aëtios tamen libro primo de Re medica, asserit acetum eximie refrigerare, & facillimè partium subtilitate pertransire. At Galenus, libro vdecimo Method. medendi, refert acetum non solum esse subtile partibus, sed & ipsa reperiensiuā vi non parum affine est: ob id quoque vtiliter eo vtuntur in principio lationum tofaceo oleo miscentes. Celsus medice materię esse acetum scribit, sanguinemque suppressere, vlcera non tamen sanare, verum Aspidis istibus contrarium. Itaque quid acetū, atque eius vsus in Schichis salutaris: tum simul humectare atque refrigerare si velis, a quæ tantum miscendum quòd mistas obtineat simul qualitates, quibusdam ægris commodum, alijs incommodum tradit Gal. in lib. Metho. medendi xliij. & Sanitatis tuende lib. quarto. Dioscorides acetum multiplex ac varium ex simplicibus medicamentis conficiendū, tum denique vsum describit de materia medic. lib. v.

*Acetum* στυφνόν, quod intensum austerum est: at id adstringens dicitur, quod Austerum percipitur: quod quoque Græcis στυφνόν dici solet: de quibus traditum est à Galeno in libris de medicamentis. Porro prodirum de natura horum est tum in tertio de Temperamentis volumine, tum de Simpl. medic.

*Acinus*, siue Acinum genere neutro ἄκων, vineæz vux, & sedetacez granum est. Sed inter vuarum acinos, acinum pro Oleastro, hoc est, Ligustro, siue olea inculatæ, quæ Græcis Κοτῶν est: & acinum ἄκων pro herba, id est, Basilico humili, Gesne:

rus vult appellari, Aconos Græcis dicitur, vt tranſtulit Ruellius Dioſco. caput xli. libri. ij. De Acinis mali Punici, & vuarum vinacear. Manardus meminit in Marcel- lum lib. Epiſtol. medicinal. viij. Epiſtola prima.

*Acylon* fructus arboris Phellodryos, id eſt, Illicis: quæ proprie Suber cognoscitur. Vide plura in diſt. Suber.

*Aconitum* ἀκόνιτον vulgus Thoram appellat. Longè quidem differt Aconitū herba, ab eo mineræ genere, quod Arabibus Reagar nuncupatum eſt, quod tamen Gefnerus Aconitum putauit. Alterum præterea Aconitum, quod eſt. herbæ genus, Param Lupinam vulgò dictam, facit: cui tamen ſi lycoſtonon λυκοſτονον nomen eſt. Horum ſimplicium Dioſco. lib. iij. cap. lxi. & lib. vi. cap. vij. apertè diſcrimen faciens, facultates complectitur. Aconitum Galeno herba pardalianches eſt: alterum autem Aconitum lycoſtonon facit, libr. Simpl. medicament. vj. in quo diuerſis viribus eſſe oſtendit.

*Acorus*, ἀκορον, neque galanga myropolarum eſt, neque calamus aromaticus Arabū, ſed xiphyo, id eſt, gladiolo ſimilis: flore luteo lilij candidi figura, non colore, naſcens locis paluſtribus: radice oblonga pollicis craſſitudine, colore rubicundo interius euergente proſpicitur. Huius radices vires recenset Dioſco. lib. primo de materia medica. cap. ij. Manardus lib. Epiſtol. medicinalium vj. epiſtola iij. quories Acoro opus eſt, vtur non vulgari illa radice, & iniucundi odoris, ſed vocato Aromatico calamo vti conſuevit. Acorum Gal. guſtu acre eſt, & modicè amarum, odoréque non iniucundum Itaque facultatis calidæ eſt, & tenuis conſiſtentiz. Atque eo vtebatur Galenus, qui hodie Calamus aromaticus præcticis appellatur. Aërius Acori radicem ordinis rectij caſſacientium eſſe, & ſubſtantiz tenuem probauit: cuius ſuccus tunica oculorum cornez antiqua vlcera abſtergit expurgatque.

*Acontiaz* ſerpens eſt, qui vbi multum ſe extendit, ſeu iaculum quoddam, corporibus inſiliens, ſic perimit, vt Gal. author eſt in libro Theriacis ad Piſonem. Sunt & Acontiz, cometarum genus, qui iaculi modo vibrantur ocuſſimo ſignificatu: ſicut ſcriptum reliquit Plinius lib. Nat. hiſtoriz. ij. cap. xxv.

*Acylon* ἄκυλος Suidæ, Illicis arboris forminz fructus eſt. Plinius lib. xvj. capit. vj. Illicis glans viriſque breuior, & gracilior, quam Homerus Acylon vocat eoque nomine à glande diſtinguit: ſed maſculas Illices fructum ferre negant. Dicitur etiam hoc nomine fructus arboris cuiuſdam, quæ mediam quandam naturam obtinet inter Suber, & Quercum: quæ ob id Phellodrys vocatur.

*Accipiter* ὁ ἵπας Græcis, Sacer ales Latinis, id eſt, magnus ratione minorū ex præda viuū. Accipiter namque Aquilam æquat: propterea falluntur qui Accipitrem Epaructrium eſſe volunt, quando vox indicat auem vulgò Sacre appellaram. Huius ſiquidem oua ilioſos conferre boni authores aurumant, caro autem ad quid, nondum legi. Plura leges apud Ariſtotelem de Natura animalium: & apud Aëlium, atque eius interpreterem P. Gillium.

*Acorna* ἀκόρνα carduus eſt, cuius rupto capitulo, in quo pappuli continentur ex flore ſubluteo candicante, emittitur pro ſucco lac. Hanc plantam ab Atractilide, id eſt, ſuſuſculo, carduo campeſtri, cuius eſt ſlauus ſlos, & ſuccus coloris ſanguinei ſpeciem æmulatur, diſſerri hac cauſa palam eſt, ex Dioſco. lib. iij. cap. lxxix. Galenus tamen ſi Gnicum agreſſem Atractilidem interpreteratur lib. Simpl. med. vj. & hæc planta ex ſpinarum eſt genere: facultatem quoque habet deſiccandi: & modicè digerendi qua ratio medici poſteriores vtuntur.

*Acredula* ὁ ἀκαλγῶν auis canora, quæ noſtris Calendula nomen obtinuit. Ex earum genere eſt, ex quibus futura tempeſtas prædici ſolet, vt ſuſpicarur eſt Cicero lib. primo de Diuinatione ex Arato poëta. Et matutinis Acredula vocibus inſtat. Auis hæc colica vexat ſi auxilio eſt. ſi roſta editur.

*Acuta* ſpina οξυακάνθα Berberis, cuius cortex medianus radicis Bugia pharmacopolis nuncupatur. Plantæ huius maturis iam acinis, & expreſſis cum ſaccharo fit ſyrupus febrilibus ardentibus vexatis, gratiſſimus. Dioſcorides libro primo, capit. cv. de hoc

de hoc fructus dictu mira refert: & quicquid in se complectitur vsui medicinae est. Galen. lib. viij. Simpl. Pyro sylvestri similem habere speciem, & vires non dissimiles prodidit: quin & ipsi fructus pates quidem vites, cum prorsum atque absolute piri sylvestris fructus amarus est.

*Accidens*, est quod contingit eidem inesse, & non inesse: sed in subiecto semper subsistere: quas accidentis partes in Olympicum Gal. lib. primo nichil diligenter pertrahat: ostendens in sanis corporibus accidentia quae dicantur. Cur item accidentia non noceant actioni, si ea à quibus actio est suam habeat naturam in agente & patiente, disputat idem ipse Gal. principio lib. ij. meih. Accidentia sanis quidem nobis, quae constitutionem (vnde actio nascitur necessario) sequuntur, vocantur: aegrotantibus verò symptomata. Sed quomodo nobis accidentia locorum affectorum notitiam inducent: ab eorum quoque proprietate affectuum indicia nobis oriuntur. Affectuum locorum lib. primo, & ij. explanat Gal. Nam quod duplex est accidens, accidentiumque pugna, lib. de Differenti. Febr. primo & ij. ministrat Gal. Quae sunt insuper cum in hora crisis apparent accidentia: deinde si non sit crisis, quandoque mortem significant: sicut primo lib. de Crisibus traditur. Itaque accidentium, seu Symptomatum tres sunt differentiae, aut enim in laesionibus actuum sunt, aut in proportionibus quae detinentur vel vacuantur: aut dispositiones existunt corporum, non enim utique quartum demum genus in Symptomatibus ponendum quemadmodum Methodi med. lib. xij. fufius à Gale. traditum est. Sic sanè ut accidentia morbum sequentia non nisi morbi ipsius significationes sunt: Locorum affectuum lib. primo expoditur. At accidentium genus in tres diffunditur differentias, in nocuum aut scilicet functionis, & accidentia corporibus, & immoderationes eorum quae excernuntur, in libro de Artis constitutione à Galeno declaratur: ut etiam de morborum symptomatum lib. ij. triplicia assignat Accidentia: Alia enim, qualia corporis vocantur, actioni repugnantia alia: atque alia subsequencia, ut quid per accidens intellegere debemus: primo libro & quarto Symptomatum exequutum est eodem auctore.

*Acidum*, ut corpus simplex, acidum, & quodcumque simile, dici potest: ac commixtum, cum eo cum quo compositum est, facultates commixtas, & non simplices obtinet. Acidum praeterea aliud occurrit, quale quod ab Hippocrate Aph. lib. vj. iniquiente, Acidum eructantes cur non valde morbo laterali corripuntur: quod quidem una cum flauis, ac tussi, fit pituitis, ex biliosis humoribus ortum habens. Scilicet quoque immiscet spumeis, ex pituitosis humoribus, sicuti quod cum nigris fit spurta ex melancholicis. Rectèque ob id à Celso lib. iij. Artium, capite ix. obseruatum est, Acidum maxime conuenire lienosis, & bile atra affectis: quibus dulcor omnis contrarius est. Actio, est agentis motus quae non impeditur nisi laesa prius substantia: atque ipsa cum passione est in fieri, ut refert Gal. lib. iij. de Symptomatum causis. Itaque actio, seu functio, operatio v. est motus actiuus, qui à facultate procedit: ideoque à Grecis *ἰσχυρία* dicta est. Est ergo facultas actionum causa, proinde ac perouente, nulla vnquam sequetur actio: quae in corpore humano duplex deprehenditur, vna animalis seu voluntaria, quae à neruis, & musculis procedit: & est ea, quam cum si cedere poteris ubi velis: & cum non sit, excitare: ut motus crurum, quam sedare dum sit & rursus excitare quiescentem, & velociorem & tardioorem efficere poteris. Accedit ad haec voluntaria actio triplex, prima enim sentiendi actio est, & haec quidem quintuplex, videndi nimirum, audiendi, odorandi, gustandi, & tangendi. Altera animalis actio mouendi, vnam duntaxat motionis speciem voluntarie scilicet obtinens. Tertia princeps, quae sanè triplex imaginatio videlicet, cogitatio seu ratiocinatio, & memoria. Quare actionum noxae sunt primae differentiae, vel enim sunt animalium, vel naturalium. Iterum animalium actionum noxae trifariam secantur, vel enim sunt sensilium, ut est visus, auditus, gustus, odoratus, & tactus amissus prorsus, hebes & deprauatus. Vel sunt morticium actionum, ut est imaginationis, cogitationis, & memoriae abolitae, deficientis, vel deprauatae. Quare dict. Naturalium Actionum.

*Actio*num noxæ sunt, quæ ipsarum actionum instrumenta affecta esse aut primitiue, aut per accidens, declarant: Galeno expositore libro primo locorum affect. capit. primo. Sed actionum noxæ symptomata sunt alia, alia corporis nostri affectus, alia quæ vtrâque per immodicas excretiones, & retentiones sciuntur.

*Actio* læsa, heque corporis constitutionem dantaxat prodiit, sed & partem patientem. Nulla siquidem actio læditur, nisi pars & instrumentum, quæ ipsi efficiat, pariatur: id quod in naturalibus instrumentis accidere euidentissimum est, quæ cognatam vim actionis obtinent: quoniam naturalia quidem instrumenta, ab animabus differunt: ob idque actioni plura destinantur instrumenta, vt docet Galen. de Vsu partium libro duodecimo. Atque actionis vsus, partis quoque differentia, tum eius definitio, cognitiôque cuius vsus inuentionem præcedit, expenditur ab eodem Galen. vbi supra, necnon libro primo. Cæterum actionis imbecillitas præter naturam dicitur læsio: sed quomodo sumenda sit ex Galen: consulendum Sanitaris: ruendæ libro primo: quia actionis vitium membri se habentis præter naturam sensu deprehendimus. Atque actiones in pueris corporales pollent, animales in reliqua ætate: quod scilicet actiones suas necessarium est vnicuique secundum naturæ cursum perficiat, Gal. Meth. medi. lib. ij. & libro sexto Sanitaris tuendæ.

*Actio* siquidem membris consimilibus efficitur: atque in compositis aliquot membrorum simile possumus est, per quod actio efficiatur: sed certè partes ad hoc conditæ, vt membrum illud per quod actio fit, adiuuaretur: vnaqueque tamen propriam suam habet actionem, ij. Meth. med.

*Actio*ne item sicut egemus, ita & compositione quadam necessitate cogimur, quod compositio actionis causa videatur, ex Gal. Meth. ij.

*Actio* insuper sequitur corpus, atque ab eo procedit, vnde secundum propriam naturam actionis necessariò cursus in naturam eandem concurret: & contra: vt Method. libro primo tractatur. Cæterum actione sana existente, & si corpus inuretur, morbus in eo minimè vocandus: quia cura necessaria non est, nisi ei solum mutationi, quæ prædictæ nocet actioni: quod actio videlicet & corpus tota natura dissident ex Gal. lib. primo Method. medi.

*Actiones* naturales Celsus Artium libro secundo, capit. primo, corporis quidam appellant, per quas spiritum trahimus, & emitimus: cibum potionemque assumimus: & coquimus: itemque per quas eadem hæc in omnes membra totum patris digeruntur. Quod videtur Celsus confirmare lib. primo suæ Artis, cap. eodem dicente, Actionum naturalium cognitionem vtilem apprehendi functionibus.

*Actus*, est qui in subiecto significat agitationem aliquam, vel substantialem, vel accidentalem. Quippe dissidet id quod actu & secundum apparentiam tale est, ab eo quod potentia seu facultate est. Actus enim est, quod iam præsens est: potestate autem, quod adhuc futurum est, atque vt fiat id quod dicitur, veluti habile, non tamen adhuc subsistens. Gal. de Temperam. lib. iij.

*Actus* calida, frigida, humida, sicca sensus sunt iudices: vt sensibilibus obiectorum propiorum & communium, vt ratio intelligibilium: cuius sententiæ Gal. lib. ij. Temperamentorum auctor est: at actu energeiæ qualiter sumuntur, ab eodem auctore lib. primo Temperam. tractantur.

*Acutus* quidè morbus vocatur, cuius febris magna ex parte continua est: in qua cum fuerit sine magna inflammatione, nedum extrâ refrigerare, sed exuri cōtingit. Cum verò inflammationis calor adeò vehemens fuerit, vt ad se trahat per modum cucurbitulæ ex toro corpore sanguinem, iis qui ita se habent, viscera peruruntur, extremitates autem partes friget propter defectum sanguinis ad viscera. & ex. ex Gal. Aphorismo r. ij. v. aphorismo primo. Sicuti autem in febribus, ita idem in aliis morbis est agendum. Morbus enim lateralis, & qui perineumonia, & phrenitis, morbi acuti sunt: angina autem, & choleta, & distensio neruorum, peracuti, & ex. ex interpretatione Gal. super primo lib. Aphorif. Hippocr. aphorif. xij.

*Acuti* morbi ad suum vigorem celerrimè properantes, per tertium repetuntur, quia paruo tempore magnas faciunt permutationes, hoc est, indicationes: aut sexto, aut septimo

septimo die ex cui incipientes ad vigesimum terminantur: quinto verò, septimo, nono die iudicari possunt: sexto item, sed non bene. Quarto, aut quinto die continui vehementes, & fieri incipientes ad decimum septimum diem progrediuntur. Ita que morbi acuti quomodo morūs habeant inæquales, Galenus legendus est Hippocrati: Aphorismorum lib. ij. Aphorismorum xliiij. Crisibus lib. iij. & lib. j. Item Hippocrati in libro qui inscribitur de Præcognitione: & lib. ij. de Diebus criticis.

*Adamantis à δαμαντίς*, herba Armeniz, Cappadociæque alū na, qua admota leones resupinari ferūtur hiatu laxo. Nominis rationē magi tradunt hanc, quod cōteri nequeat, quemadmodum nec Adamas lapis. Pl. lib. xxiiij. cap. xvij.

*Adamas à δαμαρ*, lapis inter omnes precij maximi, cuius in re modica nullus vsus: quoque sua duritie, nisi hyrcorum recente & calido sanguine, infrangibilis: quod sanè fallum compertum est. Eius genera quatuor Pl. libro vltimo Natur. historie, cap. iij. mirantur.

*Adarces*, Dioscoridi à δάρκυν, falfugo quædam gelata, palustribus in locis, humidèque humidis, proueniens quibus exsiccatīs condensari solet, atque arundinibus adhærere. Tradit Plinius lib. xvj. cap. xxxvj. nasci in cortice calamorum, sub ipsa cor na ex spuma aquæ marinæ cum dulci commixta: ob idque à nonnullis arundinacæ lanuginem vocari. Eius vires, & in medicina vsus docet Gal. lib. xj. de Simpl. medicament. facultatibus.

*Adelphydes à δελφιδες*, palmæ species Plinio lib. xij. cap. iij. sapore quàm proximè ad caryotas accedens: vnde & adelphydes, quasi caryotarum forores.

*Adenes*, glandulæ sunt carne rata, laxa, & spongiosa compositæ, in enūstoris corporis sitæ: vt in inguinibus, alis, & post aures: partium nobilium acrem humorē per vim excretotiam recipiendum aptæ, tum ob substantiæ suæ laxitatem, tum quod omnium partium minùs virtute naturali sint præditæ. Ipsi quinetiam inflammatis cum febre apostemata, quæ bubones dicuntur, gignentes patiuntur. Sed hæc qualiter fiant Gal. ad Glauconem lib. ij. & ipsorum curandi rationem docet.

*Adenes*, siue glandulæ in inguinibus & alis tum intumescunt, tum phlegmone occupantur, cum defluerem ad vltimos artus sanguinem priores excipiunt, vt & propter vlcus, quod in manus, aut pedis digito sit. Quinetiam in collo, & secūs aures, sæpe numero glandulæ, iis quibus in collo, & capite, vel aliqua vicina parte vlcus est natum, intumescunt hæc Gal. lib. xij. Meth. medendi.

*Adenes* quare fluxiones facillè recipiant, & quæ pro firmamento sunt, quarum quoque est vsus schitrosq; hæc harū quinam vsus, tum curatio docetur eodem Gal. Meth. medendi lib. xiiij. & lib. ij. De differentiis febr. cap. xv.

*Adipsi*, crasso oleo similis, cetebro humidior, quæ circa iecur cohere minimè potest: neque circa arterias venasque, neque circa cor sed nec circa aliam præcalidam partem: cogitur autem per id quod est frigidum vāldè: ob id humidissima esse adipem commodè veteribus dictū est, ab animalibus adipe ob eis hyeme delitescētib; quod in his sit plus corpulenti adipis, quàm temperatū: & hæc torpescere desidiosè frigiditate naturæ: quod memoria scriptum reliquit Gal. lib. ij. de Temperamentis.

*Adipsi*, non semper simul augerur pro carnis portione, sed alij plus carnis, alij habent plus adipis: quibus autem plus adipis est, in his frigidi plus est, quàm humidi: atque ratiocinandum est quando carnis copia corpus magis minùsue abundat: eodem Gal. lib. de Temperamentis.

*Adipsi* à pinguedine spissitudine differt docet Gal. lib. xj. de Simpl. medicamēt. atque ipsius electionem, lib. ij. ad Glauconem: tum quoque cū ipsa vtimur quid proficiat, auctor est Gal. lib. xij. Meth. medendi.

*Adynamon à δυνάμις*, vini factitij genus ex musto albo factum, aquæ parte dimidia addita, quod admotum igni decoquebatur, donec aqua injecta euaporaretur. Dictū est autem Adynamum, quod esset tenuium partium: ideòque ægrotis exhibebatur, quibus vini noxam metuebant.

*Adipsarheon à δὲ ψαρθρον*, ἢ ἀσπιδωθρον, strutex est surculosus, spinis multis horticis, qui in

qui in Syria, Rhodo, atque aliis diuersis regionibus nascitur, & ad vnguentorum spissamenta vsus. Variis nominibus, secundum regionum diuersitatem appellatur. Ruellius suspicatur id esse, quod ab Officinis pro ligno Rhodio vsurpatur. Quæze Diosc. lib. i. cap. xix. & Plin. lib. xxiii. cap. xij.

*Adipsæ* dicuntur medicamenta quæcunque sitim vel extinguunt, vel obrepere prohibent: quæ modum Alima, quæ fami obsistunt. Rei vtriusque author est Plutarchus in conuiuio sapientum.

*Adipsos* à *ἀδῖψος*, palmæ viridis species est, odore mali cotonei, nullo intus offe, simillimum myrobalano in vnguentis vsum habens. Dicitur & Phœnicobalanus ubi maturaret. De quo vide Plin. lib. xij. cap. xxij.

*Adipsos* præterea radix est, olim in Scythia, nunc in Franconia Germaniæ nascentes: quam à dulcedine etiam Glycyrrhizam appellant.

*Adonium*, à *ἀδώνω*, abrotani species suspicatur: quam herbam quidam opina ti sunt eam esse, quæ ex Adonidis sanguine fabulois nata est: vnde illi postea nomen Adonium inditum sit.

*Abrotani* grandior species, quæ Auemoni habetur, Theophr. quidem descriptione, suspicatur. Quæze dicit Anemone.

*Aër*, est sine quo nec morbus tolli, nec rueri sanitas potest: qui & multis aliis, & hoc potissimum nomine medico considerandus venit, quod calor nativus eo ad sui conseruationem indigeat. Nulla denique eius euitandi ratio est, sed inuitis etiam nobis hauriendus, & quouis tempore præsentis celi statu vtendum. Optimum aërem censeo, inquit Gal. Sanitat. tuendæ lib. primo, qui prorsus sit purus, qui optimus in pulmones trahitur, omnibus iuxta salubre est. Eiusmodi verò fuerit, qui nec stagni vel paludis habitu sit infectus, nec ex profundo specu pestilentem auram spirat, qualiter in cloacis vrbium multarum visitur. Itaque aëris delectus, vsus quoque diligendus est, qualis à Galeno lib. primo Sanit. tuendæ commendatur.

*Aëris* temperamentum nobis est veluti medicamentum ad vlcera sananda: nam qui immoderatè calidus, & humidus, contrarius est: Meth. medendi libro tertio, & de Differen. febr. primo, cap. vi. quia aër impurus omni ætati noxius: purus nulli non ætati utilis: sic optime temperatus optimo temperamento præditis corporibus saluberrimus: vt frigidus calidæ qualitatis: calidus frigidæ, humidiori siccus sit utilis. Quare aër nobis circumfusus qualem habuerit temperiem, ita etiã & nos afficiet: vt est Galenus author lib. de Crisibus ij. verum in libr. de Respiratione scribit Galenus aërem elementum non esse. Est enim aër, inquit, corpus dissimilium partiũ habens caliditatis & frigiditatis in seipso partiunculas: vnde nec elementum aër est.

*Aëris* nos ambientis temperies, vel intemperies, propterea quod noscitur, sicut & pharmacum oblatum, afficit, inquirenda est: proinde cum calor seu frigiditas ei dominatur, sanitatè vulnerum internorum & externorũ prohibet: ob idque oportet id pharmacum constitui quod facultate aëri repugnet: quod diligenter quidem animaduersum ab Hippocrate, qui frigida temporibus calidis, & frigidis calida tempora temperabat.

*Aëris*, cæterorũque elementorũ additur & hoc discrimen, cum dissimiles sint in diuersis qualitates, hoc modo tamen discernuntur: in igne excellit calor, in aëre humiditas, in terra siccitas, in aqua frigiditas. Sed aqua sensibilis humectat, quia est desior aëre: ignis magis desiccatur, & aëre calidior, quia ibi calor coniunctus est, cuius vis est valde effica, vel in congregandis homogeneis, vel in dissipandis, & resoluendis heterogeneis: sit igitur in his faciliior desiccatio.

*Æromeli*, id mel aërium Galeni est, Manna Arabum, liquida & granulosa: quam Persicam manuam laudat Actuarius, Cuius hæc subalba sit, & recens, ex planis odoratis collecta, Laricea hodie probatur. Vide plura in dict. Manna.

*Adiantum*, siue capillaris herba, vt Gazzæ placet, à *διαντος* Græcis nomen est, vulgò Polytricon. Triplex Dioscoridi esse videtur: primum polytricon, Theophrasto Adiantum album, Gazzæ capillum veneris versum. Alterum nigrum, Trich

Trichomanes nomine: vulgus polytricum ei nomen assignat. Tertium foliis filiculæ, vulgò Adiantum. Quartum etiam his hoc seculo additur, Salvia vita appellatione vulgi dictum. Arque his hæc hysteris, hydropicis, & renum doloribus affectis: atque hepatis, lienisque obstructioni quia medentur, tibi hic cum cæteris simplicibus planarum medicamentis, tradidimus: ru tamen facultates, peres ex Diosco. lib. iiii. cap. cxx. & ex Galeno. lib. Simpl. vi.

*Adstiter* glandulosi *αδυστήρες* & *ἀδυστήρις*, in collis radice sunt, in hoc à natura creati ut vesicæ ceruicem ac urinariam fistulam humectent, ne resiccata mobilis & grè reddatur. Nervi ex quibus generales partes dependent *εμψήφες*, quasi pensiles nominantur. Testem utrunque operiunt duæ membranz, quarum interior tenuis est, peruosa, & exanguis, necnon alba, Græcis *εμψήφιδος* est, non sanè quòd rubicunda sit, sed quòd velaminis seu putaminis formam habeat. Supra iam dictam membranam validior est, internè ima eius parte vehementer in hærens, *ἀέπρον* Græcis est, latinis didimi. Hæc pudenda sunt, quæ ex ossibus pubis atque superis earum partibus prodeunt, ligamentis & tendinibus affirmata.

*Adeps* seu pinguedo omnis calfacit, humectat inagis vel minùs pro varia animalium natura. Leoninus adeps calidissimus, siccissimus, minimùmque humidus: pardinus ei proximus: dein vrsinus, atque hunc sequitur taurinus: suillus autem propè omnium humidiss, atque humanovicinus. Hyrcinus crassior taurino, sed inter taurinum & suillum fuerint vulpinus, caninus, melinus, felinus, lepusculus, camelinus, equinus, vaccinus, vitulinus: omnium maximè terrestris asininus: asnerinus tenuiss est partium in volucrum genere: gallinaceus illi proximus: humanus temperatiss. omnium. Adeps cerui omnibus est inferior, ut est author Gal. lib. primo Pharmacorum secundum genera.

*Ademum* affectiones esse bubones, phymata, & phygethla, scribit Galenus eo inter se differentes, quòd bubo phlegmone absolutè est: phyma statim ab initio augescens statim ad suppurationes tendit: phygethlon verò est vel phlegmone erysipelarodes, vel erysipelas phlegmonodes.

*Ademodia*, est ex dentium stupore dolor grauissimus: dentitio quidem simplex in dentibus ex fructuum immaturorum esu stupor est.

*Adequinoctium*, est cum sol in primo libræ gradu existit, quo tempore ex æstate antecedit occasum: quod ex Galeni doctrina sic intelligatur, Vergiliz septem Rellæ sunt in Tauri dorso positæ, quæ medio vere cum sole oriuntur, Pleiades Græcis dictæ: quæque medio autumno, cum sol est in Scorpio, occidunt: hoc est, ab æquinoctio autumnali diebus ferè quinquaginta: est enim Scorpius Tauro, in quo ipsæ sunt, ex aduerso locatus. Cum igitur Sol cum Scorpio oritur, oppositus Taurus occidit cum Pleiadibus. Adequinoctium verò, quod antecedit hunc occasum, & cum Sol in primo libræ gradu existit.

*Adequalitas* temperaturæ, est in omnibus temperatis animalibus, stirpibusque, non ea quæ ex pari elementorum commixtorum spectatur mole, sed quæ rum animalis, tum stirpis naturæ conuenit: ut Galenus est author de Temperamentis libro primo.

*Adæqualis* intemperies aliàs provenit ex nudis qualitatibus, ipsis corporibus, aut calidioribus, aut frigidioribus, aut siccioribus, aut humidioribus redditis, aut etiam ex horum coniugatione affectis. Atque æqualis quidem intemperies omnino sine dolore est: veluti indicat & hæcicæ febres, & multi frigidi affectus, ubi æqualiter particulas occupant. Quære plura apud Gal. lib. ij. de Symptomatum causis.

*Adæstium*, quia in calcem colore cinnabarim æmulam, redactum artificio, appellatum est: astringit, reprimat, acre est, ob id tenuat, trahit, vlcera purgat, siccit, & carni duræ cicatricem inducit: in molli autem vlcere laudandum est, Diosco. lib. v. cap. xliij. & xliij.

*Adæris* squama vi & ietibus ex clauis & panibus æreis excussa fit: astringit, reprimat, tenuat, mordet, rodit, detrahit, & liquat. Probatum maximè quæ ærugiosa est ex



est ex Diosc. lib. v. cap. xliiij.

*Aëris* flos fit, cum æs in fornace fufum in receptacula delabitur per canales, miniftris aquam clariffimam vt refrigeretur affudentibus: quando flos fubito exilit, milij et hie brevis, grauis, fplendens, cum teritur rufus, friabilis que est.

*Aëruo*, elt ætis velut rubigo in æreis vafis, laminis, fquamis, ferobibus, lapidebus concreta decem diebus aceti acerrimi vapote, aut arefcientium vinaceorum contactu poft decuffa vel rafa Verdetum officinis nomen elt.

*Aëgritudo*, elt corporis totius, vel partis alicuius habitus morbofus, feu ad morbum aptus difpofitufve. Sed morborum quidam funt continui, aliqui deficientes, nonnulli longiores, alij acuti, quidam verò peracuti deficientes, vt febris quotidiana, tertiana, quattana. & quintana cū sextana: cōtinui, vt femitertiana feu *τρεῖς ἡμέρας*, hoc elt, ardens: acuti, vt phrenitis, lethargus, pleuritis, peripneumonia: longi, vt comitialis morbus, articularis, nephritis: peracuti, vt fynanche, cynanche, poplexia.

*Aëgritudo* quippe aliud nihil elt, quàm difpofitio, ex qua operationes obleduntur Ipla enim operationum læfio fymptoma dicitur, quod ita à morbo, ficut morbus à caufa pendet. Quæ quidem elt duplex, præincipiens fcilicet, quæ extrinfecus occurrir: & corporea, quæ intrinfecus. Manardus lib. liij. Epift. quinta.

*Aëgotatio*, elt cum infirmitate & lanuore morbus inueteratus, permanens in corporibus quæ vitâ participant atqui ægrum elfe, animo dicitur: ægotare verò corpore Itaque ægrotorum curandorum natura confideranda priùs elt, quàm curationē tentauerimus, ex Gal. lib. iij. Therapeutices. Nam ægris infanabilibus, nec tempus vllum opportunum, nec præfidium elt: tamen ægotantis temperies & morbus, contrarietatis mefuram definiunt. Methodi meden. lib. xi. Galenus author elt. Porro victus ratio in ægotante vnde fumenda perquirere diligenter docet ipfe Galen. lib. primo Sanit. tuendæ.

*Aëgotare* itaque animal vel totum, vel in parte neceffe omnino elt, propter eius temperiei vitium aut prorfus corrumpi functionem, aut impediri. Facultatium naturalium lib. ij. Gal.

*Aëmorioides* ἀιμορροΐδες, venarū funt in fede explicationes, dilatationē fue, à fan guinis fluxu ficæ ppellatæ. Harum aliz funt cæcæ, quæ intumefcunt, & parum fan guinis aut nihil emittunt: aliz apertæ, quæ certis quibuldam temporibus panduntur, & fanguinem excernunt.

*Aëmorrhoides* licet res præter naturam elfe, vel nomine ipfo videantur, nou mi nius tamen quandoque vtilis funt, quàm fanguis, qui quod fingulo mense exire à muliebris locis debet, menftruis vocatur. Scribit enim Hippocr. his qui atrabile vel tenui vitio vexantur, æmorrhoides fuperuenientes bono elfe: & cōluetis eas pati, nili vnica feruetur, periculum elfe aut tabis, aut intercutis. Celfus libr. vj. At. ium, cap. de æmorrhoidibus, poft vitij definitionem, curationem docet: cuius quoque rei meminir & Gal. Locorum affectorum, lib. ij. cap. primo: necnon Meth. medend. lib. vij. & ad Glauc. lib. primo.

*Aëtates* quatuor funt, pueritia, pubertas, iuuentus, & feneftus. Pueritia quidem, quæ flatim ab eo tempore quo vterum matris infans egreditur, incipit, & ad quatuordecimum ætatis annum durat: calida & humida elt. Pubertas, quæ *ῥῶν* Græcis dicitur, initium capit poft decimum quartum annum, & ad vigefimum quintum extenditur. Sub fe enim complectitur adulefcencia, quæ à decimo octauo anno incipiens, ad vigefimum quintum durat: atque hæc in temperamento confiftit. Iuuentus, quæ alio nomine florens ætas, confiftendi tempus, & virilis ætas dicitur: ab anno vigefimo quinto, ad trigefimum quintum extenditur, calida & ficca exiftens vocatur autē à *Γυρὰς* *πρώτης* *ἐξ ἀρχῆς*. Quarta ætas, feneftus dicitur: quæ duplex elt, vna prior, quæ ab anno trigefimo quinto incipit, & ad quadragefimum nonū definit. Altera feneftutis pars, à quadragefimo nono, ad finem vitæ extenditur: quæ in treis protrahitur gradus, primus eorum qui viridi adhuc fenefta præditi funt: alter eorum, qui tes obire fuas propter vitium imbecillitatem minimè poftunt: tertius feneftutis gradus, elt



in qua extrema existit virium imbecillitas. Senes autē frigidi & siccī sunt. De quibus quidē ætatibus perēdus est Hippo. li. j. de Ratione victus acutorum, & Galli. v. Sanitatis tuendæ, & Tempera mentorum li. ij. necnon lib. ij. & iij. Aphorismorum Hippo. in interpretationibus vbi ætates ad tempora, & loca, & victus genera quomodo bene, vel malē se habent.

*Æstas*, nulla collatione facta sibi cum vicinis anni partibus, calida & siccā est: cū in ea humor vincitur à sicco, & frigidum à calido, ipsa quoque dicitur calida & siccā. Siquidem, inquit Gal. lib. Temperament. primo, æquum cenfeo, quatuor anni temporum quodlibet ex suapte æstimatum natura, non ex alterius comparatione, ealidum frigidum, humidum siccūmvē nominari debere. Namque quatuor anni partium natura per se æstimanda, à vincentibus in ipsis qualitatibus: non ex collatione, & alia cæterorum parte. Sed æstas & ver quādo sunt similia, sudores in febribus multos expectare oportet: si sicca & aquilonia æstas, ætumnus pluuiosus & australis, quos morbos ad hyemem gignunt: & quos æstate fieri necesse est, ex Hippocrate Aphorif. lib. iij. & Prædict. lib. primo declarat Galenus.

*Ætas* enim quævis habet suos morbos, ex quibus humores eosdem ptoctean-tes facillē depræhenduntur: vt subinde qualia medicamenta purgantia sint exhibēda, promptē conicere oportet. Itaque circa ventris deiectionem expendenda est, & ad hæc morbi speciem inspicere, quod ex ea humoris noxi cognitio haberi queat: veluti quod tertiana, si ita contigerit, sit à flava bile modum excedente: quartana ab atra: quotidiana, à pituita: cancer ab atrabile: atque singulæ aliæ morborum species, eodē modo.

*Affectus* præter naturam, sunt causa, morbus, & symptoma: causa, est quæ morbum præcedit: morbus, à quo primū vitiatum actio: symptoma autem morbum sequitur: atque hi tres affectus ex diametro naturæ nostræ aduersantur. Res præter naturam, & affectus præter naturam, exprimitur à Galen. Methodi medendi libro secundo.

*Affectus* corporis omnis, qui à naturali recessit statu: vel morbus est, vel morbi causa, vel morbi symptoma, quod Græcis *παθήματα*, nominari in vsu est, vt refert Gal. libro de symptomatum differen.

*Affectus*, est qui in subiecto corpore & permanet, & reſeruat: hoc namque modo morbus & causa, & ea duntaxat symptomata, quæ affectus sunt nostri corporis, vt vitiosus color, affectus dicuntur: eadem tamen symptomata, parthe vocantur, vt vult Gal. lib. primo de Locis affect. & de Symptomatum differen. Sed & affectus corporis præter naturam vel morbus est, vel causa, vel symptoma: & numero quidpiam sanorum, ægrotorum, & neutrorum. Quinetiam affectus corporis nostri sunt quadruplices, visiles nimirum, vt sunt colores præter naturam: totum corpus, partem vnā, vel plures occupantes: vt olfactiles affectus, &c. Quære quod restat dicendum in diſtione Olfactiles affectus.

*Æditis* inest appetitus octuplex, vt appetentia, cibi conſectio, digestio, in sanguine alteratio, superfluum excretio, nutritio, auſtio: nam appetentia in naturālē & animalem distributa est: quarum operationum omnium quære feriem indicatiam in Exercitamentis.

*Agallothum* *ξύλαλοι*, vulgò lignum aloës, quod ex India, & Arabia ad nos deferretur: maculatum odoratum, gustu astringens, & subamarum, cure aliquantulum versicolore. Aliqui triplicem arborem esse suspicantur, inter se viribus multum discrepantem: sed quod hodie venit agallochon quibus aspalathum est, facultate austerum cum acredine, quàm agallochon. Quibus pollet viribus, ex Dioscoride scies libro primo, cap. vigesimo primo, ex Ægyneta libro septimo, cap. iij. Sed supposititium agallochon describitur à Syluio libro primo, de Medicamentor. simpl. natura.

*Agnus* castus iunctis ambobus, cū *ἀγνός* castus sonet, vulgò appellatur vitex, ex amerina salix nomen quoque habet, quod ad castitatem conferat, foliis &

floribus sumptis & substratis, & frixo semine, vel non frixo: id enim sumptum, ut ru-  
ta semen, nocturnas veneris imaginationes cohibet: ut est Gal. author lib. vi. Sanitatis  
rue. & lib. vi. Simpl. Diosc. lib. primo, cap. cxvi.

*Agarius ἀγρίων*, ab Agaria regione sumplisse nomen videtur, est fungus sine  
radice in llicum, & Laricum arborum radicibus qui erumpitur, maximè in Ebre-  
duntiorum Allobrogum regionibus: estque duum generum, mas in llice putrescen-  
te ad radices, sed foemina in Laricis radicibus carie intaetis albicans depræhensa col-  
ligitur. Quibus sit viribus agarius docet Diosc. lib. iij. cap. j. Gal. lib. vi. Simpl. Aëtius  
de re medica. lib. j.

*Agasyllis ἀγασυλλίς*, arbuscula est seu frutex, unde geminū Ammoniacū genus  
habetur. Hammoniacum Dioscoridi frutex è quo succus eiusdem nominis capitur.  
Sunt qui ammoniacum thymiaa vocare malint. Latini guttam appellant, frutex  
eum radice sua totus Agasyllis nominatur. Succus & hic ferule in Cyrenaica nascen-  
tis. Quære dictæ ammoniacum.

*Ageratum ἀγρότῳ*, planta est ad duorum palmorum altitudinem excresecens,  
similis Origano, florem ferens bulbis aureis non absumilem ita dicta, quod non faci-  
lè marcescat. Pli. lib. xxvij. cap. iij.

*Albugo oculi ὀφθαλμική*, hoc est, nebula tenuis λευκωματῆς, hoc est crassa in oculis  
ex cicatricibus albugines, siue nebulæ appellantur. Manardus libro septimo Episto-  
larum, secunda epist. sic refert: Communis etiam utrique membranæ est albugo ab  
Avicenna vocata, cuius duas facit species, tenuem, quam dicit vocari nebulam: cras-  
sam, quam albuginem. Quam distinctionem sumplisse ab Aegyneta videtur, sic lo-  
quente. Cicatricum oculi alia tenuis, in superficie apparens, quæ generale cicatricis  
nomen seruat, & à quibusdam dicitur nebula: alia profunda, quæ λευκωμα nuncu-  
patur. Latini cicatrices & albuginem, plerunque tamen Græca ipsa voce λευκωμα  
Gal. de Oculis Theoremare, siue cap. iij.

*Alga ὀφθαλμική*, & σφῆς alga species, ut ex Theophrasto vertit Gaza: propè maris  
littora legitur, necnon in Arari flumine, in quo copiosa depræhenditur: qua naran-  
tes æstus fervore homines ribis laertisque inuolutis demerguntur.

*Alia ἁλῖς*, sataliquibus frumentum barbarum interpretatur: re mera fru-  
menti purissimi cremor est, ex lacte amigdalino, vel caprino confectus. Nam alia ex  
Galeno lib. x. Meth. medendi, cum mali punici granis, optimus cibus stomacho bilio-  
so est: cuius compositio multiplex eodem Gal. describitur ubi suprâ: & libro de Ali-  
mentis primo.

*Albium ἄλβιον*, oruala herba odorata, siue Ornithogallon, aut Orminum plerif  
que suspicatur: hæc rusticis Tota bona appellatur Io. Agricola ex Leonicensi libro de  
morbo Hispanico, herbam stellariam, & bubonium, hoc est, inguinalem esse cõte-  
dit. Est & Alga Galeno libro sexto. Simpl. Bryon thalattion appellata, composita ex ter-  
rea & aqua essentia, utraque frigida. Siquidem & gustu adstringens est, refrigerâsq.  
*Alud* quoque Bryon ex eodem Gal. occurrit, quod Splanchnon nominat: Lati-  
ni Muscum, atque in quercubus, piceis, & populis albis inueniri traditur: cuius vis ad-  
strictoria est. Huius etiam meminit Diosc. lib. iij. de Materia medica, cap. lxxiij. &  
alterius lib. primo, cap. xx. ad quem recurres. Aegyneta Simpl. libro vij. meminit v-  
triusque differenter.

*Alimentum*, est quod substantiam augere potest: ut medicamentum omne id di-  
cimus, quod naturam alterare potest Galeno auctore libr. primo Simpl. Alimenta  
autem sumuntur ex plantis, ex plantarum partibus, ex animalibus, & animalium par-  
tibus: ut herbis & foliis, cum reliqua planta: seminibus, fructibus, floribus, radicibus,  
pedestribus, volatilibus, aquatilibus: quorum & eorum partes compræhendun-  
tur: rationesque, quibus alimentorum temperaturæ inuestigantur. Alimenta siqui-  
dem & medicamina in hoc convenire, quod utraque in nos agunt & à nobis pa-  
tiantur: in hoc differre, quod medicamina agunt quidem potius, quam patiantur:  
alimen

alimenta ē contra, magis patiuntur quā agant. Sed subiciendum alimēta tandiu modicamenti rationem subire, quādiu in sanguinem mutantur: vbi verō perfedē in sanguinem versa sunt, siue calida siue frigida fuerint, ab eis semper calorem augeri. Dein alimenta etiā vbi mutata à nutriente vi sunt, posse reddere corpus multo quā esset antea frigidius, si videlicet plus frigidorum humorum, pituitæ scilicet & nigri humoris, quā boni sanguinis & bilis generent. Colligitur ergo quā via inuestiganda sit cuiusque alimenti temperatura, ex Manardo lib. Epist. xiiij. Epistola iij, ex Gal. librorum de Alimentis, & Temperamentorum lib. iij.

*Alimentorum* superfluitas, & causæ externæ detrimēta corpori humano quæ adferant, quod alimenta sint qualitate, & quantitate, docet Gal. in eo libro cui titulus est, De optima corporis nostri constitutione. Nam alimenti tempus iudicatur accessionis & intermissionis tempore, vt lib. ij. de Differentiis febr. affirmat Gal. quāquam alimentum Valentiū exhibendum vesperti censer Meth. medendi l. vij. Atque ægrū a lere in vigore quando expedit, coniectari siquidem oportet, Aphor. ix. libri primi ex Hippocr. docet Galenus. Præterea alimentum aliud est quod nutrit, aliud quod quasi nutriendum, aliud quod nutritum est, ex Hippocr. in libello de Nutritione Galenus versus finem libri primi Sanit. tuendæ est explanator,

*Alypum* ἀλυσον, ex AEGyneta alypia. Actuarii alypiam turpetum albescens interpretari ausus est. Ex Thitimatorum generibus esse assignat Dioscorides, vt plerique suspicantur quod alypon herba succulosa est, subrubra, gracilibus ramulis, tenuibus foliis: flore molli, leui & copioso, radice betæ tenui, referta acri succo semine epithymi ad quæ Turpetum nostrum referri videtur: vulgaribus medicis Turbith appellatum. Sed iam quid per Turbith intelligamus difficile est diuinare: neque enim cum Serapione conuenit Tripolium intelligente, nec cum Dioscoride radicem Piryusæ sic vocant: folio hæc enim pini, illud isatidis constat non feruæ. Quære dict. Turpetum AEGyneta libro septimo. de Simplic. Alipi facultates assignat quales Dioscor.

*Alisma* ἄλισμα. Damasonium, siue fistula pastoria, & plantago aquatica videtur: cui Diosc. descriptio non ineptè respondet, his verbis: Alisma, folia ei plantaginis, nisi angustiora essent, laciniosa, conuexa que in terram, caule simpliciter tenui, cubito altiore: capitibus thyrsi: flore tenui, candido, pallescentem: & quæ cum his ex ipso Diosc. sequuntur, docent Alisma plantaginem aquaticam, quæ madmodum leges in dictione Damasonium.

*Alyssum* ἄλυσσον herba pentecostes officinis, quanquam sunt & nonnulli herbarii, qui eam esse suspicantur, quam vulgus Cruciatam hodie vocat. Huius meminit & Syluius, in cuius descriptione an seipsum sefellerit, ipse viderit. Quibusdam Alysson putatur Canabis agrestis: alius Rubia minor, quā & nos Cruciatam fatermur. Diosc. lib. iij. cap. lxxxvij, sic inquit, Alyssum fruticosum herba est, vnicaulis, subaspera, rotundis foliis, fructu duplicium scutorum effigie, in quo est semē, quadam tenuis latum. Quæ herba tota mirificæ, vt ex Dioscor. confirmat Galenus, morfos à cane rabido curat. ob idque accepit nomen Præstigiis, & incantamentis aduersari proderum est.

*Albus* ἄλφος, methodicis morphæa, quæ alioqui Vitiligo intelligitur. Manardus libro Epistola. septimo, Epistola secunda, sic ait: Est autem Vitiligo, si genere quodam comprehendatur, sordus cutis color, ex malo particulæ habitu proueniens, nutrimentum benè assimilare non potens: eiūsque alia solam cutem inficit, alia altius descendit, vt adeo carnem contingat, ac pilos coloret, vtrique etiam albo vel nigro præcipue colore cōmaculet. Primam, id est, eam, quæ sublimior eum sit, solam attingit cutem, siue alba, siue nigra sit. Græci eadem voce ἄλφος vocant vulgares Morphæam. Celsus vim vocis secutus, albam, leucam alphoninigram melam nominauit.

*Altera*, Græcis, & Celso Leucæ vulgaribus Albaras dicitur: quā quidam Lepram vocant. Gal. lib. xiiij. Meth. medendi.

*Allium scorodorum*, & aliud *Vipicū* ἀφροσκόροδο: cuius nuclei vel spicæ γιγνῆται, hoc est, gelyidia grana; dicuntur. Est & quoddam sativum allium singulari capite constans, dūcē, in purpureum vergens: aliud est sylvestre, ἀφροσκόροδο, id est, anguinum. Horum vis acris est, excofacit, mordet, excrenit, aliud turbat, inflationes facit, stomachum exiccat, sitim gignit, flatum permouet, cutem exuleerat, & oculorum aciem esu hebetat. Cetera ex Diosc. libro secundo, cap. cxix. cognosces. Allium quare ordinis est desiccantium, & excofacientium: at agreste domestico valentius, ut Galenus scribit lib. vii. Simpl. Allium, quibus commodum, & theriace quibus colicis doloribus, maxime quoque flatum discutiens, atque theriac agrestium quare appellatur: resu præterea sitim minime inferens, contra Diosc. Meth. medendi, Galenus libro duodecimo.

*Allis* velci Thracas, Gallosve, vel denique qui frigidam incolunt regionem, si quis veratē sit, non leuiter his hominibus nocet: & allium esse & theriacem bibere, his quos intestinorum dolor vehemens citra febrem exerceat commodissimum & contra Eodem lib. Meth. Galenus.

*Aloē*, succus est herbae nominis eiusdem: qui optimus, pinguis, sine arenis, rufi coloris, friabilis, iecinoris modo coactus, facile liquefcens, odoratus & amarissimus. Aloē optima Sepalaria ilis succo, tina vocatur: adulterina autem, caballina quod veterinatis, hoc est mulomedicis, sit dicata medicamentis. Lota ventriculū magis corroborat, sed minus purgat: non lota & contra operatur. Aloē aperire venas, & sanguinem citare, cum Dioscorides, Galenus, ratio, & experientia contestentur, quod sanguinem vndequeque fluentem sistat: etiam si per fereat in entitatur: quare si aliquando sedis venas aperire videtur, ex accidenti hoc fit, quoniam excrementa acriora agentia ad ea loca mouet, quae venas recludunt. Sicuti ab alis fieri quoque medicis scribit Gal. aphorif. xlvj. libro sexto. Celsus Artium, libro secundo, capit. duodecimo, docet aloē miscendam omnibus catharticis medicamentis, quia si vehementius fuit alius, aut saepius ducitur, hominem infirmat. Ergo nunquam in aduersa valetudine, medicamentum eius res causa recte datur, nisi ubi is morbus sine febre est. Duo herbae aloē succi genera deprehenduntur, Dioscoride teste libro tertio, capit. xxij. quorum alterum arenosum; cuius sedimentum purissimum esse videtur: secundum, ad iocineris imaginem vergit. Galenus autem libro sexto Simpl. non simplicis naturae esse aloē, ut indicio est gustus, sed adstringentis simul & amarae, reteritque ordinis est exiccantium, calfacientium autem aut primi intensi, aut secundi remissi Aegypti, & Aëris similes de aloē produunt qualitates. Onbalius aloē primo gradu talescere, neque catharticum medicamentum asse ait in libro Compendij medicinae. Aloē confectio, quam picram vocant, pupillae renebrose auxilio est, ut aperit Gal. lib. locorum affectorum iij. cap. primo. biliosi quoque humoris trahendi vires habet, ut lib. vi. de Saetituenda tradit: & ab eo excogitatum hyeram picram, ut attritionia, calotēque eorum quae in se habet, crassos & lentos succos dissecet & detergat.

*Alopecia* ἀλωπεκία, passio est, ubi in capite areas deciduus capillus efficit: sic autem nominata, quod vulpibus frequenter accidat, quoniam huic animali non raro pilus erumpi solet. *Alotomia* ἡ ἀλωπεκίαz genera sunt Celsi: vox vtraque graeca est prima à vulpe nomen habet, quae frequenter eo morbo, ut scribit Galenus, infestatur. Secunda, à serpentis similitudine, cui pars laesa similis existit. Teste Aegyptia, qui addit eam incipere ab ocellipio, nec duorum digitorum latitudinem excedere, & ad aures duobus capitibus serpente: commune utrique esse dicens, quod emortua summa pellis pilis primum extenuantur, deinde excidunt. Sont enim ambo capillorum desinitia à vitiosis humoribus contingantia: hūcque differunt à Caluitio Latinis vocato. Graecis dicto φαλλοειδής, in quo ex indigentia humoris, non ex malignitate capitis pili decidunt. Quid sit ἀλωπεκία. Galenus primò Metho. docet & ex ipsa aetiosis particula quam vtilis, in quo genere morbi consistit, Metho. med. libro decimoquarto.

*Alopecurus*, ἀλωπεκοῦρος, panicū agreste est, non frumentum caudatum: Latini, cauda vulpina. Scholastes herbā similem tritico, hoc est, frumento nostro facit: nisi quod hirsutior est, & folium ei pariter latius, ut caudam vulpinam repræsentet: quoniam spicam habet mollem & lanuginem densam, non dissimilem vulpiū caudis. Non meminit Diosc. sed ex Theophrasto Plinius. Natur. historie li. xxi. cap. xvij.

*Alphitum* ἀλφίθον, Latinis polenta est, coniectore Io. Agricola, & Manardo Epist. lib. vi. Epistola v. Est autem alphithon farina hordeacea fricta, ut medicis placet non imperitis, ἀλφριθὸν verò est, quod in multas, & eas quidem partes fit tenues: χαρμυδὸν quoque dicitur.

*Alteratio*, est alterius in alteram qualitatem mutatio: cuius contrarium, mediū, habitus, privatio. Circa omnem qualitatis speciem fit alteratio, ex Arist. cap. quarto, libri primi de Generatione. Gal. verò libr. primo facult. natural. Commune autem, inquit, omnibus his nomen alteratio est, vnum id quoque motus genus. Alterum genus in corporibus iis est, quæ situm mutant, atque ex alio loco in alium cedere dicuntur. Et de facult. item libr. iij. Nec minus illa, concoctionem alterationem quandam esse, ac nutriendis in propriam qualitatem eius quod nutritur mutationem: sanguificationem verò, alterationem esse his amplius, nutritionem, & autionem, ex eo quod corpus in omnem extendatur, nutriatque, fieri.

*Alterationem* verò ipsam à calido potissimum perficiatque idcirco tum nutritionem, tum concoctionem, tum omnem succi generationem: iam verò & in excrementis ipsis qualitates à calore innatò provenire.

*Alteratrix* facultas, ab actione nimirum ipsa generatim sic dicta, particulatim verò assimilatrix, nutritori, quæ, est quæ id quod attritum, & aliquandiu retentum est, alterat, immutat, concoquit, ac parti quæ alitur, apponit, & assimilat. Alterationem etiam ex contrariis fieri, atque ipsius particularum latitudinem tum alterari promptè quæ videantur Temperamentorum lib. iij. Gal. explanator est. Item alterationis elementa, ipsius quoque primæ facultates, & in animali quot alteratrices, tum alteratrix facultas, ex eodem Gal. Natural. facultatum lib. primo.

*Alfene* ἀλφινæ mortuus gallinæ est aliquibus: nonnullis anagallidi nomen respōdet. Sic autem dicta, quia loca umbrosa & opaca amat. Myoscora Diosc. ut vertit Gaza, auricula muris: quoniam musculorū aures folia imitatur: unde alfene dicta quod cōpare omnino facultatem helxinæ sortita est, frigidam scilicet & humidam: quamobrem feruētibus inflammationibus ceu presens remediū cōgruit. Hęc Aegynta, Aëtius, & Gal.

*Alfiorolopbum* ἀλεξτορδοπος, herba tussientibus petita, vulgò dicta Oruala, foliis gallinacæ cristæ similibus, caulem tenuem, semēque nigrum in siliquis reddēs. Plinius Cristam vocat: nos Orminum.

*Aluus*, est quæ in se ventris intestina continet: & cibi si potus recrementa nō prorsus sicut recipit, ea reicit: sed sicut vel sanitas, vel infirmitas in partibus internis corporis habetur, excernit. Cuius profluuiū διλυσίς, id est, copiosus finis vlcatione, & inflammatione fluor. Fit autē propter imbecillitatē instrumentorū vētris, alimēta copiosa, humidiora & viscosiora, eorū dēq; corruptelā, mordicationē itē in vētre cōrētorū, defluxū quorundā ē supēnis ad ventris spatia, imbecillitatēmq; retētriciū facultatis.

*Alui* deiectionis signa sunt, quando vomitus, & sanguinis fluxus nariū, & sudorū notæ non apparēt: & si plura egerātur, quàm ante indicationē ægroti consueverint, detenta præsertim vrina. Quæ crises per æmorrhoida setiā, & in mulieribus per menstrua fieri possunt. Insuper, ut in omnibus reliquis euacuationibus, teste Hippoc. Aphorif. lib. i. aphorif. ij. ita potissimum in ventris deiectione vires ægrotantis diligēter, sunt expendendæ: donec enim tolerat, & nondum laborat, tentandum ut humor exuperans educatur. Quū verò dissoluntur, eodem Hippocr. teste aphorif. xxij. libri primi, etiam si ressent superuacua, cauere oportet vacuationem. Atque, hinc est, quod Deiectiones multitudine non sunt æstimandæ, sed si talia deiciantur, qualia conveniunt, & ægrī faciliē tolerant.

*Aluus* nonnullis lapsu, casuue deuolutis adstringitur, intestinis scilicet affectis: ut

author est Gal. Locorum affectorum lib. primo, verum ipse, aluum soluit his quibus in morbis diuurnis venter sistitur non actibus per inferiora insusis: sed tantum oli-  
uo, mercuriali, Brastica marina, cartamo in ptisana, terebynthia. Sanitar. tuendæ li-  
bro quinto. Aegypteta de Arte medendi libro primo, aluum sanis emollientia, & pue-  
rorum quomodo mollienda latè aperit. Alui passiones omnes, & curationem abû-  
dè docet Celsus artium lib. ij.

*Alumen*  $\alpha\lambda\upsilon\mu\epsilon\nu$ , ab astringitione vehementi dicitur: crassarum est partium, maxi-  
mè liquidum, & Placithes, & Plinthites à crusta, & lateris forma dictum: minus stro-  
uaylon, & Astragalores, id est, rotundum, vulgò Rochinum, in astragali modum: mi-  
nimum Schistum, id est, scissile, vulgò alumen pluuiæ, non in fila sed in digitis fri-  
bile. Alumen omne minerale est, & in aqua soluitur, & igni liquefcit: scissile omniû  
tardissimè, quòd sine bullis tandem mollescit, idem aquæ innatat, linguæ & cuti  
mordacissimum Alumen fissum ordemati conferre docet Galen. lib. xiiij. Metho. &  
tritum vuluæ inflammationis præcipuum medicamentum introductionum libello  
author, esse affirmat. Dioscorides lib. quinto, scribit, omne genus aluminis in metal-  
lorû fodinis inueniri, ferèque in AEgyptio, & plerisque aliis in regionibus: cuius plu-  
rimæ, varizque species cum medendi vsu apud eundem authorem reperiuntur.

*Alunda*, Latinis Galerita, Græcis  $\eta\ \chi\omicron\upsilon\pi\omicron\varsigma\ \kappa\omicron\pi\upsilon\delta\omicron\varsigma$ .  $\chi\alpha\iota\ \kappa\omicron\pi\omicron\delta\alpha\lambda\omicron\varsigma$ . Inter auiculas  
dumetis apricantes cibo laudatissima ex Galeno habetur galecita: Varro Galericum  
nominauit, nam calculo vexatis maximè vrilis experitur.

*Altea*, quæ & Alcea seu bismalua  $\alpha\lambda\chi\epsilon\alpha$  Græcis, nam communis malua primû  
est genus domesticum: sed alcea agrestis est, foliis vt cyclamini rotundis, lanugine  
canescentibus flore rosaceo, caule bicubitali, radice lenta, intus alba subastringente.  
Altea autem dicitur, quòd inter primas sit vrilis, & pluribus polleat remediis, Gale-  
no libro secundo Alimentorum: & libro sexto, Simpl. Ebiscus siue liscus malua, at-  
que aliis effertur nominibus. Dioscorides libro secundo, cap. cxj. malu am satiuam à  
syluestri facultatibus, & effigie separat: & altzam in genere syluestrium esse vult li-  
bro tertio, cap. cxxxix. sed alceam omnino syluestrium maluarum genera assignat:  
qnas omnes versari sub eadem viiium facultate perspicuum est. Vocat autem altzam  
Gal. li. xiiij. Meth.  $\alpha\lambda\tau\alpha\delta\iota\delta\iota\sigma\mu\alpha\lambda\alpha\chi\epsilon\alpha$ , cuius radix seuo liquata salutare scirthis medi-  
camentû est. Sed & syluestris malua, quæ passim nascitur, folia cum seuo proficiunt.  
Mentionit similiter & Gal. Ebiscj, id est Altea & facultatum eiusdem libr. vj. Simpli.  
quibus quidem Aegypteta & Aëtius similes vires adscribunt.

*Altercum* siue hyoscyamus  $\iota\upsilon\alpha\kappa\epsilon\upsilon\alpha\mu\omicron\varsigma$  quæ etiam Apollinaris herba, nomè ab A-  
polline sortita est. Hyoscyamus, faba suis, quòd eius pastu conuellantur sues, interpre-  
tatur: Officinis corruptè Iusquiamus appellatur: de cuius vi veneni multa refert Dio-  
scor. libro quarto, capit. lix. apud quem tres species leguntur, vnus flore purpureo, se-  
mine nigro: alter flore luteo, semine flauo: tertius flore & semine candido: cuius præ-  
cipuus est vsus apud medicos, & myropolas. Gal. lib. viij. Simpl.

*Altercum*, inquit, cui semen atrum est, insaniam ac soporem affert: sed is cui se-  
men mediocriter flauum est, propinquam ei facultatem possidet. Verum vtrumque  
fugendum est, vt venenum: sed tertium ad sanationes vel maximè idoneum est, ex  
tertio gradu quodammodo refrigerantium.

*Amaracus*, seu maiorana, & sampsychemus  $\alpha\mu\alpha\rho\alpha\kappa\iota\varsigma$  non autem, vt placet qui-  
busdam partheninum Galeni est. Vnguentum tamen amaracinum à sampsychino cur-  
diuersum sit Dioscoridi, doctè Syluio, Musâ coniectare videtur, ex plantæ huius  
appellatione consueta vtrique regioni, in qua vtrumque id vnguentum fiebat lau-  
datissimum. Samphuchi materiam omnem recitat Dioscorides libro tertio, capit.  
trigesimo octauo. Galenus Amaracum exalfacere non instrenuè, non valdè autem  
desiccare, sed in caliditate quidem tertij esse ordinis, in siccitate verò secundi,  
affirmat. Manardus amaracum Aëtij herbam intelligit apud Italos corrupto vo-  
cabulo Marellam vocatam, quæ etiam apud vulgares Allobrogas eodem nomi-  
ne effertur: medicorum vulgus, & officinæ Matricariam: de qua Dioscorid.

scribit



feribit sub nomine Partheni, quæ longè differt odore, & amaritudine à Maiorana, siue a maraco. Quære dicit Maron.

*Amarantus*, vulgus Gallicum zelotipiam, vel passevelours, vocat ab Elichryso Dioscoridis diuersa herba: quanquam & alia quædam sit huius nominis, quæ fortassis Stêchas citrina nostras erit: quam & alij nonnulli Chrysocomen faciunt. Dioscor. etiam, quorundam appellatione, Crysanthemum vocat: lib. iij. cap. xlvij. cuius, post Diosc. vires Galenus sic tractat, Amatanthon facultatis est incidentis & extenuantis coma igitur eius cum vino pota menses educit: semen eius comitiale morbum tertio potum ad drachmam ter mensibus tribus silente prorsus luna, finire expertum est: quamquam stomacho infesta tum coma, tum semen.

*Ambrosia* ἀμβροσία, pro hyua moscata, & vineacea quibusdam visurpatur, quoniam friata vini nidorem odoratu reddit: Rura rutam vineaceam dicit. Segusiani mi craneam vocant, multumque differt à Botryide Dioscoridis descriptione, licet aliter sentiat Gesnerus. Eius vires sunt reprimere ac repellere, & illitu adstringere humores, qui in partem aliquam incumbunt. Galeno quoque vim habet adstringentem, ac repellentem illita. Aegynæta pares illi occurrunt vires. Est quoque Ambrosia antidotus Zopyci medici Ptolomæi regis, de qua Celsus lib. v. cap. xxij. in honorem positionis Deorum nominata: quam valdè laudat Galenus libr. meth. med. viij. & xiiij. & sanitatis tuen lib. ij.

*Amblyopia* ἀμβλῦπωμα, est à causa incognita visus obscuritas: quæ conuenit cū affectu alio, qui à Græcis vocatur ἀμύρωσις, quatenus vterque sit ab immanifesta causa. Differt verò, quoniam in hoc plenum est visionis totius impedimentum: in Amblyopia sola obscuratio, non plenus defectus, ut est author locorum affectorum lib. iij. Galenus.

*Amarum*, est id quod in rebus vim mundificandi habentibus inuenitur, ut stipitica vis in substantiis quibus sanantur vlcera: & siccitas, in duabus rebus non dissimilibus. Itaque amara medicamenta siccant plusquam oportet: ut retulit Gale. Meth. lib. vij. Sexto quoque Simpl. de propriis cuiusque sensus sensoriis, sic ait: Quæ abstergant, totamque linguam abluunt, si id quidem supra modum efficiant, si multumque aliquid absument, ut de natura aliquid coliquent, qualis est nitrorum facultas, amara omnia appellantur. At quæ nitri virtute inferiora sunt, ac moderata vtuntur absterfitione, falsa citra asperam amaritudinem, & grata nobis magis apparent. Vide plura his apud authorem eundem ex Platonis lectione.

*Ambubcia* Κίχουριον ἄγριον, id est Cichorium agreste, nomine alio sylvestris Intybus siue Intybum: neque domestica est Schariola, qua hyeme in acetariis prima mensa vtuntur delicatioris. Dioscorides lib. ij. cap. cxxv. sub Seris nomine Intyhum vtrumque describit his verbis: Seris duum generum est, altera sylvestris, quæ picris & cichorium vocatur, altera satiuæ, latioribus foliis constat: stomacho quàm horten-sis, quæ nostras est, vtior. Quæ iterum in duas species digeritur: vna folio latiore prodit lactucarum similis, altera angustiore est folio, & gustu amara: omnibus vis refrigeratoria est hæc Dioscorides. Seris Gale. sicæ frigideque temperaturæ est secundo excessu: sed domestica magis refrigerat, quàm agrestis. Verùm humiditas sic citatem extinguit, qualitatris adstringentis particeps vtraque est.

*Ammi* ἀμμή, ameo officinæ dicunt: varium quidem est, Illiricum scilicet, & Aegyptium. Quod autem vulgare habetur, nostræ regionis tellus producit. Ammi semen album est, & quod origani saporem habet, calidum & siccum ordinis tertij est. ob id flatus esum internos dissipat: coli quoque doloribus optimum. Aliquibus Ammiem vocari legitur. Diosc. Aethiopicum cuminum appellari tradit. Gal. simpl. lib. vj. Ami vocat, cuius facultas tertij ordinis est in calido & sicco.

*Amiantus* lapis scisso alumini similis: quo, vt pote flexili, telas in vela tantum spectaculi gratia texunt, quæ ignibus iniecta ardent quidem, sed flammis inuicta splendidiore exunt. Hæc Diosc. Atque de omnium lapidum viribus summaria consideratio ex Aëtio hæc est: vniuersis lapidibus excicatio communis est, ac quicumque in

liquorem soluti suæ triti, nullam insignem qualitatem afferunt gustui, debilissimæ omnes, mitissimæ, immordacissimæque sunt iudicandi: qui verò apertam qualitatem gustantibus inuehunt pro eius qualitatis ratione facultates habent. Nam si adstringunt cogendo stipandoque pollent, si mordent calefaciendo, discutiendo, ac liquando. Inter hæc medii neque palam adstringentes, neque mordentes abstergunt.

*Ambulatio*, ut vult Celsus, non utique plana commodior est: siquidem melior a scensus quoque: & descensus cum quadam varietate corpus moueat: nisi tamen id per quàm imbecillum est. Melior autem est sub dio, quàm in porticu: melior si caput patitur in sole, quàm in vmbra: melior in vmbra, quàm parietes aut viridaria efficiunt, quàm quæ tecto subest: melior recta, quàm flexuosa. Galenus de vsu partium lib. iij. cap. xij. & cap. v. ambulationem quomodo fieri, & quæ requiratur, docet: & cuius aëtio, Mech. med. lib. vij.

*Amygdalus* ἀμυγδαλὴ, arbor vna amara fructu, cuius gūmi calfacit, adstringit, sanguinem reiicientibus prodest: impetigines cum aceto illitum tollit: tussis ianctique medetur: calculosis prodest. Mitius multo est gummi, quod amygdalo dulci profuit: eiusque fructus mitior, ideo vinibus imbecillioribus suspicatur.

*Ambarum*, ἀμβαρ, vulgò Ambra grysea, & Arabum, & Actuarij, & Simeonis recentium Græcorum. Est odoramenti genus, locis diuersis scaturiens, ut bitumen, sulphur, nostratibus hodie larga & præstantissima ex littore Aquitanico mittitur: colore cinericio. Indica rufa est, pinguis, odorata, quòd Succinum orientale Herimolao dictum est. Arabibus, & Simeoni est prælata Arabicæ subalbæ, & tertiæ præter has nigrae, quod à piscibus fontes Ambaris gustantibus deuorata sit, omnium pessimæ.

*Amylon*, vulgus amydon: quod sine mola fiat, dictum: ex medulla triticeæ frumenti præparatur, partes exasperatas leuigandi vim obtinens. Cæterum similem panibus locis habet facultatem.

*Amomum*, herba est sine odore, sine fructu: qua amomum, quoniam ei simile, adulteratur: nascitur in Armenia flore origani Diosc. lib. j. cap. xij.

*Amomum* ἀμωμον, rosea est Hyerosolimitana, vel lacus Hyericontis vna, Diosc. Gal. & Aëtio vocata, non Aspalathus: quæ esse quibusdam videtur. Amomum est alterum, tenuissimo frutice in Alpinatum iugis: cuius semen pusillum, odoratu fragrantissimum, & ad vsus pharmacopeiæ colligitur: misceturque amomo, atque pro eo venit. & odoris conciliandi gratia medicamenti miscetur. Laxius in vna parua seminis plena diffusum, non adstrictius coherens, acre, mordax, nares vulnerans, recens non cariosum.

*Amomi* vna ob id dicitur, quæ Botrys nostras videtur: quòd racematim velut in vna cohereat semen Galeno, & Actuario testibus.

*Amphora*, siue Ceraneum, mensura est octo congiis explens. Italica, capit olei libras septuaginta duas: vini octoginta: mellis centum & octo.

*Ampeleis* ἀμπελεις, terra est bitumini similis, circa Seleuciam Syriæ nascens: quæ medicis παραμυκτης, dicitur, quòd morbo medeatur vitium. Diosc. lib. v. cap. de Terra in genere. Gal. Simpl. libr. ix. cap. de Terra Samia.

*Amodites*, serpens est qui demorosos delendo a postemate insigni tumescens intra diem septimum necat: cuius meminit poeta Lucanus his verbis: Exustisque cinicolor indifferet arenis Amodites. Galenus commendat Andromachi theriacem ad Pisonem, serpente Amodite percussis.

*Amphisibena*, serpens quoque in caput geminum confurgens: quorum alterum in loco suo est: alterum in ea parte qua cauda: quæ causa efficit ut capite uterque sexus minitabundo tractu serpat orbiculari. De quo sic Lucanus, Et grauis in geminum surgens caput Amphisibena. Galenus aduersus serpentis huius morsum commendat theriacem, quæ est Andromachi ad Neronem, de ea scribens ad Pisonem.



ad Pisonem. Nam cætera venenata serpentum geneta feriatim & ex ordine leguntur.

*Amor ineptus*, Græcis *ἰσχυρός*, est qui furoris amore percussus agitur: perinde atque is qui *πρὸς πικρὸς*, dicitur. Magna Græcorū vetustas, inquit Cælius Aurelianus Chronion libro primo, furorem manix speciem appellabat, quæ nunc *μαρτικὴ*, dicta est: atque alium ex Libero fieri patre, alium ex amore, & appellauit eroticum: uti ex musis *ὑποπρεπτικὸς*, quod eam in instruere videatur. Itē duplicem furorē esse, alium insipientiæ genus, quo omnem imprudentem insanire probant Stoici: alium ex alienatione mentis, & corporis compulsionē item tertium, ex animi purgamento fieri: sed & quartum alienatione mētis, ex corporis causa, sine iniquitate, quem Græci appellant *μυρία*, vel quod animum siue mentem laxet, ut satis compertum habetur amore dissoluto in feminas vexatis. Cætera, cum curatione, ex Cælio ipso petes. Galenus de Hippocr. & Plat. placitis libr. iiii. Immutatio, excessusque ex seipsis non aliū de oritur, quā ex rationis aspernatione: nam quod ira inferantur aliqui, exturbenturque ex se, neque apud se, neque in se sint, aliæque huiusmodi perspicuē iudicia esse perturbationes, in rationalique animæ facultate existerē significant. Unde a bamanibus, aut aliquam aliarum cupiditatum libidine vehementer aggratis, tum etiam iratis, huiusmodi audire voces licet, cum dicunt, suo se animo indulgere velle, sibi que siue id melius, siue peius fuerit permitti debere, nihilque super hoc à quoquam dicendum, atque eo modo prorsus etiam si peccent, sibi que inutile id videant futurum, esse tamen faciendum. Hæc ex Chrysippo Galenus.

*Ægido* *ἄγιδος*, est abscessus inter nates & magnum oculi angulū: qui si negligenter incuriosè que tractetur, in fistulam lachryma leni Methodicis nominatam, vertitur: cuius quoque desperata curatio omnibus est. Ad quid autem abscessus dicatur, & à quā re curationem accipiat, docet Ægyneta de Ægylope cap. proptio libr. tertii. Similiter peius quā disruptum exulceretur apostema, Anchilops appellatur.

*Æglaphotis* *ἄγλαφωτίς*, odoris iocundissimi herba est, coloris que: qua Magi videntur ad euocandos demones. Nascitur in marmoribus Arabiz, vnde illi nomen Marmoritis traxit. Quære dicit Pzonia.

*Amurea* *ἄμωρῆς*, olei cuiusque sæx est, aut expressæ oliuæ recrementum: hæc decocta in cupreo vase ad crassitudinem mellis adstringit, cæteros præbens lycij, id est memythæ Atabum, effectus. Hæc Dioscorides. Galenus verò amurcā terrestris substantiæ esse dicit, calidæ interdum facultatis, ut non palam mordet: quod si coquatut, terrosior euadit: tunc quoque ex secundo excoalscentium & siccantium excessu iudicabitur. Siquidem contrahit ut resina, & pix sicca, & bitumen.

*Æxopes*, sunt Galeno, & Ægyneta, cutis capitis cum tumore vlcera foraminulenta, & quibus sanies manat tenax, sed nec ut mel crassa. *Κήπιος*, verò achori simile maioribus foraminibus, in quibus sanies melli similis, instar faui apum continetur. Manantia capitis vlcera, vna voce nominat Pl. quæ Græci *ἄχωρ* & *Κήπιος*, Auicenna saphatum & tinean, generali & ipse nomine, sub quo non solum *ἄχωρ* & *Κήπιος*, Græcorū, sed & ficus, & *ὑδρῶν*, & *ἄρθρη*, & Atabes collocarūt. Per seriem quidem horum definitiones habeantur in Exercitamentis.

*Ammoniacum*, seruulæ gummi exudans, à Diosc. thymiana ob redolentiam appellatum: quod etiam Ægyneta inter odoramenta adnumerauit, & si odorem spiritat grauem velut castorium. Hic succus est ex frutice eiusdem nominis sumpto, tamē videtur nomen tractum à loco regionis, vbi Iouī Ammoni dictum templum est: atque ibi frutex nominis eiusdem inuenitur. Ertauerunt qui Armeniacum sal, dici Ammoniacum voluerunt quin ab Armenia regione Alexandriam, & Venetias, & nostrum vsque orbem aduehitur: fossile & non marium facile sua acrimonia, & liquatione deprehenditur. Dioscorides libr. iij. cap. lxxx. & libr. v. cap. lxxv. vj. & vij. Gal. libr. vj. Simplic. medicament. Brassanolus in Exament. Gummi.

*Amnios amnos*, ab agnorum mollicie teneritudine, appellatur: quod cum

mulier conceperit, ex semine membranæ generantur, quarum prima, quæ totum orbiculatim foetum amplectitur, tenuis est, suscipitque vaporem à conceptu defluentem, qui perfectorum animalium sudori proportionem respondet. Huic foris alia renuior incumbit, quæ sarcimen ἀλαρτοιδής, nominatur. Hæc ad foetus vesicæ fundum lato & insigni meatu pertua est, atque urinam foetus iam efformati in se recipit, ac ad partum usque colligit. Toti enim ipsi foetui undique membrana circumposita est subtilis, nomine ἀγνιον, suscipiens id velut sudor foetus: & quæ superiacet, ἀλαρτοιδής, in vesicam eius perforata, quæ colligit & acruat usque ad partum id quod est velut urina foetus. Secunda autem membrana in circuitu quæ extrinsecus est appositæ χαρίον, internam matricem sublinens, ne à subiacentibus matrix tangatur. Atque per hanc membranam mediam foetus ipse matri copulatur. His qui dem plura habes ex Gal. vsus partium lib. xv.

Αλαρτοιδής, membrana, id est sarcimen à figura, ex formineo semine generatur: initium suum ex meatu, qui θυράκις dicitur accipiens. Caterum ad uteri apices emergit, clunibus & pedibus incumbens. Vsus eius foetui est, ut urinam animalis iam efformati recipiat, cum sit melius non per pudendum urinam foetum reddere, sed per umbilicum. Galenus lib. de Dissectione vulvæ: & ij. de Semine, & vsus partium lib. xiiij. & xv.

Ανὰ βρωσις, solutio continuitatis ex corrosione est. Fit autem vel ab interno corrosio, id est, ab humoribus malis erodentibus, vel ab externo, igne videlicet, aut similem ei vim habentibus medicamentis. Facta ab interno erosio, si ossa vitientur: quæ recentioribus medicis venositas spinæ vocatur. Gal. lib. iij. Meth. medendi.

Ανακαρδus ἀνακαρδιον Actuario à cordis figura & colore dictum: veteribus Græcis & Latinis medicis indictum, an quia incognitum haud scio. Affectus cerebri & nervorum humefcentes frigefcentesque mirifice iuvare experimento elicit: admodum cuti, utpote causticum, vicerat, & verrucas in totum tollit. Frequentissima est Anacardus planta in India, Sicilia, & Apulia regionibus Italicis.

Αναγallis ἀναγallis θήλεια, id est, scemina: morsus gallinæ vulgaribus: cuius flos violaceus seu cœruleus deprehenditur, quam quidam per Corchoron à Nicanandro in Theriacis significatam existimant. Est præterea & Anagallis mas, qui sub hoc nomine κορελλία ab Aegyneta describitur: cuius flores punicei micantes cernuntur. Viribus paulò maioribus mas est, quàm scemina, quemadmodum testantur Diosco. & Galenus. Aëtius scribit herbam utramque vim abstergendi habere, & quidpiam calidi, attractorisque ut surculos impactos auellat, utraque immordacem excicandi virtutem habens.

Αναγυρίς ἀναγυρίς, frutex est arboris instar: neque, ut quibusdam placet, malua terrestis, sed cuius lignum graui odore est: foliis Amerinæ, virgisque: flore brasseæ. semen in corniculis non breuibus gignit, subrotundum firmum, versicolori facie, simile renibus, quod durefcit vua maturefciente. Hæc Dioscorides. Nomen autem habet ab excitando, quòd ea excitata deterrimum odorem emittat, digerentis exalfacientisque facultatis: semen autem magis est subtilium partium, ut vomitum prouocet Gal. Simpl. lib. vi. & Aegyneta lib. vii.

Ανασαρξ ἀνασάρκη, καὶ ὑποσάρκη, καὶ λευκοφλεγματος, fit quoties per totum corpus humor pituitosus disseminatur, ut spongiarum aut papyri instar, vniuersa caro madida appareat. Ideoque totum corpus in ea intumescit, ac mortuo simile euadit: atque hæc hydropilis species tertia, variis tamen sub nominibus est. Quare dicitur Hydropilis.

Αναήνητις, avis nota in paludibus, stagnis & fluuiorum ripis, cui naturalis est, imbribus maximè rigentibus versatur. Avis huius caro stomacho ad conficiendum durissima, & imputum sanguinem ad generandum procliui: caterum cocta caro vel lixa, vel assa seruatæque breuiter, ut cryda, putrescit, ut in grandes etiam vermes

mes terrestribus non ab similes transferatur. Verum anaris semina oua aliquibus minus vituperantur, quod est ventriculo bene conferant: sed fide dignis hominibus cum Bufone auis hæc sæpenumero coire visa est.

*Anastomoticum*, id est, ora vasorum seu arteriarum & venarum aperiens, est calidum, acre, mordax, crassarum partium, & tertenum: vt Cyclaminus, allium, porrum, & huiusmodi.

*Anastomosis*, est quæ accidit propter rum vasis imbecillitatem, tum sanguinis qui ad os imperu eius ruat copiam: ad hæc acrem quampiam quæ illi extrinsecus incidat qualitatem. Diapodesis verò ex tunica quidem ipsa rarsa facta, sanguinem verò tenuato oritur: accidere præterea interim potest & ex graciliū vasorum ore ad aperto. Curationem horum affectuum copiose docet Gal. lib. v. Meth.

*Anastomotice ἀναστομωτική*, alia est atque calastice καλαστική, vi apud Græcos diuersis quoque verbis sunt reddendæ Latinis. Igitur quoniam καλαστική, communī vsu laxatiuum consueuimus interpretari, ἀναστομωτική aliter est interpretanda: quæ teserandi, vel aperiendi significatum adfert. Difficultatis huius interpretis est Manardus Epist. lib. viij. Epistola ij.

Idem Galenus locorum affectuum lib. iij. cap. ix. ex Hippocr. hæc refert, inquietas venas frangit aqua frigida, atque ipsa per se eruptiones non facit, sed quia tunicas venarum frigiditate sua duras, & extendi contumaces reddens, vt rumpantur paratioris efficit. Ruptionis verò causa est, aut vehemens motus, aut humorum abundantia, qui vel per se, vel vnâ cum frigido & crudo & flatuoso spiritu, venas extendunt: cuius fractionis indicium præbet, subita plurimi ætuoris vacuatio, &c.

*Anastomosis* Celso Artium lib. iij. cap. iij. fit aliquando gutture & arteriis vltimis: frequens rulsis quoque sanguinem extendit. Interdum etiam & fieri solet vt aut ex pulmone, aut ex pectore, aut ex larete, aut ex iecinore feratur. Tres sunt differentes anastomoses, prima διαβρωσις, secunda πυγμοκαρμὸς, tertia ἀναστομωσις, quarum vltima minimè nocet: prima quidem grauissimè: ac sæpè euenit vt sanguinem pus sequatur.

*Anatome*, id est membrorum corporis dissectio, est speculatio eorum, quæ extrinsecus non videntur. Fit autem arte & exercitatione: ab accidente autem, quia soli empirici vtuntur. Gal. Simpl. facul. lib. x. de anatome hæc refert. Anatome viuorum si à regibus fiat in hominibus mortui condemnatis, nihil græue committi: atque quanta utilitas exteriorum & interiorum anatome, tum quomodo physice subleuiat, tum vtilissima & necessaria quæ sit, in libris ix. anatomicis Galeni. luculentissimam habes descriptionē. Sed quàm crudele, atque inhumanū viuorum corpora dissectare, ex Celso Galenus abhorruit.

*Anchusa ἀνχούσα*, herba, orchaneta herbariis dicta, officinis Partifinis Leprosaria, ex genere buglosi est nullius quod sciam, vsus. Est & anchusa Alcibiadis, de qua pereda est dictio Echion. Tertij generis anchusa alia est, cuius radice, mulierculæ cum aqua & cerussa lixiua facta capillos curiose tingunt: post frugum messem colligitur verum. Occurrit & quarta anchusa, quæ λυχνίς, id est, lingua lupina quibusdam suspicatur. Anchusa Dioscori lib. quarto. cap. xxi. nomine alio Calix, & onoclia appellatur: cuius folia sunt laetæ in acumen fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, multa & humida sparsa, spinis horrida: manus inficit radix sanguineo colore, & vi astrictoria est. Gal. lib. vi. Simplic. quatuor anchusarū species, & viribus differentes distinctè scribit.

*Androface ἀνδρόφαξ*, plerisque herbariis Cassuta est, vulgò cuscūta herba appellata, non quidem ex sententia Musæ referentis Plinium in hæc verba. Istria est Androface seracissima atque hæc habet radicem sapore præditam amarissimo: quâ occasione à Græcis pictis appellatur. Quæ Dioscoridis androface est, tendens spargit innocos sine foliis, folliculos, in capitulis habens, in quibus semen continetur: atque hæc copiosa hydricis vrinam ciet.

*Androsenum ἀνδρόσημον*, hypericum vulgatum Manardus, & Euricius Cor-

dus esse opinatur: quanquam ab hyperico, ascyroque, Dioscoride auctore, differt, quod fruticea ramulis furculosis, ac tenuibus: rubentibus virgis, & rutæ foliis, sed maioribus. Hypericum verò furculaceo frutice est, rubentæ folio rutæ: flore albæ violæ luteo, subhirsuta filiqua hordæi magnitudine, semine intrus nigro, resinosis odoris. Ascyron autem hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosiusque est, fructum habens hyperico non dissimilem, viribus neque imparibus habentur.

*Anemone ἀνέμων*, pharmacopeis herba venti nominata: sed & altera est butacei generis, quæ ἀνέμων ἀμυγνίς, Græcis dicitur: quam Porfirion aliqui dixerunt, quod Leuconium bulbosum in sylvis depræhensum est. Manardus Anemonem Diosc. à multis pro papavere rubro sumitur, quia nunquam nisi vento flante, aperitur flos: Musa tamen distinctum à papavere agresti inquit, rubrum papaver Anemone Diosc. est: quippe erraticum papaver duos tantum colores habet, rufum & album.

*Anethum ἀνθον*, vulgaris notitiæ est, ita tamen cū Sylvio sentire malo, quam cum nonnullis anisum vulgare Græcorum anethum initio tertij ordinis calidum, siccum primo affirmare. Anethum verò vulgare calidius, siccius: anisum Græcorum calidum siccum tertio gradum: nam vero veterum aniso, ut Diosc. & Galeni lectione coniectandum est, caremus.

*Anisum vel anesum, ἀνίσον* & ἀνίσον, varium reperitur, atque inter prima laudatur Creticum: eius loco & penuria anisum dulces usurpatur: quod Actuarius γλακάνη, sæpius appellat.

*Anthera*, est rosarum interior flos flavescent, in quo semen est & capillus, totumque Anthera vocatur, cū anthera Græcis compositio sit rosæ siccae & alia recipiens: quin & sine rosarum flore Anthera medicamentum memoratum à Gal. lib. vj. composit. pharma. c. Celsus lib. vj. cap. xj.

*Aneurysma, ἀνέυρυσμα* tumor blandus tactu est, digitisque cedens, sanguine & spiritu contractus. vel tumor est ex Galeno, ex vulnere arteriæ tum oriens, cū incubens ipsi arteriæ cutis ad cicatricem pervenerit: verum arteriæ vlcus neque concrevit, neque cicatricē recepit, neque carne obturatum est. Aneurysma quid, & quando fit: vel arteriarum, vel venarum ex incisuris, si aliis magis, si aliis minus superuenit, aperit Gal. Meth. med. lib. v.

*Ancycloides* vel coracoides processus anterior omoplætæ est, similis anchoræ, velostro corui collum tendentis. Quare dicit. Omoplætæ, & Galenum in libro de Ossibus.

*Anguilla, ἄγγελος*, quæ in ordine piscium est, cuius quidem cato difficilimè concoqui ventriculo præfertim hianti atque invalido, creditur: quandoquidem febrientibus cibis perniciosissimus. Est denique anguillæ species, Latinis Acus nomine: Græcis verò ἰσβελὼν, καὶ ἡ ῥαφίς, aliis autē nonnullis Collum Ciconiæ, vel Gruis, à similitudine piscis appellatur marinis piscatoribus. Totus piscis mali succi est, ut anguillæ, & Lápreatæ, quæ perperam plerisque Murena appellationem habuit. Anguis si estur, à strumis liberat: author est Celsus libro quinto capite de Struma & eius curatione.

*Angina συνάγκη & χυλάγκη*, est inflammatio in gutture vel faucibus, acutissimum malum & strangulatu præsentaneum vitæ discrimen inferens. Veteres medici passionem omnes in iis locis euenientes, quas spirandi facultas comitatur, angina nomine vocant. Huius quatuor inturruunt differentie, una vbi fauces inflammantur: altera, vbi neque fauces, neque reliquæ oris partes, neque etiam extremarum partium vlla inflammata videtur: æger tamen suffocationis periculum in gutture sentit: tertia quando gutturis partes tum externæ, tum internæ, similiter tum inflammantur: quarta, vbi ad anteriorem regionem cervicis vertebrae luxantur

luxantur & inde cauus apparere locus, dolorémque quando tangitur æget sentit. Gal' Locorum affect. lib. iij. capite v. A Egyneta lib. iij. cap. xvij. Celsus de faucium morbis, æ curatione de angina, de quæ eius speciebus deinde de spirandi difficultate, necnon de tussi, diligenter tractat. lib. iij. cap. iij.

*Anhelatio*, inquit Cælius, siue suspirium, ab accidenti nomen sumpsit. Vocatur præterea secundum aliquos spicationis difficultas, quam Græci *δυσπνοια* vocant, siue orthopnoeam *ορθοπνοια*, siquidem sese præfocari, sentiant cum iacuerint ægotantes: atque erecti facilius spirent. Item, vt alij dicunt, contrario vocabulo suæ virtutis nomen accepit. Nam cum sui ratione conuertat ac depræuet tanquam corrigat orthopnoea vocatur, quam nos spirandi correctionem dicere poterimus. Multa enim contrariæ interpretationis vocabulum sumpserunt, vt sella, quæ Græci glycea vocant, velut dulcia, cum sint amarissima. Grauat autem atque premit hæc passio magis mulieribus viros, & iuuenibus senes atque pueros, & durioribus natura corporibus teneriora, hyberno atque nocte magis, quàm die, vel æstate, in quibusdam ex initio generatur: in quibusdam perfectis irruit passionibus. Sed magis ex profundo frigore sequitur patientes spirationis difficultas, & frequenter natura celerior magis, quàm tarda. Item præfocationis sensus secundum thoracem, atque granedo, & feruor igneus. Item euteron ad superiora conductio, & cum passio vehementescere coeperit, stridor atque sibilatio pectoris cum pectoris debilitate. Tū extensio colli atque vultus cum rubore, & oculorum suspensio attentu, & iacendi potestas schemate supino, tussicula nunc arida, nunc vuida cum sputis tenuibus & spumosis, & crasis & viscosis, & fudoribus & colore morbidò, atque pulsu homili. At si grauior imperus superpositionis fuerit, ora ægotantium liuescunt: & excluso per nares humore mucilento reuelantur, atque præfocationis carént metu: quod non aliter cedit, etiam si super oculos lachrymarum fuerit fluor. Quæ sequuntur ex ipso Cælio curiosius perlegat lector.

*Angulus*, est qui fit ex duarum linearum mutuo contactu: est enim figuræ particula à lineæ contactu in amplitudinem surgens. Rectus angulus, qui ex linea super lineam cadente, & vtrinq; altrinsecus duos inuicem æquales angulos faciente causatur. Obtusus, qui recto maior. Acutus, qui recto minor. Rectilineus, qui ex rectis lineis causatur: aut quem rectæ lineæ continent. Curuus, siue circularis, quem lineæ curuæ, siue circulares causant, vt in sectione circularum fieri videmus. Spheræ, quem duo circuli sphæræ suis circumferentiis continent, quales in quouis globo sunt ex intersectione circularum.

*Anima*, est actus primus & perfectus corporis organicè in potestate vitæ habentis, nec quibusquam partibus constat: animus autem consilij particeps est, anima vitæ. Atque hæc in stirpibus simplex est, quam altricem physici appellant, quæ scilicet illæ alimentum attrahunt, retinent, & in vniuersas sui partes distribuunt, illisque assimilant: & quod in alimonia verti non potest, excernunt. Brutis verò animantibus anima duplex est, quæ à nobiliori sua actione sentiens appellatur, sub se comprehendens altricem. Longè autem homini nobilissima est anima, quæ à ratione, quæ solus homo vititur, rationalis appellatur. Anima præterea pro animo, pro vita, pro spiritu apud plerosque auctores accipi solet: quam Galenus nescire confessus est in libro de Conceptu. At animæ speciei tertie animal particeps est, quam inter phrenas, id est, mentes, seu septum transversum, & vmbilicum locari sensus est: cui nulla proprietas aut opinio, aut ratio, aut mens inest: sensus suauis, & tristis cum cupiditatibus coniunctus. Hæc Plato in Timæo, cuius interpretes Gal.

*Animus*, est quo homines sumus, quo sapimus & intelligimus, quæ vis non est educta de potentia materiæ, sed à Deo immortalis de nihilo creatur eodem tempore, quo & in corpus nostrum infunditur.

*Animi* perturbaciones, sunt turbidi concitatiue motus in homine, quod magna illarum vis sit, & miras in corpore motiones excitent: id quod timor, gaudium, ira, & vrecundia euidenter declarant. Quare dicit. Timor. Animal, est

substantia animata, sensoria, quæ naturæ impetu, ac voluntate mouetur: quod voluntario nimirum se motu exercet. A tribus item principiis gubernatur, quorum quidem alterum in cerebro: in corde alterum: tertium in iecinore quod sedem obtineat: ut ex Platone in Timæo refert Galenus.

*Animal*, est quod constituitur humoribus quatuor, sanguine, pituita, bile flaua, & atra: partibus totidem anni correspondentibus, ac elementis, calido, frigido, humido, siccò simul temperatis: ex doctrina Galeni super Hippocrate libro de natura humana, de Elementis, & de Temperamentis.

*Animalis* facultas primaria, est quæ propter quam qua imaginatur, & ratiocinatur: vitalis, est quæ sine qua viuere non dicitur: vegetatrix, per quam in melius corporis partes augetur. Alia animalis facultas, est quæ ex cerebro per nervos, ceu fistulas quasdam, sensum & motum in totum corpus transmittit, ac intellectum fouet: hinc nomine alio ratiocinatrix λογιστική, dicitur: ea voluntariis actionibus præcedit cum sensibus præsidet.

*Animalis* spiritus, est qui in cerebro sedem habere fertur: & per nervos in vniuersum corpus diffunditur, mouendi, sentiendique facultatem præbens. Animalis quidem spiritus dicitur, non quod animæ substantia, sed potius primum eius ibi habitantis instrumentum sit. Generatur ex vitali spiritu sursum per arterias elato, perfectius cocto, & elaborato: In quem sanè vsum reticularem plexum, quasi varium quamdam labyrinthum in cerebrum natura fabricauit. Quæritur dictionem, Spiritus.

*Animalis* item spiritus, à temperie & cerebri natura fit: in cerebro etiam nutritur, partim à spiritu attracto ex natibus, & in reti mirabili partim quoque nutritur, & conficitur in cerebri ventriculis. Officium eius est præstare sensum & motum, qui à cerebro in vniuersum corpus per nervos deferuntur: vtrum tamen feratur per nervos secundum substantiam, an secundum rationem parui faciendum est: ut Galenus in libro de Sedibus affectis, & de Symptoma. causis declarat. Cæterum animalis spiritus, ac visibilis quid differant: inter visionis generatione, repetendus est Galenus in libro de Oculis, Theoremate secundo, capite quinto & sexto.

*Anni* tempus partibus quatuor distinctum est, in ver, æstatem, autumnum, & hyemem. Harum quidem curationi tempus optimum, opportunissimumque verum est: aut certe nequo seruens, neque frigidum: si quidem ægritudines, & nimius calor, & nimium frigus infestant: maximè tamen horum varietas, idèque perniciosissimus autumnus est. Hæc Celsus lib. v. Artium, cap. de observationibus. Ob id ipsum etiam anni tempora consideranda, quibus methodo certa ægritudines curantur, monet Gal. Meth. med. lib. iij.

*Animi* mores qui, & quomodo animal biliosum ac pituitosum reddunt: quoniam animi affectus febrem accendunt, ac grauissimis morbis initia præbent: ipsi tametsi ad debitum modum reuocatis, ægros non paucos, nulla etiam pharmacorum appositione, curari certum est, ac per sanari: itaque animi sanitas philosopho mandatur. Galenus libro primo Sanitatis tuendæ animum pueri fingere docet secundo septennio, quod videlicet id tempus aptissimum ac opportunissimum probis consuetudinibus, & grauib. disciplinis, quæ animi modestiam pariant. Quare ne infantes in aliquos animi motus incurrant, qui optimi sunt temperamenti, non leui cura indigent: estque anima actiuarum ipsarumque optimarum qualitarum temperamentum.

*Animalia*, alia aliis sicciora sunt: alia humidiora, speciatim inter se collata, ut canis homine siccior est, homo humidior: ac canis formicæ collatus & api, humidior inuenitur: nulla verò sicciora. Gal. Temperament. lib. primo.

*Animalis* prima constitutio ex sanguine & semine est, quæ humida & calidæ res sunt: cuiusque animalis nuper nati corpus propter redundantem in eo humorem liberis ne quidem edendum. Gal. Temperam. ij. libro.



*Animantia* quæ frigidiori sunt natura per hyemem ob frigoris vim, perinde ac si mortua essent, latitare solent, quemadmodum viperæ, anguësque: quas si manibus tractes haud quaquam mordent: eadémque animantia haud obscurè declarant frigidam distemperantiam animales actiones torpidas efficere: ea quoque hyeme delurescentia adipe fiunt obesa. Locorum affect. lib. iij.

*Animalium* vetula recénsque caro vitanda: illa námque durior, concoctiùque difficilior: hæc immodicè humida, & excrementosa, ac maximè ex animalium generibus est humida suilla, & ouilla. Meth. lib. viij.

*Anodinum*, id est sedans dolorem, vacuata doloris causa, calidum primo excessu, tenuium partium, Galenus libro primo compositionum pharmac. secundum genera. Narcoticum anodino contrarium, quia frigidum, crassum, nomine tantum abusuè anodinum dictum, quia tactum stupefacit, sine quo non est dolor.

*Anodina* antidota seu medicamenta, ea sunt, quæ paruum existunt tenuium, & non multò calidiora, quàm symetra sunt: ideoque necesse est vt euacuent & discutiant: tum rarefaciant, extenuent, concoquant, & æquabile reddant quicquid in partibus dolore vexatis, aut humorum acrim, aut lentorum, aut crassorum, aut multorum meatibus infractorum, aut etiã vaporosi, aut crassi, aut admodum frigidi spiritus exitum commodum non inuenientis, cohibitum atque inclusum est: itaque nihil prorsus adstrictionis habeant oportet. Quare anodina quibus exhibenda, & ipsorum soporiferorum differentia, & quibus quando vtendum, & quomodo, Galenus maximè ab usu grauius sopientium abhorruit. Meth. med. lib. xij.

*Anodinarum* sicuti cauendus est vsus quoad fieri potest, ita si vrget necessitas, omnino non contemnendus: quoniam anodina soporifera magis salubria sunt, si post annum sumuntur.

*Antidotum*, est medicamentum quod non extrinsecus impositum, sed intra corpus assumptum malis mederur: atque in treis partibus differentias, quarum primum lætaliū gratia medicamentorum offertur: quoddam propter bestias virus iaculantes: quoddam verò malis ex prauo visu obortis auxiliatur: vt Mithridatis antidotum aduersus venenorum pericula: aut theriaca aduersus venenatos ictus serpentum.

*Antibrax carbacea*, fit cum sanguis & feruescens in aliquam corporis particulam decumbens cutim exusserit. Incipit plerumque à pustula ambustis consimili, interrim verò & sine hac. Qui malo hoc corripiuntur, particulam omnino scabunt, vnde pustula orta rumpitur, atque adeo vlcus non crusta gignitur. Est tamen & aliud carbunculi genus, quod ex humore crasso feruentēque nascitur. Sæpe verò non ab vna oritur pustula carbo, sed multæ exiles veluti scabentibus milij semina, cræbræ in particula residentes: quibus perruptis, similiter crustosum vlcus provenit. Galenus xiiij. Methodi. In carbunculo non est aduertenda fluxio, quoniam eo qui affliguntur, necessario febricitant: sed superposita remedia modicè reprimendo digerunt, vt refrigerantia desideret.

*Anthriscus* & anthriscum *æthiops*, herba est scandici adeo similis, vt eadem videri posset, nisi tenuioribus odoratoribusque foliis distingueretur. Hæc viribus quidem est, quod fatigato venere corpori succurrat: lāmque senio marcescentes coitus exciter, & alba sceminarum sistat profluvia. Plinius libro vigesimo, capite decimoquinto.

*Antispodium* Dioscoridis, & Galeni, vocatur à medicis omne id, quod cum spodio facultatem habet: quæque in spodij inopia pro eo possunt supponi. Quære dist. Spodium.

*Antimonium*, id est, stibium, stimmi Manardò, quod Plinius platyophthalmum vocatur scribit, quia in oculorum medicinis efficax est: quo eo mulieres etiã fucantur, gynæceum appellatum est. Diosc. libro quinto, capite quadragesimo nono.

Galenus libro nono Simpl. medicament.

*Asper* ἄσπερος, avis, cuius caro difficillimè conficitur: a læta tamen, iecur, & pedes, si peritis credendum medicis, ad coquendum non rebellant. Oua quinetiam in precio habentur ob nutrimentum, & concocti sunt facilia.

• *Artiosmosis*, Latinis reuulsio, est quæ ad contraria fit vacuatio: cuius tres videtur descripsisse diuersas differentias Galenus in libro de Misione sanguinis per venas, vt asserit Manardus Epistolarum lib. xij. Epistola quinta, sic inquires: Si quis contendat omnem reuulsionem à Galeno sub triplici illa diuisione fuisse comprehensam, dicam vel à dextro ad sinistrum, si in sinistra parte fuerit inflammatio: vel è contra, si in dextra facere reuulsionem, atque ita ad secundum genus ibi recitatum, hoc est, ad eam quæ secundum latitudinem fit, esse reducendam, & inter reuulsivas omnino computandam. Reuulsio itaque omnis euacuatio est, & non contra, vt est author Galenus Meth. med. lib. xij. & v.

*Aspe* ἄσπετος, genus intibi ex Theophrasto suspicatur, quod à Gaza Fraus conuersum est, eo quod gustantes a maritudine decipiat.

*Aspis* ἄσπις, siue Ischas, est raphanus syluestris, sic dictus, quoniam rotundam instar pyri habet radicem: iuncos duos, siue tres spargit, rubros, tenues, qui à terra parum attolluntur. Cætera ex Dioscorid. sunt petenda, descriptionem scilicet & facultates. Galenus sub nomine Rhaphanis hanc plantam assignat: quam excessu tertio excalfacere, defecare verò secundo, vt pote domesticæ efficaciorern, contendit. Quin & semen ipsum planta efficacius est. Radice raphanidis vtuntur medicorum hac nostra ætate plerique in macerandis affectorum corporum abditis per inediam. Ebena relicto, verum quantum profecerint fumentes hactenus haud compertum habeo.

*Asium* σίλινα, multiplex est: nam quod vulgò petrapium siue petroselinum vocatur, apij grandioris species quidem est, persillum vulgus nominat: at palustre ἡμισσίλιον, neque illud est, quod Berula palustris suspicatur: quod autem apium montanum aliquando fuit, Græcis, & Latinis ἀπρισίλιον videtur dictum quin & vtiliter cognoscitur, atque v sui aptatur, passim quoque hortis nutritur. Apium siquidem grande, quod Macedonicum petroselinum est, Græcis, ἡπιοσίλιον, cuius semine purgantur equi post torminum dolores, non accepit nomen, sed à sua ipsius magnitudine: non illud est, quo, post persillum, peculiariter passimque vtimur. Quod coniectandum est hortense apium non nostrum esse persillum, obsoniis vulgare. Quare dist. Olusatrum.

*Apocynum* ἡ τὸν κύων καὶ κύνοκραμζῆ, id est Brasica canina, siue erratica, hippomanes quibusdam auguratur, quod de ea si equi ederint, in furorem, vt scribit Hesiodus, coguntur. Ἀποκύνον præterea δὲ μὲν ζῆα μετὰ γάλακτι φαρμάκῳ πρὸς ἀναίρεσιν κύων, id est Apocynum panis est ex veneno aliquo pictus, ad interficiendos canes. Quare Catonem de Brasica, in lib. de Re rustica versus finem.

*Appetitus*, est diuersi cibi, & potus desiderium, seu appetentia animantibus à natura distributa. Est & caninus appetitus contraria amissioni appetitus passio: plures enim appetunt cibos sic affecti, atque cum appetitum cohibere nequeunt, in ingerendis cibis modum excedunt: deinde eorum multitudine grauati, & assumptos cibos citra nocumentum ferre non potentes, ad vomitum diuertunt: postea rursus se expletis, iterum ad vomitum redeunt, quemadmodum canes.

*Appetitus* vehemens animalis non caloris copia accidit, sed contra, refrigeratis scilicet his partibus quibus appetentia debetur: quoniam appetentia in conuenientis sibi qualitatibus omnibus animalis inesse partibus, odiūque contrarij: itaque appetentia si fuerit attractio, erit & fructio aliqua: cuius siquidem quinque illi occurrunt symptomata, vt author est Gal Symptoma. lib. primo, Temperam. lib. ij. facultatum, natur. libro iij. & Methodi medendi libro viij. de appetentia deiecta continuatione diarrhææ



diatēchēz ex cruditate ventriculi.

*Apiastrum* μελισσόφυλλον, herba est, quæ apes mirum in modum delectari videtur: vulgò melissa appellatur. Tota herba iucundi odoris est, ut citreum malum suo odoratu oleat: quas autem vires habet aperias facit Dioscorid. lib. iij. cap. xcix. Galenus lib. vii. Simpl. Citraginem vocat, cuius loco marrubio odoro vitendum monet. Ceterum si cui fortè ad manum quandoque marrubium non fuerit, illo uti liceat, modo non exciderit quando ab hoc exuperetur.

*Aphace* ἄφακς, vulgus domesticum Gesses, leguminis genus est: cuius vires sunt adstringentes, sicut in ipsa lenticula, quæ φακς Græcis est, estur ut lenticula, sed ægriùs concoquitur: et in moderato calore valenter desiccatur, minùs autem ipsa lenticula.

*Apophysis*, est grandioris totius ossis pars, & ab epiphyssi diuersa. Galenus in libr. de ossibus, & Anatomes.

*Apoplexia* ἀπὸ πλῆξια, est passio in qua còmuni omnium neruorù principio patiente, omnes corporis particulæ motum & sensum simul amittunt: vel, est priuatio sensus & motus in vniuerso corpore, cum functionum à voluntatis imperio prodeuntium læsione, subito superueniens. Latini Antonium morbum vocant. Author Galen. locorum affect. lib. iij. cap. x. Celsus lib. vi. cap. xxvi. Item Galenus libro primo de Morborum differentiis.

*Apozema* ἀποζῆμα, est ex variis simplicibus cum purissima aqua decoctum, seu condimentum, medicamenti vim habens concoctricem, digestiuam & expultricem. Compositiones autem diuersas ac multiplices tractat Actuarius, & post eum qui habentur posteriores medicæ, etiam emundissimi.

*Apostema* ἀποστήμα, latinè abscessus, de quo suprà egimus.

*Aphthæ* ἄφθαι, vlcera sunt quæ in ore fiunt nõ adeò profunda, sed quæ in superficie oris accidunt, igneæ caliditatis quippiam habentia. Genus hoc apostematis communis medici Alcola appellant. Meminit & Celsus Artium lib. ij. capite primo, & lib. v. meth. med. Galenus curationis author est. Sed & abscessus quoque ad Glauconem lib. ij. non minùs diligenter curandi viam ex Galeno ipso tradit medicinz doctissimus Akakia.

*Apepsia*, ventriculi vitium est, quod Latini medici cruditatem vocant, cum cibi scilicet in ventriculo non mutantur. Differt autem à dyspepsia, & à βραδύπνοια, quæ species tertia est, de qua paulò ante dictum mihi est.

*Apoplegmatisimus* ἀποπλεγματισμος, id est pituita ex cerebro à capite per os trahens: siue euacutio per medicamenta, quæ in ore retinentur & commanducantur: sub quibus quoque comprehenduntur sternutamenta cientia, & alia quæ per nares ipsa scerebrum euacuant medicamenta.

*Apostema* ventosum vulgaribus medicis quod est, Græcis ἐμφύημα, nomen habet, & hoc pacto fieri scribitur: Tumores aut ab humoribus fiunt, aut flatuosos spiritum, qui quandoque sub cute, quandoque sub periostiis membranis, quandoque in ventre aut in intestinis, quandoque in medio horum & peritonæi colligitur. Si ab humoribus, aut calidi aut frigidi sunt, aut mixti calidi aut sunt à sanguine bono, & phlegmone, hoc est, inflammatio est: aut à bile, vel seruenti & tenui sanguine, vel sanguine & bile calidioribus quæ inflammatio Græcis ἐρυσίαιλας, Latinis verò ignis sacer. Frigidi vel à tenui pituita, ut ἀῖδημα, id est tumor laxus: aut ab humore atræ bilis, vel crassa & tenaci pituita, ut σκῆρρος, id est durities. Miscentur interdù simul hi tumores: & si alter alteri dominetur, dominantis nomē præfertur: si verò sunt pares, per copulam vnà coniungimus: atque in ceteris, si trium, vel plurium sit commixtio, copulabimus. Atque hi quidem principales sunt tumores: nonnulli tamen alij occurrunt, qui licet sub aliquo dictorum generum comprehenduntur, variis tamen ex cau-

sis diuerſa fortiti ſunt nomina : ſicuti phygthlon , phyma , & bubon , laxarum partium affectus, quas adenas Græci vocant: de quibus omnibus ſuo dicitur loco.

*Aqua ſidæpea* eſt, quæ exactè & ſyncerè alterius ſubſtantiæ miſtione vacat. Ita, quæ puriſſima aqua ſenſibus tribus iudicatur, gultu, viſu, olfactu arque pondere: gultu, vt nullam prorsus qualitatē præ ſe ſorat, ſed videatur ab omni qualitate immunis: ſid eſt enim Græcorum ἀμιον viſu, vt pura ſit ſyncera, & exquisitè clara. Olfactu, quum eorum nihil ei ineſt, quæ in aquis vitioſis eſſe olfactus teſtatur. Pondere, vt ex terarum aquarum leuitatem facile ſuperet: quæ iam ſi in præcordiis, poſtquam bibita eſt, non fluctuat, ſed deſcendit maturè, potiorem non deſyderabis. Galenus libro primo Simpl. medio, cap. iiii. & in libello de Renum affectibus, ubi negat aquam ſimplicem poſſe conuerti in alimentum: contra eos qui aliter ſentiunt. Aquæ dignoſco ex Hipp. Aph. lib. v. Aph. xxvj.

*Aqua* inter cutē palpebræ, ὕδατις Græcis dicitur: eſt pinguis quardā ſuperioris palpebræ ſubſtantia, pondere ſuo ſic grauans, vt vix attollere oculū ſiueat, eoque aſſiduas fluctuationes excitat. Palpebræ enim in hoc malo aquam inter cutem repræſentāt. De aqua autem inter cutem totius vel partium corporis, Quare dicit Hydrops, & ex Hypp. Galenum Prædicat lib. ij. cap. primo.

*Aquila æætes*, vulgaris noticiæ auis eſt: cuius genus triplex repræſentatur rapina violentiſſimum: quarum quidem ſublīmior ſiue procerior oculos valde acres habet, adeo vt ſi ſelle eius ex melle probato hebetes acie oculi cuiuſvis animantis illiſcuntur, acutiores ſiant: hæc propter medicinam, ſunt diſta.

*Aqua* frigidæ intempeſtiua potatione ſecur refrigeratum affatim, aquam ſtatim inter cutem inducit, antequam ſcilicet in durum tumorem attollatur: vt teſtis Galenus locorum affectorum libro quinto, capite ſexto, qui non tamen negat frigidæ aquæ potionem à cibo per calotes aut æſtus pueris: quoniam quæ medio-cris frigidæ potio eſt, conſert, quæ immodica maximè lædit: & ſi frigida quoque eſt, non vi ſua, ſed per accidens calfacit: quale exemplum Galeni ex Hippocra. eſt hoc, vbi frigidæ aquæ multa perſuſio calorem reuocans diſtentionem ſoluit: quia calens non ſolum humectat, ſed & calfacit.

*Aqua* vitia ex frigidityte pendent omnia, cuius culpa & in præcordiis diutius moratur, & fluctuationes excitat, & in ſtatum mutatur & corrumpitur; atque ita ventriculi reſoluit robur, ſic vt deterius proinde concoquat: ſed nec digerendo per corpus alimento aliquid magnopere conducit Meth. lib. vij.

*Aquæ* omnes vim medicam præ ſe ferentes deſiccant, vt quæ ſulphureæ, a luminum, & quæ bituminis ſunt, aliquid horum ſubſtantiæ repræſentant, quò certè non ſimplices dicantur: vt Galenus paſſim deſcribit.

*Aracur* ὁ ἀραξος, leguminis genus eſt quod lenti innaiſcitur: rura veſciolam dicunt. Dioſcorides ſub hoc nomine Aphaca, meminit: cui vis adſtringendi eſt ſi torrefacta eſt: ſi freſca lentis more vtendum. Plinius Aracum ſructum appellauit, radi cibus ſolis, nec vlla ſuperficie conſtantem.

*Arbutus* ἡ ῥόζαρος, aliquibus Bruta arbor nuncupatur: cuius fructus adeo capiti & ventriculo nocet, vt ei vnedo nomen retinuerit, ex argumento vnum tantum edendi, Plinio hæc ſcribente. Arbutus autem appellatur non verè, quia hoc nomen Epimelidi tribuit Galenus. Meminit & Dioſcorides libro primo, capite cxxxvij.

*Arctium* ſiue arctium ἀρκτιον καὶ ἀρκτιον, perſonatia herba eſt maior, & minor: huic Pereciocinapi, alteri, Lappa nomen: variis capit ex Dioſcorid. vtrumque diſtinctum. Arctium verò illud ex Galeno quod Tapſo verbaſco eſt ſimile, radice tenera, candida, dulci, caule oblongo & molli, ſemine Cymino ſimili, ſacultatis eſt admodum tenuium partium: & ob id exſiccantis, & extergentis ſacultatis eſt. Arctium autem aliud, quod Lappa maior, Bardanaque eſt: ſemen proſert

profert dissipandi, extenuandi, & propulsandi vires habens: ac matricis refrigerat: semen potum dolores tum sedat, tum calfacit. Sed & Arctium tertium est, quod Galenus Protopitis nominat lib. vi. Simpl.

*Ardea* grandior, & Ardeola breuior *ἰσχυρὸς*, aues: quæ pullis volandi imperitis duces se præstare scriptoribus fertur. Auis vtriusque caro, in cibis parum grata est, quod laboriose in stomacho efficiatur: nam maioris excrementi, quam succi est.

*Ardens* febris, est quæ propter biliosi humoris copiam fit, cuius colore vrina si non inficitur, constat bilem in vasis non retineri, sed ad cerebrum sua leuitate ascendere. Itaque quibus vrinae alba & perspicua, malæ præfectum si in deliramentis appareant. Nos in dict. Febris distinctæ differentias febr. percurramus.

*Ardor* siue *ὑπὸ πυρετός*, est calor circa caput perseverans, ex sole æstiuo contractus. Vt si non tamen si ab ardore separat Galen. lib. decimo, Meth. med. sic inquit, Vt si nonnunquam corporis habitum consistat, quod ipsum scilicet febris principium, vbi cum horrore inuasit, stupationem subinde facit. Nam & frigiditas, & adstringentium vsus, mediam stupationem semper febrem excitant: quinetiam glutinosi & crassi, aut etiam copiosi succi, vbi mediocriter obstruxerunt, diariam febrem interdum accendunt. Denique lib. viij. Meth. Vt si non vult Galenus protinus ab initio refrigerationem desyderare, xnm crebriorē lauacrationem: minimè verò aut oleum largum, aut crebram frictionem: quod cum caput ardore captum est, rosaceo superfuso atque similibus eget, non alia frictione.

*Argemon ἀργεμών*, trinitiales medici Achimon, sit id vlus in oculi iridis circulo, exteriorem etiam locum occupans, ita vt intra iridem albus color, extra rubor appareat. Manard. Epist. lib. viij. Epistola secunda.

*Arca*, est cutis capitis, & faciei depillatio: cuius quoque duo sunt genera. Commune vtrique malum est, quod emortua pellicula summa pili primum extenuantur, deinde excidunt, ac si ictus locus est, sanguis exit liquidus, & mali odoris: increfcitque vtrunque in aliis celeriter, in aliis tardè. Peins, est quod cutem desam, & subpinguem, & ex toto glabram fecit: sed ea quæ ἀλαμπία nominatur, sub qualibet figura dilatur: sit & in capillo, & in barba. Id verò quod à serpentis similitudine ὀφιδιόσις appellatur, incipit ab occipicio: duorum digitorum altitudinem excedit, ad aures serpit, quibusdam etiam ad frontem, Celsus libro sexto, cap. iij.

*Araneus* titium generum animal est, vnm nomine holcon, siue lycos: quo in arceendis tertianis ad tempora apposito vtimur: tela eius vulnети imposita sanguinem sistit, & ab inflammationis iniuria vindicat. Alterum aranei genus, candidam, tenuè, densamque telam oditur: qui si in aluta ligatus, & lacerto appensus quartanis mederi dicitur: ex rosaceo decoctus & infusus aurium dolores finit. Tertium est, araneus mus, qui sui morsus, dissectus & impositus, veneficia luit. hæc Diosc. & AEGyneta.

*Argemone ἀργεμών*, cuius species tres à scriptoribus nonnullis describuntur, Hiero. Tragus suspicatur eam esse plantam, quam vulgus rosam frumenti vocat. Herba autem hæc nomen traxit ab ἀργεμα ὀφθαλμοί, quod oculorum albugines & maculas delect, estque absterforia & discussoria, vt prodit Galen.

*Arnoglossum* plantago maior est, quæ triplex passim legitur. Largus πολυπόρος, Plinius nerualis, & Apuleius quinqueneruiā vocari, tradit. Quare dict. Plantago.

*Argemon ἀργεμών*, est vlus quod in iridis oculi circulo nascitur, vndiqueque occupans, vt sic circa exteriorem iridis partem rubicundum, circa verò internam album appareat.

*Armenia* gleba vel terra, vulgò Bolus armenus, colore pallido vel luteo promptissimè calcis modo soluitur, aut quouis liquore alio affusa, summè siccat: ob id est optima sanguinis spuitioni, dysenteriae, ventris fluori, fluxionibus à capite ad thoracem, & inde nascenti a sthmatis, & phthoe, quia vlus in ea siccat, rursim sedat: vlcibus etiam putribus oris, fistulis ani remedio est. In pestilentia qui glebam hanc bibunt celeriter remediuntur.

*Armenius lapis*, præfertur levis, colore cartuleo, perquam æquabilis & friabilis non tautis deprehenditur viribus, quàm Chrysocholla. Nullum medicamentum efficiacius est melancholia correpris Armenio lapide loto vel illoto: verùm lotus quinque iagies securiùs exhibetur.

*Armeniaca mala* Plinio, & Columellæ, inter prima numerantur: quæ Abricoqua appellata isto seculo videntur. Quære dict. Persicum malum, seu Malum pers.

*Argentina* Manardo herba Asplenium est, quæ locis humidis in saxis nascitur: foliis scolopendræ vermi similis, quæ à nostris medicis Arabicis Citrachab aliis vulgaribus Argentina vocatur. Ex ea siquidem vnguentum facitatur ad lienis obstructionem peroptimù: quale namque est: Oleû capparorum, mucû alchæz, adipis anaris, asplenij in pollinem tenuissimum subacti, singulorum quantum videbitur satis.

*Argentum*, post aurum, metallorum purissimum, & temperatissimum: atque ut aurum in follicula & bracteolas ad medicinæ usum arte extenditur: ipso quoque auri loco vruntur virium restauracioni myropolz, felicitiùs propinatur, nisi ipso auro esset multò imperfectiùs atque impurius.

*Argentum*, volubilitate, viuum, ὁδραργυρος à consistentia Græcis dicitur, Latini verò à motu viuum, & à colore argentum: sed arte factum posterius libro nono. Simpl. existimar Galenus prius autem minerale vult Hermolauscum tam factitium ex minio, quàm minerale, seu in argenti fodinarum rectis stillatim concretum, siue per se in metallis inuentum Dioscorides ὁδραργυρον appellat. Argenum viuum, est metallorum omnium cum sulphure materia à calore temperatissimo sic per minima vitrum, ut siccum humido æqualiter in eo temperentur: vnde calore & frigore temperatum quoque dicitur: non quarto ordine cum quibusdam frigidum, cū aliis calidum. Eius usum in medicina docet Dioscorides: & qui sunt Diosc. sequuti Aëtius, AEGyneta, & posteriores. verùm Galenus nusquam est usus.

*Armoracia*, rapistrum agreste χριά, & χίρα. Græcis herba est folio, flore, & semine similis rapo, cui tamen si radix non bulbos est: rura rauencillas dicunt. Aliquibus παρὰς, id est, campestris raphanus siue armoracia. Quære Diosc. lib. cap. cv. & dict. Radix.

*Aroma* omne, id est quod amaritudinis, grauiusque odoris innocens est: fetoris quoque immune, ut zingiber, nux rusticica, cinnamomum, casia, caryophyllus, atque huiusmodi. Rhubarbarum siquidem ob excellentem quam habet amaritudinē, aromaticum percipitur: nam saporum nomina ad odores transferri docet Aristoteles, non contrà: amaritudinēque ipsa adeo est à propriè vocatis aromatibus aliena, ut quibus adest, quocunque odore præcellant, nomen aromatis auferat. Vinum etsi suo genuino odore fragrat, non ideo aromaticum, neque etiam inter aromata connumerandum, docet facultas.

*Aristolochia* torunda ἀριστολοχία, τριγγύλη: & est lingua aristolochia: & tertia nomine elementitis κληματίτις: & genus quartum, cuius nomen pistolochia est. Est numeriam ἀρίστη λοχούσας sic dicta, quia sit parturientibus optima & salubris. Dioscoridi & Galen. triplex numeratur, radices figura præcipuè distincta.

*Argutus* morbus ἱετπος, quod celestis arcus similitudinem, si colorem eius inspicias, habeat, nuncupatur. Aliter morbus regius, & æquatus Galeno locorum affest. lib. v. cap. vii. nominatur. Quære dict. Bilis vtriusque.

*Artis*, est compræhensionum similium congeries, quæ ad finem quandam vitæ cōmodum referri possunt: quoniam omnis ars à notioribus, ad ignotiora procedit. Facile enim ex certo, exquisitèque cognito, quod incognitum est, inuenitur. Namque ars & artifex, utique & ipsa ars & fortuna, quomodo sanitatis sint causæ, quamuis medicinæ ars longa vsque adeo sit, infinita ut credatur, docet Gale. Metho. med. lib. xi. & Aphorismor. libri primi, Aphorif. primo, atque in multis suorum operum libris.

*Arsenicum* veteribus Græcis archenicon, Latinis auripigmentum in iisdem metallis, vt auro, argento, quibus Sandaracha gignitur: ob id eadem gleba, ambo sæpe mista, videtur. Optimum existimatur crustosum, aureo colore micans, nulli materię permixtum, in scamas, tanquam bracteolas fissile: alterum globosum, pallidum, & colore sandaracham imitans.

*Artis* partes sunt, speculatiua, possessiua, actiua, perfectiua, à quibus medicina, quæ speculatur quibus principiis corpus constat, tueatur sanitatem: nihil operetur non ui, venam aperiat, luxata reponat: post actionis euident opus relinquat sanitatem, hæc Celsus.

*Artabe* Aegyptiaca mēsuræ genus, modios quinq; cōplet pro siccorū mensura.

*Artemisia* procerior est, quæ nostras: & tenuior, quæ agrestis legitur: eas inter matricarias esse neque contendimus. Est & vna, nomine *ματρίκαριος*, quæ vulgaris est: secunda, *ματρίκαριος*, quæ tenuior apparet, vulgò Marticaria. Hinc subsequitur *Artemisia* à *ματρίκαριος*, id est, vni ramis, quæ Athanasia nostras est, quæ quibudam Oculi Indici creditur. Vires habent excaustorias secundo excessu, & discicatorias versus finem primi: idque tenuium sunt partium, vt remum caleulos frangant expellantque: matricite refrigeratæ auxilium commodè ferunt tum potu, tum fomentis. Nam & sirupus facitatur ad matricis suffocationes vtilissimum.

*Arteria* omnis, est receptaculum sanguinis rarioris, puriorisque, commixti cum spiritu naturali: sensuque prædita est: cuius origo cor est. Nam sicuti cerebrum subministrat nervis, ac musculis: cor arteriis, iecur venis suppeditare virtutem functiones harum partium manifestant. Cætera ex Galeno habentur Meth. med. lib. vii.

*Arteria aspera* *τραχηλιὰ καὶ βρογχος*, fistula est, quæ à faucibus ad pulmones vsq; protenditur. Caput arteriæ huius guttur *ἀρτηρία* vocatur: quæ constat cartilaginibus quatuor. Hæc spiritus meatus est, exterior colli fistula ad pulmones, & cor pertinet, eousque aërem deducens, secatur in multas cauernas fistulas. Arteriæ asperæ corpus ipsum qualiter compositum est, sic varia curatione sanandum, quoniam variis, diuersisque implicatur ex cerebro humore acri defluente vlcerationum ægritudinibusquin & venarum & arteriarum, & cordis, & thoracis, & renum, & vtriusque vetricæ, commune est opus, cum euacuatio sit. Gal. lib. vii. Meth. med.

*Arteriæ* medicamen, ideo vocitatum, quod ad arteriæ tracheæ tumorem, rancitatem, vocis abscissionem, & ad ipsam arteriam exasperatam applicatur.

*Arthrodia*, est quæ cauum leuiter & in superficiei, & capitulum etiam depressum habet: oblongum autem, & depressum dicit Galenus capitulum, ad ceruicē id ipsum cui adna scitur referens, lib. de Ossibus.

*Articulus*, est naturalis ossiū cōpositio: ossiū verò naturalis vnio, symphy sis appellatur. Articuli autē differētiæ, Diarthrosis, ac videlicet Synarthrosis. Gal. de Ossib.

*Articularis* passio *αρθρίτις*, est vbi imbecillitas in omnibus corporis articulis consistit, humorque innaturalis ad eosdem confluat. Differunt itaque podagra, & arthritis non toto quidem genere, sed locis patientibus: in vtroque enim articulo est imbecillitas, & humor à natura alienus ad hos ipsos cōfluēs. Si ergo in pedibus cōstiterit, podagra appellatur: si verò reliquos actus occupauerit, articularis morbus nominatur.

*Artiola* *ἀρτιόλα*, panis genus delicatissimi, quod pusillo cum vino, lacte, oleo, & pipere pinfabatur, coquebatūque ad vsum. Plinius lib. xviij. capit. xi. & Ruel. lib. ij. cap. xliij.

*Arundo marina*, quæ sacra & crassior Diosc. habetur, apta olim quæ pro sagittis, & hastis vsurparetur: cuius tandem vsus apud posteros inoleuit, quanquam adhuc videtur in Græcia, atque ipsis vel ignota, vel vsui inexpecta.

*Arundo suppurans*, hoc est, fistularis, ea est de qua sunt calami scriptorij: at quæ *χαρακίς*, id est, vallaris arundo, in sepibus vallium frequens visitur: olim pro militum castris muniendis: imbrum coercendorum causa, fuit vtitatissima. Quæ arundo tibialis, siue musica ad faciendās ligulas tibicinum legitur, illique

illique instrumento armoniam accommodat. Arque ille crebrè in Brannonicum stagnantibus paludibus, stagnisque, hoc solum differte cognoscitur, quod altera mas, altera arundo forma sit.

*Arundo καλαμος*, Columellæ canna vocatur, de cuius radice calcinata alterum fieri solet Spodium, quo hodie vtuntur vulgares medici: & si Spodium verum in metallorum fornacibus ex Dioscoride, & Galeno, eruitur. Neque sanè eo inquam vtendum ad medicamentum corpus internum purgantia, quia veneni viribus pollet asperimis a priore quidem, quod Arabum inuentum est, ex cannarum radicibus, semoto omni etiam periculo vtendum. Quare dict. Spodium.

*Arundo* vernacula δῶναξ, iuncea, herbaceaque, foliis porri multò longioribus latioribusque: tota palustris, atque in aquis stagnantibus nascitur, priore quidem dissimilis: fert pappos in summitate ad culcitra valdè vtiles componenda: atque in eum vsum iam traxere Bellicèses Segusiz. Pl. Cypriā arundinè vocat, cuius radix inutilis.

*Aron*, & arifaron ἀρον, bulbosa herba est, quæ inter serpentarias annumeratur. Quidam ob similitudinem idem atque vnum simplex esse retulerunt: Aron, & Dracontium, quod ex Diosco. cognoscitur descriptione differri, diuersumque esse vtunque & figura, & viribus.

*Argentum* viuum manifestum, quod mercurius appellatur antiquorum vsu est aqua viscosa, substantiæ subtilis, albæ, rinctæ, per calorem temperatissimum vnita tali vnione per minima, quousque humidum temperetur à sicco, siccum æqualiter ab humido, vsque dum calidum contemperetur à frigido, & frigidum æqualiter à calido: nomen quoque sumpsit Mercurius à planetarum, instabilissimo Mercurio. Et hæc Geber de Argento viuo.

*As* vel alsis duodecim vnciis, quæ libra Romana est, constat. hæc siquidem medicæ pro libra, non ea, quæ est sexdecim, nec non myropolæ in pharmacorum exhibendorum mensura, vel pondere vtuntur. Partes autem eius sunt duodecim: deunx, vndecim: dextans, seu decunx, decem: dodrans, nouem: bes, octo: septunx, septem: semissis, sex: quincunx, quinque, rriens, quatuor: quadrans, tres: sextans, duo: vncia, vnum.

*Assarius*, ponderis genus est, & habet in se binas drachmas.

*Asa*, quæ duplex est, sitens & odorata, quæ pro liquore Syrenico Gal. vsurpatur: myropolæ Benzoin appellant: verum quæ sceter, Asa simpliciter auctoribus scribitur. Nam cuius odor est acceptus, Lasei, aut Lasepicium nō est. Quare dict. Lasei, & Lasepicium.

*Asarum ἀσάρω*, Bacchar olim Gallis, vt Italis, vt auctor est Vergilius, dicebatur: nunc quidem syllabarum inuersione vulgus Cabbarat, vocat. Quare dict. Baccharis.

*Asellus ὀνίσκος* piscis, specie quidem duplex, maior scilicet, & minor: vulgò Merlus, & Merluche, quibus Britannica Anglia abundat. Sic quidem ab asini colore, vt Varro scribit, piscis vterque est dictus. Febrientibus recens captus, & esus, non minùs saluber, referente Galeno, quàm quiuis alius saxatilis piscis.

*Aselli*, vermiculi sunt, qui Diosco. millepedæ vocantur, sub aquariis vasibus stabulantes, multis pedibus nituntur, & contactu re aliqua contrahuntur in orbem, ac si cōuellantur. Quæ verò experientia venerint in medicinæ vsum non facillè dictu est, nisi qui legerit Diosc. lib. ij. cap. xxxij. Galenum lib. vij. Compos. pharmac. Aæquarium lib. v. & Syluium de medicina simplici lib. i.

*Asyllus ἀσυλλός*, lactuce latioris genus, sine caule, quod ob insignem frigiditatem Veneri resistere maximè creditur: vnde & Eunuchion, Spadonium, à nonnullis est appellatum. Columella lib. x. Quare dict. Lactuca.

*Asylla* herba est, quæ sibi medentur pecora, si quādo Anagallidæ formidā imprudenter degustarint: Latini Ferus oculus habet nomē, vt scribit Plin. lib. xxvj. cap. xij.

*Ascarides ἀσκαρίδες*, tertij generis lumbricorum sunt, breues ac tenuēs, vermibusque similes. Horum magna interdum copia in hominibus ac iumentis cibum ineptè concoquentibus apparer, qui in extremo longaone potissimum reperiuntur. Quare dict. Lumbricorum Helminthes.



*Ascalonia* *ασκαλονία προμήνια*, genus affine cepis capitatis, quoniam ascaloniz longiores capite produntur: atque harum vites cæteris cepis non sunt inferiores. Vulgus Cibolas, & Ascalotas vocat. Quære dict. Cepa.

*Ascyron* *ἀσκύρον*, tertium hypericonis herbæ genus est: secundum, Androsæmō: & primum, hypericon, idcirco neque perforata, siue tracherana myropolis popularibus appellata, Ascyron erit: quæquam Herbariorum quidam Rutam campestre ab antiquis autoribus appellatam admonent, quam posteriores ex foraminibus, quæ in foliis apparent. Perforatam nomen ei attribuant, nullam inter ipsas distinctionem facientes, quod easdem vnam arbitrentur non diuersas, decepti Dioscoridis descriptione.

*Asцитis* *ἀσцитίς*, sit cum inter membranam peritonæum, & intestina plurimus aquosus humor coaceruatur. Sic dicta, quod vtrius modo locus qui est intra peritonæum & intestina aquoso humore impletus videatur. Huius speciei hydropisis meminit Horatius his versibus:

*Crescit indulgens sibi diu hydrops,*

*Nec jam pellit nisi causa morbi*

*Egerit venis, & aquosus albo*

*Corpore languor.*

Quære dict. Hydropisis.

*Asthma*, est cum ob crassorum humorum ac viscidorum multitudo pulmonis brœchis fuerit infarctæ: aut tumor quispiam abcessui similis in ipso si constiterit.

*Asthmatici* *ἀσθματικὸι*, sunt qui citra febrem frequenter respirant, vti adolent qui velociter cucurrerunt: hi & anhelosi, & suspiriosi dicuntur: quemadmodum & malum ipsum asthma vocatur. Eosdem etiam propterea, quod thoracis corpus penitus rectum habere cõgunt ob suffocationis formidinem, orthopnoicos appellamus: passio verò ipsa orthopnoea dicitur: dyspnœa omnis difficultas spirandi est: propriè tamè est ea difficultas spirandi, quæ propter crassos, & viscosos humores bronchia pulmonis obstruentes accidit, vt placet Gal. lib. vij. Secundum locos. Facile aures inuicem hæ passionis distinguuntur: nam destillatio etiam sanis ex manifesta causa repente accidit, in totum ferè citra febrem, rō comitantibus etiam propriis destillationis signis. Si verò tumor abcessui similis in pulmone fiat, necessariò febris consequitur: neque ita diu post, inflammatione in pus transmutata, pus reiecitur cum tussi. Si autem cridum tuberculum gignatur, hi neque gravitatem magnam sentiunt, neque difficultate spirandi admodum in festantur. Qui propriè asthmatici & orthopnoici appellantur, in totum febrem non habent, gravitatis verò sensus eis contingit, neque quippiã purulentum per sputum reieciunt.

*Asclepias* *ἀσκληπίας*, non est hederacea herba Græcis medicis *χάμαϊκευος*, dicta, triuiali vocabulo hederæ terrestris, vt placet quibusdam: sed quæ Segusianis populis pestifuga vocatur, quod aduersus pestis furores legitur. Quære dict. Chamæcythus, & Hederæ Asclepiadem Dioscorides depingit ita: Asclepias ramos emittit longos, folia hederæ longa, radices numerosas, tenues, odoratas: flos viris graue: semen Securidacæ nascitur in montibus. Galenus huius vires non expertus est.

*Aspalathus* *ἀσπάλθος*, rosæ hypericonthis frutex aliquibus suspicatur. Manarido autem arbor nobis incognita, quæ Arabibus Darisifahan profertur, vt Santhali species, quod Bras. negat. Sed consideret Lector, Santhalum quoduis frigidæ, & siccæ essentia esse: quod si quod aliud admittitur, supposititium quidem est: contrariis verò habere vires Aspalathum negabit nemo. Proinde gemina Aspalathi in Diosco. descriptio maris Rosmarinum vulgarebus diuim, repræsentat. meminit post Ser. Largum, Columella hb. rei rusticæ vj. capit. decimo septimo, in hæc verba: Venena depellit viperæ Symomanum trifolium, quod inuenitur in confragosis efficacissimum, odoris grauiissimi, neque absimilis bitumini: idcirco Græci eam aspalathon *ἀσπάλθων* appellantur: nostri autem propter figuram Trifolium acutum: Rhomanensium Allobrogum vicinia asphælo trifolio abundat, vt in Lyguria montes, si Largo credimus.



*Asparagus ἀσπαραγός*, duplex reperitur, hortensis scilicet, & rusticana planta, nomine alio Corrua. Orminum Atticè appellari vult Gesnerus. Est & Asparagia ἀσπαραγία, quam vertit Gaza Corrudaginem è Theoph. nomenclaturam Dioscoridis sequutus li. secundi, cap. cxviii. Galeno Asparagus petraeus, aut myacanthus vocatur: cuius absterforia vs est citra manifestam caliditatem aut frigiditatem: roñibus & iecinori radix & semen vtilis.

*Asphaltor* & asphalton bitumen est, optimum nigrum, & subsplendescens: dum aquis innatat molle: cum siccatum est, pice sicca durius efficitur. Verum bitumen in mari mortuo, stagno salso in Cælosyria, id est, cana Syria, provenit. Hoc mare abyssus est Gomorrhæ, & Sodomæ vrbium diuinitus subuersarum. Dioscorides Iudæicū bitumen, quod præfert cæteris appellat: nigrum & sordidum non probat, tanquam vitiosum & inualidum. Nascitur & bitumen alterum citra Epidaurum nomine pīssasphaltos, quod mistam bitumini picē redolet. At Babylonica Naphtha bituminis colamein, colore candidum: sed & nigrum quoque colore inuenitur. Vis ei ignium rapax, ita vt ex spatio protinus in eam transiliant. Hæc ad suffusiones oculorum, & albugines vtilis. Omnis autē bituminis facultas est, glutinare, discutere, & emollire. Petes cætera ex ipso Dioscoride li. i. cap. lxxxv. Gal. li. xi. Simpl. med. prope finem docet bitumen hoc omne resiccare & excalcacere in secundo ordine. Merito itaque eo vtuntur chirurgi, popularēsque medici, ad glutinationes vulnerum cruentorum, quæ exsiccari debent cum leuiuscula excalcacatione.

*Asphodelus ἀσπόδελος*, hastula regia, siue Albucum est à caule insigni ex multis radicibus bulbosis emicante, quibus agnatis abundat. Nunc porcorum cibis, olim hominum, muribus venenum. Autumno legitur, cum valer plurimum. Diosc. li. secundo, cap. clxi. Galenus li. Simpl. vj. ait esse facultatis Asari, Ari, & Draconij vtriusque: nempe extergentis facultatis, proinde vsta radix alopecias sanat, quia potentior.

*Aspis*, inter serpentes venenatas nominatur, cuius corporis longitudo à tribus cubitis ad quinque protenditur: cute liuida, & oculis coruscaatibus apparet, & collo prætumescente, Nicandro & Strabone auctoribus. Si quem vulnerat, tabe repentina conficitur, & membra frigore stupefacit, singultu assiduo, vehementique dolore excruciat, & somni tandem profunditate sopitus moritur. de quo Lucanus poeta:

*Hic quæ prima caput mouit de pulvere tabet:*

*Aspide somni feram tumida cervice lenant:*

*Ætior huic sanguis, & crassius gutta veneni*

*Decidit, in nulla plus est serpente coactum.*

Est præterea & aspis alter, cubitorum duū longitudinem adæquans: cuius cutis aspera atque arida, oculos non in fronte sed temporibus & narura hebetes habet: atque auditu expergiscitur: neque minor quam. in cæteris veneni facultas experitur: huic aduersatur antidotus Andromachi, & Zopyri Theriac.

*Asplenium ἀσπλινός*, quibusdam Ceterach creditur, est herba solius scolopendre vetimi non dissimilis, quæ vulgaribus Argentina, id est, Ceterach myropolis vocatur: Dioscoridi Scolopendrium, longèquæ discrepat à Lingua ceruina herba vulgò sic appellata, quæ Diosc. Hemionitis est: Quære dict. Scolopendrium, & Hemionitis.

*Atheroma ἀθήρωμα*, ex abscessuum genere quidem, est: vt Testudinem appellamus tumorem hunc vt mollem, non vsquæ deò durum, satis tamen magnum, in quo pinguis materia tunica quadam obiecta continetur, quæ caluarie ita hæret, vt ipsam plerunquæ vitiet. Hoc ergo non est dubium de numero esse abscessuum sub meliceride, contineri: sed tamē ad meliceridem magis attinet. De quibus singulis quære dict.

*Aster Atticus ἀστὴρ ἀττικὸς*, neque Eringium, neque Centum capita Pl. neque Aspergula, quæ minor est, videtur: verū recentioribus quibusdam Inguinalis, Bubonium, & Alibium imaginatur, Dioscoridem sequutis libro quarto, cap. cv. cuius verba hæc sunt. Aster Atticus, seu Inguinalis, cauliculus lignosus, florem in cacumine habens purpureum, luteūmve, & in ambitu diuisum, athenemidis modo, capitulum: sed ea quæ ambiunt folia, stellæ modo radiata, oblōga, hirsuta. Quibus sit remediū post

post Diosc. Gale. lib. vi. Simpl. docet Bubonium non tantum ob id vocari, quod illi-  
tum, sed etiam quod suspensum bubonas sanare credatur habet verò quiddam etiā di-  
gerens, vt mista sit potentia, vt i rosa, verum id non astringit.

*Aster* Samius, terræ species ad varios medicinæ vsus, quæ in Samo insula effodi-  
tur: præfertur quæ candida, leuis, tangenti linguæ glutinis modo adhærescens, mol-  
lis, succosa, friabilis. Dux enim species eius. Galenus Samiam terram egere lotione  
negat: sed vtitur altera eius specie magis, qui *Aster Samius* est, ad sanguinis expui-  
tiones vndeunque obortas, velut etiam Lemnio sigillo, terra sigillata vulgaribus  
appellata. Eadem vt iuuant hæc omnes sanguinis ex vtero profluua, & vocatum flu-  
zum multebrem. Diosc. lib. v. cap. xciii. Galenus Simpl. libr. ix. cap. de Terra Samia.  
Nos cætera prosequemur in dictione Terra.

*Attractilis* ἀτρακτῖς, spina est ex enici genere, cartamo similis: cuius rura flore  
pro croco vtuntur, myropolæ verò semine ad placendas purgatorias conficiendas:  
cui diacartamo nomen tribuunt. *Attractilis* alter, *Carduus benedictus* neque est, ne-  
que ei vires teprascentat similes. Quære dicit. *Cnicus*, & *Cartamus*. Galenus *Attracti-*  
*lida* cnicum agi esse ex spinarum genere esse scribit: cuius facultas est desiccatoria,  
& modicè digestoria, ex lib. vi. Simpl.

*Astragalus*, siue os balistæ, talus pedis est: cui calcaneus, seu os calcis adiunctum  
est, vt author est Gal. in libello de Ossibus & in Anatomicis administrat.

*Astragalus* planta, montanum cicer, & rusticum rura vocant: nonnunquam  
etiam syluestres Serras, vt memorie prodium est à Ruellio de natuta Scirpium. lib.  
iii. cap. ciii.

*Attonitus* morbus qui Latinis, *Apoplexia* Græcis dicitur: testimonio Celsi vel ei  
tissimè moriuntur attoniti, vel in resolutionem transcurrunt. Quære dicit. *Apoplexia*.

*Atta bilis*, veluti sfx est ac sedimentum sanguinis: ideoque colore, vt nomen satis  
indicat, nigra. Ab ea expurgari necesse est, ideoque instrumentum quo eiusmo-  
di humor expurgetur, natura hienem condidit. Qui si minus, quàm iustum sit, attam  
ad se bilem trahit, vt sanguis impurius, sic totum corpus redditur magis decolor. Por-  
ro *atta bilis* inerte, subdolos, auaros, morosos, perfidos, tristes, inuidos, timidos, & pu-  
sillanimes reddit. Galenus Locorum affectorum lib. iii. cap. v. de *atta bile* hæc refert.

*Atta bilis* ob substantiæ varietatem non obscuras habet differētiās: nam alia est  
veluti sfx sanguinis, quæ admodum ipsa est, sfcibus vini crassioris haud absimilis.  
Alia verò, quàm superior, essentia est multò tenuioris, atque vomentibus eam, & ol-  
facientibus, acida videtur, quæ etiam terram radit, attollit, & fermentat: atque am-  
pullas quales setuentibus iusculis supernatante videmus, excitat. At ea, quæ similis  
sfcibus etatæ est, in terram effusa, non inducit feruorem, nisi fortè in ardente febris,  
ipsam præpassari contingat neque vlla etiam acida qualitate participat: cuius nomen  
melancholicus succus, aut sanguis est. Quære Gal. lib. de *Atta bile*.

*Atriplex* ἀπαρξῖς, herba artochia est hortis & ruderibus notæ vulgaris, quod  
vna hottensis, altera ruricola legitur. Inter hæc spanachium vtunque adnumeratur,  
agreste silicet & satium: agreste diuo Phylacro tribuitur: Græco autè nomine Chry-  
solachanum, quasi plus aureum, coniecto lo. Agricola, appellatur. Spanachium no-  
bis hodie olitorium, non ex *Atriplicum* genere nihil differre videbitur: quoniam in-  
ter lactucas minus conuenit, Manardo hæc ambigente, lib. ix. Epistola iii. Diosc. lib. ii.  
cap. cxij. *Atriplex* vtraque Galeo, humida & frigida temperie est: humida quidem  
secundi, frigida verò primi ordinis est: quæ, cuiusmodi rosas, qualitas teporis est.

*Attractrix* facultas, est quæ cōuenientem particula succum appetere, & attrahe-  
re potest. Conueniens autem & familiaris cniue particula succus est, qui maximè  
vt hæc asimiletur, atque adeò vt inde alatur est accommodus. Hæc itaque facultas  
materiæ copiam, ex qua quævis particula nutritur, suppeditat, vt inde alteratrici famu-  
letur: nā rebus omnibus attrahēdæ familiaris facultas inest. Gal. Natur. facult. lib. i.

*Attrahens* facultas, est quæ succos ex alto vehementius euocat, vt calidum te-  
nuinum parietum in dictamno, thapsia, sagapeno, fimo colubino, & huiusmodi.

*Atrophia*, nutrimenti penuria est, siue defectus & indigentia, propter quam corporis membra nutriti non possunt, neque habere augmentum, quod contingit non solum animantibus, verum plantis etiam ipsis. Gal. lib. i. Metho. Non omnis mutatio, inquit, ab eo quod secundum naturam se habet, ad id quod præter naturam est, morbus censetur, si modò permanentia illi adhi: At coloris tum vitium, tum atrophia, in quo corpus non nutritur, sy mptomatis, nequaquam morbis adnumeretur. Sūt præterea affectus qui ad totum oculum videntur pertinere, ut *atropia*, quasi nullius nutrimenti membrum dicatur, qui quoties fit, totum oculum minorem, humiliorémq; hoc est, depressum magis reddit. Celsus imminutum oculum. Fit & è contra, ut nimis prominat, *ἐκτασίαν*, vocat Aegy. vulgares medici, Exitū. Manar. Epist. li. vij. Epi. ij.

*Attagen* & *attagena* ὀττᾶγεν, & ὀττᾶγεν, Beccafica avis nostras: magnitudine pullastræ adulescentis, rostro oblongo, cursu celeri, sed volatu brevissimo. In Galliis, Allobrogibus, & Segusianis frequentissima: & inter cibos mensæ lautioris repræsentatur: tamen intrinsecum non nihil habet, quo succus sanguinem minime laudabilem vescentibus generet. Scholiastes Attagenam pro Gallinagine, id est, Scolopace usurpavit, sequutus Poëtæ Nemesiani descriptionem, inquentis.

*Cum nemus omne suo viridi spoliatur honore,  
Futuræ equi nerei sylvas pete proinus altas  
Exuvit, præda est facilis, & amara Scolopax,  
Corporē non vappit aubus maiore videbit.  
Illa sub aggeribus primis, qui proluit humor  
Pascitur, exiguos sectans obsonia vermes.  
At non illa oculis, quibus est obtusior, et si  
Sint minium grandes, sed acutis naribus instat,  
Impresso in terram rostri mucrone sequaces  
Vermiculos trahit, & vili dat præmia lingua.*

Quare dict. Gallinage.

*Augmentum*, seu incrementum αὐξήσις, & πιδόσις, & ἀναλασις, est id quod statim post morbi principium incipit, & ad vigorem usque durat: quod inter ipsum & declinationem Status est. Sed morbi augmentum, est ex hora in qua fit accessio, & longitudinem eiusdem, & magnitudine deprehenditur.

*Auctio*, est solidarum partium animalis incrementum, ampliatioque, in longum, latum & profundum: & acquisitio maioris, molis corpori intrinsecus ab alimentis.

*Auctrix* facultas, ea est quæ ampliat in longum, latum, & profundum: hæc ubi perfectam magnitudinem animal est adeptum, toto postquam editum est tēpore, usque ad ætatis vigorem dominatur. Auxiliatrices & veluti ministræ eius sunt, alteratrix, & nutrix facultates: de quibus suo loco tradimus. Gal. lib. j. Natural. facult.

*Auellana*, & antiquitus Abellina, καρύνη ἀντικύων, & λεπτοκαρύνη, nux siue fructus Coryli arboris in Ponto exuberantis: vnde traxit nomen Pontica nux, Romanis. Nux auellana stomacho infesta est, quia ægerimine conficitur, costa tamen & esca semen augeat: quapropter Veneri dicata traditur: sed pota tussi veteri non minus mederi videtur. hæc, arque alia ex ea Dioscor. libro primo, caput. cxlij. Galenus libro septimo. Simpl. Est & aliud genus nucum Ponticarum plus habens essentie terrestris ac frigide, cætera magnæ nuci similes, quæ Iuglandes Latinis, καρύς βασιλική Græcis.

*Avena* ἄραμος. A Egilops Galeno, quam Gesnerus pro sterili auena, id est, festuagine versore Gaza, usurpat, digerendi vim possidet, id quod ex gustatu deprehenditur, leuiter enim est acris, quod phlegmonas induratas & egilopas sanat: febrientibus in pulmentis ministrata calores vehementius accendit: ob id iumentis, non ardoribus autem infestis hominibus, exhibenda.

*Auricula* muris μύρς ὠτός, & μύρς ὠτα, vel ut Latinis, quæ iam vox vltior, Myosotis: ea est, quæ nomine altero Alsine proferitur, non autem

Mater

Materis lyua, siue syluana, aut caprifolium. Quidam vulgares medici simpliciu ignari hanc plantã pro Anagallide vsurpant figuræ vicinitate decepti. Ad quid hæc faciat, docet Diosc. lib. ij. cap. clxxvj. Galenus Simpl. lib. vj. Alsinem vocat.

*Auriculum* muris, diciturque Helxines, id est, parietariæ, similes obtinere vires, nepe refrigerantem, & humectantem: essentia enim aqueæ est.

*Aureus* myropolis, pondus est drachmæ vnus & semis. Dauich Arabibus, granorum sex pondus: Kirath verò rrium.

*Auris* vtraque in temporum sita est, & sub vtriusque foramine particula mollis suspensaque fibra seu auricula à Valla dicitur, superior verò pars, pinna: verum in vtraque nasi parte sub oculis quidem Concaua sic dicta, sita sunt.

*Aurium* dolor, *αυτις*, est qui vel inflammatione, vel vlcere, vel abscessu, vel alia quapiam causa fit: cuius propinquus affectus *δυσκοια* est, hoc est, difficilis auditus, respondetque *κωφωσις*, seu surditas, quæ vel à primo statim ortu, aut post, accidit Galeno lib. ii. ij. locorum affect. cap. iij.

*Aures* vermiculantes *σχιδαυκῶτα* *αῦτα*, in auribus retrum mali genus est, vt nō aliter quàm ex corrupto cadauere, illic prodeuntes vermes videre liceat. Exit ex aure interdum vtraque modò sanguis, modò pus, modò vermiculi *σχιδαυκῶτα* *αῦτα* AEgypta: *αυρῶστρον*. Galenus: Dioscorides autem *ἰχθυόστρον*: tertiu *σχιδαυκῶτα*, vocat. Latini hoc vltimum verminofas aures. Crescit in eis caro, & vocant Græci *ὕπαιρουρα* *αῦτα*. Deest aliqua eius pars, & *κολοβύματα* idem AEgypta, Celsus curat. Tumores post eas nascuntur, & *αυρῶνιδας* vocant.

*Aurium* sibilus, est qui & ipse sub symptomatis genere continetur: est enim operatio auditus corrupta. Fit autem ex alio symptomate, hoc est, à motu inordinato, suorum in meatibus ad instrumentum proprium auditus pertingentibus, oclusis, atque vt sequens est, à morbo in eis existente. Manardus lib. xiiij. Epist. iij.

*Aurigo* *αὐρῶς*, inquit AEgypta, est effusio bilis vel flauæ, vel nigrae in totum corpus, quæ redndat regium morbum & arquaturn Celsus: Plinius fellis suffusio: sunt qui auriginem, ab auri pallore: medicorum vulgus ictericiam.

*Aurium* vehementissimis vlcibus ferri scoria tonsa tenuissima, cum acerrimo aceto rosaceo ad mellis sordiumque crassitudinem cocta auxiliari docet Galenus Meth. med. libro quinto. Nam auribus sanandis vehementissimè siccantia adhibenda, quippe audiendi locus siccissimustum quæ oblectentur medica menta aures: earumque dolor, de Symptr. causis, & de Different. febrium libro secundo. Galenus cap. decimotertio.

*Austerum* atque acerbum, vtrumque scilicet adstringit sed magis acerbum, qualis omphacia galla: austeri sunt multa, vt mali punici genera, atque coronea mala, ac reliqua non pauca mensis apta. At adstringentia vocata in idem cogendi ac stipandi, non detergendi, neque purgandi facultatem habent atque ipsorum vsus siccitacibus maximè contrarius, siue ea cibi sint, siue porciones, siue medica menta. Meth. med. lib. vij. & locorum affectorum lib. ij. cap. iij. Galenus.

*Auster*, à meridie ex tempestatibus ventus est egelidus, Aquiloni maximè contrarius: & quas secum asserat ægritudines, hæc sunt: Aures hebeant, sensus tardat, capitis dolores mouet, aluum soluit, totum corpus efficit hebes, humidum, languidum. Cæteri venti quo vel huic, vel illi propiores sint, eò magis vicinos his illius affectus faciunt.

*Aquilo*, tussim mouet, fauces exasperat, ventrem astringit, yrinam supprimit, horrores excitat, item dolores lateris & pectoris. Sanum tamen corpus spissat.

*Autumnus* partium anni longè periculosissimus, ac saluberrimum ver est: proxima deinde ab eo hyems, sed periculosior æstas. Ex tempestatibus verò optimæ æquales sunt, siue frigidæ, siue calidæ: pessimæ autem, quæ variant maximè, quò sit vt Autumnus plurimos opprimat nam ferè meridianis temporibus calor, nocturnis

atque matutinis, simulque etiam vespertinis frigus est. Ex Hippocrate Celsus. lib. ii. cap. primo, atque ex Hippocrate Galen. Aphorismo. lib. iij. per totum.

*Autumnus* à vere hoc maxime dissidet, quod mediam temperiem & aequalitatem perpetuò non seruat: quippe metidie est multò calidior, quam mane aut vesperti. Sed frigidus non adeo si per se spectetur, quam si cum aestate collatus, frigidior appareat: sed neque tamen temperatus ac ver deprehenditur: tamen si morriserum autumnum maxime facit ipsa inaequalis intemperies, ob id quoque pestifer, & letifer à poetis describitur. Neque tamen autumnus, calidus absoluto sermone, neque frigidus, quippe cum utrunque habeat, ac ad summum neutrum. Temperamentorum lib. j. Galenus.

*Auripigmentum* rubrum, Serapioni Sandaracha est: Chymistis verò Arsenicū rubrum, ut croceum Auripigmentum quoque videtur. Scribonius Latgus distinguat Sandaracham ab auripigmento cap. centesimo decimo quarto: contra tormintos & euliacos Dioscoridem sequutus libro quinto, capit. septuagesimo, & vno. lib. item vi. cap. vigesimo nono, in quibus facultates medicatorias, & vires veneno plenas exprimit. Galea. ix. Simpl. Archenicum more veterum Auripigmentum appellat, facultatis causticae siue vrentis esse tam combustū, quam vitonis expert: atque exulcerans est. Vide Arsenicum.

*Aurora*, tempus est ante Solis ortum quo cælum splendere incipit, hoc est, circa horam sextam matutinam, ad exhibenda ægrotis, & sanis medicamenta liquidiora, supputatum.

*Auditus* in sensu impeditur, cum quicumque affectus in aurium oculis obiecta contautate, oriuntur: neque rationali investigatione egent: illa vero apparente aurium foramine, si audiendi facultas læditur, simili via & ratione inquirenda sunt notæ. Vbi enim præter hanc nihil læsum est, necnum proprium affectum esse, non absurdè coniciamus. Gal. Locor. affector. lib. iij. cap. iij.

*Aurum*, metallorum purissimum & temperatissimum, in foliola & velut bracteolas detractum inter chartas latefcit: eoque vtuntur medici posteriores ad naturæ robur, & affectus melancholicos, quamvis in eo principiorum mistio sit firmior, quam ut à calore nostro possit dissolui. Aëquius multo chymistica arte solutum, & potabile exhibent, medicinam laticifcantem, & corpus conseruantem iuuenilibus viribus reparandis, quam vel in bractæas, vel pollinem in catapota subactum proficeret, si, post Geberum, Ficino credimus.

*Auxilium*, quod ad hominis salutem constitutum est, dicitur: compositum quantitate, qualitate, ordine & tempore, quibus ad curationem ex ipsis observata m. recor. datur medicus, vnde sequitur temperamentum, & naturalis facultas ad sanitatem corporis humani conseruandam: quæ rum rerum perdiscendarū libris propriis præceptor est Galenus.

*Auxilium*, quo tempore inuat ac proficit, sicut omnis materia quæ quomodolibet corpus a lacerat, & impedit, sanitati contrariū est, ita è contra, vocatur à Methodicis auxilium. ut cum homini bonum affert, prodest ex causis sanis: at cum malum, ex causis morificis est. Adeò difficile tamen est, aliquid auxilium inuenisse, quod citra villam noxam proficiat magnificè. Id accidit ex complexione ortorum in corpore, præter naruram affectuū, vñ cum precedentibus causis, & sequentibus symptomatis. Atque ita quidem à temperamento ægotantis, aut ipsius partis laborantis, auxiliorum indicatio sumitur.

*Auxilium* denique est, ut aliquid nonnulla cum fiducia, vel cum periculo facere, quam spe adempta certò perire: tantò profectò satius est: potentibus præsidii pugnare, quam nihil agere. Sunt autem auxilia tria, quæ deplorata non sunt: à quibus quidem principio seruantur omnes, per sanguinis missionem, per purgationem, & per ea quæ caput, & eor roborant. In quo enim desperata omnino salus est, imptudentis consilij fuerit apud vulgum infamare præsidia, quæ muleis fuere salutis: verum iis tempora præsidiaque, quos seruari spes est, obseruanda: quando ægris qui insana-

biles

biles sunt, iis nec tempus vllum oportum, nec praesidium vllum est. Gal. ex Hippo. Metho. libro vñ decimo.

*Axis*, linea recta est per centrum sphaerae acta, circumferentiae ambas extremitates attingens, circa quam sphaera voluitur, quemadmodum rota circa axem.

*Axes* conorum visiorum, necesse est in vno eodemque plano habere positionem, ne quod est vnum, duplex appareat. Axes hi in nobis principium habent meatus ipsos à cerebro proficiscentes: quod oportuit eos, cum animal vtero geritur ac formatur, in vna quadam superficie locari. Gal. lenus libro decimo. Vfus partium, capit. decimotertio.

*Axioma*, id est, enunciatum seu propositionis argumentum, est quod ex seipso ad huiusmodi dignotionem, fidem habere videtur. Id enim quo tangente afficimur, & quo separato quiescit affectus, causam esse, apud omnes homines, in confesso est. Gal. Loer. affect. lib. primo.

*Antirrhinum* Dioscoridi, aliis anathinum vocatur: herba est caule & foliis

Anagallidi similis, flore albae violae, purpureo: ideoque sylvestris

Anagallis nominata est: semine viruli narium simili.

Vide plura apud Ruellium.

D 3



## De litera B.



*Bacchar*, & *Baccharis* *Βάχχαρις*, id Dioscoridis *Asarum* est, & Virgilij Poëta: quod inuerso nomine *Chabara* passim enunciatur. Interdum etiam *Baccharis* usurpatur pro *verbascum* herba *stolonos*, ab vna radice quamplures producente: quæ officinis *Herbariorum Chyrotæ* diuiz *Matiz*, appellari solita est. Nam *Baccharis* huius radix *Veratri* nigri si æmula, *cinnami* tamen odore est: verum quæ *Asari*, exilis est: & per anfractus nodosa, *Nardi* odore. Folia illi scabra ut violæ nigra, & *Verbasci* magnitudine: huic planè leuia, & herbacea, prorsusque hederacea. Illa ramosa, cubitalis hæc foliosa, & humilis. Vtraque rei medicæ in usu est. Ex Ruell. hæc I. Agric. Quære dict. *Asarum*.

*Baccharis*, *Doronicum* Rom. est: atque ex Diosco. fruticosa herba, folia habens aspera, violam, & *verbascum* sequens, & subrugosa cum caule anguloso & cubitali, aliquantulum aspero: flore luteo, violæ haudquaquam simili, & inodorato: ex *cinnamo* eius radix nonnihil retinens. Huius facult. apud Dioscorid. libro tertio, capit. quadragesimo tertio, petes. *Ægyneta* libro sexto, de *Simpl.* herbæ huius radicem decoctam aperitiuam esse docet, urinæque, æ mensis muliebres ciete: necnon adstrictoriam vim occultam habere: & folia cohibendi fluxiones. Cuius herbæ totius nullibi (quod sciam) meminit Galen. *Manardus* libr. noni, epistola tertia, *Baccharem* Diosco. & *Vergilij* ignorauit, & si regionibus nostris vulgarissima est. Sicuti interdum apud veteres medicinz authores *Bacchar* pro herba sumebatur, ita nunc quoque pro *Lydio* vnguento, præsertim apud *Hippocr.* accipi tradit *Galenus*.

*Bacca* *μαργαριτης*, gemma candida, & bacce visci arborum more pellucida, rotundaque, non glutinosa: quam sanè vnionem, & perlam dicimus. Huius meminit *Plinius* libro decimosexto, capit. decimo, atque apud peritiores medicinz authores vsus ad cor corroborandum est frequentiss. Quære dict. vnio.

*Bacca*, τὰ ἀρόδρια, continent intra sui nominis ambitum fructus diuersorum generum, laurus, oliuæ, corni, myrti, & aliorum huiusmodi. Differunt ab acinis, quod acini densius nascantur, ut in vuis: bæccæ verò dispersius, & rariùs. *Corymbi* autem hederæ vtriusque, nigra videlicet & albæ, inter *Baccarum* genera non numerantur. *Plinius* libro xv. capit. decimoquarto. Authore *Dioscor.* *Baccarum* laurus, neque cæterarum arborum, meminit libro primo, capite nonagesimo.

*Balanus* multiplex est, myrsifica *μυρσική* *Βαλανος*, vulgus officinarum *Bern* nominat, id est glandem vnguentariam. *Myrobalanus* quoque *Plinio* dicta, quia ex *Barbarica* regione iam olim allata ad nos, hodie frequens est. Hæc cum *hydromelite* pota drachma vna. vomitoria est. Vide plura apud *Syluium* lib. primo de medicam. simpl. natura. Item post *Diosc.* *Galen.* simpl. libro sexto. Recurre ad dictionem *Myrobalanus*.

*Balaustium* *Βαλαύστιον*, sylvestris mali punici flos creditur: satiui verò flos citinus. Nam postquam arbor florere desit, fructus ipsius apparet in mali punici speciem figuratus. Vtriusque arboris flores à medicis seculo isto cum *Plin.* *Balaustia* vocitantur. *Diosc.* lib. j. cap. cxxvij.

*Balani*



*Balanī* Sardin iβαλανοι (αριδανοι) Græcis olim: nos nunc Castaneas vulgatas dicimus. Primum enim Sardibus creduntur prouenisse referente Plinio: decimoquinto libro, cap. vigesimo tertio: Cæterum Balanitis genus castaneæ rotundius, & maximè purgabile, sponte prosiliens: à rotunda glandis effigie ita appellatum. Sed quæ sit Balanitis docet Plinius lib. xv. cap. xxij.

*Balanitei* βαλανιτης, gemma subuiridis est, & Corynthio æri persimilis, secante mediam fiammea vena, author est Plinius lib. xxxvij. cap. x.

*Balanus*, βάλανος, generale nomen ad omnia continens, quæ apud medicos glandis vocabulo compræhéduntur. Præcipuè tamen hoc nomen Dactili assument, & oliuæ, & suppositoria medicis vocitata, & si quæ sunt alia, quæ nucleos intrus habent. Atqui Balanus myrepsee, βαλανος μυρεψαδ, fructus est arbusculæ Myricæ similis, magnitudine nucis auellane: ex cuius cortice liquor odoriferus erumpit, quem vocant oleum Balzanimum. Sunt qui suspicantur glandem eam esse, quam vulgò Nuccem moschatam vocant, quod verum non est: nam glans myrepseica est intrus lignoso osse, quo moschata nux caret, veteribus parum nota. Glans autem myrepseica nux yaguentaria est, ex Dioscorid. & Pli. lib. xij. cap. xxi. Quære dictio- nem Myrobalanus.

*Ballose*, βαλλισα, marthubium nigrum est, siue putidum, nemini non cognitum: praeium scetens alioqui dictum: At verò Musa Anthonius Brassanolus ex Dioscoride illam suspicari herbam ait, quæ nostris vrtica mortua, id est, inextingens declamatur: cuius folia vrticæ similia, sed non pungentia aut adurentia. Nam albo, hoc est odore praeio ad setapiorum, cataplasmarum, & emplastro- rum medicamenta vtiliter vtitur. Præter cæteros medicinarum scriptores, quære Dio- scoridem libro tertio, capite centesimo deinde dict. Marthubium. post Gale. Simpl. Medic. lib. viij.

*Barba* hyrcina τρυχατώδης, Theophrasto delinitur radice longa, dulci, folio croci longiore, caule paruo, quo super calix latus & barbula, quæ summo in vertice incana & proluxa funditur: vnde illi nomen inditum: atque apta esui est. Diosc. lib. ij. cap. cxxxvij. Ruellius lib. ij. cap. lxxvj.

*Barochum*, hoc est, Apisugium, quam herbam Cordus diuinat Galiopsim esse. Brunfelsius verò pro galiopsi herba Scrophulariam, hoc est, Chelydonium minus Dioscoridis esse innuit: cuius herbæ apud eundem Dioscorid. fusa descriptio habetur lib. ij. cap. clxxij.

*Balsamum*, arboris nobis incognitæ lachrima est. Strabo libro decimo sexto, tradit de Balsamo hæc, inquit. Hicricus est campus monticulis quibusdam circumdatus, vt in theatri speciem declinet. Hoc in loco palmetum est, cui immista alia materies cernitur domestica, & serax: palmis abundans spatio stadiorum centum, totum irriguum, habitationibusque plenum, vbi & Regia est, & Balsami viridarium: quæ arbor aromatica est, & fruticosa, Cytiso & Ternyncho persimilis. Eius corticem vulnérantes lachrimas in vasis picatis suscipiunt, tenaci lacri persimiles ac subinde coagulantur repositis in conchis. Dioscorides aliter arborem vniuersam depingit lib. i. capite decimo octauo. Verùque authorem locum Balsami adiisse certum est: sed quanta est descriptionis in ambobus discrepantia viderit candidus lector, quoniam rarior in Plinio fides est. Balsami lachrima, fructu, foliis, & ligno caremus.

*Balsileum*, id est, regium ocimum duum generum notitia nostra est: vnum latioribus longioribusque foliis, subpinguibus, odore fragrantibus: semine rotundiore & pleniore, quo vsus est Actuatius in cordis passionibus. Alterum verò minus est tum stolonibus, sed fruticosis, densius, & semine feracius: at constat folio breuiore rotundiorque, cum seminis minusculi exuberantia: verum odoratius priore experitur, viribus quoque superabundat ipsa

experientia. Interdum apud Galenum in libro Compositionum pharmacorum Secundum locos in vfu inuenitur. Lege Dioscoridem libro secundo, capite cxxxv. Recurre ad dict. Ocimum.

*Balena*, φαιλίνα, vastissima maris belua, ex genere Cetorum: quam Plinius tradit in Oceano Indico ad quarternum iugerum magnitudinem excrecere: cuius vſus in cibis est, sed quàm difficilimè conficitur edentibus. vide dictionem Cetum, & Plinium lib. ix. cap. iij. iij. & vj.

*Bambacium*, βαμβάκιον, βαμβάξ, & βαμβάξιν, lanæ genus candidissimum, in exiguo nascens frutice: quem nonnulli Gossopium, plures xilon appellant. Fert arbuseula hæc fructum barbaræ nucis non dissimilem, quæ dehiscens veluti in cucurbitum lanæ globum detegit, ex qua deinde vestes fiunt. Hanc lanam vulgus Tomen-tum, siue Coronum vocat. Require dict. Gossopium, post Pl. libro Nat. hist. xix. cap. primo. Deinde Ruellium ij. lib. cap. cl.

*Balneum*, est euacuationum medicinarum quintum genus, quod quidem occurrit duplex: vnum naturale, alterum arte confectum. Primum, quod per se aut sponte, aut naturaliter prouenit scaturitvè: sunt & qui Thermas, quod insit calfaciendi sacultas, dicant. Balneorum autem naturalium, quedam falsa, alia nitrosa, nonnulla sulphurea, alminosaque, bituminosa aliqua, & quæ generis varij metallorum vim obtinent sunt non pauca. Balneorum saluberrima prope Chamberiacum Allobrogum veterum nobile oppidum & regionis caput, varij generis scaturiunt, ad infirmorum languentium sanitatem requirèdam. Vide Galenum de Balneorum vtilitate. Fuchsum Compositione Medicamentorum, capite xx. & Brancalæonem.

*Balnei* arte confecti apud veteres fuisse quinque partes sequentibus nominibus comperitur: pars prima ἀποδυστήριον, Latinis Tepidarium, in quo balneantur sese exuebant: secunda pars, τυπνυτήριον, & ὑποκαυστήριον, nostris calidarium, siue sudatorium: tertia, solium calidum, siue labrum aut lauacrum: Gale. μύζαν, vel δέξαμεν dicitur: pars quarta, frigidum solium: quinquā, vbi sudorem detergebant veteres. Galenus libro decimo Therap. metho. & libro tertio de Sanit. tuenda. & post hunc Brancalæo.

*Basilare* palati os, dictum videtur, quod totius cerebri molem columella respondentem, sustineat, & nisi in Anathome, ostendi minimè quidem potest.

*Basiliscus*, inter reptilia serpens perniciosissimus, cuius color ad nigredinem citrinum interdum colore misto, declinat: capitis supremum acutum habens maculis spatium candidis, & rutilis insurrentem oculis interficit. Longitudo totius animantis est sexquipedalis Solino auctore, & Plinio lib. xxix. quem Aelianus est sequutus libro nono, cap. decimo octauo & xix. Nascitur in Sicilia, Italia, Allobrogum Alpinatibus, & potissimum in Sirenaica regione Lybie prouincia. Huius animantis his versibus meminit Lucanus poeta:

*Sibila que effundens cunctas terrentia pestes:*

*Ante vtriusq. nocens latè sibi submouens omne*

*Vulgu, & in vacua regnat Basiliscus arena.*

Nicander Poeta in Theriace. & Gal. meminerunt huius serpentis. Galeni autem sunt hæc verba: Nam Basiliscus, belua sublaui, & triplicia pice frontis munita: visus etiam solium, conspectusque & sibilo auditus, homines momento perimit. Porro ex aliis animantibus si quod illum iam extinctum, iacentemque attingit, & ipsum subito interit: quare omne aliarum ferarum genus propinquitatem ipsius deuicat.

*Βαρύχιον* Dioscoridis, vulgus Latinorum hoc ipsum Ranunculū & pedem coruinum: Officinæ Apium risum dicūt. Nam à colorum varietate sic denominatum est Pausania auctore. Chymistis autem quoddam est Chrisocollæ genus ex diuino latice proueniens: cui tanta est veneni vis, vt vel solo halitu incaurum Physicum quendam, alioqui præter cætera Chymistam insignem interfecerit. Post Cælium Rhodiginum Antiquarum Lectionum libro vigesimo octauo, capite nono vide dictionem

Ranun

Ranunculus: qui speciatim quatuor habet differentias, Galeno teste Simplic. medica-  
mentorum. libro vi.

*Batrachia* mora sunt, quæ ex Baro, hoc est, rubo leguntur: non longè latèque ser-  
penti & spinis hamaris horrido. sed altero minori ac mitiori, mora parua, non nigra,  
sed cœrulea ferenti. Hæc Syluius.

*Batrachæ*, niri factitij species est: olim quotidiani vsus in balneis & elcīs, iam  
vix cognitum, ob id vsu perquàm ratum. Vera autem niri spuma Dioscoridis &  
Galenī naturalis est. Petrus Belonus ait Salpetræ supposititium nitrum esse, quodd  
scilicet verum non ampliùs visitur. Post Dioscoridem & Galenum, quære dictio-  
nem, Nitrum.

*Batis* *κρυβισιον*, quæ est quæ hortis colitur, Plinio Asparagus Gallicus appellata:  
vulgò Bacilles, quasi baticulas. Altera Batis crista marina, quod ad maris littus  
nascatur, in hunc diem eo nomine insignita est: atque eam ipsam Bacillam sylue  
stem plerique vocant. Crethinum, & Cretanum Gesnerus appellari posse scribitur  
Quære Diosco. lib. ij. cap. cxxij.

*Bechium* *Βήχιον*, Latinis Tussilago, officinis vngula caballina, & pes asini nomi-  
nata est. Hæc vehemensissima tussi succurrit si per infundibulum fumus crematæ  
herbæ & radici suscipitur & deuoretur: maximè quidem ipsa radix. Farsara non-  
nullis posterioribus insignita est. Vide plura in dict. Tussilago.

*Bechica* medicamenta, sunt tam quæ tussim excitant, vt Galenus simpl. me-  
dicament. capite decimo septimo libri secundi, quàm quæ eam sedant, vt isdem au-  
thor capite primo libri quinti Simpl. & bechicæ hypoglottides similiter Galenus  
in lib. compos. med. part.

*Bedegar*, est elchinus ille qui in rosetis concreuit ad spongiæ formulam quan-  
dam natura coaceruatus, ad medicinæ vsum frequens. Quidam cardui esse spe-  
ciem, perperam Dioscor. & Plin. interpretantes, crediderunt. Vide I. Agricola de  
Simpl. medic.

*Beben* duplex est, alba; & rubra, magnitudine radici pastinacæ palmæ, ca-  
lida, humida, odorifera, semen augens viris, & foeminis. Bius loco, si id solùm  
non possunt, Eryngij radicem substituit Iacobus Syluius potius, quàm radices no-  
scio quas laceæ herbæ albæ scilicet & nigre, id est, Gyi, nobis ab insitioribus ven-  
ditari solitas. Vide Ruellium libro secundo, capite centesimo trigesimo octauo,  
& dict. Geum.

*Ben* descriptione Mesues ex Syluiō, & Serapionis Arabum, est Dioscoridis.  
& Galeni aux myrepica, id est glans vnguentaria. Quære dictionem Myro-  
balanus.

*Bellis* *βύλλης*, pratensis, & erratica, ac humilis herba est, à qua prorumpit  
inodorus flos, qui mulierculis Margarita ob insignem formæ pulchritudinem,  
vocatus est. Medicis recentioribus Confirma minor: vtique bellis altera, Con-  
firma media, siue bouis oculus *βουφθαλμος*, nec perperam appellationem accepit.  
Quæ autem maior confirma, siue consolida magna, cumicis acuti folio est, non  
herbaceo, sed albicante, & est radice oblonga, tereti, extra nigra, intus can-  
dida, & glutinosa admodum, atque insipida. Nec hæc Symphitum est, vt suo  
loco describitur. Has tres Confirmas distinguunt Ruellius libro tertio, capite octoge-  
simo primo.

*Behabard*, referente Ioanne Agricola, est Antidotum contra veneni vim epo-  
tum efficacissimum & prorsus diuinum. Itaque memoriæ prodiit Plinius libro octa-  
uo capite xxxij. quod ceruis cum serpente sit pugna ita vt inuestigent cauernas, na-  
riumque spīritu contrahant renitentes. Exitio serpentibus esse ceruos nemo igno-  
rat, vt si quæ sunt extractæ cauernis mandant, sitique ardentissima corripian-  
tur: hinc confestim fluminibus sese immergentes, nulla potè aqua, animo & viri-  
bus reficiuntur. Erumpunt autem interim ex oculis lachrimæ, quæ paulatim  
crassescunt

crassescunt, coeuntur & coagulantur: atque in multam magnitudinem excrescunt: quas postquam ex aqua sanus eua sit ceruus, deciduas homines obseruat & colligunt, & vt rem præciosissimam inter Cismelia mercedi reponunt: atque hoc Belzahard Arabum voce appellatum.

*Berberis*, & spina vineta  $\delta\epsilon\upsilon\lambda\alpha\rho\delta\alpha$ , Dioscoridi libro primo, cap. cv. quam nonnulli pyrinam, aut pythyanem vocant: arbuscula spinosa est valde, pyraastro minor, non tamen similis: baculas profert racemosas, oblongas, rubras cum maturuerint, & intus nucleum veluti acinum habentes: ipsi iam maturi pro serapis, cum saccharo conditis, & per se aduersus acutas febres, & sitim vehementem sine noxa vtiuntur. Non omnis regio hanc arbusculam profert, nisi quæ lentori dedita est: qualis propter Segusiotorum ciuitatem Bellicium frequens apparet Vide Ruell. lib. primo cap. cvj. deinde Gesnerum de plantis.

*Berberis*, & berberium genus conchæ est, ex quo margaritæ sumuntur, quarum caro inter epulas landatissima est. Ex iis autem conchis eximuntur vñiones, quæ vulgi appellatione Margaritæ dicuntur. Hæ perlae sunt, quibus mulierculæ ad ostentationem precationis vtuntur: man Indico colliguntur, Plinio teste libro ix. cap. xxxv. Est & vnio genus capræ capitatum: vt refert Columella lib. xij. capite decimo rei rusti, cuiusmodi nomen apud Gallos veluti triuiale hætenus vsurpatum est pro eo capræ genere, quod pluribus bulbis non coagmentatur: atque hæc capula est.

*Bersilium* lignum, vel verzinium à verzinia vrbe Indicæ aduectum dictum est: medicis in vsum nondum venit, sed quia rubente colore est, hætenus insectorium tantum manet. Lege dictionem Sanchalum, post Ruellium libro primo capite quadringentesimo quinto.

*Bes*, partes duæ tertie, id est, vncie octo: continet scrupula ducenta & quadraginta. Bes etiam est Geometrarie mensura, continens iugeri partes octo in duodecim diuisi, vt est auctor Columella lib. v. cap. primo.

*Balsum* blesusque, atque alio simili impeditus vitio quisquis is est, linguz in loquendo impedimentum atque loquutionis formandæ exprimere vocabulum nequeat, aut quum natura ipsum formare non possit, vniuersam linguz functionem, lædi certum est. Huius rei Galenus auctor est Locorum affectorum libro quarto cap. vij.

*Bdellium*  $\beta\delta\epsilon\lambda\lambda\iota\alpha$ , arbor nigra, magnitudinis oleæ, & folio glandiferæ roboris perpetuo virentis, fructu caprifici, gummi genus exudans: quod & ipsum Bdellium vocatur. Mirifice commendatur à Dioscoride & Galeno, qui duo ei constituit genera lib. vj. Simpl. medic. Vide Dioscorid. libro primo, cap. lxxix, & Plinium libro duodecimo, cap. ix.

*Beta* vtrique nigra scilicet & alba,  $\sigma\iota\upsilon\tau\lambda\alpha\varsigma\ \mu\epsilon\lambda\alpha\varsigma$ , &  $\sigma\iota\upsilon\tau\lambda\alpha\varsigma\ \lambda\epsilon\upsilon\kappa\alpha\varsigma$ :  $\tau\epsilon\upsilon\tau\lambda\iota\alpha\varsigma$ , &  $\tau\epsilon\upsilon\tau\lambda\iota\alpha\varsigma$ : vbique gentium olus notissimum: dictum à similitudine quam habet cum  $\beta$  itera Græca, dum semine surgit: habet enim summmitatē in cacumine reflexam: A que eadem ratione à caulis rectitudine quæ literam Iota æmulari videtur, à quibusdam Iota appellatur: aliis populis Gallicis, des Romans, quod id olus à Romanis primum inuentum sit. Allobroges omnes Reparatam, more medicorum veterum, quibus in vfu fuit, nominant. Quidam etiam Sielam vocant: sed hæc magis rubra est, tum nigra altera, sed tertia candida habetur: quæ omnes ventrem, & clysmis, & decocto optime subducunt. Verum quæ candida est, magis mouet intestina: cuius quoque radix, quia tenuioris est substantiæ, ad glandes sedi inferendas valde conuenit. Hæc Carol. Stephanus de Re hortens. Diosc. lib. ij. cap. xvj. Gal. lib. Simpl. medic. vj.

*Beta* syluestris, Bistorta vulgaris non est, quæ à Gesnero ex vocabulo Græco  $\eta\ \lambda\iota\mu\alpha\tau\alpha\varsigma$ , &  $\tau\omicron\ \lambda\epsilon\iota\mu\alpha\tau\iota\omega\upsilon\sigma$  suspicatur. Nam Bistorta non ea est, quæ Serpentaria creditur: neque etiam quam Britannicam appellant. Fucæ qui secundam speciem Cantananses apud Dioscoridem putarint: sed repugnant radix, & folia. Iam verò Tormentillan

mentillam vulgarem Officinæ Bistortam planram vtramque confundentes, appellant: sed quæ Tormentilla vulgò dicitur, quinquefolio est: at Bistorta censetur Rumicis folio, à terra cæsis, supra herbaceo, flore rubro, concolorique radice: atque vtrique ad eadè effectus, sed huic imbecillior, vt refert, Ruel. lib. de Natura stirp. ij. cap. cxxxix. Dioscor. cap. xxxij. libri iij.

*Betonica* siue Cestron, ea est, quam quidam Latinorum Serratulam vocauerunt vt auctor est Plinius: quia circumsaque in morem serræ folia diuisa sunt. In pingenda hac herba Brunfelsius descriptionem aliam facit, quam tu, si curiosus lector es, perleges, iudiciūque feres. Post autem lectiones varias, recurre ad Dioscoridem libro quarto, capite primo: & Ruel. libro tertio, cap. lxxvj. Plin. libro xxv. capite viij. & x. Gal. Simpl. medica. libro septimo, à quibus omnibus vires maximas collige.

*Badius* color, is est & quem Phœniceum vocamus, à colore dactylorum, quas *Φωνίγειος* vocant Græci *Φωνίγειος χρῆμα*. Idem & Spadiceus dicitur, & Baius, ab eo quod termitem vnà cum fructu à palma reuulsam *σπιδίκα, καὶ βαίος*, Græcis appellatam. Qui huius coloris est infectus homo, à cholera nigra, quandoque vtrique contrahit: qui color vulgò dicitur Bazaneæ, quod cutem totam huiusmodi infestet. Neque à Medicis colorum diuersitates sunt aspernandæ, propter recementorum in ægrotis varios colores vnà implicatos continentium. Vide Thylesij libellum de colorib. & Actuarius de Vrinis, & Bayphium de Gene. vest.

*Betonica* *βερτονική*, siue *vettonica*, aut *Altilis*: quam vulgò flores Tunici, aut Caryophylli aroma repræsentans, esse Ruellius suspicatus est: quod Villium nostrum est, & garyophyllata vtrique rubra videlicet & alba: & tertia colore vtroque tincta. Longè differt nostra garyophyllata, à viola lutea, cuius præcipuus est in medicina vsus de qua re plura in dict. viola reperies.

*Bimpinella*, *βιμπινέλλα* vt vertit Gaza in Theophrasto, inter Syteritides adnumeranda est, vt putat Ruellius, non inter Saxifragalices sit Saxifragi facultatis indifferens, vt docuit experientia. Dicta est Bimpinella, quod folia habeat alternatim diuisa, ac veluti in duas pinnas assurgere videantur. Hæc herba inter acetaria reponenda est, quoniam cruda non cocta estur. Vide plura apud Ruell. lib. ij. cap. cxxxvj. Diosc. lib. iij. cap. xxvj. de Sideritide, & de Empetro.

*Blatta* Byzantia *βλάττος βυζαντος*, appellatur Actuarius, in compositione Aureæ Alexandrinæ, & diamarg. calido: qui vnguis odoratus, vel aromaticus Dioscoridi est. Est hoc conchilii tegumentum, odore quadantenus in castorium inclinans: hinc odori gratia suffitu adhibetur. Lege Dioscoridem, capite septimo libri secundi. & Pl. lib. xxxvj. cap. vj. Ruell. hb. ij. cap. vij. Gal. lib. xi. Simpl.

*Blatta* præterea est vermis, qui in pistrinis degit, & in aquariis Scribonio Largo auctore, stabulari consuevit: quem vermem Asellum vocat. Ad quem medicinæ vsus conueniat ex eodem auctore petes: & ex Diosco. lib. ij. cap. xxxiij. ex Plinio lib. xxv. cap. ix.

*Blattaria* Plinio, Primula veris est: quæ Græcis *φλάμων* *τὸ ἔϊδος*, genus est verbasci, non ita hirsutis, sed viridioribus foliis tertia verbasci species esse suspicioneprehenditur. Ruell. lib. ij. cap. cxxvj.

*Blitum* *βλίτον, καὶ βλῆτον*, à Beta oleris genus est diuersissimum: nunc rubrum, nunc subalbum passim sescoloribus offert, pulmentis, & clysteribus diligenter asseruatur. Ruel. æstimat hoc olus betam rubram esse, cuius locum leges libro secundo, capite quinquagesimo sexto, ex Dioscoride nullius in medicina vsus. Quare dictionem Atriplex.

*Bilis* flaua *χρῆσις* sic ab eius colore qui est flauus, appellationem accepit. Huic humori natura propriam sedem machinata est, eam nimirum quæ iecinori subest vesicam: necessarium siquidem fuit vt ab ea sanguis purgaretur, ne scilicet totius corpo-

ris color ab ea, haud secus quàm in ictero, conficeretur.

*Bile* flaua qui abundante, iracundi, celeris ingeni, iagiles, leues mente, macilentis, & cibum confestum conquoquentes fiunt. Pete dict. Humores.

*Bilis* flauæ non naturalis quinque sunt species: prima λευκοειδής, hoc est, vitellina, quòd ouorum vitellis, tum colore, tum consistentia sit similis, appellatur, & hæc in venis generatur. vide Gal. de atra Bile.

*Bilis* flauæ species secunda παρὰ Γεωδής est, hoc est, portacea, quia porri calorem re præsentat. Hæc in ventriculo gignitur, vt est author Galenus Pronost. libro secundo, capite xxxix.

*Bilis* flauæ tertia species ἰωδής, id est æruginosa, ab eruginis similitudine, vocatur: & vt superior, in ventriculo nascitur.

*Bilis* flauæ quarta species ἰστέπιδής, isatidis herbæ colorem referens, nominatur: atque eodem quo præcedentes duæ, loco procreatur. Quinta autem, cœrulea nuncupatur. Quare Galenum lib. x. de Simpl. medic. facul. cap. p de Bile.

*Bilis* flauæ vsus, vt intestina à pituitosis excrementis expurget, & abstergat, atque eorumdem excretionem adiuuet. Hæc ab hora diei tertia, vsque ad horam diei nonam dominatur.

*Bilis* atra μελαγχολία, veluti sæx est, ac sedimentum sanguinis: ideoque colore, vt nomen satis indicat, nigra. Ab ea expurgari iecur necesse est, ideoque instrumentum quo eiusmodi humor expurgetur, natura Lienem condidit. Quod si minus quàm æquum sit, atram ad se bilem trahit, vt sanguis impurior, sic totum corpus redditur magis decolor. Porro bilis atra inertes, subdolos, auaros, morosos, perfidos, tristes, inuidos, timidos, & pusillanimes reddit. Gal. de Atra bile est author: & Calanius suo libro de Bile atra.

*Bilis* atræ non naturalis vna duntaxat species est, quæ radens vel acida nominata, quoniam acris in modum aceti sit, & eorpus animalis radat, terramque, si suprâ eam effusa sit, attollat, ac fermentet, bullasque quales feruentibus iusculis innatare videmus, excitet.

*Bilis* atræ vsus, vt ventriculi actiones iuuat Galenus libro quinto de vsu partium sic docet: Ipsa enim, quum acerba, & acida sit, ventrem intendit, & in seipsum contrahit, & comprehendere cibos exquisitè cogit, & retinere vsquedum planè concoquantur. Pete Hippoc. lib. vj. Epidimiarum, partic. vj. deinde Fusch. super eodem libro in commentariis.

*Bilis* atra ab hora diei nona, donec ad horam tertiam noctis dominatur. Cæterùm prædicti humores non semper seruant eandem formam, seu speciem, dum animal præter naturam afficitur, quam habent quum secundum naturam dispositum est. Galen. ij. libr. Faculta. natural. & Fusch. in compend. medic. capite decimo diligenter perquires.

*Bilis* vtriusque per vniuersum corpus effusio ἡπερὸς, sic dictum malum hoc vel ab aue, quæ ἡπερὸς, id est, Galbula: quæ si spectetur, sanari malum, & auem mori, creditur. Vel ab aue, quæ ἡττιος, id est miluus vocatur: nam oculi hoc vitio laborantium, miluini oculis similes videntur. Vel à mustella, quæ ἡττίς, id est viueta nominatur. Harum partium te docebit Fusch. comp. medic. cap. xxxvij.

*Bolismus* βολιμὸς, est ingens vehemensque ac execrabilis appetitus auaritia, siue fames, canis appetitui contraria ex vomitu tantum, sed inappetentiæ dissimilis proctus: potest quoque dici irrequietus appetitus. Fit autem ex ventriculi frigidityte indigentiaque, ac virium imbecillitate, & ferè in totum ab externo frigore initium capit. Curatio est apud Fusch. lib. iij. de Medendis morb. cap. iij.

*Bolus* seu buccæ βλωμός, ἢ ψωμός, medicamentorum frustulum est esui aptum. quantum scilicet buccæ commodè capere potest vice vna: variisque formatur modis, secundum ætatis, morbi, temporis, & virium exigentiam. Quare Fuschium.

Comp.

Comp. Medic. lib. ij. cap. vij.

*Bombacis semen*, habet simplex tomento lanuginoso, cerasi nucleo simile inuolucrum: quod cardiacum Aëtuario depræhenditur, & ad vitia pectoris purganda effica. Melita insola stequens mittit, & multiplex, sed sibi implexum, & nigrum.

*Bombæx*, vetmis est natura sua sericum texens, qui arboris mori vtriusque frondibus Vere toto pascitur: & cæteris anni partibus in inuoluto veluti ouo quodam delitescens nouos ponit sætus. *Bombæx* iam stequens in Galliis ad vestimentorum luxum cum magna cura alitur, & expetitur maximo prouentu. Vnde carmine eleganter *Bombicem* descripsit, quem ocyus petes: & dict. Sericum crndum.

*Boletus*, βωλῆτις, fungi genus Aegynetz inter omnes optimi: de quo abundè Plin. lib. xxij. c. xxij. At verò Dioscoridi fungorum duplex: aut enim manduntur, aut perniciosi sunt. Multis de causis venenosi gignuntur, vbi videlicet clauus ferreus, in quo sit rubigo, au panni marcor adfuerit, aut si iuxta serpentis cauernam arborisve, quæ priuatim pariunt noxios fructus, erumpant. Eorum qui veneno imbuti non sunt, suauem in iuribus gratiam habet. Vide reliqua apud eundem Dioscorid. lib. iij. cap. lxxj.

*Borago* ἡ βωργῆλος, buglossum tum satium, tum agreste veteribus & recentioribus medicis, est: Catoni bubula lingua: & quia calida humida vino iniecta, lætitiæ ac hilaritatis causa esse creditur. Vnde εὐποροῦνδρ, id est, Corago, corrupta voce, *Borago*. Diosco. Buglossum magnum Circium dictum est.

*Borax*, seu *Borachinus* lapis vulgari medicorum appellatione, est ex Myrepso, aut ex eius interprete Fuchio, Crisocola: nam artifices argëtarij autum conglutina re non possent, si deesset *Borax*. Siquidem à Dioscoride, Plinio, Galeno Crisocola nuncupatur, quasi auri gluten, siue colla dicatur: & capistrum auri, & tincar Arabibus. Quære dict. Crisocola.

*Botrys* βότρυς, herba micranæa est Allobrogibus: vulgaribus autem officinarum Sepalsariis Crispula. Hanc quidem varietate, & odore decepti, Ambrosiam esse contendunt: alij Ammomū propter odoris in semine fragrantiam, decepti Myropolæ nostrates pro vero Amomo Botryos semen, quod racematim ostenter per furculorum longitudinem, pendentes existimant. Quim Ammomū volutū, turbinatūque semen in se habet. Quære dict. Ammomum, post Diosc. lectionem lib. iij. capite ex. & lib. primo cap. xiiij.

*Botryitem* duplicem reddidit Scholiastes, qui vnam fruticis speciei assignat, quasi inter arborem, & herbam non dissimilem coequet: quæ vulgò Mycranæa est: alteram, quam vulgus rosam Hierusalem, Botryitem expressit: sed simplex aliud est, atque diuersum Hiericontis rosa, vt suo loco scribitur.

*Brachium*, siue Humerus, totum mēbrum cum manu cōprehenditaliquando ab humero ad cubitum: interdum etiam à cubito vsque ad vertebram manus tantum: arque à musculorum motu, id est, lacertorū Lacertus nominatur. Brachij os superius, quod vnicū est, os adiutorij habet nomen: à cubito verò ad manum vsque, vlna, & fossile maius est, & minusque pars etiam hæc tota dicitur brachium Celso. Fossile minus Cerebri, seu Radius est. Carpus, seu Brachiale, & Ra sacta: constat ossibus octo, quatuor in singulos ordines coniectis: non incertus horum numerus cum Celso. Metacarpium & pecten ossibus quatuor constat Galeno, non quinque cum Celso, Guidone, & alijs. Singulis quinque digitorum ossa tria. Acrocheirum seu manus extrema, etiam carpum, & metacarpium cum digitis continet. Vide plura in Galeni libello de Ossibus: & Celsum de Brachij curat. lib. viij. & Methodi medendi lib. vi. apud Gale.

*Bolus Armenicus*, ab Armenia ad nos vectus, ideo appellatus: neque is est qui hodie in officinis ostentatur: quia facultate non respondet. Ergotellus Armenica summa exciccandi vi est, colore palida, stibilis veluti calx, aut terra Samia, leuitate tamen inferior, vt inde constet hanc spiciorem, & minus aëream esse: itaque nisi ac-



curatè spectetur, facile lapis putabitur. Disentericis, aluique fluoribus, sputo sanguinis, distillationi, ac patridis ovis vlceribus conuenit, præcipuè tamen capitis fluorem ad pectus cohibet, nec tibi laborantibus minùs prodest: ita enim eorum vlcus excutit vt non ampliùs tussiant. Gal. ix. Simpl. cap. x. Diosco. lib. v. cap. xciiij. Aëtius Simpl. lib. ij. dein quære dict. Terra.

*Brassica*, cuius generalius nomen ad omnes herbas hortenses, Caulis est: quæ herba. Triciana Columellæ, Lacuturris, id est, cabucia, Plinio, & quæ Apiana, id est, crispata, Selnocis Catoni: vt Sabellica rubea dicitur; atque hæc omnes eandem facultatem obtinent. Lege plura apud Carolum Sieph. in libello de re Hortensi, Catonem & Columellam.

*Brassica* agrestis, ἡ κρύα, Theophrasto est, vt Gesnerus scribit: quibusdam verò Lampiana, sed eodem Gesnero potius Armoracia vt sit, placet. Sed marina Dioscor. Brassica seculi nostri medicis Soldanella est. Est denique hortensiss Brassica, vulgato nomine: olus, siue caulisque superioribus differt, vt videre est in dict. Crambe.

*Branca vrsina*, Dioscorid. Acanthus, & Romanis Pederota: sic cognominata quòd folijs priores pedes vrsorum imitetur figuram. Sed re vera spinarum mollicie, quibus armata est, mollis Acanthus Vergilio celebrata est. Dioscorides alteram scilicet syluestrem tradit superiore, effigie tota inferiore, sed durioribus aculeis fulctam: viraque vires easdem habet radice, & folijs, & edulis olim apertissima, sed in clysteres postea commodè vt veniret, vt ederetur desitum est. Requirit Dioscoridem libro tertio, capite decimo octauo. Brasanolum libro prære de Simpl. examine.

*Bregma*, id est ὁ κεφαλῆς, capitis anterioris pars in qua ossa duo numerantur, quæ alioqui parietalia appellari solent. Vide multò plura in dict. Caput.

*Britannica*, viola altilis, ea est Barbaro, quam vulgus nostrum vocat Armoric. Dioscorides & Plinius Veronicam appellare videntur. Scholiastes quidem Simpl. de Britannica his verbis inquit: Britannica ea herba est, quæ ab Italis Piatamæna vocatur: alijs herbarijs, Bistorta: quam nonnulli præterea alij Lapathum acutum autumant, id est Rhabarbarum monachorum. Eius autem herba Britannicæ & si origo ad Britannos refertur, circa Rhenum tamen in Germanici Cæsaris exercitu inuentam auctor est Plinius lib. xxv. cap. iij. de qua mira scribit. Igitur viderit lector in ignotis simplicibus depingendis apud plerosque auctores idoneos scribendi diuersitatem: quorundam etiam obseruaturus negligentiam. Quære dict. Bettonica.

*Bryonia*, ἡ ἀμπέλως λευκὴ, id est, vitis alba, quòd folia, & corymbos, ac capreolos vitis vineæ, eademque folia habeat alba, præsertim dum grandiora sunt: est quoque radice in terræ altum propensa, intus & extra alba, & cum eius corymbi maturuerint rubri fiunt. Aliqua, ἀμπέλως μέλας, id est, vitis nigra: quam alij Bryoniam nigram esse volunt, quòd eius corymbi primum virides, deinde verò nigri appareant, folia & caules hederæ similes, radicem foris nigram, intus verò buxeam. Dicta est præterea vitis alba Pilexton, quod locum vrendo depillet. Galenus libro sexto, Simplic. medic. & primo libro. Compositio. pharmacorum ἀμπέλως λευκὴ, ἀπὸ τῆς βρύωνικης separat. Scribonius largus vitem albam Bryoniam interpretatus est. Dioscor. petendus est libro quarto, capite clxij. & clxiiij. Plinius libro vigesimo tertio, cap. primo.

*Bryonia*, ἡ μυrica, id est Myrica Dioscoridis, pumillus quidem frutex in Achata reperiunt, qui Romanis Thamarix appellatur. Eius duo occurrunt genera, sativum fructum ferens gallæ similem: & sylvestre fructu viduum, flore muscoso excepto. Dioscorid. lib. j. cap. xcix. Ruel. lib. j. cap. xcix.

*Bryum* marinum βρύον θαλάσσιον, aliquibus Corallina suspicatur: est præterea muscus senescentibus arboribus, & rupibus continua aqua madentibus, valde peculiaris: qui Græcis etiā βρύον nominatur. Itaque Corallus, id est, muscus marinus Diosc. & Plin

& Plinij Bryon est: cuius vsus contra lombricos, pntas, & tereclines efficac, atque frequens. Est denique Bryon herba Plinio lupus salictarius appellata: officinis Lupulus. cuius petes distinctionem. post Dioscorid. libro quarto, cap. lxxxiiij.

*Brochon* βρόχον, arbor sui generis, colore nigra, magnitudine oleæ, folio roboris perpetuo virentis, fructu caprifici: ex qua Bdellium illachrimar. Arboris aut lachrimæ duo efferuntur genera, Scythicum, & Arabicum: prius nigrius, sed posterius lucidius ostentatur. Vide Dioscoridem libro j. capite lxxix. Gale. lib. vi. Simplicii. Aëtii lib. primo medic. Aegyneta libro vij. Artis cur. Ruell. lib. j. cap. lvij. Repetes dict. Bdellium.

*Bronchus* βρόγχος, asperæ arteriæ cartilagineum corpus est, quod pro gutture accipitur, & gutturis tumore à defluxi cerebri ibi ferento Galeno deficiente: est quodque ab eo Bruchocela, vicium: siue tumor magnus, & rotundus in ceruice intercutem & asperam arteriam, qua modò caro hebes, modò humor aliquis includitur: interdum etiam minutis ossibus pili immixti. Contrahitur hoc vicium assiduo potu aquarum niue resolutarum.

*Bruchus* βρύχος, ex vermium genere videtur: atque inter locustas, si alis non careret, adnumeraretur: adeo herbis, & arboribus perniciosus, erodendo vt interficiat: vnde ei cecidit nomen βρύχος, vt authores sunt Columella, & Plinius. Atque hic etiam describitur, quod in morbis abditis quibusdam benefacere docuit experientia.

*Bruma* βρυμήσις τροπή, hya malis solstitii dies dici creditur, qui est ad xvij. Calendas Ianuarias, quo die fit in Capricorno hyemale Solstitium. Et dicta Bruma, vt interpretatur Budæus, quasi βραχυμέσις, id est brevis dies.

*Bruscum* βρόσχος, arboris Aceris tuber est, intortius crispum: nam quod simplicius sparsum est, Moluscho dicitur. Huius rei Plinius scriptor est libro, & capite nono.

*Brutia* pix, secundus est liquor qui ex tæda excoquitur & aceto coagulatur: dolis aliisque vasis illinendis utilis ab alia pice lentore differens. Primus autem tædæ liquor Cedrium appellatur, quo Aegyptij defunctorum corpora in multum æuum conseruarent. Hoc autem accepit nomen ab agro Brutio in quo excoquebatur. Plura de hoc gummi genere leges apud Plinium libro xvj. cap. xj.

*Buteo* βούτοπος, non ex Accipitrum, sed Ardearum genere auis est, nisi quod plumarum colore variatur. Versatur hæc auis in aquis stagnantibus, demisso in aquæ profundum rostro clangorem ædens, terrorem horrescentem audientibus vt inferat, tantumque spectaculum ignaris præstat, quasi Genios aut Larvas errare credant. Vulgus Gallicum Boutot vocat, sed Græci scriptores à testiculorum numerositate, βούτοπος appellarunt.

*Buceras* βουκεράς, herba est Theophrasto, quæ notiore nomine Fœnograecum esset: quam herbam Columella Silicam simpliciter describit. Dicta quidem hoc modo, quod corniculorum similitudinem quandam figura semen præ se ferat. Facultates reddit Diosco. lib. ij. cap. xciiij. Plinius lib. xxiiij. cap. vltimo. Gale. libr. viij. Simpl. medic. Quære dict. Telis.

*Bucranium*, Antirrhinum est vulgò oculi catti, cuius flos caeruleus id est, violaceus, deprehenditur: neque videtur differri ab Anagallide, cuius dict. petes, & Antirrhinum.

*Bubo* βούβω, tumor est in inguinum emunctoriis, qui propter vlcus quod in collo, capite, manus ac pedis digito, vel aliqua alia vicina parte natum, oritur. Per pestilentiam denique periculo præsentis in femoribus, alis, & collo Bubones ingruere solent. Petenda curatio est à Fuchf. libro primo de Medendis morbis, capite vigesimo septimo. Gal. libro secundo ad Glauconem, cuius est Akakia interpret. Est insuper Bubo auis nocturna, dirum omen cantu suo vicinæ præfagiens, vt author est Vergilius libro primo Georgicorum. Quære Aelianum libro decimoquinto, cap. xxxvj.

*Bubonium*, siue *Aster atticus* ἄστυς ἄττικος, quod describit Galenus libro nono *Simplicium Medicamentorum*, *Aster atticus* nuncupatum: & à Latinis *Inguinaria* quoniam tritum & impositum pro cataplasmate, ordinata cohibet. Pl. libro xxvi j. cap. v. Diosc. lib. iij. cap. xv. & recurre ad dict. *Aster att.*

*Bubonochela* βουνοχέλη, Manatdo teste, herniæ species, cum intestinum, vel omentum non intra scrotum delabitur, sed in inguine tetentum, ipsum tumescit. Vide plura in dict. *Ramex.*

*Bubon*, genus orchis, id est, *Satyrionis*, quem palmam Christi herbatiorem officinæ vocant, *Brassanolæ*, ob radicis similitudinem, visum est. Huius siquidem nominis nemo veterum cum Græcorum, tum Latinorum scriptorum, sed solus recentium *Hermolaus Barb.* in *Cottolariis* primus meminit. Quare dict. *Satyrion*, post *Diosc.* lectionem lib. iij. cap. cxxij. *Ruell.* lib. iij. cap. lxij.

*Bucca* γνάθος, utrumque oris latus quod spiritu recenti inflatur, dici solet vel oris concauitas intra malas à mento ad oculos, quæ spiritu à pulmone reuocato, & oppressis labiis retento inflatur: & quod est reliquum in dict. *Malæ* reperies.

*Eucephalus* βουκεφαλος, herba eadem cum tribulo terrestri est: quoniam tritum generum occurrit, ita dicta, quod bubuli capitis imaginem refertur duobus cornibus & ritu, ut author *Marcellus Verg.* super *Dioscoride*, capite de *Tribulo* herba. Quare dict. *Tribulus*.

*Bucolicum*, βουκόλιον, panacis genus videtur, quod ex Macedonia affertur: ita dictum, quod armentarii eius sponte profluentem humorem excipiant, ut est author *Plinius* lib. xxv. cap. iij. In dict. *Panax* lecturus plura.

*Bulbus* appetitiorius ἰδιώδιμος, quæ capula, alioqui portera minutula: quæ dum estur, appetitum mouet, hortulanis denominata est: *Ascalonitæ* Latinis, quod etiam vulgus nomen retinuit. *Cibus* hic veneris potius irritamento, quàm vitæ utilis.

*Bulbus* alius est agrestis, quem Græci καρδίων vocant. Est præterea *bulbus* alius laniger, citra annuum tipas nascens. Insuper & alius est *bulbus* vomitorius appellatus, ad bulbi cibarii discrepantiam: estque foliis nigris, radice alio simili: & vomitum ciet. Plura alia sunt *Bulborum* genera, quæ qui scire cupiet, requirit *Theophrastum* libro octauo de plantarum historia, *Dioscorid.* & *Plinium*.

*Buphonum*, siue *vlophonum* *Plinio* lib. xx. capite xvij. βουφόνον, & βουφώνον, herba est, quæ à bobus deuorata, anginam parit: eosque necat. Aliquibus hæc herba *Chamæleum*, aliis *Cynozolon*, quod fetore eius *Ricini* è canum auribus decidat. Quare dict. *Chamæleum*.

*Bulle*, quæ in superficie vrinæ apparent, adulterini spiritus sunt signa: quorû alix per omnem superficiem videntur, alix in sola coroua circumiacent. Vide dictionem *Corona*.

*Bulle*, quæ in corona sola seriè consistunt, si contigerit ut colore humoris vrinæ imbutæ sint, magnam capiti passionem, & dolorem non mediocrem adesse significant: quæ autem sparsim mitiorem, si aurea non appareat vrinæ: cuius dict. *petes*.

*Bulle* albæ, in coronæ ambitu consistentes, nullum aut exiguum capiti dolorem adesse pollicentur, sed propter renum potius obstructionem, ut est author *Hippocrates Aphor.* lib. vij.

*Bulle* versus vrinæ medium appatentes, remissionem quandam doloris ostendunt: sed palantes in superficie, solium multam naturæ imbecillitatem, & crudorum humorum copiam portendunt.

*Bulle* densiores in vrinæ corona, dolores capitis, aut renum, aut defluxum in pulmones nunciant. Apparent quandoque etiam innatantes pinguedines quædam veluti ataneatum telæ.

*Bunias* referente *Ruellio* *Napus* nostras creditur, & differt à *Rapo*, & *Bunio*: Quare dictionem *Napus*.

*Bunium*, Scopæ regia est, qua charpentarij, vt Plinio placet, recenter vulnerati, vtuntur: & hæc Bunij species altera Gesnero videtur, sed quæ sit nondum cõstat. Sunt quidam tamen, qui ad minorem Saxifragam, sic officinis dictam, hanc accidere, lege nulla adstricti, suspicentur. Verùm quid Bunium, sit docet Dioscor. libro secundo, capite centesimonono. Pl. libro vigesimo, capite quarto, Gal. libro sexto, capite Bunium

*Bursa* pastoria, quia admota naribus sanguinem profluëtibus, Sanguinaria herba pastribus appellata est. Herbariis quibusdam Thlaspi alterum suspicata est. Brassanulus Thlaspi plantæ similibus lineamenti, non gustu, comparauit. Itaque Thlaspi semen in mandendo, vt Sinapi, mordaxprehenditur. Pastoriz vetò burse & herbæ & seminis facultas, siue gustatu in mandendo, siue in odorando, satua omnino refertur: quod planè cõticiendum Bursam pastoriam minimè inter herbæ Thlaspi ordinem esse adscribendam descriptione Ruellij lib. ij. Scirpium, cap. cxlij. Summatia consideratio docetur in dict. Thlaspi.

*Bubula* caro, Galeno teste de Alimentis, medioctis non alimenti perhibetur, sed & cõcoctũ difficilis, adeò equidem sanguinem vt gignat scæculentrem, ingeniumque edenti hebetiorem. Facile id esse quidem melancholicis natura apparet, qui sibi si contraxerint affectu aliquo mœrorem alterum, pedetentim torresieri sanguinem, in grumósque passim conuerti: hinc inde suboriuntur affectus Cancer, Prurigo, Scabies, Elephantiasis, Lepra perperam nominata, & sebris quartana.

*Buphtalmus* Βούθαλμος, id est Bouis oculi: quæ alioqui Confitma media Ruellio, & aliis herbariz rei scriptoribus, describitur: Bupthalmi siquidem flos cardiacus Aduario est, æmulaturque Anthemidis florem colore, multo maiorem, & acriorem referte vim, quod valentiùs digerit. Hæc putatur Cotula non scetens vulgò dicta, Anthemis autem, seu Chamæmelon ab odore mali dictum: cuius genera sunt tria Dioscor. flore tantum diuersa, intus in omnibus aureo, foris candido in Leucanthemo: melino in Chrysanthemo: purpureo in Eranthemo, quod Vere floreat: atque has herbas hæc nominibus Macer herbarius distinxit. Legèdus est Pl. lib. xxv. cap. viij. Dioscor. libro iij. cap. cxxxij.

*Buprestis* Βούπρεστις, cõiectore Ruellio libro secundo, cap. cxxvij. herba est, quam maiores nostri in ciborum deliciis habuere. Est & Buprestis referente Plinio libro xxx. cap. iij. animal ex genere Cãtharidum, Scatabeo longipedi simile, venenosum, quod fallit inter herbas bouem pascentem, vnde nomen inuenit: in quo genere Pythiocampa scetile animal numeratur. Horum animalium meminerunt Dioscorid. Largus Plinius, & Galen. contra iaculantium venena, Butyrum ex eo fit, quod in lacte habetur pinguisimũ, digestiũque facultatis resoluentis & emollientis Tumoribus præter naturã acquisitos flaccidos ac molles digerendo facile consumit, vt sunt parotides, bubones, & oris flegmones cataplasmatis forma impositum: necnò ad quamplurima alia probatur vtilissimum Diosc. lib. ij. cap. lxxij. & Gal. Simpl. facult. libro x. experientia.

*Buxus*, & buxum ὄξυς, exiguus stutex est, qui nonnunquam lōgitudine procreta apparet, vt altitudine primum æquet in imis montium rupibus. Producit ex se granum siue semen siliqua rotunda, olivæ ferreæ forma, inclusum: quod postquam maturum est, recluditur fissura triplici, in quo grana tria tantum compagibus inter se diuisa, reperiuntur, lini semine colore, sed grani pyri serè figura: cuius facultas mouere aluum, & beneficere Neapolitana Lue vexatis docuit experientia. Huius autem tria genera facit Plinius libro decimosexto, capite xvj. cuius neque Dioscorid. neque Galenus meminerunt.

*Byssus*, lini genus tenuissimi, vt inter Scrici genus videatur reponendum, proximam ab Aësto dignitatẽ obtinens, ex quo subtilissimæ sũt vestes: quæ mulieribus olim præcipuè in deliciis habebantur, Plinius circa Elim Achaiz nasci credidit. Po-

lux verò in India: Philostratus autem Byssum ex quadam nasci arbore, quæ populos æquat a leitudine, foliis autem falsis esse prodidit. Videbis reliquum apud eosdem authores.

*Eugla*, Symphitum per ræum est: plurimum quoque differt à reliquis Consolidis, siue confirmis: quæ quatuor differenter Dioscot. Plinio, & Galeno distinguuntur, quem admodum memoriz tradidit post omnes Ruellius lib. iij. cap. lxxx.

*Bulimus*, insatiabilis fames est: quæ calfaciendi metodo curatur. Bulimos enim ab externo frigore, quale contingere solet in longo itinere, per gelu, & niuem, ortum habet. Hûc affectum sequitur membrorum inanitio, spirituum defectio, & virium lapsus. Itaque omni ratione calfacere oportet: hoc est, cibo potu, medicamentis, odoribus, frictionibus, & aliis, quæ corpus calefacere idonea sunt. Hæc super libro priore ad Glauconem Acacia.



## De litera C.



*Cacalia* κακαλία ὄψα, aliquibus Leontice est, aliis Careum syluaticum: Scholiastes verò sic interpretatur, Cacalia, officinis Liliū conuallium: vulgò Muguerum magnum: quod quidā Galeni Canca mū esse suspicantur: nonnulli præterea alij Carci agrestis semen. Carus autem, vel Carum officinis carui possidet nomen. Descriptionem integram lib. quarto, cap. cviii. reddit Dioscorides: Plinius lib. xxv. cap. vñdecimo, Ruell. libro tertio capit. vigesimo octauo.

*Cachexia* καχεξία, corporis totius habitus malus, quo corrumpuntur alimenta in stomachum iniecta, appellatur: fit cum longo morbo corpora deprauantur, verum si illo etiam vacante, alimentum tamen in sui substantiam non conuertunt. Hoc vitio qui detinentur, Cachetici dicuntur. Legendus est Gal. Temperamentorum lib. iij. Sanitatis tuende lib. iij. Methodi lib. xij.

*Cachrys* καχευς, sunt oblonga panicularum modo nucamenta, quæ squamarum compacta pendunt è ramis arborum. Crescunt enim hyeme, Vere dehiscunt in fluantes squamulas, & folio prodeunte decidunt: qualia multa in Abiete, Picea, iuglande, Corylo, cæterisque id genus arboribus, conspiciuntur. Descriptionis author est Plinius lib. xvi. cap. vij.

*Cachrys* καχευς, Lybanotidis secundæ semen est, id est, Rorismarini nostratis referente Dioscoridi, libro tertio, capit. septuagesimo. Sunt qui etiam volunt semen hoc Cachrys nominandum, cardiacum est apud Aëquarium Medicament. libro quinto. Est insuper Cachrys, quoddam parturientis arboris indicium, quod nec fructum, nec florem propriè esse dixeris. Cachryn Plinius pilulam veterè ausus est libr. xvi. cap. vij.

*Cadmia*, Chymicis cathimia, & climia peculiare nomen, est corpus racematim & densè concretum in rudibus ferreis, ex fuligine æris in fornacibus candentis egesta statū, & lateribus camærisque fornacum serratis inhærente: est colore spodij, fræque, cinerulenta, & æruginosa, quæ optima est. Fit etiam ex argenti terra, & cocto lapide pyrite. Dicitur & Cadmia Botryitis Dioscorid. & Galen. id est, racemosa. Est denique lapis in montibus, & riuis fluminum Cypri repertus, alia omni cadmia efficacior, inuentu rarus. Lapide calaminari, sic dicto, hodie æs tingunt.

*Calamintha* καλαμιθῶν, cuius formæ tres scribuntur: vna hortensis Nepita dicta: altera pro agresti Pulegio ostentatur: tertia Herbariis aliquibus herbæ carti, quæ verè Nepita vsurpatur: quartam addit haud vulgaris literaturæ medicus, quam, quòd in fontium irriguis calamintha deprehenditur, facultate, lineamentis, & figurâ, à cæteris differentem, facit. Dioscoridi triplex legitur: Galeno duplex: Syluius autem ex Aëuario, quadruplex: sed ob imperfectam omnium historiam in hac sententiarum varietate iudicium difficile, vt refert Syluius lib. priore de Medicam. simpl. naturæ & Ruell. libro tertio, capit. xxx. Dioscor. libro tertio, capit. trigésimo quarto.

*Calamus* odoratus, vel aromaticus, neque galanga, neque acorus, sed cannæ vnguentariæ species: Hippocrati μυρτακος: Arabicus Plutarcho: Alexandrinus Celso. Requirendus est Galenus Simpl. facult. libro septimo. Syluius de Medimen. simpl. naturæ, libro priore.

*Calamita*, ranz paræ sunt, & prorsus virides, quæ quibusdam Dryopetæ vocan-

tur: quòd super quercus, aliàsque arbores versentur, sic sunt appellatz, Plinio libro xxxij. cap. vij. Vigonçi Chy rurgi emplastrum ex oleo ingrediuntur.

*Caligo oculi*  $\alpha\chi\lambda\upsilon\varsigma$ , vlcus superficialium est, quod in nigro oculi apparet cœruleum, caliginoso aëti simile, nigri partem maximam occupans. Caligare verò oculi, auctore Celso, nonnunquam ex lippitudine, nonnunquam etiam sine hac propter lippitudinem, imbecillitatemvè aliam consueuerunt.

*Calendulam.* I. Agricola in Leontopodio, non in caltha vult annumerari: Errant inquit, qui calendulam aliquibus sponfam Solis dictam, Helyortopium esse censent: Cætera sunt ex ipso auctore elicienda: nos verò meminimus paulò fusiùs in dictione Helyortopium. Sed horum simplicium controuersia dirimenda est ex lectione Dioscor. Plinij, & Ruellij.

*Canna* siue arundo, Græcis  $\delta\omicron\nu\alpha\zeta$ , de cuius radice cremata fictili vase, non autem de elephanti ossibus, si Auicennæ credimus, spodium conflat: quod de vitroque id facere reclamat materia ex Dioscoride & Galeno. Quin Spodium fieri ex Pompholige, aucthorum recitatorum lectione ediscas: quod nos etiam adnotauimus in proptiis dict.

*Calx* omnis viua vehementer urit, & secundum materiam de qua conflatur multiplex, variâque est: cuius chymistæ diuersitatem virium experientia nouerunt. Fit ex omni metallica & fossili materia, & ex omni genere lapidum, ossium, & cornu.

*Saxifraga*  $\xi\mu\pi\tau\rho\varsigma$ , quæ & saxifraga, vulgi appellatione Salvia vita, inter Scolopendria aliquibus annumeranda: itaque Plinio libro vigesimo septimo, capit. nono, ea herba est in maritimis locis proueniens, & à calculis frangēdis Saxifraga nominata. Auctor plenioris descriptionis, post Dioscor. est Ruellius libro secundo, cap. centesimo vigesimo nono, & quod reliquum est, in dict. Saxifraga copiosius retulimus.

*Cali* herba in Gallix maritimis prodirat Narbonam, Solda regionem Incolentibus appellata: de qua fit cinis, atque tum ex ipso sal nomine Alkali, & soldura veluti sex. in conflagrandis poculis candidis, quæ vitra & vitrea vasa dicuntur, aptissima excipitur.

*Callitricum*  $\kappa\alpha\lambda\iota\tau\rho\upsilon\kappa\omicron\varsigma$ , Adiantum videtur: cuius genera plura efferuntur, vt Polytricum, Cæteras, nigrum Adiantum, & album, Salvia vita, & lingua ceruina, quæ nomine proptio Omyonitis Dioscoridi pronūciatur: quæ quidem herbæ omnes facultatis eiusdem reperiuntur. De Adianto vitroque latius tractat Dioscor. proptiis cap. & Plinius lib. xxij. cap. xxi.

*Calligonum*  $\kappa\alpha\lambda\lambda\gamma\omicron\gamma\omicron\upsilon\varsigma$ , vulgari nomine à sistendo sanguine Sanguinalis herba proclamata est: à Diosco. lib. iij. cap. iij. Plinio lib. xxij. cap. xxi. Polygonum: differtque à Polygono sicut suo loco dicitur.

*Calix*  $\kappa\alpha\lambda\upsilon\zeta$  significat folliculum, quo primùm flos, & deinde semen harbarum, vel fructus arborum cooperitur: à quo calliculus deducitur. Descriptionis rei huius auctor est Pl. lib. xv. cap. xxij. & lib. xvj. cap. xliij.

*Calculus*  $\lambda\iota\theta\iota\sigma\iota\varsigma$ , renum aut vesicæ passio est, qua prouectæ ætatis homines, quàm pueri frequentius apprehenduntur. Causæ autem generationis existunt, aliudque cruditates, ardor ignea, humores crassiores, & huiusmodi similes calculos formant. Curationis est auctor Galenus in eo libro, qui de Renum curatione inscribitur: & Fuchsius lib. iij. de Medend. morbis, cap. xxxj.

*Calathiana* viola, flos est præter violarum naturam autumno erumpens cœrulei coloris, foliis minutis, sine odore: à calathi figura nomen flos cum herba contraxit: cuius descriptor ex Plinio libro vigesimo primo, capit. sexto, est Ruellius, quem adibis.

*Caltha*, quæ & calendula, & Solsequia  $\kappa\alpha\lambda\theta\eta$  quam violæ speciem, eamque luteam & graui odore Plinius scripsit: vnde coniiciendum datur aliquibus Caltham Dioscoridis esse Leucioium, præsertim tertij generis, luteis floribus, & odoratis,



tatis, maximi in medicina vsus. Petendus est Diosc. libro tertio, cap. cxviii. & lib. iiii. cap. cvij.

*Calor* cœlestis, est qui tanquam naturæ primariæ, seu diuinæ primarium instrumentum, res varias pro variis elementorum misturis generat. Cum igitur Sol omnis luminis fons sit, ab eo non solum Luna, verum etiam reliqua Astra lumen mutantur, proindèque variis luminum, & calorum missionibus afficiuntur. Similiter quoque in plantis flores variis notantur coloribus, quod ars sicur natura effingere nullo modo potest. Consulendus Acacia super priore libro Galen. ad Glauconem: & Angelus super libris ambobus de Materia, & Formæ proprietatibus.

*Caldum* prorsus, frigidumvè nullum cæterorum corporum est, sed sola elementa: quicquid præter hæc ceperis ex his mistis constant, vt docet Gal. lib. primo Temperamentorum.

*Caldi*, frigidi, humidi, siccique duo significata hæc sunt: alterum ex absoluto sermone, loquentium mistura carens & syncerum: alterum ex contrariis mistis constans: cæterum ex se pollent in mistura nomine dictum: vt primo Temperamentorum libro tradit Galenus.

*Cancer* καρκινος, fluuiialis ambabus cholis anteriùs armatur, & induitur testaceis squamis toto corpore, quibus vsus & in cinerem redactis aduersus morsus venenosos benefacere docet Galenus libro vndecimo. Simpl. medi. Cancrorum caro cum caprillo lacte, vel bubulo hecicis analeptica vsu cõtinuo, est. Quântum proficiant corpori humano cancri vel crudi, vel quomodolibet cocti in integrum docet Dioscorides lib. ij. cap. ix.

*Cancer* καρκινος, passio est cornæ oculi, dolorem immensum excitans, & ruborem tunicarum, cruciatumque punctorum vsque ad tempora, potissimum si quatiantur, protensum vuez membranz pãssiones sunt & πρηπτις, & crosio, & ruptio, corneavè procidentia contingens.

*Cancer* καρκινος, & καρκινωμα, est denique inæqualis, lineescens, aspectu reter, & cum dolore tumor, in omnibus corporis humani partibus qui fieri solent. Siquidem in oculis, vtero, verum præcipuè ac sæpius in seminarum mammarum accidit, quod rars, & laxa sint, ac crassissimam bilis atre materiam promptè excipiant. Fitenim hoc malum à Bileatra seruescente, quæ si acrior existit, vlcérationem etiam efficit. A similitudine Cancris accepit nomen, quoniam in eo venæ oppletæ, & in ambitu tensæ, cancri animalis pedibus similes sunt.

*Carcinus* καρκινος Manilio, commune nomen est Plinio, quo γρακοδελμα comprehenduntur. Aristoteles autem eos Caneros vocat tantum, quibus corpus est rotundum. Cancer est etiam species γρακοδελμου, quæ Gallis Crabes, hoc est, Caridas, & Gamaros. Galenus scribit Astacos, Paguros: Cancros, Locustas, Caridas, & Gamaros carne dura constare tam maris, quàm fluuiorum: arque ob id difficilimè confici, sed firmi alimenti esse.

*Cancratum* καρχαμον, neque lacca pictorum, neque myrtorum est: est arboris Arabicæ lachrima, myrrhæ quodammodo similis, virosi gustus, ad suffimenta vsurpatur, Lacca interdum Actuario vsurpatur, præcipuè in duplici descriptione compositionis Dialacca, iniquenti: λάχαν καρχαρισμωτον purgatum. Dioscor. libro primo, cap. xxiii.

*Cannabis* χανναβις ήμερος, & άργη, id est hortensis, & agrestis: planta est magni in vita vsus, præsertim quæ domestica colitur. Semen eius largiore cibo sumptus, genituram exstinguit: succus ex plantæ foliis conuenienter aurium doloribus instillatur. Syluestris Cannabis decocta radix, illitu, inflammationes mulcet, humores discutit: tofos articulorum dissipat. Hæc Diosco.

*Cannabis*

*Canaria* *κύνωρ*, quod ea herba canes ad vomitum proritandum edocti à natura, vtantur. Canaria, vt Ruellio placet, accepit nomen : nullius quod cōiciam in medicina vsus, nisi ad sanguinem è natibus eliciendum iuuenibus capitis dolore vexatis. Vtrum Dioscor. Phœnix sit, quæ alioqui plerisque officinis Palea nominata est, nondum liquet.

*Canis-rubus* *κύνος βατος*, Esplanterius rubus est, non Flamboisius, siue Ampoius rubus, frequentissimus in Grolza Segusiorum monte: & eo nomine ab incolis appellatus. Differt iterum à Rubo, qui inter Sentes refertur, proceritate, & eius fructu aliquantisper: cuius rei scriptor est Dioscorid. libro primo, capit. centesimosexto.

*Canis* testiculus *κυνόσχη*, ὁ ὄρχις ἀπλός, scriptoribus nonnullis creditur, sed ex Gesnero secus. Testiculus referente ex Andrea Dioscor. nomine alio Serapias vocatur, quoniam radix ad multa utilis sit: radice bulbi effigie testiculi similitudine, quæ gemina est, apparet. Hæc differt à Satyrio, cuius differentia quàm plures passim Herbariis occurrunt. Reliquum libro tertio, capit. centesimovigesimo primo, docet Dioscor.

*Cantharides* vermiculi alati, sunt & versicolores, luteas in alis transuersas habentes lineas, corpore promisso, crasso blattarum modo præpingues, inertes, ac imbecillæ quæ vnus sunt coloris. Totis vititur Galenus ad psoras, & lepras libro vndecimo. Simpl. & in Theriace ad Pisonem. Hippocrates caput & pedes amputat in libro de Fœminarum morbis. Diosc. earum differentiam tradit, & vires libro ij. cap. quinquagesimosecundo.

*Cammarum* *κάμμαρον*, herbarum veneno quouis aptissima: quæ notiore nomine Aconitum Herbariis peritioribus appellatur: quam à radicis flexura Dioscori. Scorpij caudæ assimilat. Cammarum item nonnulli esse Mandragoram voluerunt, aconiti genus referentes. Torius discriminis elucidandi author est Dioscor. libro iij. capit. sexagesimosexto. Nos attigimus partem portiore totius energiz in dict. Aconitum & Toxicum.

*Canis*, vrticæ sylvestris, vt Plinio placet, genus acre, caule mordaci, fimbriatis foliis: quod vrticam græcam esse suspicor ab ipsius hyeme vehementi mordicatione, in quo tempore, cum suis pilulis racematis & virentibus, pollet. Locus ex ea nudus membri qui tangitur, Confestim in arduas pustulas conuertitur, & aduritur, quia veneno abundat. Vrticarum differentias loco suo reposuimus, post Dioscor. diligentiam libro quarto, capit. octogesimo primo. Plinius libro xxi. capit. xv.

*Capillus* seu crinis, est corpus frigidum siccum, ex humorum inter cutem & carnem fuliginosa materia per poros spirante, compositus, sensus expertus. Est & herba vulgato nomine Capillus Veneris, cuius Adiantum album, & nigrum nomen retinet pro simplici vtroque: sub quo Polytricum Trichomanes, Ceterach, & salua vicia constituuntur: quorum petes proprias dict.

*Capillorum* contenta in vrina sunt, quæ capillis similia apparent: quæ in vas sanguineis, & spermaticis generantur, & per renes, & vterus purgantur. Accidit nonnunquam vt pus, sanguis, arenulæ, carunculæ, & alia quædam minguntur. Petendus est Galenus libro tecto. Locorum affectorum, capit. tertio. Actuarius de vrinis libro ij.

*Caput* *κεφαλή*, quod namque humanum capillis eius, tanquam terræ, radicibus suis inheretibus tegitur: sub cuius cute membrana est, quæ extrinsecus caluariam cingit *σφαιραειν* nominata: os verò ipsum quod cerebrum ambit *κρανίον* est, Latini his caluaria, & testa dicta.

*Capitis* naturalis figura est ad oblongæ sphaeræ similitudinem structa: alia verò eius natura, quæ *σφαίρα* dicta est, deprauata, & acuminato vertice, vt est author Gal. in libr.

ibro de Ossibus, & in libro Artis patet.

*Capitis* iterum partes, quarum eius portio prior est. Synciput, & *ῥινημα*: posterioꝝ vero occiput: media autem inter Synciput, & occiput pars, vertex nuncupatur.

*Capitis* suturæ tres sunt, ac duæ quidem transuersæ, quarum altera in Syncipite est, nomine Coronalis *ῥινηματις*, quod coronæ in ea capitis parte collocatur: altera in occipitio existit, & .A. similitudine *λαμβουμένης* vocata est. Tertia à medio posterioris per capitis longitudinem ad mediam vsque partem anteriorem extenditur: cuius nomen Sagittalis, & *ῥινηματις* Græcis, atque harum suturarum figura. H. literæ similis apparet.

*Capitis* pars, quæ sub syncipite posita est, pilis vacua, aperta frons est: cuius ad latera sunt tempora, sic dicta, quod in ipsis animalium ætas, & anni dignoscantur, dempto in homine. Spiciant iterum in homine ad tempora ossa duo, quæ vtrinq; ad aures sunt posita constituunt, & petræ formam referunt: ob id verò petrosa, & lapidosa, *λιθουρά* Græcis nominantur. Iterum futuræ duæ sunt ad tempora, quæ *χρονάριαι*, hoc est, temporales, & squamæformes *λεπτοδαγδαί*: quæ vetius sunt commissuræ, quàm futuræ, hinc est quod mendosæ etiam dicuntur.

*Capitis* dolor *κεφαλαλγία*, qui non inueteratus est, non curando an per se accidat, aut alterius affectus symptoma sit: vulgaribus medicis Soda est. Huius autem duæ causæ sunt: nunc enim ex sola intemperie simplici citra humorum complexum, nunc verò ex humorum copia accidit. Vehementissimi autem capitis dolores fiunt, ob caliditatem, & frigiditatem: moderati ob siccitatem. Humiditas sui ipsius respectu nullum planè dolorem inducit, nisi calori, aut frigori, aut copię humorum adiuncta sit. Simili modo humoribus vel in toto capite, vel in aliqua tantum parte redundantibus calidis quidem ac frigidis vehementior, siccis verò moderatior dolor inuadit, si tamen siccitas absque manifesta caliditate fuerit. Humidi autem, quantum in ipsorum ratione est, nullum, prorsus dolorem afferunt, multitudine tantum grauantes, si citra obstructionem sint. Cum obstructione enim moderata, moderatè dolorifici: cum forti, vehementer dolorosi sunt. Atque hæc, quæ capitis dolorem internum incurrunt vexatis.

*Capitis* dolor si cum pondere fuerit, ex humorum abundantia est: si cum pulsu, feruorem cum calore possidet: si tentio inest sine pondere, & pulsu, indigesti status copia est: si verò cum pulsu, à fetuorè membranarum indignatio est: si autem cum pondere, sinus infestantur. Author Galenus lib primo ad Glauconem, cum Acakiz explanatione: & secundo libro Curationis Locorum partic.

*Caruncula*, siue carnis excresecientia, & ipsius incrementum, sub fistula lachrymali in oculo: quæ etiam suffusio explicatur, inter ægritudines solet oculorum adnumerari, sicuti scriptum reliquimos in dict. Fistula lachrymalis.

*Carbunculus*, ex humore crasso, seruidoque gignitur: cui si pituitosa sanies mixta sit, cum pustulis sine tybiceris ac putris, sine his: quæ occupant partem, exurit, exbleterat, ac ei crustam inducit: magis iniquè pro humoris facultate. Nā ubi crassus sanguis vitritur, inindus ubi flaua bilis supra modum torretur, magis periculosum carbunculum creat. Interdum verò vitiosa, pestilentemque putredinem cōtrahit, usque enecare prorinus solet. Quod igitur si vitiosior humor est, eò maiore cum periculo in corpus tepellitur.

*Carbunculi* genus alterum parit sanguis niger, crassus, sæculentus, ac, vt prior, seruidus, cui admista sanies quædam tenuis sit, quæ gignendis in summa cote pustulis, quæ ex igni sunt, similibus, materiam suggerit: serosa enim hæc humiditas, vt quæ tenuis sit, faciliè in cutem, vt diximus, erum pereporeit. Inter quam & subiectam carnem conclusa pustulas parit: sub quibus ruptis crustosum vlcus inuenitur. Author

thor curationis est Galen. libr. ij. ad Glauconem, cum Acakia, & Fuchsius in Opere chyrurgico.

*Carnilago* corpus est terrestre, ex tendinum capitibus, neruo, ligamentis, & osse compositum: iuncturis membrorum, ossiumque extremitati inhaeret. Quæ vix fracturam, rupturamvè patitur, si vulneratur, difficilimè quidem est consolidationis.

*Carus* καρος, medicis popularibus, Subet cum Arabibus, passionis Lethargicæ species est, sensuum, vniuersarumque motionum priuatio, spirandi facultate manente illæsa, consequitur. Differt ab Apoplexia, quòd in hac spiratio vehementer opprimatur, sic vt quis vel magno conatu, vix spirare possit: in illo autem spirandi facultas haudquaquam lædatur, Gal. lib. iiii. de Locis affectis, cap. ij.

*Carobalsamum*, siue balsami fructus, flauum sit, plenum, grande, graue, mordax gustu, & seruen: in ore, modicè opobalsamum redolens. Post Dioscorid. querendus est Galenus libro sexto, simpl. deinde sunt requirendæ dict. Balsamus, Opobalsamus, & Xilobalsamus, vbi multò plura leguntur.

*Capiro* ο κεφαλος, piscis è Mugilum genere aliquibus putatur: Tetardus Parhisiæ lingua, Romanis Italiæ populis Cephalo, dictus Galenus optimum esse docet, qui imprimis in mari versatur. Hæc est Hicēso apud Athenæum libr. ix. Dipnosophist. Scholiastes. Maioris descriptionis Galenus author in lib. de Alimentis: & Gillius in lib. de Piscibus.

*Canabrica* καταβρικὴ, exilit passim propter vias in Biscaya Hispaniæ regione, pedali ac iuncea caule, flosculis calathi figura, oblongis, in quibus exile semen: radice nigra, longa, digitali crassitudine: foliis humi sessilibus, longis, quæ non extollantur à terra. Hanc rura nostra Colubrinam vocant: quam ex Plinio depinxit Ruell. libro ij. cap. cxxxj.

*Capbura* καπουρα, post Diosc. Plinij, Galeni, Aegyptæ seculum, inuenta: Aëtio. Actuatio, Simeoni, Arabibus celebrata est: lachryma Indicæ arboris ferulacæ quidè, sed maximè frequentibus fulgetris, tonitru, terræ motu copiosior proueniens: quæ igni, vel Sole ex rubro albescit, pellucet, & friabilis est: frigida siccâ gradu tertio Arabibus, tamen mistam habet substantiam, vt Syluio placet: sed Simeoni ordo non expressus est.

*Capparis* ἰντῆρις καπάρης, vulgaris notitiæ est, cuius radicis cortex acer, acerbus, amarus: lienes induratos, & hirsiddas mirificè iuuat sumptus, vel cum idoneis remediis admodus, Eadem radix etiam hepatica est, flos, & fructus aceto & sale conditus primis mensis ad excitandam appetentiam, medicorum indulctus, sumitur, licet stomacho noxius, & aluum turbare cum siti Dioscoridi dicatur. Exquisitoris Iectionis est Galen. author libro septimo de Simpl. & libro nono, Compos. phar. mac. Diosc. lib. ij. cap. clxvj.

*Caprificus* ἰππος, cuius caprificatio σὺκασμος, id est, ficus syluestris nonnunquam quod producit maturescens, sed à liis tribuens, vt refert Plinius lib. xv. cap. xix. Ruell. lib. primo, cap. lxxxj.

*Caprifolium*, periclieum est, id est, Mater sylvæ Largo nominata simplex fructu caræ, ex intervalis parua folia habens, ipsum amplectentia, subcandida, hederacæ, inter folia furculi exiit, in quibus bacce hederæ similes: flos sabbæ candidus, aliquantulum rotundus, & quasi in solum procumbens: semen rotundum, & quod difficile euellatur. Nascitur in arvis & sepibus. Cætera collige ex Diosco. libro quarto, capite duodecimo.

*Caprea*, olim vitis ἑλῆξ, & ἀμπελος, quòd adnatis singularibus capreolis tæquàm manum digitis se viciniore planiæ retineret, dicta est.

*Caprimulgus* ἀγροβαλός, avis montana, paulò maior quàm merula, minor verò quàm cuculus, in caprarum stabula adnotans, earum vbera suggit, quæ iniuria vberè extinguitur, & capræ cæcitas oboritur. Hæc ex Plinio libro decimo, capite. xl. author Scholiastes.

*Capnos* καπνος, seu fumana, fruticosa herba est, pratenera, coriadi similis: foliis candidioribus, vndique numerosis flore purpureo: viret toto anno in agris cultis, & macerius. Diosc. lib. iij. cap. xcv. Meminimus etiam in dict. Fumaria.

*Cara* radix καρος, vulgò Pastinaca δ παρυσίως μελίζων, vt ex Athenæo interpretatur Gesnerus: radix est herbæ eiusdem nominis, qua lacti admista & cocta Hircius scribit Cæsar ex exercitu diu inopiam leuasse. Si Carum Dioscoridis est, eius radix cocta, & pastinacæ modo, manditur: cuius semen vtiliter miscetur antidotis, quoniam auri vicem præbet.

*Cardamum* nigrum Largo, id est, nasturtium, καρδαμους Græcis, in hortis passim proveniens. Semine & folio Nasturtium siccum est, caustico, & adurente, vt sinapi, phægnium, hoc est rubificationem in coxendicis, aut capitis dolore excitat. Olibros Ctesionem Alenoyz vocant.

*Cardamine* καρδαμίνω, aliquibus Sisymbrium est, σισυμβριον, quod Officinis Nasturtium aquaticum vocatur: quædammodum id esse Scholiastes Ctesionem aquaticum, ex Diosco. lectione lib. secundo, cap. cxvij. contendit. Aliis præterea nonnullis Hiberis, cui nomen aliud Lepidium, suspicatur: & duplex deprehenditur, vt in dict. Lepidium scriptum reliquimus, ex Ruell. lib. i. cap. ix.

*Cardamomum* maius καρδαμώμω μελίζων, granum paradisi non est, sed quod Arabum nomen larura Carplicum appellatur. Vtrumque tam maius, quod granum paradisi vocant Officinæ, quàm minus, nihil habet commune cum Diosco. & Galen. vero Cardamomo, hodie etiam nobis desiderato. Quod faciliè coniiciendum est ex Galen. libro nono. Composi. pharmac. & libro primo Antidot. Plinio libro duodecimo, capit. decimoretto. Cardamomum minus Arabum sententia, frutex est. Anomomoserè similis, odoratus: quem plerique Amomum ipsum esse coniiciunt, quod modo eodem metiruo semine suo oblongo & anguloso.

*Carduus* varius, ac multiplex est: Αττίλις αττόλιμος ήμερος, qui in hortis colitur: est denique agrestis scolymus: vtrumque Articanthum Gesnerus suspicatur: nomine alio Columellæ rei rusticæ libro decimo Cinaram, dictum. Amborum semen, & radix aduersus venena pollere Nicander author est, vt in Carlina agrestis carduo plerumque probatum est Dioscor. lib. iij. cap. xiiij. Ruellius lib. iij. cap. xiiij. Quod desideratur hic, vide in dict. Cinara.

*Carduus* benedictus κηκός, hortensis est, non agrestis vt Atrattilis, neque vartamus, cuius semen purgatorium est, flos autem pro croco oriétali myropolis effertur, atque in vsu est. An verum sit acanthium, vel chamaeleontis species aliqua, dictu facile non est ob imperfectam horum historiam.

*Cardui* benedicti singularis facultas est aduersus venenosos, & pestilentes affectus, necnon putres intrinsecus humores. Theophrasto, vt recitat Ruel. lib. iij. cap. lv. Atrattilidis species est.

*Careum* καρος, celsissimum in dict. Cara: officinæ sub carui nomine vsurpant, Gesnerus Græcos recentiores, vt quibusdam placet, Carnabum appellari scribit: et quoque nomen multiplex Carum, Carion, Careum, & Caroon. Gal. lib. vij. Simpl. & Diosco. lib. iij. sub nomine Careon multò plura docent.

*Carlina* pro carduo vsurpata Chamaeleon albus non est, sed niger Segusia, & Allobrogum incolis valdè notus: cuius quidem sententiæ neque Brasianolus est, neque I. Agricola: verum genus tertium, suspicantur carduorum: quod sub nomine Carnabum retulimus.

*Carotides* καρπιδες, venæ circa colli iugulum sunt, quæ σφαγιτιδες Aristoteli, id est, iugulares dicuntur. Carotides autem appellatæ, quod his vehementius compressis, Caros morbus gignatur.

*Carpesium* καρπιδιον, nonnullorum sententia Cubearum fructus non est: quorundam verò Diosc. & Gal. oximyrcines, seu myrti sylvestris, fructus: cum nullibi Carpesiorum meminerit vterque, vt Cubebas cum prædictis collatas patebit. Hæ

enim sunt fructus tenues pipē æmulares, sed min⁹ acres & subamari. Galeni verò Carpesia sunt καρπῆς, id est, festucaz tenues ἀκριστοί, id est, surculis cinnamomi similes odore vocati φῶς, & facultate etiam phu similia. Plura docet Syluius libro primo de Medic. simpl. natura.

*Caryophyllum* κάρυφύλλον, quasi nucifolium, quamvis hanc non seruet naturam, quæ nomine prætenditur: fructus est arboris Aërio, Aëgynetz autem Indicz arboris euiusdam flos, festucaceus, niger, longus, acer, subamarus, odoratus: à figura clauus passim nominatur.

*Caryota*, & caryotides φάρις, palmulæ genus in ludæa præcipuè circa Hiericonem nascens ita appellatum, à capitis grauedine, quam edentibus gignit: si Plinio credimus lib. xiii. cap. iiii. Scriptoris aliis palmulæ gratæ sunt cibis, quarum succus vberimus, & vini loco Orientalibus grauis. Palmularum genera sunt etia à Gesnero descriptione distincta. Quære dict. Palmulæ.

*Carduelis* siue Acanthis ἡ τράυις, auicula notitiæ vulgaris, ex his est quæ carduorum grana appetunt: vnde factum arbitratur, vt omnes eas aues Cardonetos sermone Gallico carduos appetentes, appellemus, & si sunt generis promiscui, vt est auctor Aristoteles lib. de Historia animalium viij. atque hanc rem nos attingimus in dict. Acanthis.

*Casia*, xilocinnami cortex est, qui rarus ad nos deferretur: pigritiæ in fasciculis deprehensus.

*Casia* genere proxima cinnamomo est, quin ipsa nonnunquam ex æmulatione cinnamomum euadit, vt totum quidem veluti exacta arbor, Casia videatur: circuli autem in ea quidam cinnamomi, ramis casia proximi reperiuntur, vt optima casia in cinnamomum sæpius degeneret. Ob id etiam authores pro cinnamomo frequentius casia vtuntur. Cætera retulimus in dict. Cinnamomum.

*Cassia*, cognomento fistularis, fructus est ad nos ex India vectus, oblongus, teres, fistulosus, concretum intus humorem continens, non vna coalescens serie, sed ex interuallis lignosis membranis interuenientibus septum, seminalibus granis. Hæc sufficiens modo distributa quibusuis, incandescens, tortidamque bilem citra molestiam expurgat. Quia indiciæ veteribus Græcis, tota descriptio petenda est ex Actuario lib. v. compositionis medicamen. aut ex Mesue, Syluij curâ restituta.

*Cassita* auicula, caudam tremulam vulgus vocat, Aëtio cap. de calculorum curatione, Troglydites auis hæc nominatur, quæ regulo paulò maior, & nigrior est: caudamque semper subrectam & albo colore tetro interpunctâ habet: magis item garula, quàm regulus est, & sanè iuxta summum alq̃ lineamentum cinerei ampli⁹ coloris breues item volatus facit: naturalem autem vim omnino admiratione dignam habet. Cætera leges apud eundem authorem.

*Cassitas* κάσιντας, Latinis Cassuta, quam officinæ podagram Lini, & Cuscutam appellant: quæ si quando Thymo frutici hæret, epithymū est. Dioscoridi hæc cassuta deprehenditur, reclamantibus Manardo, Othone, esse Androsacem affirnantibus: verum qua tandem ratione nixi ambo, qui à Diosc. descriptione tam latè discedant, viderit peritus lector: sed non pauca nos in dict. Epithymum retulimus.

*Cassita* præterea auis est, nomine Ciris: cuius descriptionē Vergilius facit ad Mesalam. Extat & de ea petelegans apologus apud Geliū lib. Noct. Aëticarum ij. quam Cassitā appellat. Aliquid in dict. Alauda de ea retuli, ne hic prolixus lectori videar.

*Caryophyllum* καρποφύλλον, Lantii genus non nisi in montibus nascentis, foliis mollioribus: ad coronas, non ad medicinam, conficiendas accommodatissimū perhibetur: vt Plin. est author lib. x. cap. xxx Est & Caryoppos authore eodē lib. xij. cap. xxvij. cinnamomi quoddā genus, quod in Syriæ regione gignitur.

*Carythæ* Plinio lib. xxvj. cap. viij. ex Tithimali genere esse representatur, & deprehenditur foliis myrti acutis, sed pinguioribus, tota planta in re medica perniciofa est.

*Caryon* καρυον, ad omne genus nucis nomen hoc commune est: quanquam peculiariter hanc sibi nomenclaturam luglandes, id est, nuces nobis communes, vendicant. Nam quid sit luglans, post Plini. lib. xv. capit. xxij. & lib. xxij. cap. iij. Dioscoridem lib. j. cap. cxlj. in dict. Nux repofuimus.

*Carica* καρυκη edulij genus ex Cælio Rhodigino lib. xxvij. cap. xxij. refertur, ex variis cum sanguine condimentis compositum. Est denique Carica per I. Latinū scripta, quæ inter ficus pingues inseritur, & in re medica vsui est: quod adnotatum est in dict. Ficus.

*Carphor* σκηνογρæcum est, nomine alio Buceras à bouis cornuum similitudine: aliquibus item A Egoceras, quod siliquas caprarum cornuum modo rependat. Telis quoque Græcis signatur. Vires & vsus collige ex Diosc. lib. ij. cap. xcij. deinde Plinio lib. xxij. cap. xix. Sed & repetenda est dict. Fœnugræ.

*Castanea* Sardiana διος βαλαρος, quasi lous glans efferas, aut Lopimum appellatur aliquibus. Genus duplex, vnum quod provenit in arboribus sui nominis: alterū, in aquis stagnantibus herbacea planta innixum, triangulari armatum aculeo: Tribulus aquaticus Dioscoridis est, lib. iij. cap. xij. Ruell. libr. primo, cap. sexagesimo primo. Quære dict. Tribulus.

*Cataracta* ὑπόχυσις, Saffusio est teste Celso lib. vj. cap. vj. & Galen. lib. de Oculis, Theorem. vj. cap. xi.

*Cataplasma*, est quod ex plantis viridibus, vel interdum aridis, confusis, vel iisdē ad mollicie vsq; in aqua decoctis, adiecto oleo pro componendis arbitrio, conficitur. Componēdi formulæ apud Mesuem, Myrepsum, Fuchsum, & Syluium, variè habentur.

*Catapodium* seu pilula καρπάδιον, medicamentum à parvæ pilæ similitudine compactum, quod deglutiendo sumitur. Et ne ventriculus adscititiis grauetur humoribus, vernaculis interdum alioqui satis oneratis, à medicis priscis quidem tale excogitatum fuit: & adusque ætatem nostram ventum est. Hoc sanè secundum ægrotantium ætatem, vires, morbum, & tempus variatur, quemadmodum & aliz medicamentorum texture. Nam finitore Scrib. Largo, Catapodium id est, medicamentum quod non diluitur, sed ita ut est, deuoratur, & pro varia morbi ratione diuersum componitur. Sic namque forma simili vsus est L. Apuleius.

*Cataputia*, ea species Tithymali est, quæ à Diosc. Characias vocatur: cuius in vsu sunt & femina, & radices, & ramuli, ut retulit Io. Agricola. Est similiter & altera Cataputia, Latinis Ricinus dicta, Græcis κροτῶν, & κρου, & Arabibus Kenna, vnde oleum ex ipsius semine appellatum.

*Cartamus* κήκος, & Atrattilis horrensis, officinis notitiæ vulgaris à quo floris capillamenta ex ipsius pappo leguntur, quibus pro croco generoso culinarij in cibariis, & ferculis colorandis, sicut supposititij Myropeij in aromatibus, vtuntur. Est & agreste genus alterum, quo olim mulierculæ pro fuso vsurpabant: quod à superiore differens, nisi solùm agricultura, videtur. Plura scripsimus in dict. Atrattilis.

*Catanance* καρτανγκη duplex deprehenditur Gesnero: Scholiales patam lupinam Catanancem interpretatur: & quod cogat ad amorē sortilegio, nomen retinuit.

*Cathartica*, hoc est, purgatoria medicamenta, vel communiter quæ excrementa quouis modo vacuant, vel per excellentiam, quæ vomitu, aut ventris deiectione humorem sibi familiarem trahunt, non solo calore, sed qualitarum quæ in substantiis sunt, proprietate, seu totius substantiæ similitudine, & simili elementorum missione quatuorquæ res experientia sola cognoscitur. Ex Galeno Syluius.

*Catharticum*, id est, superficiem solam detrahens, & hyperfarcosum absumens, vnde & farchophagon quoque dicitur: est calidum sicum minus, quàm septicum, ut flos aliz petræ, æris squama, æs vsus non totum. Gal. lib. v. Simpl.

*Catheter*, concauum instrumentum, oblongum, teres, ex atgenti, auri, ærisvè ma-



teria conflatam, ad reddendam per colem ex vesica urinam maximè necessariū, quod Sohda Chyrgurgis appellatur; Largo Methrenchites, sicut in eadem dictione adnotauimus.

*Catoblepas* serpens est, cuius ad sesquicubitum longitudo ab incolis loci spectatur: eius caput quod per graue est, humi deiectum semper habet, ceteris quoque membris iners: in ortu, visu, sibilo vt Basiliscus, necat: siquidem ab eo percussum animal dissolutum moritur. Nasctur in Aethiopia prope fontem Nitrim scaturiginem, originemque Nili fluminis. Quare Aelianum de Historia animalium lib. vii. capit. j. l'inius li. viij. cap. xxj.

*Castorium*, Castoris siue Fibri ancipitis vitæ animantis, vterque testiculus est: tenuium valde partium. Deque ipsis testibus oleum locis frigidis appositum efficax, componi vbiq; solet. Neque inepti sunt Castores, qui ad Isaram, & Rhodanum flumina capiuntur, spectaculo mirabili animantes, cauda piscosa squamis obducta, pilis supernè canino, pedibus anterioribus Simæ, posterioribus Anseris, sed vngaris, auribus vulpis, dente validissimo, seta oris cornea, architectura in fossa sua mirabili, animal aliud omne vincens.

*Casus*, causa est per accidens eorum quæ raro contingunt, & alicuius gratia: fortuna verò, causa per accidens agentium secundum propositum eorum quæ raro eueniunt, & alicuius gratia, vt ex sententia, ratione, voluntate, & contra.

*Causa*, est ad quam aliquid sequitur: ad eam verò aliquid sequi ex ea, eius gratia aliquid fieri: quod autem ad eam sequitur, effectus nominatur.

*Causa efficiens* est, à qua aliquid fit, vt conseruans, produciens, & corrumpens. Finalis, gratia cuius aliquid est.

*Causa propinqua*, est quæ particulari nomine designatur: aut inter quam & effectum non multe interiacent causæ, remota verò, quæ nomine communi designatur: aut inter quam & effectum multe interiacent causæ.

*Causa per se*, est quæ cum ad aliquid suapte natura sit, causalitatis nomine pariter expressa est: per accidens autem eum ad effectum non ordinetur: aut causalitatis nomine non sit expressa.

*Causa in actu*, est quæ simul cum effectu existit: in potentia autem ea dicatur, quæ non simul cum effectu existat.

*Causa primitiua* à materia, est ex qua cum aliquo fit aliquid. Rerum verò naturalium materia, est ex qua cum forma fit compositum. Secundò, est in qua aliquid fit, vt in subiecto.

*Causa formalis*, est per quam res habet esse: nam dat esse rei, & eam conseruat in esse ipsa namque præsentè, res est: & ipsa fugiente, perit. Rerum naturalium forma ea est, per quam res naturales existunt.

*Causa morbi*, est affectus præter naturam morbum præcedens, eumque excitans. Per hunc scilicet affectum suapte ratione, per se, & primo non læditur actio, sed ex accidenti, vel secundo, interueniente nimirum morbo: vt auctor est Gal. in lib. de medic. Definitionibus.

*Causa morbifica duplex* est, vna quidem externa, quod extrinsecus adueniat, nec intra corpus animalis consistat, veluti frigus, aut Scorpius pungens: & hæc primitiua causa morbi neotericis medicis appellatur. Altera interna, quæ in ipso animalis corpore consistit, vt sunt humores præter naturam affecti: hanc Græci *παθολογικὴν*, nos antecedentem: & superiorem *παροξυστικὴν*, nos verò primitiuam causam dicimus. Harum siquidem rerum examen copiosius habetur apud Galeum in lib. de Morborum causis: & primo, & secundo Methodi medendi lib. Item Fuchsius comp. medicam. cap. xxij.

*Causæ conseruatrices* sunt, quæ constitutionem corporis conseruare possunt, modò commodè iis vtamur: vt Gal. scribit Attis medicæ cap. lxxvij. Nostri seculi medici res non naturales vocant, quod nimirum corpus nostrum necessariò arterent, & nisi oportune, ac salubre adhibeantur, sanitatē etiā destruant. Ab his itaque sex res non

non naturales numerantur, prima, aer, quod eo, quandiu vita fungimur, altera mundi secunda, cibus, & potus, seu ea quæ assumuntur: tertia motus & quies, tum totius corporis, tum singularium partium: quarta, somnus, & vigilia: quinta, excretio & retentio, seu abundantia, & in initio: vltima, animi perturbationes. Quæ diligenter exprimuntur à Fuchio in lib. comp. medic. cap. xv.

*Cerebrum*, est quod nulla alia ratione factum à natura existit, nisi ut nervorum principium, & vniuersorum sensus instrumentorum, motusque voluntarij dux esset. Eius structura in anteriori nempe est, & posterius diuisa: humidum à natura, & frigidum, vt docet Galen. Vfus partium lib. viij. Vel sic.

*Cerebrum* diuiditur in anterior, & posterius: anterior mole superat posteriorem, molliusque est, in dextrum & sinistrum à dura membrana secatur: posterius alteri adiacet, vnde à paruitate cerebellum dictum.

*Cerebri* ventriculi duo anteriores animalem spiritum prius elaboratum in cerebellum transferunt, memorie efficiendæ gratia: quapropter necessarium fuit meatum fieri ex illis in posterius cerebrum: estque cerebri ventriculus totius in quo animam, neque in corde, residere Galenus falsò putauit.

*Cerebri* meatui huic particula in modum fornacis facta, extrinsecus gibba, intrinsecus caua, vt liberum habeat motus ipsius spacium, incumbit: quæ fornix, & camera medicis Latinis, Græcis verò *χρηματις*, & *ψαλιδουίδης*, accepit nomen.

*Cerebri* meatui corpus quod iuxta ortum adiacet, quod figura pineam nucem referat, *κοιλίον* vocatur. Ex utraque medijs illius meatus rotunda corpora subiacent, à Græcis *γλουρία* nominatur, hoc est, cerebri nates, vel testiculis haud dissimiles, *ιδουίαι*, Græci vocant.

*Cerebri* meatui vermiforme, id est, particula quædam adnata superiacet, quæ circumscriptionem obtrinet, figura vermi insignis nascenti similem. Corpus hoc Anatomici, quia totum meatum contegit, excrescentiam vermicularem, siue *σκαλωτικοῖς* *επιφυσὶν*, nuncupant.

*Cerebri* ex medio vermicillo canales duo ad palatum recrementa deriuantes procedunt, quos concauitas quædam excipit: quæ à figura labrui, vel scyphus, vel peluis, à Græcis *πυλινος* ab vsu autem infundibulum, & *χων* dicitur, quod supra amplius sit, infra autem in angustum desinat.

*Cephalæa* *κεφαλαία*, est morbus diuturnus, & ægrè cedens capitis dolor: qui ex parua occasione vehementes exacerbationes, adeo vt neque strepitus, neque vocem vehementem, neque splendidum lumen, neque vini potum, neque caput replētia odoramenta, neque motum tolerare possint: sed in quiete & tenebris decumbere cupiāt, vt quibus veluti à malleolo feriri videantur. Gal. requirendus est Locorum affectorū lib. iij. cap. ix.

*Ceratium*, quod à cera nomen habet, est quod ex speciebus paulò crassioribus caryophili, galangæ, cinna mi, maceris, atque ipsius myrsiticæ nucis, Zaduræ, iunci odorati, calami, aromatici, xilobaloes, xilobalsami, galliæ moscatæ, amomi, cardamomi, spicæ nardi, balaustij, rosarum, violarum, chamæz mali, stachadis, coronæ regie, mastiches, myrrhæ, olibani, ladani, stacteidos, aloes, santholorum: & oleis ex mastiche, mentha, absinthio, rosacco, chamæmelino, & cum cera nuper excreta, aut terebintina resina formatur. Variatur tamen si peritorum artificum industria, & vt postular ægrotantis ipsa infirmitas. Similium compositionum conficiendarum præcipui auctores sunt Celsus, Scrib. Largus, & Gale. lib. ij. *ἄν. γόν.*

*Cervix*, spondilium seu vertebrarum principium est, & ab his spinæ dorsû capitiq; adnectitur: atque ipsi denique ceruici, à quo collum, vertebræ septem numantur. Quod superest, reperies in dist. Vertebræ.

*Ceruissa*, Largi interpretatione *ψύμμιον* Græcis vocatur: fistitia res est, atque inter venena Brassa mirantur. Decipiuntur qui cerussam æruginem plumbi

faciunt, quoniam ex argentea ceruina caret, tamen ex plumbo & aceto fieri certum quidem est: atque ex ea cocta, ut cruda, unguentum paratur. A Dioscoride, libro quinto, & Plinio lib. xxxiii. cap. xvij. & Vitruvio, lib. Arch. vii. Gal. lib. ix. Simpl. & primo compos. pharmac. modus conficiendi docetur. Post omnes autem Serapio ad unguem conficiendi formam ostendit cap. cclxxvij. & Geberus suae artis lib. j.

*Cedrus*, ἡ ξέδρος, & Cedrula, utraque nostratibus perquam rara arbor: quae vulne rata, & de se praegnans etiam liquorem illachrimat, qui cedrinus omnibus appellatur, impense calidus & siccus, ut Gal. placet lib. j. compos. pharmac. κατὰ γιν. Diosco. lib. j. cap. lxxix.

*Cestrum*, & Arabum corrupta voce, Tethraith, Betonica est, nonnullis verò herbis, cui denominatio est Iudaica: quae potius inter Syderiides videtur adnumeranda. Plura in dict. Betonica expressimus.

*Centaurium* maius κενταύριον τὸ μέγα, Rha. ponticum nostrum medicis esse suspicatur. A Chyrone Centauro Herculis sagitta vulnerato inuentum, & nominatum Centaurium. Diosc. tamē à Rhapontico Centaurium mag. distinguit cap. propriis, quod diuersi sunt generis, & facultatis, quod Centaurio mag. folia iuglandis insunt, oblonga, viridi brasearum colore, cetrata in ambitu caulem Rumicis, multis ab radice adnatis, habet: radix crassa, grauis, solida, tripedalis, subacris & rubescens. Rhapontici autem radix nigra, centaurio mag. similis, sed minor, & sine odore rufior: quod Rhaponticarum hodie nobis commune, Diosc. descriptione, videtur, cap. ij. libri iij. Recurrendum est ad dict. Rhaponticum.

*Centaurium* minus κενταύριον τὸ μικρόν, & κατὰ γιν, sel terra, & febrifuga vulgaribus nominatur: Limnesion, quoniam rigua a met, etiam dicta, insigni amaritudine praedita, sed radice inutili. Descriptionē, & vires ex Diosc. & Gal. peres.

*Centaurium* tertium est, palmi altitudine, interdū plus aliquāto, vnicū caule, digiti parui crassitudine, foliis per interualla Radiculæ, id est, Struthij, vulgo Fullonix, aequalibus, cū radice sine appendicibus, medioeriter longa, crassaque. Flos est in caulis vertice modò purpureus, modò luteus, per diuisuras striatus, apparet praesertim autumno. Haec sua amaritudine Cetaurium alterū vincit, cetauriumque aliud videtur. Diosc. & Gal. de ea nihil, quod cōiciā, scripserūt: sed Plin. solus sub nomine τριόρυς, ut refert Gesnerus,

*Centrum*, est punctus ille, à quo omnes lineae rectae, ad ambitum circuli eiectioni inuicem sunt aequales: est praeterea cuiuscunque rei medium. Euclides.

*Centroneulum* γράφλλον, cotonaria herba est, foliis mollibus, minutis: quibus rura pro tomento vtuntur. Bibuntur efficaciter in vino austero ad dysenteriam: sed tota prodest herba torminosis, coeliacis incorta data ex aqua Largi testimonio.

*Cenebris* κρυγρίς, ex genere Accipitum avis est, à doctis aliquibus. Querecerella populari nomine diuulgata. Legēdus est Plin. li. xxvij. c. vj. Est denique serpens Cechris nomine, qui insparfus maculis seminis milij similitudine suppositus denominationē: Lucan?

*Quam semper resolo lapsum limite Cenebris*

*Pluribus ille notis variatam tingitur aluum,*

*Quam paruis tinctus maculis Thebani Ophyter.*

Plinius lib. xx. cap. xxiii.

*Ceratium*, siue Ceratonia, Galeno κεράτιον, & κερανία, arbor siliqua, quae quoque xiloceratia, vulgò charrhubis. Latinis siliquae, quae edules sunt casiae fistularis saporis, nigrae, dulces, fabae in siliquis magnitudine in quibus semen minus, quàm casiae. Haec Syluius.

*Cerinthus*, vel Cerinthe κήρυθος, lilij genus tertium fertur, quod plebeia voce pauceta effertur. Est folio incuruo, candido, capite concauo mellis succum habente, cubitalis altitudine, cuius florum a nidissimae sunt apes: ut scribit Vergilius lib. ij. Geor. Plura habet Ruell. lib. ij. cap. cxxij.

*Cestiana* mala apud Galenum imaginantur Arantia poma, Vergilio mala aurea, priscis etiam mantiana. Columella haec videtur appellasse Sessiana, ut est interpretes L. Agri

I. Agricola. In dict. Malum medicum ex terra expressimus.

*Ceraſter*, hoc eſt, ſerens cornu ſerpens: cuius genera duo prædicantur, quorum alterum quaternum geminorum cornuum appareant: alterum genus duum tantum cornuum eſt. Horum ad cubitos duos longitudo metitur, ventre ſquamato, capire vicipiti, dētibz prælongis, æqualibzque. Vter horum ſi qualecūque animal veneno tinxerit, intolerabili dolore, & corpore toto graueſcente, vexatur: vertigine cum oris, laborumque inflammatione, corripitur, & captus mente moritur. Hæc Strabo lib. ij. Geograph.

*Ceraſia* *κεραſια*, vñico tantum folio herba eſt, quæ plebeis, ſive etiam ruſticis Lanæa Chriſti nomen adepta eſt. Hæc in pediculi folio rigillū teretem modicè ſtriatum, colore herbaceū, in quo ſemen pro ducit. Fuchſius *οφιολισσος* nominauit, à ſerpētis linguæ ſimilitudine: neque veterum Herbariorum aliquis de ea ſcripſit.

*Cepa*, & cepe *κεραμμυον*, bulbus vulgaſiſſimus: olim vñedo dicebatur, vñde adhuc ei nomen ougnion: Sed cepa aſcalonia *κεραμυνα ἀσκαλωνια*, nō vulgaris notitiæ eſt, vñ neque cepæ *κεραſια*, quæ eſcalota minuta, vt ſuperior maior, opinatur. Occurrit & cepæ *κεραſια*, quæ aquatica perhibent. Dioſc. lib. iij. cap. cxliij.

*Cera* *κερως* *φαικτος*, id eſt, cera ſtaſte, & ſtillatitia, vt eſt Gal. author initio ij. lib. cōp. pharma. ſecundum genera. Eſt & cera propolis calidi frigidi, humidi ſicci quodāmodo media, craſſæ eſſentiz, emplaſtica: habet paulūm quiddā digerentis, calidæque facultatis, quæ melli plurimū inerat. Materia ob id eſt aliorū medicamētorum caſſificiētis, & refrigerārium. Dioſc. lib. iij. cap. lxxv. Sylu. lib. priore de Simp. med. natura.

*Ceraſus*, cuius ceraſum fructus eſt, variū quidem genus multiplēxq. habetur: nam ſua natura genera tria diuerſa reſerūtur, vñū quod ſubacidum guſtatu eſt placidum & gratum: alterū dulce, colore ſanguineum, & hominū arte candidum, ſed in ſalubre tertium quod ſurculis trāſfertur ſuper quibuſlibet arboribus, vñde illis artificio non natura, nomē. Ceraſo reſudās gūmi tuſſi vetuſtæ medetur, arterias exaſperatas lenit, ſuo lentore morſus expers, colorem commendat, viſum acuit, calculoſis ex vino potum prodeſt: cuius facultas eſſentiz tenuitatem in eſſe ſignificat.

*Cere* *τὰ κέρτα*, inter balenæ apud Ariſtotelem ſunt omnes piſces maximj vinipari: quāquam Aegynera Thūnum ouipatū inter cere numerat. Vinipari piſces quidem ſunt, qui beluarum ritu pullos pariunt: atque ouipari oua, non pullos.

*Cauliculus*, quam alij ſy lueſtrem daucum faciunt, cauliculo eſt dodrātali: aut maiore, ſubhit ſuto: cādida in cacumine vñbella, ſua uiter olēte, vñbi urget ſemē: vñnæ diſſicilari crudū coſtūvè efficaciter eſtur. Dioſc. lib. ij. cap. cxxxij. Ruel. lib. ij. cap. lxxij.

*Cancamon*, vt cum Ruel. ſentit Geſnerus Galeno Calalia eſt, & Leontice. Quare Ruel. libro iij. cap. cxxvij. & diſtinctionem Calalia.

*Cibeta*, viridis ex ſudore animalis ſeli haud diſſimilis, humor per quā odoratiſſimus eſt: ei quidem animali nomen Gaſellæ eſt, de quo Serapio Arabs cap. clxxxv. me minit: ei quoque cornua tribuit, & prælongos dentes, apri ritu ſimiles: quod an veriſſimile ſit ex animalculo coniectandum eſt: Nonnulla de hoc animali ſcribit Io. Agricola in libro de Recentium ſimp. med.

*Cibus* *κίτριον*, *καλός*, in vñuerſum iſ eſt, qui leuiſ quiq. partium tenuiū dicitur, & qui ſuecum bonum procreat: qui alius eſt, aut habetur, malus cenſetur. Varietas autem decernēda eſt ex lib. Gal. de Cibis boni & mali ſucci: & de Alimentis.

*Cibi* conſectio, dicitur præparatio ea, & maſticatio quæ in ore fit, ne ventriculo niſium negotium exhibeatur à fruſtis in eum demiſſis. Paulò poſt ſequitur diſt. Concoctio, ad quam recurre.

*Cibi* qualitas, quoniaſ varia quidem eſt, quæ tam in ſanis, quàm in ægris à circumſtantiis accuratè eſt expendenda. In ſanis enim ſimili, non contraria qualitate præditi cibi aſſumendi ſunt, quòd natura ſeu temperamentum eorum, qui rectè valēt ſit conſeruandum per ſimilia, & minime per contraria demoliendum. Contrā, in morbis cibi potiùs aduerſa qualitate præditi exhibendi: verbi cauſa, in calido, frigidi in

frigido, calidi in humido, sicci in secco, humidi: Fuchsius author est post Gale. in lib. comp. Medic. simp. cap. xvij.

*Cibi mensura est, ubi præter naturam non ingestus est: verum præter naturam hic morbum facit.* Itaque Hippocratis sententia hæc est, *ἀκορπὸς ὕμνος, ἀκορπὸς ποπὸς ἀθὺρὸν πόνος*, hoc est, sanitatis studiū est, non satiari cibis, & impigrum esse ad labores: sic enim fiet ut nunquam aut raro saltem, morbum periculo sum incidas. Hippoc. lib. ij. Aphorif. & lib. vj. Epidimiarum, & lib. ij. Rationis victus in morbis acutis inter prætibus Galeno, & Fuchsio.

*Ciborum rectus ordo est, ut ne præpostero ordine eorum fiat ingestio, id quod fiet, si concoctus facilius, iis quæ difficulter concoquuntur, præmittatur, & si humida, siccis & aridis, ac lubricantia astringentibus antecedant.* Ordo itaque præposterus erit, si quis cotonea, aut panica mala, mespilavè imprimis ingestierit, postremum autem ollera ex olo garovè sumpserit. Sine itaque cibi consueti non negligendi, neque ipsorum delectus, neque assumendorum tempus; & qui præterea temporibus anni congruentes, & ætatibus quarum omnium in cibis partium vsum Hippoc. Celsus, Gal. Oribasius, Aegyneta, Aëtius, copiosissimè ubique in variis librorum suorum locis, descripserunt. Nos verò in Amethodicum sic allusimus.

*Acria qui primis condonas ferula mensis*

*Aegrotis erras, mensa secunda rogas.*

*Quæ referenda forent, claudis, claudenda relaxas.*

*Ora Jocum siquidem ledis, utrumque miser.*

*Invalidum digesta decent: sed in scula primum*

*Orbi acerbis, valido cruda, & acerbis nocent.*

*Ciborium, & cibotium, vaseculum est Aegyptiæ fabæ in quo fructus includitur, de scribente Dioscor. lib. ij. cap. Fabæ Aegyptiæ. Græcis κικώριον, & κικώριον, Quercæda est dicta Fabæ.*

*Cicer, & κικώριον, leguminis genuse est, & triplicitate coloris triplex quodque deprehenditur: quod omne tamen cornutum seu arierinum vocetur. Vnum quidem est, quod subflavum, nec prorsus album: alterum subrufum: tertium sed nigricans toto colore discernitur. Huius leguminis decoctum medicamento sum est: ob id quæ tenum affectibus, inter cæteros præcipuè affectos commendatur.*

*Cicerbita, vel Sonchus Γύγες, & Condrilla omnis, & Hierachium utrumque Seleos species Dioscoridi, Gal. etiam credita. Sereos ac Cichorii nōmine etiam ab his, & aliis dignata, ut forma & temperatura sunt affines, sic viribus minimum discrepant: licet Chondrillam lactucæ, non Seri lib. ij. Alimentorum iungat Galen. verum ea tanquam congeneria iungit Diosc. Pto Intybo autem vulgus Endiviam re & nōmine corruptit, ut pro Seri Schariolam, quasi Seriolam dicere tentaverit.*

*Cinclus δ κίχινος, avis quæ quibusdam Batternara putatur, ex his est, quibus cauda in motu continuo deprehenditur, & ob id aliquibus σικίπρις vocari Suidas scribit: quod verbum exprimere volentes Latini quidam medici, Moracillam non ineptè transtulerunt. Avis est infirma, & corpore minùs robusta, quæ per se nidum construere nequit: quæ pauperes, rusticorum proverbio, Cincli vocantur. Hæc ex Suida Scholiasies.*

*Cinara: carduus satius est, cuius summitate, & veluti fructu in eduliis utimur; quæ Græci σκελῶν, Latini Strobilum vocant, quod sit ipse Echinus, vel capitulus nucis pinæ haud dissimilis: at quæ hunc quidem Hippocrates Coccalum nominat: cui dictioni articulus ab Arabum subinde quibusdam additus & alcoocalus dictus est: mox verò corrupto articulo, articoccalus. Tota planta Columellæ libro xj. capite iij. Cinara appellata est.*

*Cimolia terra, quod à Cimolo insula è Cicladibus vna fodiatur, nomen accepit: quæ ad nos aliquoties, neque nunc, afferbatur. Eius loco utimur hoc seculo ferri & molis recrementis, in subditam aquam congestis.*

*Cicer* arietinum, colúbinum, venereum, vel ex Colúpunicum, & sylvestre cicer, necnon Cicera, atq; cicercula: a púd authores Græcos & Latinos generis diversitate, & facultate scribuntur. Noli reponere cicer hoc in genere Phacarū, id est populari vocabulo Gessarū, vel cicerculā, vt Marr. Grego. interpretatus est in lib. de Alimēt. Gal.

*Cichorium*, Intubum, Seris, quāquam nominibus diuersa, tamen Romana lingua Cichoriū, Intubum olus dicitur. Gal. ij. lib. cōp. pharmac. Id verò, & reliquæ species, foliorū magnitudine, & cultu distinctæ, facultatibus parū discrepāt, nisi quòd agrestia satius sicciora sunt, & amariora. Post Diosc. Gal. est legendus lib. ij. Simpl. deinde repute dictionem Cicerbita paulò suprā.

*Ciconia*, quæ & Ibis, ὁ πτελαργος, frequens & nota avis in Segusiorū, & Heluetiorum plagis, & stagnantibus aquis: quæ parentes ætate exacta, magna cura alit, vnde pelargica lex, qua parētes alere liberi iubentur. Anis huius caro magna appetētia heroum mensis apponitur, cōcoctu tamen difficilis habetur, stomacho infirmæ præsertim valetudinis quia maioris excrementi, quàm boni succi: cuius quidem loco ipsius oua aptiora sunt. Post Aristot. & Aristophanem, legendus est Aelianus, de vi & natura animalium libro xv. capite iij.

*Circuli* oculorum sunt septem, primus & extremus adnatæ tunicæ est, alter adnatæ tunicæ, tertius duræ, & hi tres duri sunt: quartus est choroidis, quintus vuez, sextus arachnoides, septim⁹ rectiformis tunicæ est: atq; hi postremi quatuor molles existūt.

*Cicuta* κύων, herba coxurnicibus valdè amata, atque ea etiam purgātur, hominibus autem letalis: itaque refrigerat extremè quartum excedens ordinem. Est in super vna eius species pumilla, odorata, quæ oliuo frixa & parti affectæ mota, dolorum causas dissipat. Galenus post Dioscoridem lib. vij. Simplic. requirendus est.

*Cinamomum* κινάμωμον, & cinamoides κινάμωδον, quod pseudo-cinamomū, vel adulterinum coniicitur. Similis arbor lauro cinamomum est, & eius ramorum, non trūci, tertio quoque anno delibatorum cortex vellitur, vt refert Ludovicus Patritius Romanus, rei huiusce testis oculatissimus: & Gal. post Diosc. Simpl. medic. libro vij. Syluius tamen differentias describit lib. i. de Simpl. med. natura. Tetigimusquæ vi sunt necessaria in dict. Cassia lignea.

*Circæa* κίρκια, vitis agrestis, & nigra quibusdam suspicata est: quæ tametsi seculo nostro ignoratur, aut desyderatur. Ex authorum monumentis cætēra ad veritatem sunt petenda.

*Circium* κίρκιον, Dioscoridi, & Galeno Circæa videtur: sed vulgaris Buglossa est, cuius species multiplices imaginātur, sicuti scriptum reliquimus in dictione Buglossum, & Borrago.

*Cistus* κίστος, reperitur in Gallia Narbonensi, vbi non assurgit supra hominis altitudinem: huius plantæ hærēt stolones, ex quibus constrictis, & expressis fit Hypocistis, quæ illic sua lingua Guarena vocatur. Est & cistus ferens Ladanum λάδον, Græcis dictum. Vide Ladanum, & Hypocistis dict.

*Citrum*, & citreum, seu medicum malum, è cuius genere sunt etiam mala aurea, quæ hodie Arantia plebeio sermone dicuntur: Græci κίτρος & κίτρον, vocabulo tanquam vñtato vocant. Est & Citrus, sive Trogetes, Græcis θύια, à fructu superiore diuersum succo. Inter citrea mala Arantium numeratur Hermolao, cortice, succo, semine illis proximū: vt & quod Limonem vulgus Gallicū appellat: succo frigidiore, quàm Citrū. & quod ex insitione pomū citreum peculiariter dicimus Pōcile. Citrus, seu Citreolus, species cucumeris satiuū videtur, citrum forma, & colore æmulante.

*Circulus* est figura plana, vna quidem circunducta linea contenta, in cuius medio punctus est, à quo omnes rectæ linæ, ad circunductam lineam eiectæ, sibi inuicem sunt æquales. Dimidiūs circulus, est figura plana, diametro circuli, & medietate perisphærij contenta.

*Circumferentia* est linea, quæ circulum continet, ad quam linæ rectæ, ac sibi inuicem æquales, educuntur. Hæc autem & ambitus, & circuitus, curuaturæque & nonnunquam

nunquam circulus.

*Citharus*, à medicis quibusdam, etiam doctis, Rosseta piscis interpretatur: quòd autem is piscis Rhombo sit similis, ad carnem, non ad formam referendum censet Scholiastes: Optimi succi caro edètibz deprèhenditur, ob id inter medicinales cibos habetur.

*Citrage* *μυλίσσος* Græcis, id est, apum folium: Latini Mellissam exprimunt: cuius suo loco dict. petes.

*Chalka* *χάληξ* purpura est, siue herba, qua purpura tingitur, vt esset ex Phocio- ne grammatico Ruellius libro de Natura Stirpium iij. cap. lxix.

*Chalcanthus*, & *Chalcanthum*, fossilis materia, vt scribit Dioscorid essentia est eiusdem & naturæ eum Chalcithi: hæc autem materia, illud ex hac factitium vt Syl- uio placet, & in hanc tandem per se rediens. Ad hæc cum medicamentum, id est, ve- hementissimum, vitanda eius per se vehementia, sed mitioribus mistis obrundenda: vltum verò & lotum multò moderatius redditur, vt auctor est Galenus libro iiii. Comp pharmac. & lib. ix. Simpl. Chymistis autem, & Officinis Chalcanthum Chol cothar exprimi solet.

*Chalcitis*, Sori, Misy, essentia consistentia, & situ differunt: nam Sori in fodina infimum ac crassissimum: Misy grumofum & frustulosum magis est durum, auro simile: Chalcitis situ & essentia est media æri similis. Soreos pars extrema in summa in Chalcitim & Chalciteos partes extimæ in Misy tandem transeunt. Hæc discussa sunt à Galeno ex Dioscoride, libro sexto Simpl. & libro tertio compositionis phar- macorum secundum genera.

*Chamadrys* *χαμυδρύς*, Trixago est, siue quercula: estque duplex, erratici videli- cet, & palustris, quæ nomine alio Scordium effertur. Quæ Cretica est, ad Theriaces compositionem efficacior perhibetur, tamen vbique gentium nascitur: odore & gu- stu, vehementer amara, si himber illam toto die non attigerit, Dioscor. lib. iij. capite xciiij. Gal. lib. viij. Simpl. med.

*Chamaeleo* albus, *χαμυδαίου λεικός*, vernilaginem in Theophrasto, Gaza interpre- tari ausus est: hæc non habet caulē, sed statim à radice è medio foliorum cōplexu ca- put exerit breui pediculo sultum, & densioribus spinis echinatum: in quo flores emi- cant purpurascens, & statim in pappos se dissoluentes. Fructus autem non est dissimilis Cnico: frequens in neglectis montium sabulosis, petrosisque locis. Diosc. libro iij. cap. ix. Gal. lib. vij. Simpl. medicam.

*Chamaele niger* *χαμαίλειον ὀ μέλως*, foliis Scholimo similis esset: nisi minora, tenui- oraque, ac rubro distincta viderentur: cuius quidem caulis magnitudinis dodranta- lis est, & paruz crassitudinis. In cauarū iugis carduus hic est copiosissimus, cuius pap- pus capitatus in eduliis, vt Scholimus, rusticorum industria, pro napsi voratur. Atq; is est, quem Carlinam visciferam vocant: admiror etiam Gal. affirmare aliquid ve- neni esse in radice, quod sanè retulisset Dioscorides: quos videbis.

*Chamaeyparissus* *χαμαίκνυπάρισ*, humilis cupressus, hoc est, Abrotanum sæ- minam aliter mulio mas effigie tota se repræsentat, sicut docuimus in dict. Abro- thanum, & a bsynthium, quas repetes.

*Chamaebatus* *χαμαίβατος*, rubus humilis est, Gale. interdum simpliciter *βάτος* dictus: fert mora racematim crescētia, per maturitatē nigerrima *βαίρα* Gal. appellata.

*Chamaeleuce*, Plinio Farfugium. Italis vngula cabalina vt est interpret Fuchsius, sed dubiū an fuerit Tussilago nostras, quamquam ei quoque idem nomen tribui cer- tum est. Viderit plura lektor super dict. Bechion.

*Chamaepitys* *χαμαίπυτος*, pinus pumilla est: quòd odore & foliis eam imitatur; Auiga Idæa Scribonio Largo dicitur: aliis Abiga Iua arthetica. Diosc. lib. iij. cap. cl. Galen. lib. viij. Simp.

*Chamaeriphes*, surculi sunt ex diu rursus germinantes à radice succifi. Ex Plin. Ges- nerus hæc à quo plura exiges.

*Chama*



*Chamedaphnem*, à daphnoide Dioſc. diuerſis capitibus ſeparat; quòd facultate & viribus vtrumque inter ſe diſcrepat: & Daphnoidem crediderunt Laureolam noſtratam potiùs, quàm Chamedaphnem: ſuperior Laureolæ viribus iſdem pollet, at quæ poſterior, medicinis vtilis, neque lætalis, vt author eſt Dioſc. libro quarto, capite cxxxj. & ij.

*Chamaeciſſura* χαμαιχις, terreſtris hedera eſt, quòd ſoliis hederam æmulatur, ſed humi quia ſerpit, terreſtris accepit nomen: in herba virulentus odor & vehemens depræhenditur: odoranti Ruel. lib. ij. cap. xcv. Dioſc. lib. iij. cap. ex.

*Chamaeraphus*, ex Aſclepide Scholiaſtes apud Athenæum lib. ij. Dipnoſ. in Bythia naſcitur, cuius fructus edetium caput têtat non minùs, quàm vinum: quod idem tribuitur Minecilis, id eſt fructui Arbuti arboris: quem fructum Itali adhuc Ceraſa tranſmaritima vocant.

*Chamelea* χαμαιλεα, oleago, & quibuſdam mezereon lingua Arabica, apud receptiores oliuella nomen accepit. Largo oliuæ folia ſimilia habet. Scholiaſtes herba tamen eſſe coniecit, quam Linum ſylueſtre gẽtilitio idiomate quibuſdam in locis Cellæ Galliz, Boy-gentil appellant. Dioſcorid. lib. iij. cap. cliij.

*Chelidonium maius*, χελιδονιον το μεγα, caule eſt gracili & cubitali, agnatis ſoliſis colore caſſiſ flore violæ luteæ: in eo ſuccus croci, mordax, acris, & ſubamarus, grauiter olens. Ad quæ conſeruat tota herba, tradit Dioſc. libro ij. cap. clxxij.

*Chelidonium minus*, Scrophularia vulgaribus dicta, quòd Strumis, quas Græci χοιραδες dicunt, mēdeatur: herbula pediculus ab radice pendens, ſine caule, ſoliis hederæ multò rotundioribus, minoribus, teneris & ſubpinguibus, radices habens ex eodem callo complures, Dioſcor. lib. ij. cap. clxxiij.

*Chænix*, meſura eſt apud Celſum, Largum, & Galenum, quæ quatuor ſextariis, id eſt, heminis octo conſtat.

*Charopa* vrina eſt, quæ ſimilis ſubalbidis cameli animalis pilis apparet. Charopus enim color, qui dilutam habet viriditatem, igneo quodam ſplendore intermicantem, qualem in Leonum oculis conſpicimus. Vnde χαροπος amabilis, blandus & grauiſius dicitur. Thy-leſius de coloribus cap. ij.

*Cheme* meſura, cuius quarta pars cyathi illam complet: quod denariũ duorum pondus & ſemis eſt.

*Chærephyllum* χαιρεφυλλον, quãquam nomen hoc Acantho tribuitur, Cere fillũ vulgare, & noſtras eſſe depræhenditur. Gingidium Dioſc. herba Syria Plinio, quæ ſylueſtri paſtinacæ ſimilis, tenuior tantum, denſiorque, radice parua, ſubamara. Oſus hoc erudum eoſtũvẽ eſt: magna ſtomachi vtilitate: totum medicamentolum eſt vrinæ difficultati, & veſicæ vlcenibus. Dioſc. lib. ij. cap. lxx. Ruel. lib. ij. cap. cxxxj.

*Chænix* meſura ſextarios duos poſidet: alibi libras ſex, heminas Atticas tres capit: ponderare autem drachmas centum octoginta. Quare Leonardum Portium de Meſuris, & Budæum de Aſſe.

*Cherchydrops*, ancipitis vitæ ſetpenſ, cuius morſu inflammatur locus, quem momorderit animantis, & veneno ſenſim expanſo animal iactum quodcunque, vomẽdo amara quam plurima, moritur. Lucanus.

*Natus ex ambigua coleret qui Syrtidis arua Cherſedrops.*

*Chelmer* Arabibus, ſed granũ tinctorium Latinis: & coccus Baphyca, vel coccum baphycum, vt paulò ſuprà retulimus: à quo quidem grano cõpoſitio fit medicamenti à Myropæis nomine Alchelmes, magni vetò apparatus, vt liceat vti tantum magnatibus, & ditionibus. Ex grano eodem lana tingitur, à qua coccineæ veſtes texuntur, quibus præſci viri illuſtres utebantur ad ſanctimoniam oſtentandam, quod noſtro ſeculo pontifices dehoneſtarunt, in tegendis carniſicum arupiſcibus. De hoc grano variè ſcripſerunt Braſſanolus, Agricola, Manardus: & poſt ipſos ex Ruel. Syluius. Sed de hac relegendus eſt Dioſcorides libro quarto, cap. xxxix. nominans id granum coccum inſectorum.

*Chrysocolle*, officinis borax, tam metallica, quàm factitia à Dioscoride, Plinio, Galeno nuncupatur, quasi auri colla, & gluten dicatur: ideo à Gebero, & Anticenna capistrum auri dictum est, cæteris Arabibus Tynehar: Sed serapio deceptus inter sales, quod ex pueri infantis vrina fieret, annumerauit. *Chrysocolle*, *Spodium*, *Pompholix*, *Psoricon* metallica sunt admodum tenuis substantiæ citra inensum calorem: de quibus omnibus suo loco retulimus.

*Canso*  $\chi\alpha\iota\sigma\varsigma$ , atdens febris est, ex genere continuatum, fit quando fluuabilis in venis putrescit, atque adeo cum tertiana inrermittebat, eo quod ab eodem procreatur humore, communicat. Differt autem, quod in hac per totum corpus bilis deseritur, in ardente verò febre flauæ bilis humor in vasis vnâ cum sanguine continetur: æque ob eam etiã causam in aduigente febre singulæ accessiones ad inscricitatio nem non perueniunt. Quando verò in iis bilis vehemētiôr agitatur: & à natura in ualescente compellitur, runc rigor superuenit, & febris soluitur. Requirendus est Gal. in lib. de Febr. differentiis, post Fuchsum: & Acaciam.

*Cholera*  $\chi\alpha\iota\lambda\epsilon\alpha$ , est immodica ventris perturbatio suprà, infraque erumpens: hinc Cholericis bilioli non sunt, sed ij potius, qui multa bili per inferna & superna deiectione laborant. Curationis author est Fuchsius de Morbis medendis libro tertio, capite septimo.

*Chamæmelum*  $\chi\alpha\mu\epsilon\lambda\iota\delta\omicron\nu$ , Anthemis est. differtque ab ea, quæ sua graue olentia Cœcula scetres dicta est officinis, quoniam huius odoris suauitas, & gratus inest, quem admodum in pomis iam maturis odor spirat suauissimus. Diosc. genera tria assignat, tantum flore distantia libro tertio, cap. cxxj.

*Cheironia*  $\chi\epsilon\iota\rho\omicron\nu\alpha$ , vlcera dicuntur inueterata, & quæ vix curam recipiunt: cicatricemque difficilimè contrahunt. Sic dicta, quod Cheirone medicinæ peritissimo ad sanationem indigeant: nam vlcera pro humorum qualitate variantur, & multiplicia deprehenduntur, vt docet ex Gale. lib. ij ad Glauē. Acacia. Celsus autem lib. v. Arrim, Chyronium vlcus, inquit, appellatur, quod & magnum est, & habet oras duas callosas, tumentes: exit sanies non multa, sed tenuis, odor malus neque in vlcere, neque in eius tumore est: nulla inflammatio, dolor modicus est: nihil sepius ideoque nullum periculum affert, sed non facile sanescit. Interdum tenuis cicatrix inducitur, inde iterum rumpitur, vlcusque renouatur, maximè in pedibus, & cecuribus.

*Cheirurgia*  $\chi\epsilon\iota\rho\upsilon\rho\gamma\iota\alpha$ , dicitur de ea parte medicinæ, quæ sectione, vel vstione, aut alia quavis ratione, quæ manu administratur, morbos curat. Celsus libro primo Artium, Græcorum medicorum temporibus in tres partes medicina diducta est, vt vna esset, quæ visu, altera quæ medicamentis, tertiâ quæ manu mederetur. Primam, Dieteticam, secundam Pharmaceuticam, tertiam Cheirurgicam Græci nominarunt.

*Cheirurgus* est operator manualis cum experiētia artificiosa, ad necessarium medicinæ finem pertinens.

*Chenix* mensura, sexarios duos possidet alibi libras sex, heminas Atticas tres capit: pondere aurem drachmas centum octoginta.

*Chrysanthemum*  $\chi\rho\upsilon\sigma\alpha\theta\iota\mu\omicron\nu$ , ea Anthemidis species suspicatur, quæ foliis per ambitum luteis constat, vt *Leuchanthemum* albis: nonnullis *Bupththalmos*, quod bouis oculum flore imitetur, postea bouis oculus omnibus appellata est. Diosc. in cap. Anthemis, lib. iij. & *Chrysanthemum* lib. eiusdem discriminatim meminit: nos verò in dict. Anthemis.

*Chrysolachanum*  $\chi\rho\upsilon\sigma\lambda\alpha\chi\alpha\theta\omicron\nu$ , officinis minor crassula suspicatur, duplex est, vnum subluteo colore pallens, alterum subeandidum. Occurrit & tertium genus, ex rubro in purpuram insignitum. De his retulimus in dict. Arriplex, & Armotæcia.

*Chrysocome*  $\chi\rho\upsilon\sigma\omicron\chi\omicron\mu\alpha$ , aliis *Chrysanthemum*, & *Amaranthus*, aliis *Iouis barba* in opacis petrosisque locis sine cultura nascitur: Plinio *Chrysis* appellata est: quæ simillima pulegio montano officinis inueniri creditur, vt author est Ruellius lib. iij. cap.

cap. c. j. & Diosc. lib. iij. cap. xlvij.

*Chrysogonum* χρυσόγονον, quibusdam videtur Chrysanthemū, verūm perperam: quando duobus capit- simplex vtrumque distinguit Dioscorides. Hoc simplex densē fruticā, quernis foliis, & per ambitum modicē terratis: flore coronarij verbasca: radix vt rapum extuberat, intus valdē rubra, foris nigra: quasi effigie sua Tuber terræ coniciat. Diosc. paulō aliter lib. iij. cap. xlvj. Ruel. lib. ij. cap. c. j.

*Chrysomela* χρυσόμela, aurea mala, quæ ex Coroneorum genere poma ad aurum colore imitantia, siue inclinantia verius, arbitrantur: quæ mala quoque Cydonia petitis efferuntur, quorum vsus in medicina, & pletaque alia peto optimus atque frequentissimus.

*Chondrilla* Laetucæ, non Seri lib. ij. Afimentorum iungit Galenus: verūm ea tanquam congenetæ annectit Dioscorides: pro Intybo autem vulgus Endiuia re, & nomine corruptit, vt pro Seri Schariolam, quasi Seriolam dicere tentauit. De quibus speciatim suis locis tractamus.

*Circus* κυρκός, Accipitris avis secunda species, quam vulgus gentiliū Quercellam assignat. Hæc extra medendi remedium vsus est, nec hic idcō describitur, nisi auium cætetatum differentiz causa.

*Clavicula*, siue Iugula κλειδάς Græci, Triuiales medici ferculas, elatior thoracis finis est, infetior autem septum transuersum. Gale. autem in libello de Ossibus cap. xv. Iugula ab utroque latere summæ pectoralis ossis extremitati adnectuntur: eaque fistulosa sunt, figuratque, & crassitie inæquabili. Quod est reliquum, a eodem auctore requiritur.

*Clavicula* extremitatibz, suræque processuum partes σφυρά, & ἀστραγαλοί, malleoli, & tali nominantur: atque hæ partes cum cæteris tibiam complent.

*Clematis* daphnoides κληματὶς δαφνοειδής, mulierculis in suis diuinationibz Vincaperuina nominata est. Est clematis altera, volubilis maior Ruel. quæ suspicati potest ea quæ in fractura lac effundit: cuius quoque folia in ambitu spinis præcutis fulciuntur. Tertia ex Plinio tostratis foliis ad similitudinem capitis penularum, iacens in aruis: Clematidis, Aristolochiz species tertia: quæ sponte sua in vineis, & aruis Allobrogum inferiorum peculiarissima prouenit. Diosc. lib. iij. cap. vi.

*Clymenus* κλύμενος, herbam eam esse fatebimur, quam officinæ & herbatij cypriam & saponalem, quod elota pingue quoddam in aqua saponis modo emittat. Pa flores elauellatam, sed vulgares Sigeiam, vocant. Ruel. lib. ij. cap. lxxij. Diosc. libro iij. cap. xi.

*Clinopodium*, Græcis & Latinis nomine eodē appellatur: officinarum vetō opinione pulegium montanum videtur, vt conicit Ruellius: frutex est foliis serpillio similis, furculosus, duum dodrantum altitudine: nascitur in petrosis, flores marubij modo producat. Diosc. lib. iij. cap. xcj.

*Clima* propriè regio est quoquoersus sexaginta pedū, est enim octaua pars iugeri, vt metitur Columella. Nam geographicè, Clima est spaciū terræ inter duos parallelos comprehensum, in quo porrectissimè ab initio climatis, vsque ad finē eiusdem dimidia hora variatio est diei. Hæc lib. Geograph. Glareanus, cap. xj.

*Clauus* ἵδος, rotundum tuberculum est clauorum ferreorum capitū simile, quod plerumque in calcaneis, & pedum plantis nascitur, in gradiendo afferens dolorem, & impedimentum. Dicitur etiam formicalis ruptura: cuius dict. petes.

*Clyster* seu clysmus κλύστρον, & ἐνυμασιν iectio Latinis, patitur ac Græcis vsus patitur: qui iuxta motbi diuersitatem variati solet. Clysmatum enim genera tria præcipuè à medicis obseruantur, primum, quod ex liquotibus, aut carniū decocto, vel etiam herbarum, paratur: alterum, quod abstergerendi, aut obstruiones tollendi, aut adstringendi, aut glutinandi facultas inest, facitatur: tertium, quo oleo & pinguedine intestina leniuntur: quartum, quo facultas excretoria excietur, neuè quæ iniecta sunt diutius tetineantur, ex salium genere conditur. Nos in ignarum quendam,

qui elyteri puluerem Bombardicum immiscuerat, sic velut obiter allusimus.

*Pulueris igniferi vires retinere sepulchris*

*Ceditur, at visus impetus omnis obest.*

*Terreus armatos celeri bombardæ tumultu,*

*Pulvere letæo facta quocunque vomat.*

*Iuicis in ventres tali cum pulvere clysmum,*

*Compositum rapida materiaque rudi.*

*Desine metatum cursu finire sed eum*

*Affectis, quam mori, plus mihi vita placeat.*

*Collum* & *ceruix*, *κράχης*, quod caput usque ad humeros excipit, appellatur: columna ea natura fabricata ad sustinendum coelorum molem, hoc est corporis in homine vniuersi paruum mundum, atque ex ipso capite rerum cognitionem, ac deum administrationem suscipere: Ex vertebrae colli primæ quidem duæ inter se vndique colligantur, reliquarum verò quinque anterior pars nexu restricta firmissimo coalescit. Neque id quidem per cartilaginem fit, verum ea membrana quæ geminas spinalis medullæ tunicas extrinsecus ambit, sese in mediam ipsarum sedem insinuans commune utrisque vinculum præbet. Eadem ratione vertebrae omnes se habent, duabus primis exceptis, uti demonstrabimus suis locis, distinctè adornatis.

*Columella*, portiuncula quædam est in summo ore, quæ dependens apparet: ut si quis aperto plurimum ore roto, linguamque deprimat, videtur. Hæc veteribus appellabatur *γλγγαρεῖον*, *ἡ κίλα*, hoc est, gurgulio, & columna: recentioribus verò *κιστῖδα*, id est columella vocitata est. Curationis author est Fuchsius libro secundo, de med. Morbis, cap. primo.

*Cæcum* siue monoculum intestinum quod est anfractuosum, succeditque Colon intestinum, medio intestinorum, quod mesenterium dicitur, modicè innitens. Huic proxima sunt Ileon, & leion in varios nuplicata orbes: ambo regionem, ventris inferioris elatiorem occupant.

*Colon*, intestinum crassum, seu carnosum præcedit Cæcum, quod à sinistro rene ad dextrum super ventriculi fundum fertur, donec lienem, & iecur attingat. Ab eo dolo colicus deprehenditur: qui in laxiore intestino accidere solet: aliter *καλὸν* intestinum dicitur, à quo ipsa passio: quæ dispositio diuturna in ventre est, per intervalla dolores intollerabiles exercens cum spirandi difficultate. Curationis author est Fuch. lib. iij. de med. Morbis, cap. xij.

*Colleeticum*, id est, glutinans carnem in vlcere, est succius factotico, astringit, non terget, ut omnia acerba, & austera.

*Color* quoniam varius, multiplexque est, multò minùs ex ipso de medicamentorum temperamenti exatè colligere quid liceat. In singulis enim coloribus calida, frigida, humida, siccaque inveniuntur: neque necessarium est ut, quicquid rubrum sit, calidum quoque sit: neque ut quicquid album sit, frigidum etiam sit: quemadmodum fusiùs lib. primo, cap. ij libro ij cap. ij. & libro quarto, capite ultimo Simpl. medic. Gal. docet.

*Color*, est qui corporis naturam ex temperatura testatur, similis enim effertur cutis humoribus: itaque ater, atram bilem, flauus, flauam, albus, pituitæ: rubicundus sanguinem abundare in corpore significat: qui humores cuiusque propriam naturam perspectam reddunt. Acacia super libro primo Galeni ad Glaucanem.

*Color* contentorum in vrinis vehemèter albus est, qui aut pituitosi humoris ramentum aut pus summè coctum, quod à aliqua interna parte patiente secretum est, indicat.

*Color* contentorum subpallidus pallidusque bonitatem minùs portendit, veluti is qui à colore, qui secundum naturam est, declinat.

*Color* contentorum vrinæ flauus, malus etiam est, quod exauctam esse flauam bilem in secundæ concoctione significet. Subrubeus, & rubeus color quandam cruditatem, & defectum coctionis, atque adeò diuturnitatem morbi monstrat.

*Color* cruentus contentorum vrinae, omnino non esse elaboratum sanguineum humorem portendit. Venetus, liuidus & niger, mortificationem virtutis vitalis, aut humorem nigrum, qui illuc ab aliquo loco profluens in vrina subsidet, significant. Quare dicitur Contenta.

*Color* venetus, qui ex nigro leuissimò colore, atque albo æquis portionibus, conflatur: coloribus aliis nullis producitur.

*Cochlearium*, continet senos scrupulos, hoc est drachmas duas, alibi scrupula tria possidet.

*Cæcitas* nocturna *νυκταλυσια*, est malum, quo quis interdum quidem videt, Sole subinde occidente, obscurius: noctu vero penitus nihil. Ea autem correpti morbo Nuscitiosi vocantur.

*Cæliaca* passio *καλιακα*, non omnis ventris fluxus est: neque enim si cibi crudi & incocti infernè prodeunt, neque si corrupti ac in peregrinum habitum mutati sunt, cæliaca passio vocatur: verum tunc solim, quum leuia, liquidaque egerantur, ventre præ imbecillitate cibos coquere, & digerere nequeunte. Aliter hanc vocem vsurpat C. Celsus lib. iiii. cap. xij. Morbi petes curationem à Fuch. suo loco repositam.

*Colliria* *κολλυρια*, inedicamenta, Celso definitore, sunt quæ oculis admoventur, quorum quidem omnium materia ex qua componuntur, varia est. Nami succi, liquores, semina, fructus, plantarum paries, & metallica iis inferuntur, quæ pro affectuum magnitudine variantur. Horum compositionis authores sunt Celsus, Largus, Galenus, A. Egyneta, & Aëtius, in libris de Oculis medicandis.

*Conpius*, octaua amphoræ pars, senos capit sextarios, & plerumque olei libras decem, & vini duodecim, vel heminas duas: quæ & triblyā dicuntur: Atticis est heminis duodecim.

*Comitialis* morbus Epilepsia est, *ἐπιληψια* Græcis, quod nimirum sensum capitis, atque mentem pariter apprehendat. Comitialis autem, quod hac passione correpti in comitiis maximè manifestabantur. Est autem Galeno lib. ij. de Locis affectis, capite v. teste, conuulsio omnium corporis partium non perpetua, sed quæ ex temporum accidit intervalis, cum mentis, ac sensuum oblesione: quæ triplici modo gignitur.

*Concausa*, seu causa adiutrix est, quæ etsi vi sua non potest generare morbum, alteri tamen cohaeret, & cum externa, vel interna coincidit. Huius meminit Hippocrates plerisque in locis, & Galenus.

*Cochlea* *κοκλεις*, Limax terrestris, cuius duæ occurrunt species: vna quidem sub-alba concham in se fetens: altera rufa, in semitis, sepibus, & nemoribus passim subest, & verno tempore inuenitur, & vt superior, non estur, sed cataplasmatum medicamentis utilis. Quæ aquarilis & marina occurrit, Turbo est, & estur vtraque, sed mali succedenti probatur.

*Cochlear*, & cochlearium, mensura est drachmæ vnus, vt interpretatum est à Fuchio super Myrepso.

*Colchicum*, *κολχικον*, hermodactilus officinarum non est, sunt qui hephemerum, & agrestem bulbum vocant: autumnii exitu, quo & crocus, cum flore erumpit in pratibus: postea semen producit rufum: sed radice extra nigra, intus verò candida. Ea canes & lupi interficiuntur. Diosco. lib. iij. cap. lxxij.

*Colias*, vel parianus Plinio, Lacertorum minimus Nicesensis ostentatur: Allobrogibus Isaram, & Rhodanum versantibus, lingua sua Παϊος, vocant.

*Conche* testæ sunt, id est, concharum coopercula, vel potius onix odoratus, triuia nomenclatura, Blatta Byzantia dicta: cuius dicitur petes.

*Colocasia* *καλαμος αινουατος*, fabæ Aegyptiacæ radix esse Gesn. suspicatur. Manzanon vocat Aëtius, id est, Colocasion: Diphylus apud Athenæū lib. ij. Diosoph scribit radicem fabæ Aegyptiacæ vocari *κοκοκαζιον*, cuius sententiæ est & Plinius.

*Colocynthis* *κοκοκυθις*, agrestis cucurbita est: cuius fructus in pilæ speciem conglomeratus, & post maturitatem delibatus, vehementer amarus, validè quoque purgatio-

nis in sua medulla experitur: ob id sola non vtenda docent Largus, Dioscorides & Galenus libro vij. Simpl.

*Conserua* Plinio, herba est villosa densa, aris, arque fistulosa, ea inuenitur enatans fluminum vadis, formam spongiz retinens. Nomen ex eo inuenit, quod presentaneum sit remedium aduersus ossa, quæ cum per porum glutinantur, conseruere Celso dicuntur, & *κατὰ νύκτα* ab Hippoc. dicuntur.

*Colutea* *κοδύρια*, ramis est exilibus, folio scæni græci, mēbraneo folliculo, pellucēte, & prætumido, in quo semen arum, durum, latum, lenis magnitudine, pistigūta. Planta hæc topiaria hortis Gallicis non infrequens, vulgò Baguena dicta, scateque ea pōmētia vrbis Rhodaniensis Allobrogū. Ergo neque Sena, neque pepylon, neque emperum, neque delphynion, neque pelecynon, neque alypon Colarca est: nam Sena, non alterius nominis aut generis est.

*Comarus*, frutex nominibus aliis insignitus, vt ei nomen Arbutus, & Epimelis videatur: & est mespili genus, foliis mali, sed minoribus: pomam fert rotundum, esui aptum, vmbilico lauiore, quod adstringit, serò que maturefeit. Dioscorides libro primo, ca. p. cxxxiij.

*Cornu* seu tibia: os ribiz ipsius est, scilicet maius, cuius quidem minus os, Perone seu sura nominatur: nam toga hæc pars etiam ribia, & crus dicitur, vt in cubito brachium.

*Congrus* *κόγρος*, piscis quem Galenus carnis duræ esse scribit, & quæ vix consici possit. Maritimis in regionibus vbi piscatur salirus, cum varijs generis leguminibus edi solet. Sed neque frequens in littore Gallico est.

*Columbus* & columba *κολομβος* & *κολομβή*, nomen est, quo species omnes turricularum auium complectitur: quanquam & *κολομβή*, species est minor palumbæ, nec maior vinagine, hoc est, tūpicola columbo. Huius avis caro, quemadmodum Galeno placet, ira de ea scribente, ad coquendum facilis stomacho est. Porro quod vulgus putat columbam felle carere, falsum est, nam in testino in ea aue fel quidem iunctum est. Ex Aristotele & Aeliano plura elicies.

*Consiligo* *διασώπον*, pomelea quasi pulmonea, quod remedium presentaneum sit pulmonum vitiiis, & hanc Param Leonis ex Ruell. suspicatur Gesn.

*Concoctio* est potus & cibi alteratio ad sanguificationem parata, quæ quidem fit à natura per calorem. Prima autem animantis concoctio ventriculi est, altera iecinoris, & tertia venarum ad arterias spectat.

*Concoctio*, ex Aristotele Metereol. libro quarto capite secundo, est perfectio quæ à naturali proprioque calore ex oppositis fit passiuis, quæ sua cuique materies existunt: hoc est, concoctio est actio quædam caloris naturalis in qualitates passiuas: vel quæ ab innato corporis fit calore.

*Concoctio* duplex est, vna eorum quæ secundum naturam se habent, vt est concoctio qua in ventre cibis concoquitur, aut in visceribus, & vasis vbi generatur humor, vnde pars vna quæque nutritur. Et hæc sanè nihil aliud est, quam alteratio nutrimenti in propriam & familiarem nutriti qualitatem, quæ *σώμα* nominatur. Rei finis auctor est Gal. super lib. j. Epidem. sect. ij.

*Concoctio* altera est, humoris morbum efficiētis alteratio: quæ etiam maturatio dici potest Latinis, Græcis verò *σώμα* vtraque fit à nativo calore, & à simili in præsens iuuantur. Differunt autem in eo, quod prima planè secundum naturam existat siquidem quod in ea concoctum est, in substantiam eius quod conquirit, transsit. Altera verò partim secundum naturam existit, partim præter naturam.

*Concoctio* differt à præparatione, quod hanc soli crassi ac tenaces, non autem tendentes exigunt: illam verò vtrique, vt finior est Gal. super Hippocra. lib. vij. Aphor. Commentar. xxxj. Concocta mouere, & non cruda.

*Conditum*, est quod ex floribus, radiebus, & succis cum saccharo, vel melle conficitur: vt Iosaphar ex iolarum succo, & saccharo conditum facit: itaque: & huiusmodi

varia, quibus miscentur interdum aut idora & electatiorum species. Huiusmodi compositionum author Aëtarius lib. v. compos. medic. & post Mesuem, Fuch. cap. x. lib. comp. med. ij.

*Condiloma* seu ruga  $\chi\omicron\delta\upsilon\lambda\omicron\mu\omicron\varsigma$ , est aut eminentia cum inflammatione, ut docet Cel- sus libro vj. cap. de Condilomate.

*Congelatio*, seu detensio  $\chi\epsilon\tau\omicron\chi\eta\iota\varsigma$  &  $\kappa\alpha\tau\epsilon\lambda\eta\sigma\iota\varsigma$ , est tensio subita, & occupatio tum mentis, tum corporis, sensu ac motu priuati, ægro in ea corporis figura permanente, in qua fuerit correptus, siue sederit aut iacuerit, siue clausis, siue apertis oculis fuerit. Curationis author est Fuchsius libro primo de medendis Morbis, capite xv.

*Cioni* Atticis vocati olim fructus, Coccali, & Strobili à quibusdam nunc dicti, vi ridet toti sunt, subamari & subacres, in sua nuce pinea setuantur. Coni, præterea cuspessi pilulæ Plinio dicuntur, ut coniferæ cyparissi. De his passim loquitur Galenus lib. vij. comp. Pharmaz. & vij. lib. Simp. & lib. ij. de Alimentis. Deinde petenda est Dictio, Strobilus.

*Contusio*  $\theta\lambda\alpha\sigma\iota\varsigma$ , fit, cum caro, vel ossium aliquod molle, sub irruente extrinsecus aliquo violento, valido, & duro corpore ita colliditur, ut partis externa facies integra permaneat, & in profundo sint multæ ac paræ diuisiones: potest & collisio appellari quod si verò cõcauitas aliqua à collidentis corporis ictu indicta apparet  $\epsilon\theta\lambda\alpha\sigma\iota\varsigma$ , id est, illisio nominatur. Contusio præterea seu aurium compressio  $\theta\lambda\alpha\sigma\iota\varsigma$ , est foraminum quæ sunt in auribus, passio.

*Complicatio*  $\iota\pi\alpha\tau\alpha\lambda\omicron\kappa\iota$ , quando horis diuersis febres inuadunt: confusio  $\chi\epsilon\alpha\sigma\iota\varsigma$  verò est, quando eodem incipiunt tempore: ut descriptor est Galen. lib. ij. de febrium Differ. cap. viij.

*Contenta* vrinx  $\omega\pi\omicron\upsilon\sigma\tau\alpha\iota\mu\epsilon\tau\alpha$  dicuntur, eo quod in qualibet altitudinis corporis, vrinx patte consistent, & contineantur: nunc in fundum scilicet scaphij, nunc superiorem regionem, & vrinxque harum extremitatum medium. Quod in fundum vas descendit  $\iota\pi\omicron\sigma\tau\alpha\iota\varsigma$ , hoc est, sedimentum, seu subsidentia est: quod verò æquis spatiis ab utrisque extremis decedit, & in medio pædet  $\iota\pi\alpha\iota\omega\pi\theta\eta\mu\omicron\varsigma$ , hoc est, suspensio apparet: quod in summa superficie vrinx apparet  $\nu\epsilon\phi\alpha\lambda\omicron$ , id est nebula, vocatur. Contenta crassa, crassorum, atque crudorum humorum in venis copiam significant. Contenta tenuia, magnam quãdam naturæ in secunda cõcoctione aesse imbecillitatem monstrant.

*Contentorum* colores sunt qui à mediocritate decedunt eorum alij, sunt & alij vehementer albi, alij subpallidi pallidique: flauj alij & subrubei, rubeique: nonnulli cruentj, & veneti, huidi etiam atque nigri: qui omnes contentorum colores suo ordine exprimuntur.

*Contentorum* vrinx quantitas est, cum elaboratio naturæ circa alimentum, multa quoque excrementa fieri necesse est: sed contentorum paucitas est, vel ob inediam, vel exercitiam, vel obstructions, vel tardas concoctiones, generatur.

*Continens*, & continua febris  $\sigma\iota\upsilon\tau\chi\omicron\varsigma$ , &  $\sigma\iota\upsilon\tau\chi\eta$ , Etæcis, inter se differunt, in synochos nulla fit remissio feruoris: synochia autem in singulis accessionibus remissionem sensibilem obtinet. Item synochus vnã tantum accessionem habet, synochis verò plures: atque huius sententiæ Galen. est lib. ij. de Crisibus, cap. vj. & Meth. med. lib. ix. Fuch. lib. iij. de med. Morb.

*Continua*, seu  $\sigma\iota\upsilon\tau\chi\alpha\iota$ , febrium tres sunt species: si enim flaua bilis intra vasa putrescit, tertianam cõtinuam, seu ardentem febrem efficit, quæ generis  $\kappa\alpha\upsilon\upsilon\pi\omicron\varsigma$  dicitur. Si verò pituita putrescit intra vasa, quotidiana continua nascitur: habent autem continuæ febres idem genus cum singulis intermittentibus, ut est author Gal, libro primo ad Glauc. Diuertatis præterea ad dict. Tertianã continua.

*Continuitatis* in carne solutio, vulnus est: quemadmodum in ruptura, non ex di-



attentione, sed incisione profectum.

*Cossæ* *αλαυπαί*, in oranibus ferè animantibus quatuor sunt & viginti, ab utroque scilicet latere duodecim. Septem priores longiores Græcis γνόσιαι, Latinis autem vere & legitimæ dicuntur. Reliquæ inferiores breuiores, & ad pectus minimè pertinentes, quinque in quouis latere, spuriz & illegitimæ larinz, *νοβζι, η, ροαί* Græcè nominantur: hæc ad septum transuersum desinunt.

*Conuulsio* *παρασπυς*, est ubi nerui & musculi præter voluntatem conuelluntur, in eumque affectum veniunt.

*Conyza* *κονύζα*, triplex est, Latinis Cunilago nominatur: vulgaribus cimicaria, & pulicaria, quam Psilion plerique interpretantur. Conyza utriusque folia sunt oliuæ similia, tertiz nõ item: in maiore caulis duû eubitorum altitudinem attollitur, in minore pedem æquat, sed non in tertia. Vtraque veneno resistere, non tertiam scribit Nicander in Theriacis.

*Conuoluulus* *κλήμυς, τυς*, volubilis, & cāpanella vt Ruel. & Gesn. placet, appellatur, Scholiastes verò sic eā scribit, iniquens: Cōuoluulus *ἰλξίνη κατὰ μπελός*, solius est heretæ longè minoribus, & in mucronē turbinatis, & herbas alias suo reptatu inuoluit: vulgus Cāpanullam appellat, officinis volubilis effertur: quibusdā autē liliastrum, quod vt ait Plin. est rudimentum naturæ lilia facere condiscens Conuoluulus.

*Conuulsio* *σπασμύς*, est ubi nerui & musculi præter voluntatem connectuntur, in eumque affectum veniunt, quem in motibus secundum arbitrium sacris assumpserunt. Huius quidē tres sunt species, vna nimirum distētio, seu *τὶ ἄστος*, quā Celsus rigorem vocat: sit autē quādo ceruix vnā cum reliquo corpore immobilis manet, & in neutrā partē inflectitur, sed iuxta in utrāque recta intēditur. Altera *ἐμπροσθόττος* vocatur, & fit cū caput, ceruix reliquūque corpus in pectus contrahitur: quæ dici potest tensio ad anteriora. Tertia *ἐπισθόττος*, quæ accidit, quādo caput in scapulas cōuertitur, & est tensio ad posteriora. Hippoc. Aphorif. lib. vi. aphorismo xxix. Gal. lib. ij. de Simptomat. causis, cap. ij. Fuch. curationem docet lib. j. de Med. morb. cap. xxi. Acakia super Gal. ad Glauconem lib. primo.

*Cor* *καρδία*, inter vtraque thoracis spatia medium situm est: & vtraque ad Basim ipsius parte auriculas habet, sic nominatas ab aurium similitudine. Dextra auricula cū insigni rā mo cauz venæ, & dextro cordis ventriculo cōmittitur. Sinistra cū ostio venosæ arteriæ, & sinistro cordis sinu conferta est: caloris vitalis, ipsiusque vitæ principium & origo, ex quo sanguis tum spiritus vitalis emittitur. Itaque tria sunt, quæ vitam humanam stabilire dicuntur, cor, hepar, & cerebrum: cor principale cæteris est, & thesaurus naturalis caliditatis, ac ipsius roboris vitalis. Item affectus per quancunque rei causam accidentis significant arteriarum perpetuam morionem, atque nihilominus cæteras passionēs existimādas, quæ in diuersis corporis partibus fiunt. Hepar secundæ dignitatis est, sed cerebrum tertiz auctore Aëtuario libro de vrinis primo.

*Cor* duos sinus intus obtinet, dextrum & sinistrum, interstitio discretos, per cuius foramina sanguis ad sinistrum transfertur. In utroque sinu bina vasa habentur, dextrum siquidem, qui & mollior tactu est, & capacior, cauz venæ, ubi septum transuersum permeauerit, insignis ramus ingreditur, qui ex iocinore sanguinem fert, eumque omnibus venis intra & extra cor distribuit. Egredditur autem ex eodem sinu vena arteriosa sanguinem ad pulmonem deferens, sic dicta, quod vsus respectu vena sit: tunica verò quæ duplex existit, arteria. Sinistro ventriculo cordis arteria venosa, quæ ex pulmone aërem cordi desert, fuliginosaque educit excrementa, inferitur: sic nominata, quod vsus ratione arteria sit, tunicæ autem respectu, quæ vnica est, vena. Egredditur ex hoc sinu maxima arteriarum, Aorta dicta, omnium aliarum origo, altera sui parte iugulum petens, altera dorsum ad spinam torquetur. Cordis affectus ex Galeno libro v. locorum Affectuum cognoscuntur.

*Cordis*

*Cordis* morfus, seu oris ventriculi dolor *καρδιακόν, ή καρδιακή πύα*, est non cordis, sed oris ventriculi dolor, morfus, aut punctura. Prisci siquidem os ventriculi *καρδία*, hoc est, nominabant: alio nomine passio hæc, *καρδιαγμός*, hoc est, morfus cordis dicitur Hippocrate. Itaque errant, qui hanc vocem pro cordis tremore, quæ Græcis *πάλμος* appellatur, usurpant. Fit quidem ab omni eo, quod cor præter naturam afficere potest, ut est intemperies omnis, aut humoris multitudo in ambiente tunica cõtenta, aut tumor præter naturam. Petendus est Gal. li. iiii. Aphor. Hippocr. commentario xvij. & Locorum affectu lib. v. cap. v. & libro secundo, de Placitis Hippocræ, & Platonis.

*Corona* in vrina, est linea vmbra depicta, quæ circumcurrit per ambitum superficiæ vrinæ: circulus aliquibus medicis appellatur.

*Corona alba* in vrina si fuerit, bonum portendit, at in viridi, & passæ vrina si peioris coloris, prauos humores iam dominari, & malum denotat.

*Corona* in vrina significatio est, quod si humores nocentes fuerint virtuti pares, & pari mensura vrinas tinxerint, nulla corona euidenter spectari potest: sed si virtus vicerit, aut vincatur, colores coronæ vndecunque apparebunt.

*Coronale* siue os frontis *τριανία*, id est, coronalis, quod coronari soleat. Os frons quod coronali sutura, atque ea, quæ capiti cum maxilla superiore communis est, distinguitur: & ut sincipitis ossa rarissima infirmæque sunt, occipitum densissimum, firmissimumque: sed inter hæc ipsa medium frontis os habetur.

*Corpus* est, quod profunditate, latitudine, & magnitudine continetur: & elementis quatuor æqualiter mixtis, compositum apprehenditur.

*Corpus* hominis constituitur ex humidis, solidis, & spiritalibus, ut osse, neruo, arteria, vena, & musculo: liquore & excremento: natiuo calore in corde.

*Corporis* partes duplices sunt, similes, & instrumentales: ex similibus ossiū itaque essentia frigidam & siccā, ipsorum temperaturā indicat. Item etiam de pilis, cartilagine, tendinibus, neruis, ligamentis, venis, arteriis, membranisque est censendum, ut pote quæ à calore cocta, atque à frigore concreta, sed hæc magis in vno, quàm in altero præpollent. Pilus quidem frigidissimus omnium, ac siccissimus, ab illo ossa, deinde cartilago, postquam ligamenta, à quibus tendines, deinceps membrana, & venæ, & arteriæ, postremo nerui duri. Molles enim partes in humiditate & siccitate mediā naturam, sicut cutis, obtinent. Caro autem, sanguis, ac spiritus temperamento calido prædita sunt. Spiritus quidē calidissimus est, deinde sanguis, postremo caro ipsa. Spiritus quod humidus sit generis ærei atque essentia ex eo liquet. Aer autem aqua humidior est. Tunicæ corporis, & vasorum non solum exangues sunt, sed etiam frigida natura, contactu tamen, & nutritione sanguinis calefiunt, & ad temperamentū perueniunt. Sanguis à corde calorem accipit. Pinguedo frigida & humida est, quam ordine eodem sequitur spinalis medulla.

*Corporis* dissimilares partes, quas & instrumentarias licet appellare, cor primum occurrit, omnium animalis particularum, quod maximè sanguineum, atque humidum, calidissimum est. Proximum illi iecur, cerebrum omnino frigidum, & humidum est temperamento. Pulmo calidus & humidus, quemadmodum etiam Lien, & renes. Quod verò ad duritiem & molliciem attinet, sciendum id quod siccum est, id prorsus durum esse non tamen id quod durum est, idem statim & siccum est. Si enim quid molle sit, humidum est: si durum, siccum: idem sanè sentiendum de aspero & leni: lubricovē. Hæc Gal. lib. priore Simpl. facult.

*Corporis* virtutes sunt, robor, pulchritudo, integritas, & perfectio: ab animæ virtutibus dependentes, prouidentia, modestia, temperantia, fortitudo, & iustitia: à quibus animorum perturbaciones moderantur, finiuntque.

*Corporis* item partes dissimilares, quæ & instrumentariæ dicuntur, sunt quæ ex simplicibus, similibusvè constant, ut caput, manus, pes, & id genus. Dicuntur nomine alio secundæ, compositæ, dissimilares, diuersique generis. Sed

corporis partes similes sunt, quæ vndique in similes partiuntur: vel sunt, quæ partes omnes, tum sibi mutuo, tum toti similes habentur, veluti caro, os, nervus, cartilago, membrana, ligamenta, venæ, arteriæ, & id genus. Hæc autem prima elementa hominis Galeno dicuntur: atque cum brutis nonnihil communicationis hæ partes habere dicuntur. Obtenient alias & multas appellationes similes partes apud Galenum. Dicuntur enim nunc simplices partes, nunc primaria corpora, quod scilicet ex iis constituuntur, quæ compositæ, & instrumentales nominantur. Item generis eiusdem elementares, sensilia elementa, & solidæ corporis partes. Denique corporis partes quædam sunt, quæ nec aliotum gubernationi præfunt, neque aliundè gubernantur, cum innatam habeant facultatem à qua gubernentur, vt os, ligamentum, membrana, caro simplex.

*Corporis* humani partes quidem omnes venarum, & arteriarum adminiculo indigent ad essentia, seu substantia suæ conseruationem: venis quidem vt nutrantur, arteriis autem ad insiti caloris moderationem.

*Coriandrum* κόριον, καὶ κορίαν, cuius semen præparatur, & inter bellaria reponitur: sed largius sumptum mentem mouet non sine periculo, ob id aceto maceratur, post siccatur. De eo Dioscorides, Largus, & Galenus copiose, & diligenter, tum de ipsius remedio, quod venenosum est, scripserunt.

*Cornus* κρυία, arbor: cuius fructus cornum est: hæc siquidem speciosa arbor est, & fortis, fructum oliuæ magnitudine ferens, oblongum, viridem, cum maturum rufum, vel rubicundum: astringentioris facultatis, vt alui fluxum esu confestim retineat. Decipiuntur qui Cynobastum protulere, non minus quidem, quàm qui pro Sorbo, suoque fructu Cornum arborem vsurpant.

*Corallus* lapis Actuarius dicitur, quem λιθόδενδρον aliqui vocant: fruticis formæ cinamomi æmulus crescit ad promontoria in mari, astringit & refrigerat, contra sanguinis reiectiones magnopere efficax. Rubrum & nigrum tantum facit Dioscorides: albus tamen exusta vitionem, vt viridis, visitur Diosco. libro quinto, capit. octogesimo sexto.

*Cornicis* pes, κορυτόπους, quam Leoniceus interdum capriolam, & sanguinariā nonnunquam vertit. Gesnerus dentem canis, ab acumine folij olitores, ex Ruellij sententia, vocare affirmat. Etimon autem pes corui est, sed non ea planta quæ pro pede corui ostentatur, vt refert Scholiasles.

*Corrigiola*, proserpinaca Apuleio est: Dioscoridi polygonum mas: officinis verò sanguinaria, & centinodia nomen habet. Pedes dicit. Polygonum.

*Corylus*, Auellana nostras, Græcis κρυά πυρνα, Latinis nux pontica, & Græca habet nomen, hanc Galenus laudat in lib. Alimentorum, in cibis spermatidis augendi gratia, quia sterulentis suoci experitur: sed stomacho infesta. Diosco. lib. j. cap. centesimo quadragesimo secundo.

*Costus* κοστός, varius hodie habetur: sed præcellit Arabicus: secundus est Indicus, vber, leuis, niger: tertius Syriacus, grauis, colore buxus, odore feriens: sed Arabicus cum dulcedine amarus est: Græcis indicus. Costus autem hortensis, herba haudquaquam amara est, fuerit magis piperitis aut siliquastrum Plinij, & Pseudocostus Ruellij. Nam piperitis Pedemontana est, hortis isto seculo valde familiaris, quæ siliquas rotundas profert, retetes, pyramidis forma, digiti medij longitudine, & crassitudine, ad maturitatem versas, rubicundas apparere, semine paruo & scutulato turgentes.

*Cotonea* malus κυδωνία μηλέα, id est, Cydonia malus: cuius arboris genera tria in Gallis habentur: de virtute & efficacia fructus, legendus est Diosco. lib. j. cap. cxxxj. & Galenus de Alimentis.

*Coryledon* κορυληδών, id est, Veneris umbilicus, quæ herba similia folia habet cymbalis: nasciturque sæpe in parietibus humentibus: aliis habet acetabuli mensuræ figura, orbiculatam, imperspicueque concavam, cauliculo breui, qui è medio profilit,

profilit, & in eo semen, radice oliuz modo rotunda in Clariaci vici mœnibus frequēs Dioscor. libro quarto, capit. septuagesimo octauo. Ruellius libro tertio, capit. centesimo decimo septimo.

• *Coronale* os, antetioris partis capitis frons est, in synepite collocatum: cuius posterior capitis pars, occiput est: & tertia à medio anterioris, & posterioris ostenditur. Galenus in lib. de Osibus, cap. j.

*Costæ* sunt numero viginti quatuor, vtrinque vertebri duodecim ex ligamentis annexæ: ex quibus geminæ siue perfectæ ab latere vtroque septem superiores Stetnum attingentes: nothæ seu imperfectæ, hoc est, spuriz, atque mendosæ quinq; vtrinque Stetnum non tangentes, quæ inferiores sunt, computantur.

*Cornix* ἡ κορυφή, auis castissima, & coniugalis amoris obseruantissima, ad vitæ exitum vidua permanet: vnde in nuptiis olim veteres post Hymeneum, Cornicem inuocabant, & hoc concordiz symbolum his dabant, qui liberorum propagandorum gratia conuenissent. Aristoteles lib. v. de Natura animalium.

*Coruus* ὁ κορῶς, auis, cuius, genus triplex inuenitur, vnum nomine Nisticorax: alterum Coruus, qui per fluuios, stagna, lacus, & mare piscium prædam capter: tertium, Coruus rupicola, & gryllinus à gryllorum venari, appellatus. Atque hæc genera tria hominibus cibi gratia in prædam veniunt, cili caro dura, & confectu difficilis. Est præterea & inter hæc genus vnum, quod Coruis cæteris natura, non nomine, differt: estque auis, quoniam hominum voces fingere nititur, planè domestica, de cuius intelligentia mira docet Plinius lib. x. cap. xliij.

*Coryle*, hoc est, acetabulum, quod nonnullis glene vocitatur, est, quod ex cauis capitula excipientibus, & quod alius descendit, quodque in superficie situm est, ab oculatis sinus similitudine, nominatur.

*Corula* scitida herba ea est, quæ chamæ malo similis deprehenditur, nisi ab ea suo nidore dignoscatur: tota apibus insensibilis. Decipiuntur ergo qui Parthenij speciem alteram esse volunt, & Bupthalmum, & Chrysanthemonem. Ruellius libro tertio, capit. lxi.

*Crassa* vrina, est quæ excessum materiæ, & humorum implentium ventrem, intestina, & iecoris partes cauas demonstrat. Quæ si in febre spectetur, vbi tenuis præcesserit, statim futuram declinationem ostendit. Si verò cum iam accessit febris vrina crassa apparuerit, nec tenuari ceperit, humorum copiam iam manifestat, sicut docet Hippo. lib. vi. Epidimia particula iij.

*Crassa* & lactea vrina in fine veniens, calculos in vesica, vel renibus, significat: & crassa quæ charopos, & vt iumentorum turbida dolore capitis portendit, vt author Hippoc. Aphor. lib. iij. Aphorif. lxx. Galeno interprete.

*Crassa* vrina, & subrubea, maxime si talem subsidantiam habuerit. longos portendit morbos, & à periculo immunes: crassa & tубea, sanguinis copiam ostendit, quemadmodum in Synochis febribus.

*Crassa* & nigra vrina, melancholici humoris euacuationem significat, vbi maxime in declinatione melancholiz apparuerit.

*Crategon*, hoc est, aquifolium: arbor vulgò Houx. Ruellius ex Theophrasto, arborem Mespilo similem esse assignat: cuius fructus postquam maturuit, niger est, & facultate adstringens. Ipse Ruell. li. j. cap. liij. plura docet.

*Crategonum*, à multa acrimonia qua vitæ, popularibus Cura ge appellatur: verum neque differt à Persicaria, arboris Persici folia in rotum representans, solo nisi gustu & Naculis, nam solum idem amant.

*Crescio*, à crescendi celeritate, Sisymbrij species altera est, quibusdam Cardamine, & Nasturtium aquaticum. Cardamum Græcis, Nasturtiū hortense siue Alemnicum Latinis est: sic quoque dictum, quòd cor fouet in sineope illa cardiaca, ac plurimum valet, distributum, nempe dum vites alicui deficient, & repente animo delinquantur. Est & aliud Nasturtium aquaticum, à quibusdam cardamine appellatum, quòd

quod sapore sit cardamo similis quā quidam Latini Lauer, Graeci Sion herbam esse putant, vulgaribus Berulam dictam. Dioscorides, libro secundo, capit. centesimovigelimo, & centesimovigesimo primo.

*Crisbimus*, seu Crichamus, vulgus cretam marinam, & Baticulam, id est Bacillā, dicit. Contendunt plerique sponculum marinum esse, quod non scribit Dioscorides. Sale & aceto conditur, quia tota mensis lautioribus appetitur.

*Corruda* sylvestris asparagus est, nunc a tilis passim spectatur: duplexque habetur, ut auctor est Dioscorides, libro secundo, capite centesimodecimo octavo. Ruellius libro secundo, capit. quinquagesimo septimo. Tu praeterea peres distinctionem, Asparagus.

*Crisis* in morbis, seu indicium, est, quando in melius aut in peius morbi sit mutatio: & quae morbum finit vomitu, alui fluxione, sudoribus, urinis, sanguinis & naribus profusione, haemorrhoidibus, muliebri profluvio, parotidibus, ac aliis abscessibus: quae in quibus accidere soleant, diligenter est advertendum ex Galeno, lib. primo ad Glaucopem.

*Crisis* simpliciter appellatur, mutatio prima quae in morbo nihil reliqui facit, & subito ad sanitatem pervenit.

*Crisis* mutatio altera est, quae non integrè à morbo vindicat, sed tamen è fatu dignam in melius permutationem efficit: & haec deficiens nominatur.

*Crisis* mutatio tertia, seu morbi mutatio, mala crisis indicatur: quarta, quae insigniter ad deteriora declinat, atque ἀπελθὺς, hoc est, imperfecta malaeque nuncupatur. Plura habes in dicto Indicium, & Solutiones.

*Crisis* bonae indicium est, ut ab aliqua die indice prius indicetur, cui sanè annexa est diei indicatæ potentia: sicut docemus in dicto. Dies decret.

*Cretica* terra à Creta insula usurpavit nomen, quae gentilitio more, & officinis hodie Creta vocatur: candida nativo suo colore prospicitur, & parum ad medicamenta utilis.

*Crocus* ὁ κροκός, notitiae vulgaris: optimus medicamentis est Coryceus, veteribus celebratus: aliis sanè procerior, non tamen robore odoris, aut diuturnitate praestantior. Cilicius crocus etiam laudatur Galen. li. vii. compos. pharmac. licet hodie officinæ cum medicis orientalem non postponant. Huius rei gratia Dioscoridem Plinium, & Galenum lib. j. Antid.

*Crambe*, brassica est, & vulgi denominatione Caulis, ad ceteras omnes herbas horrentes nomen quoque peculiare: κραιμὲν, quod triplici genere à peritioribus est observatum, crassum siue herbaceum, & subnigrum colore depræhenditur: alterum colore rubicundum: tertium κραιμὲν κεφαλῶν, id est, capitatum, aut turbinatum, conglobatum vè ubique mortalium abundat. Similiter κύνκραμὲν, id est, brassica canina, siue Cynia, quae est Attriplex agreste officinis appellata: & κραιμὲν θαλάσσια, quae brassica marina, & Soldanella habet nomen.

*Crocodylus* κροκοδείλος, terrestris & marinus: diversique generis est, qui terrestris, croceum refugit: ob id mellis confectores dum timent a lueis à Crocodilis, croco illiunt. Nam marinus in littore maximè meticulosus est. Est & crocodilus ex lacerorum maiorum genere Scynco Nili similis: cuius magnitudo duodeviginti cubitorum plerumque est: referantque auctores tantam proceritatem excedere. Illi superior maxilla ad mandendum mobilis, contra ceterorum animantium à natura facultatem, & solida inferior manet, pectinatim utrinque dentibus ordinatis: carnis humanæ voracissimumque animal: cuius sola Aegyptus fecundissima perhibetur ex Nili nutritione. Parit ova ut anser sed multò maiora, incubatque ea serpentum, ceterorumque reptilium consuetudine: Aristotelis, Plinii, & Aeliani testimonio.

*Crocodylion*, & Crocodilia κροκοδύλιον, ex carduorum genere duplex, albus, & niger

niger: neque fortasse ea planta fuerit, quam ex Ruellio Carlinam gentilitas vocat, nam mihi constat apud Allobrogum, & Canarum rura esu plantas inter earum esse diuersissimas. Crocodilion alterum perhibetur chamæleonthe nigræ simile coniectore Manardo, ei videlicet carduo, qui modò carlina vocatur. Distinguitur, præter natales, radice, quam longuam nigrâque, & laram mediocriter habet, odore, ut nasturcium, acri: Carlina crassam extrinsecus nigram, intra subflauam: quam horum differentiam in dictione Chamæleon reposuimus.

*Cranium*, id est, caluaria ossibus constat septem: os frontis, quod coronale est: os bregmaticum, id est, scincipitis, & parietale utrunque: os lithoides utrunque, id est, lapidosum, & petrosum: os palati, & basillare, quod, nisi in Anatome, ostendi non potest: Zygomata, vel os Zygoeides, id est, iugale & paris.

*Curditas* cibi ingesti ἀπεψία est, quando videlicet nulla penitus sit ciborum alteratio, sed secundum omnes qualitates, quales assumpti sunt, permanent. Quam passionem sequitur διαψία, quæ fit quando in alienam qualitatem cibi permutatur, id est, tarda cibi concoctio quæ βραδυπεψία alio nomine appellatur.

*Cruentum* spiritum αἱμοπτόσις, καὶ αἱμοπτῶσις, est sanguinis spuitio seu reiectio: quæ ex causa interdum externa manifesta, nempe delapsu ab alto, aut si grauius aliquod corpus thoraci incidit, clamore, aut frigore, ruptis venarum capillamentis, & consimilibus. Accidit quandoque ex occulta etiam causa, veluti plenitudine, aut oris venarum apertione, aut eandem erosionem, atque alius humoris generis. Curatio morbi huius petenda ex Fuch. libro ij. de med. Morbis, cap. vij.

*Cubitus* αὐχὺς vocatur quoque membrum, quod est inter carpi & ἀγκύρος articulationem: alio nomine Latinis vlna, & facile maius dicitur, porro ἀγκύρις est quo firmamur & sustentamur.

*Cubitus* αὐχὺς, alterum vlnæ ossium maius quod supereminet radius κερκίς, rudioribus medicis facile minus dicitur.

*Cubiti* tuber, seu processus posterior ἀλεχάρον, nuncupatur: vbi cubitus desinit & cum summa manu, quam Græci ἀπὸ χειρὸς, vocant, articulationem efficit: καρπὸς Græcis, brachiale Latinis: nasceta sciolis medicis, & Chyrurgis vocatur. Post brachiale μετακαρπιον est. Itaque carpus constat ossibus octo, quatuor in singulos ordines coniectis, non incertus, horum numerus cum Celso. Metacarpium & pecten ossibus quatuor constat Galenò, non quinque cum Celso, & aliis singulis quinque ossa tria numerantur.

*Cucumis* agrestis, officinis asininus σίκυς ἄγριος, cuius succus Elaterium est: cuius conficiendi rationem docet Diosco. Est & satiuus Cucumis σίκυς ἡμερος, qui videtur inter Melopepones numerandus: quorum multa variæque occurrunt genera, ab ipsorum & figuris petita: verum cucumis sui generis est, neque cum pepionibus miscetur. Ex Ruellius Carolus Stephanus in libello de re hortensi perlegendus est.

*Cucurbita* item occurrit suo in genere multiplex, verum forma & facultate κολλοκυβη Græcis nominata: nam quæ satiuâ, frigida & humida ordine secundo, ut cucumer satiuus, manifestatur: ad phlegmonas, & sitim utrunque efficax, Galenò auctore lib. vij. Simpl. Occurrit & altera præter agrestem, quæ Γυφὸς Græcis dicta est, coactæ breuitatis, digitali crassitudine, & in petrosis nascens: nostratibus Barbara, & marina nominatur.

*Cucurbita* erraticâ κολλοκυβη, paulò supra memorata est: atque de ea quàm plurima scribit Dioscorides, libro quarto, capi, centesimoquingentesimo octauo, inquit: Colocynthis sarmenta foliæque satiuî cucumeris emittit, per terram repentia, diuisa fructum in speciem mediocri pilæ conglomeratum, vehementer amarum, quem legere oportet, cum ceperit in pallidum colorem permutari: cuius



cuius medulla purgatoriam vim habet in clysmatibus cocta, obolotū quatuor mensura tantum addito melle coctoneque hoc pacto in potu pro pharmaco exhibenda est, quia vitæ periculosa, ut istis versibus in Chyrurgum prorsus amethodicum retulimus.

*Obvini en quoties tibi sum colocynthidis à me  
Ignea ne virtus, ne noceat de petis.*

*Hæc epota fiet cruciantia tormina ventrem,  
Pectora tum crebris ulceribusque probas.  
Non procul est Elephas morbo sanare satemur,  
Cui regio nomen Gallia deinde dedit.  
Festidis potus tibi sunt catapotia curæ,  
Si placet hic usus; tu tamen adde Senam.*

Cuminum κυμινον, triplex est: sativum unum, alterum sylvestre, & tertium sativum proximum: quonquam erraticum repperitur, cuius figurâ depingit Gesnerus. Quin etiam agreste cuminum est ἀραβος Græcis, Latinis Draua: apud herbarios quosdam nasturtium orientale, vel Babylonium est appellatum. Post Diosc. lib. iij. c. lvij. quære Galenum lib. vij. Simpl. medic.

Cunila bubulâ ὀρίγανος ἄγριον, id est, origanum sylvestre: cui differt Cunila capitata, id est, Thymbra, vel Satureia θυμברה κτραλωτη, species origani: & cunila molli Plinio, quæ Encensaria Gesnero est, sed cunila gallinacea, id est, Origanum heracleoticum, maioranæ species eidem Gesnero creditur. Cunilam etiam pro Satureia Largus vsut paup, quæ vera non est, Græcis medicis veteribus singulari diligetia descripta: longè discrepat ab ea, quæ nostratibus medicis celebratur, ut rationibus apertissimis docet P. Bononus: uti neque Thymbra, stechas, Hysopus, & Thymus vera, & germana nobis seculo nostro opponuntur.

Cunilago κυνίλη ἄγρια, mascula Græcis dicitur: ut suspicatur Gesnerus, odore fædo, radice lignosa, folio aspero: licet idem nomen Conisæ tribuatur. Atriplicem fortentem si dixerit, neque movebor: ubique gentium vulgus mictum canis vocat.

Cupressus κυπαρισσος, vel cypressus frutex: cuius pilulæ Cōni dicuntur, unde cōnifera cupressi apud Vergil. legitur. Mominimus copiosius in dict. Cōni.

Cucurbitulus evacuationis per reuulsionem sanguinis genus est, quo non solum materiam evacuari, sed etiam dolorem solvere, phlegmonem minuere, inflationem discutere, appetitum reuocare, ventriculo infirmo robur addere, animi deliquio liberare, ex alto fluxiones transferre, sanguinis eruptiones cohibere, facultates mensium corruptrices extrahere, mensesque suppressere. Imponuntur quandoque sine scarificatione ad simplicem quandam reuulsionem, sed plerumque cum scarificatione adhibentur. Gale. de usu cucurbitarum author est, & li. v. Meth. med.

Cuculus κόκκυξ piscis, littoreis Malsiliensibus gallina marina consuetum nomen habet: Siculis regionibusque vicinis Cochus dicitur: nimirum quia piscis hic itreticus vocē avis Cuculi similē addit. Numenius, ut Scholiastes refert apud Athenēum ἐρυθρον piscem hunc appellat, id est, rubrum: quæ appellatio convenit ei pisci Rogeto, qui pro Cuculo Luteciae ostentatur.

Cuculus κόκκυξ, avis hæc sua prudentia sapit plurimum, cui omni excludendi pullos facultas non sit, propter frigidam corporis sui temperiem, in Alaudæ, & Luteolæ nido parit, quod non ignoret ab his oua suis persimilia pari solere: quæ postea per ipsas auiculas excluduntur, sonenturque dum volent.

Curca η̄ ἐπιλαΐς, & ὑπολαΐς, avis pnatatur, quæ Cuculi oua fouet & excludit: pagani quibusdam Verdōn, & Rogebourée, dicitur. Arquatis videtur opitulari hæc avis vel efator resacta, vel in cinerem subacta, & quopiam liquore potantam experientia remediū fuit.

Culeus, viginti capit amphoras, siue urnas quadraginta, ut est apud Plin. li. xxij. cap. i. & Columellam, li. iij. cap. iij. Ab eo sesquiculareium dolium triginta continens



neus amphoras: quasi culeum & dimidiatum.

*Cuminum*, duum generum est, satium, quod ori gratum deprehenditur gustatu: sed multò magis AEthiopicum, quod Hippocrates regium appellauit: Carnabadiū apud Myrepsū Euchisus interpretari a usus est, secundum locum tenet Aegyptiū. Alterum est cuminum syluaticum, frutice paruo gignitur: dodrā tali caule, ac tenui, quarectis aut quinis foliis tenuibus, veluti ferratis, & gingidij diuisura, in capite cacumina quina, aut plura habet, mollia, rotunda, in quibus semen turget, gustu satiuo acriore, nascitur locis mollibus.

*Cutis* *δερμς*, est corpus neruofum, totam superficiem corporis exornans, atq; protegens, vt offensam, & noxam à gelu, & calore torrido prohibeat: cuius summitas ἐπι δερμς Græcis, Latinis flos cutis.

*Cutis* densitas est, quæ per totum corpus meatus exiguos obtinet: quoniam aut frigote fit, aut qualitate affatim astringente, qualis in aluminosa aqua est: vt docet Acacia super lib. j. Galad Glauconem.

*Cyame* mensuræ genus, pars tertia mistri dicitur: quæ duo cochlearia capit: & *Cyamea* *κυαμεία*, quæ velut gemma apparet: arque hæc officinis vmbilicus marinus videtur, quoniam fracta & in partes diuisa fabæ similitudinem refert. Lege Plin. lib. xxxvij. cap. xi.

*Cyamos*, colocasia dicitur, vt paulò supra retulimus in diēt. Colocasia: & est *Cyamos* mensuræ genus, quod semunciam complet: & *Cyamos* faba, quod est leguminis genus: à cuius esu Pythagoram ferunt religiosissimè abstinuisse.

*Cyanus*, siue cyaneus lapis, id est, cœruleus, officinis lapis Lazuli: cuius vires colorem varium in ipso fusissimè describunt: post Diosc. Phosium & Galenum, nostræ ætatis Brassanolus, Fuchsius, & Syluius super Mesuem vires aperuerunt. Vim purgare melancholiam supra, & infra, ac attrabiliosum succum habet, & illotum præbet Mesue non sine graui noxa: communemque habere cum Armeno lapidem facultatem, ob id pollere vtrunque aduersus omnes melancholicos affectus, maniam, epilepsiam, elephantiam, quartan, & hæmorrhoidas: vocaturque Stellatus lapis.

*Cyanus* *κυανός*, flos cœruleus, hermines alioqui vocitatus: officinis verò Blattifella nomen habet.

*Cyathus* duo mistra continet: Plinio authore pendet per se drachmas decem: olei pendet per se drachmas duodecim: vini sesquiantiam, & scrupula quatuor: mellis sextantem, drachmas duas: in mensuris aliter sextantem, id est, uncias duas.

*Cyathus* liquidorum mensura, chy mas paruas, vel mystra parua duo continet. At si voles liquidorum ponderum mensuram nosse, plus alia aliis in aqua lance trutina ra momenti habent: exempli causa, dicemus de melle, vino & oleo: mel vtiq; vino grauius est quarta parte & adhuc decima, quæ est integra ipsius mensura, & præterea triens: oleo autem mel media parte est ponderosius, continet enim totum eius modū, & semicem: vinum oleo nona parte præcellit, quippe totum ipsum capit, & nonam eiusdem partem.

*Cyclaminus* *κυκλαμίνος*, officinæ Sigillum Mariæ vocat, vt affirmat Ruel. & quod raprum terræ, & tuber terræ Gaza interpretatus est, plebeiis panis porcinus, Arthamira myropolis, Cyclamini tertiz speciei Plinio: & vnico deprehenditur folio. Quære diēt. Tuber.

*Cuminum* semen est, à Carmania regione Persuti proxima, carmanum dictum. AEthiopicum præfert Gal. Mesues verò ipsum Carmanum.

*Cynaros*, *Cynara* *κυνάρως*, caucalis hortensis, qui alioqui artococcalus populariter appellatur. Coccali diēt repetes.

*Cynocephalæa* *κυνόκεφαλα*, anthirrinum plerisque etiam expertis herbariis suscipitur: cuius diēt. petes.

*Cyboides* seu cubiforme, ex rarsi siue rachetæ ossibus quatuor maximum & extremum est, & calcaneo commissum, neque ossa pedum omnia propria habent nomina, verum Calchoidea quibusdam dicuntur: & cætera toti manui respondent pedum ossa.

*Cynoglossum* κυνογλωσσον, id est, lingua canis: planta similis Anchusæ, id est, Orchanetæ nostratis est, sed sine caule, vel interdum modico. Non ea est, ut Scholiastes scribit, Lingua canis officinarum: nam Chynoglossum geminum folio est molli, venoso, latiusculo, lanugineo: canescit, ut altera quæ virosa est: & caulem ramulosum promittit cum floribus purpureiscentibus: atque illa, ut hæc, in sabuleis nascitur.

*Cylidrus* serpens à volubilitate dictus: quæ transit parte fumum emittere copiosum scribit Lucanus inquit: Tactique visa fumante Cylidri, de quo serpente in libro de Theriace plura Galenus.

*Cyperus* κυπερος, iuncus angulosus, & odoratus, vulgi nomenclatura officinarum Parhiensium Sochetum est: verum Cyperus Babylonicus, ut placet quibusdā, vulgaris Galanga est: quando Cyperus Indica, terra merita, & Curcuma ex Ruell. sententia radix eadem agnoscitur.

*Cyrtus* κυρτός Gæcis, Latinis, vel potius Gallicis regionibus Lygustrum est, siue Oleastrum. In Lygustro quæ visa sunt vtilia diligentius scripsimus: post Diosc. libro j. cap. cvij. Ruell. lib. j. cap. xciiij.

*Cytinus* κυτίνος, granati mali satiuæ, vel punice flos, vel pomum ipsum immaturum, ex primo eius partu florere incipiente, quod Cytinum appellat Plin. flores autem Balaustia ex ipso Cytino erumpentes hæc Barbarus. Legitur quoque Cytinus in Moro, & vocamus futura mora: quæ prima germinatio vnde promittimus malum punicum est Cytinus, hoc est, Punice satiuæ flos: Balaustium verò agrestis. Dioscorides lib. j. cap. cxxvij. Ruell. lib. j. cap. cxxv. in dict. Rhus.

*Cypsellus* κυπελλος, avis est hirundini haud dissimilis: viderique ea esse, quæ Apes apedis gentiuo: vulgo Martinetis.

*Cytisus* κυτίσος, frutex est odorem Etucæ reddens si digitis teritur: commanducatis item foliis gustum ciceris recentis percipies. Inuentus hic frutex in Cychno insula, inde translatus in omnes Cycladas insulas: mox in vrbes Græcas, atque per totam ferè Italiam. Duplex est Columella auctore, inuenitur enim in segetibus frutex albus, surculis cubitalibus, foliis ramulosis trifolij similitudine, dorso in mediis prominente, flore pisi luteo. Folia dum teruntur, Erucam subolent, commanducata, ciccer respiciunt: & hic creditur Cytisus esse agrestis.

*Cyttarum* κυτταρος, est nucamentum quasi panicula dependens è pinearum, roborum, & iuglandium ramis: de quibus fit mixtura medicamentis idonea muliebribus. Ruell. lib. j. cap. cxij.

*Cynanche* κυνάγχη, inflammatio est, quæ in interioribus musculis gutturis accidit: *απὸ πικρὰ καὶ γαλχὴν* verò est, quæ in exterioribus eiusdem musculis oritur: cuius est explanator Gale, lib. iij. de Locis affect. cap. v. Aegynera lib. ij. cap. xxvij. Repetenda est item dict. Angina.

*Cynoscobus*, Latinis testiculus canis interpretatur, quod adhuc officinarum plebs nomen hoc retinet. Dicitur à nonnullis Serapias, à Serapi Aegyptiorum deo nomine deducto, propter notatam magnam lasciuiam, qua is deus Canopi vrbe colebatur, ut scriptor est Arthianus de Alexandri magni gestis lib. viij. & Strabo de Serapi de, & Canopo, lib. xvj.

*Cypsi* Thymiaa ex Dioscoride, auiculæ cypriz respondere imaginatur: nam situs est ad delicatè olfacentes principes, & antistites, magnates, & mulieres molliores, compositus. Hoc itaque suffitu Aegyptij sua minima sibi placabant. Compositiois auctores sunt Diosc. Galenus, Plutarchus de sacris Isidis, & Osiridis, Aëtius, & Actuarius.

*CrySTALLUS* notissima est: gelū vehementius concretum quicquid ex niue, vel hyeme est, ChrySTALLUS est, ideo nunquam nisi in frigidissimis locis, & niuosis inuenitur. atque hæc vera ChrySTALLUS est. Reliquum, ut spurium, & ignotum medicis, relinquo.

## Delitica D.



**Dactylidium** δακτυλίδιον, scammonij liquoris nam Scammonia Dioscori di, ferula est ramos ab una radice trium cubitorum longitudine emittens, multos pingues, & qui nonnihil crassitudinis præ se ferunt: foliis hederaceis mollioribus tamen, hyrsutis & triangulis: flore candido, rotundo graneolente radice prælonga, graui odore, candida succo grauida, à quo elicitur larex, quod Scammonium, & Diacridion Aëuario effertur: medicamentosum valdè, purgatoriumque vtiens deprehenditur, vt stomachum, Galeno teste, doloribus, cruciatibusque grauissimis offendat.

**Dactylus** è genere Concharum est, ab humanarum vnguium similitudine sic appellatus. Item piscis genus: & dactylus latus gemma Plinio auctore lib. xxvij. cap. x. Dactylus præterea graminis genus est.

**Dactyli** δακτύλοι φῶνεις, palmulæ sunt, id est, palmæ arboris fructus nobiles: de quibus copiosius in dict. Palmula.

**Damaconium**, vel Alisma δαμασκόνιον, καὶ ἀλίσμα, quidam fistulam pastoris dicunt, nulla ad hanc herbam comparatione lo. Agricola alisma suspicatur, quia similia plantagini habet folia, & in terram aliquantò reflexa: flores candidos, & post illos in summo caule cubitali enata capitula magnitudineradices graciles, odoratas, modicè pingues, veratro nigro haud dissimiles, nisi quod non ita nigricant. Huius simplicis est luculentis. scriptor Diosc. lib. iij. cap. cxliiij.

**Daucus** creticus δαυκος κρητικός, Carota erratica est, & daucus alter, vulgò Asininus: sed tertius est, qui à superioribus latè differt, Diosc. auctore lib. iij. capit. lxxvij. Plinio libro vigesimoquinto, capit. nono, & Galeno libro nono, comp. pharmac. in malagmare Diaspermarum.

**Dapnoides**, empetalon, peplyon, Chamædaphne, nominiibus tot insignitur, quot popularibus medicis placet Laureola nostras, quæ fruticosa est: Latinis à soliorum similitudine Laurus erratica appellata: cubitalis altitudine ramulos habens multos, à medio in partem superiorem iunceo lentore, flexiles: flores non in totum candidos, sed aliquatenus virentes, fructum ante maturitatem viridem, sed cum maturuit, nigrum: & radicem inutilem habet. Dioscor. libro iij. capit. centesimotrigesimoptimo, Plinius libro xv. capit. vlrimo. Est quoque Dapnides reptilis, vulgi appellatione vinca-peruinea: quæ virginum corallis valde conuenit præsertim brunis, eius flos celestis sine odore, sed aspectu periuicundus habetur: aliquibus Clematis, quæ multiplex est, appellatur. Reperes dict. Clematis.

**Dasyus** δασυς, ex leporum genere est, rustica nominatione Cuniculus, scribente Polybio lib. historiatarum xij. animal nasci lepori simile κύνουβιον καλούμετον: idque animalculum Latino nomine Cuniculum appellare maluit, non secus ac si Græca lingua animalis eius nomenclatura destitueretur. Verum sic à Lepore distinguitur: Cuniculus procul visus primùm, lepusculus esse videtur, vbi verò in manus sumitur, plurimum discriminis habet non tam aspectu, quàm cibo. Nascitur autem ac degit maiore ex parte sub terra: cuius caro alimentis succique boni est, & modici recrementi, sed carne leporina salubrior. Plin. lib. viij. capit. quinquagesimoquinto, Aelianus lib. vij. cap. xxxix.

**Diæthio** cita, tarda, & assidua recrementorum expulsio est à natura incita: quoniam deticere, & meiere corporis affectuum sunt remedia, egestionemque vel in urinam retinere non modò annis, sed ne mensibus quidem: quin etiam nec diebus pauculis aliquis potuit. Verum deiiciendi, egerè diu faecultas ne destrueretur, totus tho-

rax vndique poterat stringitur, musculique omnes iuxta alium tenduntur in egerendo, magis vero qui in hypochondriis. Deijcere autem nequeant praterquam accedens fluxibus excrementorum adfistentes. Galenus de Musculorum libro secundo.

*Delphynium*  $\delta\epsilon\lambda\phi\upsilon\nu\iota\mu$ , quibusdam Sena interpretatur: sed delphynium herba est florem habens purpureum violae maritimae non dissimilem, sesquipedales ex vna radice surculos tenues emittens: folia autem diuisa, & praelonga, quae delphynorum effigiem repraesentant, vnde illi nomen. Est alterum *Bastinum* Romanis dictum, priori haud absumisse, sed ramis longè gracilioribus. Diosc. lib. iii. capit. sexagesimo octauo.

*Delphyn*, vel Delphynus piscis, numeratur inter Cetæ, ut qui animal etiam pariat, neque ideo compari piscis. Carne durissima, & crassa & lenta est, & ob id concoctum difficilem itaque vescentibus malum succum gignit. Aristoteles, & ceteri, quàm plurimi auctores multa tractant etiam fabulosa.

*Dendroides* Tithymali è septem generibus est, in petris nascens, ampliter opacat, in cacamine frondosam spargens comam, succo lacteo prægnans, & uiculis rubentibus, foliis mayti tenuioribus, fructu Characiz, atque effectus cuius superiores, similisque usus. Diosc. lib. iii. cap. cxlv. Tithymalorum genera suo loco sunt requirenda ad differentiarum notionem.

*Declinatio* cuiuscunque febris, vel morbi acuti, quartum morbi ipsius tempus est, quod vigorem sequitur. Declinatio siquidem contrariis incremento signisprehenditur, videlicet si tardius quàm consueuerunt, accessiones fiant: si breviori tempore durent, minusque affligant, ac præcedentibus sint mitiores: vigorem vero indicant, si in eisdem permanerint, & sibiipsis perquam similitima fuerint. Est enim vigor totius morbi vehementissima pars, præsertim si laudabiles crises futuræ sint. Si quidem accessio plurimo tempore anticipans, id est, multo, celerius inuadens, & longius, & multo etiam celerius vehementiusque affligens, effatu dignum in diebit augmentum.

*Decoctum* medicamentum est, quod paratur radicibus, foliis, seminibus, & floribus plantarum: ususque obtinuit, ut foliorum quantitas fasciculorum manualium seu manipulorum, fructuum numeri, reliquorum autem ponderis adiectione estimetur. Radicum verò quantitas uncias tres, ad summum quinque: seminum drachmarum quatuor, aut sex: florum manipulorum quatuor non excedat: aqua mensura in qua singula coquantur, raro libras duas, vel ad summum tres, superent, ne facultas multitudine absurgat. Cæterum cuilibet libræ aquæ, saccharis & mellis libra semis adijcitur: & odoramentorum cuius libræ decocti drachmae permiscuntur. Hæc sic putant opinantes Fuchsius, & Sylius.

*Definitio*, est rei quasi in vniuersum dicta, non tamen vniuersalis in propositione per singulas partes, siue in vniuersum deductio. Dialecticorum, & Galeni definitio est.

*Deleteria* medicamenta  $\delta\epsilon\lambda\epsilon\tau\epsilon\rho\iota\alpha$   $\phi\acute{\alpha}\rho\mu\alpha\kappa\alpha$ , noxia & mortifera dicuntur, quæ scilicet à calore vinci nostro non queant, neque concoqui, alia celerius, alia tardius mortem inferunt. Plura apud medicos Græcos & Latinos passim reperies.

*Delirium*  $\delta\epsilon\lambda\iota\rho\iota\sigma\mu$ , mentis alienatio est, proueniens ex cerebri intemperie, facultatis principis actiones viciante, qualem in senibus, & in iis qui morbis ardentissimis instantur, videmus.

*Delirium* à febris calore abundante, non autem à propria capitis dispositione fieri quoties existimatur: quoniam aliquoties à laterali morbo permanens euenit, sed à capite proprium habere affectum portendit: definitore Galeno Locorum affectuum lib. secundo, capit. xvi. Nonnunquam delirare solent ob vitium nonnulli quod in ore ventriculi, & febris ardentibus, & phrenetide, & perinemonia:

nia: quia delirium in laterali morbo, & perinenmonia, cum ad vigorem febris perueperit, sequi solet.

*Dendrolachnum* *Ἰνδρὸν* Græcis, Radicula Columella, cæterique Latini medici vocant: Itali Raphanum, & vulgus nostrum Rauanellam appellare voluit. Cæterum raphani radice cruda minutim confcissa cum aqua & salis momento, ad prouocandam ciborum appetentiam, & promouendas vrinas ytimur. Notandum quoque illud est, radicem raphani alias esse dulces admodum, alias subacres, alias omnium acerrimas: quarum succo cum oximelle ad vomitum excitandum vsus est Galenus. Raphanum præterea agrestem recenset Dioscorides, quam Bellicij in Anteromontis Comitibus Marnisicorum horro, prægrandem, & candidam radice, atque etiam gustatu feruidam & vidimus, & depræhendimus: quam Armorarum Romani appellant: nec mensis receptam. Est denique & alia radícula nomine *Strutium* *σπύριον* Græcis, quam Latinorum nonnulli Lauariam, & Saponariam herbam ab vsu vocauerunt: quod eius radix purgandis lanis admodum conferat: plebei sui more sulloniæ nominant: quoniam sullonibus apta est. Diosc. libro secundo, cap. centesimo quinto, sub nomine Radix: & Plin. lib. xiii. cap. xi.

*Depilatorium* Philoctetum est, quod visis alba, hoc est, radicis Bryoniz acinis pelles infici, & depilari possunt. Philoctetum præterea lachrima hederæ est, & Americæ salicis nigre semen: cuius effectus aquæ vitis vinaceæ lachrymantis post amputationem, habet. Clematis, vtriusque à radice succus depuratus, vel ex vtriusque grano, pro Philocteto usurpatur. Quæritur, Philoctetum nullo existere in capite proprio affectu. Idem author ipse Galenus libro secundo, capit. tertio. Locorum affectu.

*Densus*, est quod poros contrahit & cogit, frigidum, aqueum, non terreum, non æreum, non adstringens: vt aqua frigida, sempernuum, portulaca, & huiusmodi, cui contrarium rarefaciens.

*Densitas* cutis, & obstructio raritati contraria est, vt in corpore modò denso, modò raro: nam densitudo aliàs ex siccitate prouenit. veluti post feruores, aut fatigationes, aut post iras aliàs ex frigore, eoque vel simplici, vel adstrictoria vi: auctore Galeno lib. x. Methodi med.

*Dementia* *φωρις*, est cerebri, aut membranarum eius inflammatio: de qua re vi de plura in dict. Phrenetis.

*Demonstrationis* principium, & ipsius demonstrationis radix, non sunt nisi res sensui & intellectui manifestæ. Itaque demonstrationum duplicia sunt principia secundum genus: aut enim ex sensu, aut ex intelligentia certa demonstratio, & fides incipit. Galenus lib. ij. Alimentorum, cap. i.

*Desipientia*, est quæ trahimur feruida cholera in cerebro abundante: nigra verò in melancholiam: ætate autem, cum frigidis omnibus, causa quibus lethargia, & memoriz deperdita functione occupamur.

*Desipientia* propria *ἡπύχονος*, est quæ sine febre accidit, infania quoque esse videtur: verum desipientia altera est, quæ Græcis *ὑπὸ πρῶτον* est, quæ ob cerebri consensum accidit, & delirium Latinis appellatur: De his vide quæ oportet in dict. Insania.

*Delirium*, est accidens actionis eius, quæ à loco compote mentis prodit, continuis quoque vigiliis acuti morbi alicuius euidente causa accidit: interdum septi transversu affectus, aut vini meracioris largior potus, aut candescens ira promouetur: sed quod continuum affectus diaphragmatis, seu phrenum, efficit delirium, deprehenditur. Galenus libro secundo, & quinto Locorum affectorum, capit. tertio.

*Delirium*, quod propter septi transversu, seu diaphragmatis, affectum accidit, non multum quidem distat à phrenetide: quod mitigari solet per par-

tium ceterarum affectus: exceptis his, quæ à phrenibus contingunt, atque per febres ardeutes quoties morbus declinare videtur. Sed quod est delirium ferè continuum diaphragmatis affectus inducit, authore Galeno supra recitato.

*Delirium* si in laterali morbo permanens eueniat, caput primùm habere affectum portendit: neque mirum, nam delirate solent nonnulli ob vitium, quod in ventriculi ore consistit ex febribus ardentibus, & phrenitide, & perinemonia: sed cum ad vigorem peruenerit, sequi solet, nullo existente in capite proprio affectu. Denique delirio infestante multa varietate, inæqualem spiritum reddit, & languentem: prius tamen aliquis quàm deliret, frequens, ac exiguus ei cum pulsu anhelitus est. Author Galenus Locorum affect. libro quinto, capite tertio.

*Denarius* quàm drachma, plus est: constat enim, Largi descriptione, scrupulis quatuor, recentium tamen auctorum coniectura, drachma vna tantum. At hic grauis inter auctores differentia, iudiciùmque varium est: Plinius denarium esse scribit idem, quod Græcis drachma, eiusdémque Celsus, & Scribonius sententia sunt: qui septem denarios in vnciam mittunt, vt octuaginta quatuor duodecim vncias, siue libram absoluant: Galenus autem, aliique medicinæ scriptores Græci octo drachmas vnciæ tribuunt: & nonaginta sex, librar. Iam verò Galenus cum ex Scribonio medicamentum adducit, denarium semper drachmam reddit: etsi Romæ vtrique medicinam professus sit. In eo Latini scilicet, & Græci conueniunt, quòd denarium & drachmam continere sex obolos dicant. Celsus verò libro Artium quinto in hunc ferè modum scribit:

*Denarius* à me diuiditur in partes sex, id est sextantes: vt idem in sextante habeam, quod Græci in eo, quem obolum d' *ὄβολον*, appellant. Quidam locum hunc corruptè legunt, in sex vncias denarium ponentes diuidi à Celso.

*Dentes ὀδόντες*, in animante numero triginta duo, aliquibus viginti octo, tantum existunt: vtraque enim maxilla sedecim, aut quatuordecim habet. Priores octo incisorij *τομῆες*, quia secant, nominantur: His deinceps canini vtrinque hærent quatuor *κυνόδοντες*, sic dicti, quòd canum dentibus quàm valde sint similes. Molares & maxillares *γόμφαι, καὶ μύλαι*, viginti à latere vtroque numerantur, quòd scilicet his cibi, veluti molis cereales fruges tenuantur, ac attrerantur.

*Dentificium ὀδοντίζημα*, est quod ex polline tenuissimo, vel alumini, vel atramenti, adiectis liquoribus, succis, & destillatis aquis, componitur: maximè quidem secundum graues dentium dolores: Author Galenus lib. v. de compos. medic. secundum locos. cap. vltimoquem Aëgynera, Aëtius, Actuarius, cum Latinis posterioribus, sunt sequuti.

*Dentes* ex osibus tantummodò, mollium cerebri neruorum sunt participes: ob idque soli euidentem sentiendi vim habent: coniectore Galeno in libro de Osibus.

*Dentium* dolor omnis *ὀδοντῶδης* Græcis dicitur: sicut *ὀδοντῶδης* pruritus, estis, qui conceptis iam intra gingiuas dentibus, & erumpere festinantibus sentitur, quo solent infantes relatis ad os digitis identidem eos mordere, & ipsi gingiuas suas conficcare. Tradit curationem in integrum Fuchsius lib. j. med. Artis, caput. vigesimo nono.

*Dentitio* puerilis *ὀδοντοφυΐα*, est vbi scilicet è gingiuis iam prorumpunt dentes: hinc ferè affinis est *ἀμυδία*, id est, dentium stupor, passio sanè quotidiana, in qua acerbitate, aciditate uè cibi alicuius nondum maturi stupent dentes, nec alios cibos dolore conficere possunt.

*Dentalis* lapis, qui marini piscis alicuius dens forma intuitur, & interna cavitae. Est item *Dentex* piscis marinus sic Plinio vocitatus, in cuius cerebri capitis medio *Odontides Lapis* inuenitur: qui fortassis dentalis est.

*Derivatio* materię, est vacuatio quædam vicina semper ad latus: retractio verò semper ad contraria, sed non semper ad distantissima. Hæc enim fluentem humorem retrahit ea loca versus, à quibus ante fluebat, excrettricisque facultatis impetum in contrarium conuertit, & attractricis impedit tactum. Coneraria autem, sunt extrema extremis, extrema mediis, & media mediis. Explanationis author est Aca-  
kia lib.ij. Galeni ad Glauconem.

*Desillatio* *κατάρροος καὶ κἀρροπος*, est humoris ex capite ad os & fauces delatio, scribente Galeno libro tertio, de Sympt. causis. Hæc enim sub se complectitur omnes ex capite in subiectas partes defluxus, cuius genera tria assignantur: primum catarrhus, alterum, coriza *καρῖζα*, quod sit, dum ad nates decumbit humor: tertium, branchus *βράγχος*, hoc est rauco, accidit ubi ad asperam arteriam humor desillat, quod ob varias causas accidere solet: Curationis author Fuchsius lib.ij. de Mendendis morbo. cap. xxij.

*Desillatio* arte facta, est humoris alicuius à planta, animali, terreo, vi caloris facta extractio: veteribus intentata, neotericis vitatissima, propter hominum huius seculi molliciem, aut nouorum morborum malignitatem, præcipuè inuenta imitatione. Hæc Syluius, apud quem plura lecturus in libris de Simplic. & Cōpositorum præparatione.

*Deus*, est omnium creator in toto mundi globo per intimam præsentiam spiritus vnus residens, omnia sua potentia mouens, sua sapientia gubernans, & bonitate sua perficiens cuncta: quem spiritum mundi seu animam, Plato, Aristoteles, Pythagoras, & Vergilius crediderunt: à quibus libro secundo Natur. historię dissidet Plinius.

*Deus*, est essentia spiritualis, intelligens, æterna, verax, bona, iusta, misericors, casta, liberissima, immensa potentia & sapientie, pater æternus, qui filium imaginem suam ab æterno genuit, & filius imago patris coætærna, & spiritus sanctus procedens à patre & filio, sicut est patefacta diuinitas certo verbo, quod pater æternus cum filio & spiritu sancto condiderit & seruet cœlum & terram, & omnes creaturas; & in genere humano condito ad imaginem suam, & certam obedientem elegerit sibi ecclesiam, ut ab ea hæc vna vera diuinitas patefacta certis testimoniis, & per verbum traditum prophetis, & apostolis agnoscat, inuocetur, & colatur, & in vitam æternam suam deinde tradatur, & in vita æterna coram conspiciatur, & celebretur. Quæ definitio pertinet ad Dei ecclesię doctrinam. Hæc Melancthon Phisic. lib. i. cap. de Deo.

*Detensio*, seu depræhensio, congelatione *κατάρροος καὶ τὴν χῆν καὶ κατὰ τὴν ψῆν*, est subita detensio & occupatio tum mentis, tum corporis sensu ac motu priuati, ægro in ea corporis formæ & figuræ permanente, in qua fuit correptus. Hinc est quo cœmo laborantes interdum dormire, interdum apertis palpebris persistere, atque vel nutare, vel intentè oculis veluti congelatis, & immobilibus spectare videntur. Et quia in ea sensuum in anima priuatio est, cum totius corporis eorum quæ gelantur modo, concretionem, congelatio nominatur.

*Denarii* vnciæ sunt vndecim, in quo sunt scrupula ducenta & sexaginta quatuor, hoc est, duæ tertiæ, & vna quarta libræ.

*Destans*, pars libræ dimidia & tertia, id est, vnciæ decem: capit scrupula ducenta & quinquaginta.

*Distamnus* & distamnium *διεταμνος καὶ διεταμνον*, officinis zingiber hortense est, differtque à Distanno, qui Creticus appellatur. Folia eius pulegium similia, maiora: densa, lanugine obsita, facultate qua præstat pulegium esse expetiuntur. Quæ vulgò circumfertur radix, distamni non est, verum qui Creticus est, potu, & a positu laudatur magnopere. Quod pseudodistamnium vocant, multis in terris nascitur, antè dicto simile, sed minus quàm illud acriter eosdem affectus præbet, multò tamen inefficacius. Diosco. lib. iij. cap. xxxj.

*Diacodion* *διακόδιον*, medicamentum est, quod ex papaueris albi capitibus confectur: aliquibus diapapauer dicitur cum Plin. lib. xx. ca. p. viij.



*Dieta*, cuius contrarium Inedia est, valetudinariis aut ægrotis præscripta victus formula, siue ratio, Hippocrates de victus ratione in morbis acutis author est: quem secutus Galenus in *Met. med.* & in libris de Sanitate tuenda: post ipsum quoque quotquot fuere posteriores.

*Digitos δακτυλῶν*, ex genere testaceorum obductorum creduntur, qui ab Adriatici sinus incolis Cappæ dicuntur. Digni ideo appellari, quòd humani digiti speciem æmulentur, alioqui etiam vngues, quod eorum testa vagui similis sit, quemadmodum paulò supra recitauimus. Apuliz incolæ Imbricem piscem hunc vocant ab imbrice similitudine. Galeno autem, & Athenæo *γροδῖνος αὐλοῖς*, καὶ δὲ *δῖνος*, hi pisces videntur: quod scribit Galenus de Alimentis dura carne esse, & ob id *δωρεῖται τοῖς*.

*Diameter*, est quouis linea recta per centrum circuli transiens, virinque in circumferentiam circuli pertinens. Hæc autem linea Latinis dimentiens dicitur.

*Diaphragma διαφράγμα*, musculus quidam rotundus, penè in medio suæ latæ profunditatis neruosus: qui veluti paries spiritalia viscera à naturalibus intercipit ac dirimit. Latius medicis Septum transuersum, Platoni verò phrenes appellatum est. Huius functiones docet Galenus in prohemio primi libri Anatomici, administrationum, & Celsus Artium lib. iiii.

*Diaria* *ἐπιμεινῶσα*, febris est, quæ fit si in spiritibus immodicus calor acceditur: hæc sanè similis est ventro calido viri incluso, cuius vnica est accessio natura circumscrip-  
pta, vnde *Diaria* dicta est, nec vltra dici vnus naturalis spacium extenditur. Galenus curationis author est libro primo ad Glauconem, & libro primo de different. febr. capite secundo, & tertio. Fuchsius libro quarto de Medendis morbis, capite primo. Est præterea *Diaria* febris, quæ in tertium vsque diem extenditur, vt est quæ ex densatione meatuum oritur. Petendus est Galenus libro nono Methodi medendi, & Fuchsius libro quarto de Medendis morbis capite secundo. Item Gal. de Differ. febr. lib. i. cap. vii.

*Diabeter διαβητης*, diuturna est circa renes consistens passio, in qua supramodum sitiunt infirmi, atque subinde bibunt, exuberanter quoque reddunt id quod biberunt, eo à sua qualitate non mutato. *ἡ δὲ βίβωσι, καὶ οὐκ ὀφείλουσιν πίνειν*, hoc est, aqua inter ceterum aliquibus est, aliis *διψασκός*, ab inextinguita siti, vocatur. Curationis Fuchsius author est lib. ii de Med. morb. cap. xxxvi. *Sub lib. 6. de long. & breui. cap. 1. §. de uisita.*

*Diarrhœa διαρροή*, est copiosum sine ulceratione, & inflammatione alui profusum. Fit propter instrumentorū ventris imbecillitatem, alimenta copiosa, humidiora, & viscosiora, eorum eodemque corruptionem, mordicationem, item in ventre contentorum, defluxum quorundam è supernis ad ventris spatia, imbecillitatemque rectoricis facultatis. Fuchsius docet curationem libro tertio de Meden. morb. cap. viii.

*Diastrioi διαστρίους*, hoc est, tridui medja, quam libro decimo Therap. Methodi in Thessalios damnavit Galenus: nimirum quia & æger, vbi vires imbecillæ fuerint, protinus in primo, aut secundo die nutriendus, idque in accessu, quemadmodum eleganti à pætrabili historici loco supra citato docet ipse Galenus.

*Diartrosis*, est quæ ossium structura dicitur, quorum motus euident est: cui in oppositum *Synarthrosis*. Huius triplex est species, enarthrosis videlicet, arthrodia, & ginglymos: sic enim à recentioribus appellabantur: de qua re vide Galenum in libro de Ossibus.

*Dies iudicatorij*, seu decretorij sunt, in quibus firmæ pariter ac plurimæ sunt mutationes, & natura non solum cognoscitur, sed & in quos labatur circuitus, quos quaternarios, & septenarios dicimus, diuiditur. Retulimus cetera in dict. Quatern. & Septen. circuitus.

*Dies intereidentes* vocantur, quòd scilicet inter iudices, & decretorios dies intercedant, differuntque inter se mutuo, natura & vsu: natura quòd suæ naturæ ratione priores perfecti sint, & quod omnibus rectè factis, solius naturæ  
motu

motu, ac nullo alio impellente in iis crises fiant. Vfu, quia ad futuri vigoris & indicij cognitionem quaternionum circuitus fufficiunt. Ad crifim iam verò factam difcerendam num fcilicet fida aut infida fit, interdicendum cognitio conducit. Galenus de Diebus dect.

*Dies caniculares*, funt qui incipiunt à xv. Calend. Iulij, definentes verò Nonis Septē. numerum quinquagenarium complectentes. Qui isto tempore fanguinem fibi trahunt, & pharmanis videntur periculis, breui fpatio vitam finiunt: ficut vehementi atque frigore, qui fimiliter videntur, peteunt. Galen. libro primo ad Glauconem, cum expofitore Acakia.

*Dierum ceterorum* potentiffimus eft feptimus, in quo tum natura, tum cœlum morbum mouet: contra, periculofiffimus sextus, in quo horum neutrum adeft. Decimus quartus, feptimi naturam proximè imitatur, quia cœlum potenter mouet. Luna enim ex a duerfo locum in quo cœpit morbus, intueatur. Vnde decimus, & vigefimus feptimum fequuntur: hic, quòd tertiæ hebdomadis finis fit ille, quòd & impar fit, & fecundi feptenarii medius. Inter periculofos autem sextus prima obtinet: deinde octauus, decimus, & decimus sextus neque enim nature, neque motum experiantur, neque cœli potentiam. Dies itaque feptimus omnium fortiffimus eft, quem quartus prænuntiat: deinde quartus decimus, cuius vnde decimus eft index: poftea verò viceffimus, quem indicat decimus feptimus. Primam enim hebdomadam quartus dies in duo æqua partit: fecundam, vnde decimus: tertiam, decimus feptimus, & reliqui pari modo. Porro autem viceffimus, quàm primus & viceffimus potius decernit quòd qui ad hunc diem perueniunt morbi, diuturnorum naturam fortiuntur, qui paribus diebus iudicari folent: præterea hebdomas non integros feptem dies complectitur.

*Dydimi* dydimus, id eft, gemini tefticuli, qui & adftites, glandulofa carne præditi: hi autem ex ilium regionibus, mufculis vtrobique fingulis dependent: molli carne in mufculis deprehenfis, rotundi, oblongi, cauernofique, vt humidum quod in vafis præparatur extipiant.

*Digeftio*, eft aimenti ad fingulas corporis partes diftributio: primò ad ftomachū, atque ab ipfo per venas mefentericas, ad hepar: ab ipfo denique mittitur fanguis ex chyli fubftantia illic confectus per venas ad fingulas vaforum fanguinis vtufque partes. Siquidem in fanguine alteratio dicitur fanguificatio, quæ fit in iecinore ex chilo, vbi congregatio homogeneorum, & segregatio heterogeneorum eft.

*Dilatatio* pupillæ, fine effufio *μυδρίασις* eft, fcilicet quando pupilla colore nihil euariat, fed multò, quàm confueuit, latior fit, vt interdum iridis circulo appropinquet.

*Diphryges*, quafi bis toftum dicas, perfecti ætis veluti fex fubfidens, & cohærens imæ fornacum partij, tanquam viftorum in foco lignorum cinis, ablato æte vifitur. Gal. lib. ix. Simp. Diofcor. lib. v. cap. lxxix.

*Dipfacus* διψακός, aculeatorum generis caulem habens altum: & fpinis horridum extra folium, concauo alarum finu, in quo hymber, aut ros afferuatur, vnde non metu trahit fitiens, & fiticulofus. Petenda eft dictio, Labrum veneris, poft Diofcor. lib. iij. cap. xi.

*Dipfas*, ferpens eo quòd fiti inextinguibili demorfos afficiat, dictus eft Galeno teftante in Theriaca Pifonem qui à Dipfide eômorfus, canfo febre male conficiuntur: nam & multa fiti, & æftu vehemēti, interdum ftomachi motu vexari, diem obeunt, Lucanus.

*Signiferum* iuuentem Tyrrheni fanguinis Aulam  
Torta caput retro Dipfas caleata momordit.  
Vix dolor, aut fenfus dentis fuit ipfaque leti:  
Frons caret inuidia: nec quicquam plaga minatur:  
Ecce fubitus viri taciturnus, carpitque medullas  
Ignis edax, calidaque incendit viscera tabe.

*Dipfm*

*Distinctio* duopioꝝ, limitatio, seu determinatio est, definitio ac declaratio facultatis remediorum, cui affectui differentiz, à qua causa, in qua natura, quo aëre idoneorum: citra quas cum quid absolute pronunciat Galenus ad naturam temperatam in aëre temperato referri vult ad quales affectus, & quantos, & quo affectuum tempore illa sint salubria. Syluius de Medic. comp. rat. lib. ij.

*Distorsio* siue strabositas oculi, & obliquus aspectus, *σπαρμωδς*, est conuulsorius musculorum oculi bulbum mouēcium affectus: per quem aut sursum, aut deorsum, aut in obliquum torquentur oculi: atque ab ea passione Strabonē hoc est, toruis oculis inspicientes sunt appellari.

*Distorsio* palpebræ *χλωμωδς*, est, cū vtræque palpebra ex vehemēti inflammatione distorquetur, vt vix oculos operiant, & album oculi nigro sublimius sit, & rubrum ac muliam nigri partem occupat.

*Dodrans* pars libæ dimidia & quarta, id est, vnciæ nouem, scrupula ducenta, triginta.

*Doctrinici* sunt, in quibus nullum casum habent apparentem, qui causam indicet, in his percunctari non detrahant: idque causam principalem appellamus. Galeno definiōe libro introductiōum.

*Doctrina* communiter acceptum, est ex rei euidētia consensio, & compositio: proprie verò, est cuius rationalis secta doctrinica vocitata creditur: hinc medicina rationalis, nimirum & empirica, scē & quæ medicorum quàm plures sortitæ. Ex Galeno videlicet in lib. Comp. medicam. capite iiii.

*Dolium* sesquiculare, sexaginta urnas capit.

*Dolor* est, qui sanguinem ad se trahit, & sæpe partium debilitas phlegmonem, citra etiam plenitudinem corporis, procreat. Sic vbi magnus morbus fuerit, omnino sanguinem mittimus, etiam si nulla existat in corpore plenitudo, inspecta tamen ætate, & viribus: vt author est Hippocrates. lib. Viſus acut. cap. xviij. Quære dictiōnem Plenitudo.

*Dolor*, tristis sensus est: voluptas blandus sensus: itaque doloris species duas primas esse perspicimus, cum scilicet affatim temperatura altetur, atque cū soluitur continuitas. Gal. Locorum affect. lib. ij. cap. primo.

*Dolor* vbi vehemens est, quid scrutandū pro causa illa inuenienda, conueniet: quia doloris nequeunt cause adimi, nisi intelligatur cuius vitio is dolor excitetur: nam causam si ademeris, ægritudinem curaueris. Gal. meth. med. lib. ij.

*Dorycnium* *δωρύνιον*, siue, vt placet nonnullis, doricum, radícula aromatica est, & alba, etiam priscis incognita: officinis hodie notissima, quam I. Agricola in vulgari herbarum nomenclatura Pyrethrum, & herbam saluarem à Romanis vocatam, quod manſa affatim saluam eliciat, suspicatus est. Dioscoridi Dorycnium est frutex oleæ nuper prodeſti ſimilis, ramis cubito minoribus: foliis oleæ coloris ſimilibus, minusculis, firmioribus, præter modum scabris, flore candido, ſiliquis in cacumine ciceris, quinis intus ſemiſibus erui exigui magnitudine libro quarto, capite ſextageſimo quarto.

*Doricum* est præterea, quod manicum Solanum aliqui appellarunt: epotum, laetis ſaporem in gultu reſert, cōtinentes ſingultus ciet, humor linguam vexat: ſanguis cōſertim reſicitur: mucoſa quædam perinde quaſi dyſentericis, aluo egeruntur. Itaque venenum prorsus eſt. Dioſc. lib. vj. cap. vj.

*Dorycnium* ſtryclini eſſe genus Theophrastus reſert, radice lingua, cubitali, capite gethyi maiore, pilosiorēque folio erucæ maiuſculo, caule quatrī cubitali, pilulæ platani non abſimili. Tota prorumpit veneno herba, quam qui imprudens ederit, conſectum moritur. In ipſam herbam remedia docent Dioſc. loco ſuprà citato: Scribonius Largus ſuo libro Antidot.

*Doricum* radix ex Oriente ad nos adfertur, zingiberis craſſamento, nodiſcata, dura & ponderoſa, quæ Ruellio & Aegyneta, Arnabo ex Aëtio Carnabadium: & Arabibus Zurumbet, non zedoaria, ſuſpicatur: quod cum Geſnero Syluius exiſtīmauit. Nā Doronicum Rhomanum rumicis æuri folio à ſuperiori diuerſum oſtenditur:

ditur: cuius radix, quia dulcis, ut orientalis, non seruet: Scorpiique animalis effigie ostentatur: nisi quod tota candida intus & extra visitur.

*Dorsum* *παχὺς καὶ μετὰ σπονδύλῳ*, posterior thoracis pars est: huius pars spina *ῥάτῃ* existit, quæ vertebtis xxiii. constat. Nam colli sunt septem, dorſi duodecim, costas duodecim, excipientes: lumborum quinque, quibus *ὀπίον ἐπὶ ῥάτῃ τελευτῇ*, id est, os sacrum, à magnitudine dictum, latum & amplum subiacet. Huic opponitur parti anteriori os pubis, fulcimentum oneris ventris totius: à quo etiam agnoscitur sexus utriusque pubertas; maximo quoque auxilio esse solet grauidis, & parturientibus, quando naturæ beneficio dum peperint secedit, ac post partum se, ut ante, recipit, coniectotibus plerisque medicis.

*Dosis* proportio simplicium, quæ Græcis medicis, ut Latinis, dictio familiaris est, & compositorum pariter medicamentorum exhibendorum, vires & pondus non excedens.

*Draba* *δράκων*, quæ etiam Arabis *ἀπολλῆς*, vulgi nomenclatura, Cuminum sylue stre. Apud nonnullos herbarios Nasturtium orientale, & Babylonium interpretatur. Apud Dioscori herba ad cubiti altitudinē assurgit: tenues spargens ramos, & ex utroque latere folia, seu lepidij, sed molliora, & cãdidiora. In cacumine vero sambuci, vmbellam gerit, cãdidos flores habet enim: cuius herbe semen aridum pro pipere in obsoniis apponitur, Diosc. lib. ij. cap. cxlix. In dict. Nasturtiũ plura leges propter diuersa, apud varios auctores rei herbariæ scriptores genera.

*Draco* *ὀδράκων* terrestris & marinus ex genere serpentum perhibetur: sed præter hoc genus, est & piscis, qui à plerisque viua vulgi appellatione opinitur, quem Galenus Phylorini sententiam comprobans, inter pisces duræ carnis reponit.

*Draco*, vlcus est delationem à membro ipso vicino ad ipsum habens neruum, quod in motu secedit ad vlcus, & occultatur in eo: à quo per nominis diminutionem Dracunculus, à barbaris medicis vena meden appellatur. Neque quẽadmodum in quodam Arabiæ loco in tibiis hominum dracunculi vocati nascuntur, neruosa natura, colore, crassitudineque lumbrici similes: cuius quidem rei copiosissimus Locorum affect. lib. vj. cap. iij. scriptor est Galenus.

*Draconica* siue dracontio maior *δράκωντι αὐτομαλά*, plebeio vocabulo Serpentaria, & Colubrina dicta: sed Dioscoridi Dracunculus est, qui constat hedera ceo folio, magno, candidis notis insigni, caule recto, versicolore, maculis resperſo purpureis, ita ut æguem planè referat, baculi crassitudine. Nascitur in sepibus vmbrosis, ut Aton, vulgò getthu, appellatum, cui nisi magnitudine, haud dissimile est. Cetera elucies ex ipso Dioscor. lib. ij. cap. clviii.

*Drachma*, scrupula tria, obolos sex, silicas octodecim, pendet: quod medicis scire est proprium: alioqui illis vanum pondus.

*Dropax*, vulgari recentium appellatione, Sparadrapum, est quod ex sicca pice, gummivè alio, oleo quopiam liquatis, atque super petacea robustiore, interdum expansis, cõstat. Veteres tamen corporis partes affectas aliquas, non expanso super petacea dropace, simpliciter delinebant, atque calida interdum fovebant, dum decideret. Vſus huius in totius corporis partes, aut eiusdem partium extenuatione, attractione, lenitione, corroborationevè applicatione probatur. De re hæc fusiùs tractat Aegynera lib. vij. cap. xvij. & si plura desideras, Aëtius lib. tertio, capi. cxc. præter hos Mesue, Actuarius, Fuchsius, & Syluius.

*Dryinus*, serpens sic nominatus, quod in quercuum radicibus viuat, tam malignus ad petendum proditur, ut eius qui supergreditur imprudens, cutis à pedibus excorietur, tota crura intumescant, & quod mirandum magis est, manus quoque ipsas curantium eodem modo periclitari. Si autem quis aggredia tur perimere, olſadu multatur a deo, ut quilibet gratum odorem, prauum esse existimet, nec aliter præterea rei queat sentire. Hæc Galenus in libro Theriaces ad Pisonem. Dryini pestilens morsus, & curatio docetur à Dioscorido libro sexto, capi. trigefimo octauo. & quadragesimo. Similiter quoque scribit Largus Comp. med. capite centesimo nagesimo primo.

*Dryophenum*, *δρυοφένον*, herba est dryopteris persimilis, cauliculis tenuibus, cubitalibus, circumdati utrinque foliis oxymyrtine similibus, sed candidioribus, & mollioribus flore sambuci. Officinis nemoralis myrtus est. Ruellius libro secundo, capite cxxxv.

*Dryos* hyphear *δρὺς ὑψηρὰ*, genus visci est, copiose in quercu veteri, & cæteris arboribus, nascens. Est autem sui generis planta sponte proveniens, fruticosa, læta, semper virens, grauis odoris, buxi folio, baccis exiguis sine flore, Sturdus gratissimis, vnde natum prouerbum, Sturdus sibi viscum cecat: atque hoc ipsum nunquam in terra nascens. Plinius author est libro decimosexto, capite vltimo. Dioscorides lib. tertio, cap. lxxxv.

*Dryopteris* *δρυόπτερις*, filici similis herba, in arboribus & rupibus inter petras nascens, tenui foliorum subdulcium incisura, radice hirsuta. Hæc Myropolis, & officinis Osmunda regalis appellata est: quæ descriptio multum quadrat Polypodio, cuius dictionem petes. Dioscorides libro iij. capite clxvij. scribit in hæc verba: Psilotrum est cum radicibus trita dryopteris illinitur enim primum vsque dum sudorem euocet, mox sudor abluitur, & recens imponitur. Quære dictionem Psilotrum: & Plin. lib. xxvij. cap. ix.

*Drypetæ* *δρυπέται*, oliuæ sunt maturæ, & adultæ: & quasi iam ex arbore decedentes ita appellatæ. Ruell. lib. i. cap. ciij.

*Dulcis* radix Glicyrthis est, quam Theophrastus Scythicum vocat, quod Scythæ ea in bello sitim vitarent: atque ob id α' *δύλος* dicebatur. Veteribus, ut hodie in Gallis adhuc Arabicum nomen retinet, dicebatur. Galenus lib. vij. Medicamen. part. γλυκύν simpliciter appellat: Aetius interdum γλυκυρρίζον: Scribonio largo radix dulcis est. Dioscorides lib. iij. cap. quinto, vberius tractat formam, natale solum & vires.

*Dulcis* sapor, calidus modicè, coquit, maturat, laxat, rarefacit: quoniam in calidi & humidi temperamèto est. Si plura cupis, petenda est dict. Sapor: & Gal. lib. j. Simpl. med. facult. & de Alimentis.

*Dysstole*, *δυσστόλη* est eleuatio ac veluti adfurrectio, & arteriarum, & cerebri, & membrana rum cerebri inuoluentium, depræhensæ: quæ in longum, latum, & profundum tactui sensibilis apparet: cui contraria est Systole, quam suo loco repetes.

*Dysenteria* *δυσεντερία*, est intestinorum cum torminibus exulceratio: Latinis intestinorum difficultas, & tormen, quod in hoc malo torqueantur intestina. Interdum fit à causis extrinsecis, ut frigiditate, ardore, & humiditate: interdum malignorum medicaminum potu, scammonij, cotocynthidis, elaterij, euphorbij, esulæ, turpetic. daphnoidis, id est, lauroleæ, lapidis cyanzi, id est, fuli, de quo pilulæ fiunt, & similiū nec non à cibus stomacho imbecilliore inæqualibus. Curationē habes apud Fuchium lib. iij. de Medeu. morb. cap. x.

*Dysenteria* cruentæ tria alia occurrunt genera, Galeno lib. iij. de Sympt. causis an thore, primum est, in quo sanguis per quosdam circuitus excernitur, ob membrum nimirum aliquod præcisum, aut exercitationem vitæ derelictam: secundum, in quo sanguis aquosus, hoc est, qui aquæ in qua carnes cruentæ nuper maceratae, sunt ablutæ, similis est, deicitur: tertium, in quo sanguis & nigrior & splendidior eo qui naturalis est, excernitur.

*Dyspepsia* *δυσπεψία*, difficilis & ægra concoctio est, Gal. lib. de Sympt. differentia, tria ponit genera lætæ coctionis, inter quæ hanc miscet differentiam, ut a pepsia dicatur, quando cibus non mutatur, sed talis omnino permanet, qualis est ingestus, & hæc cruditas appellatur: bradypepsia autem, cum cibus quidem immutatur, sed ægritūs, seriuū & imperfectiūs hæc imbecilla & tarda coctio dici potest.

*Dyspepsia* verò dicitur, cum cibus mutatur in alienam qualitatem, naturæ nostræ non conuenientem: & hanc coctionem dicere deprauatam possumus. Hanc quandoquidem differentiam seculi medici minus obseruantes sæpenumero confundunt. Quære suprà dict. Concoctio.

*Dyspnœa* *δυσπνœα*, spirandi difficultas est, quod vitij genus senibus solet esse familiare,

miliare nonnunquam & iunioribus à pulmonum obstructione. Tres autem spirandi difficultates inuicem differentes traduntur: nam cum ea modica est, dyspnœa, cum vehementior, Esthma vocatur: cum verò euenit, vt nisi recta ceruice spiritus trahi non possit, orthopnœa appellatur. Quære dict. Anhelatio.

*Dysuria* δυσουρία, malum est, in quò vrina ægrè & difficulter admodum redditur: Latinis vrinæ difficultas nominatur. Huic propinqua est passio

*ισχυρία*, in qua vrina in totum supprimitur ac retinetur:

latine suppressionem vrinæ dixeris. Cætera in dictione, Vrinæ difficultas.



## Delitera E.



**E**benus arbor, natiuitate & regione nostratibus valde quidem inco-  
gnita: Arabibus ab India ideo magis frequens. Diosco. lib. i. cap. cxj.  
Ebenus optima habetur Aethiopica, & nigra, nullos habens vena-  
rum discursus, sicutij cornus laenore, cum frangitur densa apparet,  
mordens gustu, atque astringens: sufficit iucundo odore supra car-  
bones, sine sumi tædio, recens autem ad ignem prolata, ob pingui-  
rudinem accenditur, & trita ad cotem flauescit. Altera est Indica, cuius plenam de-  
scriptionem facit Diosco. lib. & cap. supra recitatis. Post hunc dict. Gayacum lignum  
petes.

*Ebenotriches* adianton est, cuius duplex genus occurrit, album nempe, & nigrum:  
ideo sic dictum, quia folia capillis Ebeni similia habet: atque hinc forsasse cor-  
ruptum vocabulum, inquit Hermolaus, ut vocemus capillum veneris: de qua herba  
plura scripsimus in dict. Adianton, & Capill. ven.

*Ebulus* χαυλακίνη, humilis Săbucus interpretatur, & herbaceo generi assignan-  
da, caule quadrangulo, geniculato, foliis amygdalæ, ex intervallo longioribus, geni-  
culatum expansis, pinnatisque, graneolentibus, in ambitu ferratis: mulcario sambuci,  
flore & acino eiusdem radice nititur longa, crassitudine pollicari: vis eadem, cuius  
& sambuci: cuius dict. petes. Diosco. lib. iij. cap. clv.

*Ebisus* ἑβίσκος, malua ruralis est, quæ hodie in hortis magnatum magno appa-  
ratu colitur, & editur tum cocta, tum recens nata, & ad emolliendam aluum, exone-  
randâve, quàm ad renum cruciatus difficiles. Medici quinetiam maluarum (quo-  
niam genus triplex passim occurrit) decocto in clysmis ad aluum ciendam & vrinas  
vutuntur. De his plura in dict. Althæa.

*Ebur* olisium Elephantis animalis quod ex dente est, præstat tota substantia cor ro-  
borare, & conceptum iuuare practiciis Arabibus, & Latinis neotericis, non Græcis, &  
Latinis veteribus, scribitur. Diosco. lib. ij. cap. xlvij. docet adstringendi Ebur vim ha-  
bere, & in scobem redactum tenuissimum paronichia sanare: neque vires plures obti-  
nere suspicandum.

*Echinus* ἑχίνος, varius genere quidem est: qui piscis est orbiculatus, & ex ge-  
nere testæ obductorum, atque ut terrestris, vndique aculeis armatur, quibus pro pe-  
dibus ad gradiendum nititur. At terrestris dorso tantum, non ventre, armatur acu-  
leis venenatis, pedibus quatuor, ut cuniculus, sed tibiis breuibis, nititur: atque  
se contra canes in orbem breuiter contrahit, armaturque. Medicorum aliqui hoc ani-  
mal ad medicinæ vsum diligenter obseruant. Erius ruricolis communiter appella-  
tum Terrestris Erinaceus feminei sexus animalibus perniciosus adeo experitur,  
ut suo si sudore, vel vrina fructum aliquem tetigerit, quameunque vel herbam, dein  
inscia, quæ grauida est mulier, aut aliud semineum animal, edat, mox quicquid in  
vtero est, in Erinaceos non paucos, ut in boue semina adnotavi, transmutatur. Dio-  
scorides lib. ij. cap. primo facultates animalis vtriusque docet.

*Echium* ἑχίνον, buglossum syluaticum est, herbariis autem leprosarum. Quinetiam  
Dioscorides Echion lib. iij. cap. xxviii. quibusdam nostratis buglossi species esse su-  
spicatur, quod borraginis flores æmuletur quadam effigie, & colore, nisi quod minùs  
lancinosi sunt: ut ab I. Agricola adnotatum est. Quidam interpretes deductam her-  
bam volunt à nomine ἑχίς, id est vipera, aduersus cuius ictum pollet. In dict. Buglo-  
sum discriminatum, nec obiter, differuimus.

*Eclipsis*, est quando Luna inter terram, solémque secundum diametrum locatur:  
vel est, quando terra inter solem, lunamque secundum diametrum ponitur. Solem  
enim



enim semper sub Ecliptica esse linea, non etiam cæteras planetas: sed lunam non habere per se lumen, sed à Sole accipere, quoniã terram esse longè maiorem certò constat, quia fieri eclipsis minime potest, nisi secundũ diametrum. Nam corpus esse densum, & non translucentum omnibus apparet.

*Eccartharticum*, hoc est, poros omnes expurgans, acris est, partiũ per adustionem tenuium, non glutinosum, ut nitrum, aphronitrum, abrotanum, orobus, lupinus amarus, amygdala amara, abstinthium nostras, sabina herba, & huiusmodi, sed hæc & similia poros cutis non purgant, internos sed & latiores repurgant.

*Ecephalica*, id est, obstructionem tollentia pororum, tum interiorum, ut hepatis, lienis: tum exteriorum, ut cutis: hæc etiam sunt rhyptica generatim dicta.

*Eesthalica*, id est, mentem alienantia, sunt crocus, in magna copia exhibitus: solum manicum, hyosciamus, id est, faba suis, papaner nigrum, sicuta: & huiusmodi.

*Eestasus iniquus*; stupor corporis, & mentis motio ex re aliqua repente oblata: ut cum ad subitũ temerari conspectum protus obstupescimus. Galenus insaniam non diu perseverantem interpretatur in libro de Definitionibus: quod qui hanc patitur, extra seipsum quodammodo constitutus est: & hunc mente commotum vocat Plinius.

*Eestio ex humore*, id est, *ex humore*, est ubi sanguis ex contusione, aut ruptione cutem subit, atque hinc exit.

*Egestio* optima; est mollis, compacta seu coherens, eodem tempore quo in secunda valetudine assuevit, reddita & quæ iis quæ ingesta sunt proportionem respondet. Secundum naturam se habet ea quæ subtrusa est, nec admodum fortens. Hippocrates Pronost. lib. ij.

*Egestio* mala & præter naturam, est dura, diuisa seu liquida, aspera, nec ea quæ sanitatis tempore consueuerat, excreta.

*Egestio* mala exactè rufa, vel nullo modo rufa, sed colore similis cibo ingesto: hæc enim cruda, & nihil bilis in ventrem omnino fluere, illa verò plurimum denunciat.

*Egestio* rufa vehementer circa initia, biliosiores morbum indicat: si in declinatione apparet talis, corpus purgari probè significat.

*Egestio* viridis, est bilis æruginosæ nota, sicuti nigra vel atræ bilis, vel sanguinis in eo loco adusti. *Egestio* liuida, partium interiorum validum frigus, ac veluti mortificationem monstrat. *Egestio* pinguis, ubi nihil tale fuerit assumptum, colliquationis, ac consummationis corporis signum est.

*Egestio* viscosa, colliquationis signum pariter est: fortentè nimis neque exiguum ostendit putrefactionem. *Egestio* spumosa fit, cum aliquid quod seruet, aut flatuosus spiritus cum humiditate pugnat.

*Egestio* varia, corpus variis affectibus obnoxium ostendit, & maligna ob diurnitatem existit. Fuch. Meth. cap. xliij.

*Effectus* præsidiorum in medicina sunt multi & boni, & qui ex vno præsidio possunt sequi quod ab vno, quatenus effectus vnus, possunt varij effectus prodire. Hæc Manardus Epistolarum lib. xij. Epist. v.

*Effectus* præterea est, qui in suas semper proximas causas, ut febrem in putredinem, hanc in prohibitam dicas transpirationem, quam in meatum constipationem, rursus hanc in obstructionem, & adstrictionem, resoluitur. Acakia super libro primo Galeni ad Glau.

*Elapboboscum*, *ἑλαφβοσκον*, serulacea herba est, geniculata, digiti parui crassitudine, semine corymbi, dependentibus foliis, olusatri, commendata in cibis, contra serpentum omniumque aculeatorum ictus. Neque ea est, quæ officinis gratia dei, & auriculæ leporis appellatur: cuius umbella aniso, vel feniculo haud dissimilis: folia linguam potius, quàm auriculam leporis æmulantes. Cuius descriptionis Plinius auctor est libro & capite vigesimo secundo. Dicitur & ophyostonum, quod ea herba mansa cerui se arment auctus serpentes, atque hanc præualere renum calculis infringendis, mox quoque protrudendis experimentò est. Dioscorides libro tert-

tio, capite sexagesimo quarto.

*Elate* ἑλάτη, speciosus est abietis vnguentis nascens, quam alij palmam, alij sparten appellant. At gyneca cum Diosco. & Galeno, Elaten vocat tenerum Palmæ germen, quoddamque piosilientis fructus operimentum: cuius ratio verisimilior, quam Plinij, quia qui cum Plinio ipso abietem inter vnguentorum materias enumeraverit, haud faciliè invenias. Lege Plinium libro duodecimo, capite ultimo: & require subia de quæ Abies.

*Elatine* ἑλάτη, Gesnerus rapum terrestre interpretatur: est & Elatine, quam Ruellius, hæc nomine pimpinellam appellat: quidam etiam alij Parpasium gramen Elatinem esse voluerunt. De qua, re Plinius lib. xxvij. cap. nono. Dioscori. libro quarto, cap. xxxij.

*Elaeterium* ἑλάτηριον, succus cucumeris erratici est, facultate omnibus ventibus cognitus. Elicendi autem succi à radice formam docet Dioscorides libro quarto, cap. cxxxvj. Plinius libro vigesimo, capite primo. Verum ita à satiuo cucumere differt hic Dioscoridi sententia, solo fructu, quem longè minorem parit, oblongis glandibus non dissimilem: & radice longiore, trasiorèque, quam habet à satiuo etiam differt: nascitur in sabaleis, & rudibus, frutice in totum amaro. Infiltratus foliorum succus, aurium dolori convenit stillita ex polenta radix, veterem omniem tumorem discutit: tubercula rumpit cum resina apposita: podagras cum aceto cocta discutit, nec minus prodest isdem radice doloribus. Radicis succus sesquibolario blem, pituitamque deicit. Cætera ex Dioscori. petes. Nos in Chyrurgum Italico morbo vexatis portigentem Elaeterium, sic his versibus Lusimus:

*Dulce quod hic prestat, durum medicamen aegrestis*

*Est cucumis: sibi nam tu, arthriticisq; bibes.*

*Hinc malè quæ purgat, potiuntur corpora morbis*

*Italici, sed non apta medela tua est:*

*Se venis exiret morbus, gravioribus audax,*

*Arte tua miserè quam velis ipsa mori.*

*Per sanant corpus non nunquam elatoria flexum;*

*Ardores gelida non fovet ignis aqua.*

*Elaeter* ἑλάτηριον, lapis est è genere hæmatitarum, atrobustis præcipuè utilis: ita dictus quandiu crudus est, nam coctus Miltus appellatur Plinio libro trigesimo sexto, cap. xx.

*Elleborum albus* ἑλεβορός λευκός, veratrum album etiam dici solet. Vtriusque radix, tum nigri, tum albi ellebori multiplex, tenuis, ab exiguo, & longo capite procedens: alba radix calida sicca ordine tertio: sed nigra gustu calidior, amarior. Elleboro albo abundat Segusia regio, quam partij bellicensem dicunt, nigro elleboro Alpinates, & Vocuntij, siue Vafiones: hodie Gappenses nominare hic ex anticyra melior, ille ex Syrenaica regione. Elleborus niger nomine, alio nomine Melampodium, id est, veratrum nigrum, ab inventore Melampode pastore, qui eo Pretidas furentes fertur persanasse, dictum est. Dioscor. lib. iij. cap. cxxxij. & iij. vires in integrum, & medendi formam, explanat.

*Elleborinè*, herba est exiguè foliis ornata, quæ ex Epipactis Dioscori. lib. iij. cap. nonagesimo quarto & Plin. libro vij. capite ix. dicitur: iccinotis vitis utilis, & contra venena pota.

*Eithaca* pafsio, ἑΐθας, est intestinum tenuium gravissimos, & letales dolores inferens, cruciatus, sic à doloris circumactione etiam voluulus appellatur, siue χορδαίλος, quod conuolui intestina, ad chordæ similitudinem videantur. Id vitij contrahitur continua ciborum corruptione, & cruditate, maxime autem à pinguibus carnibus: oboritur etiam ex plagis ac ictibus quibusdam, iis locis ubi intestina tenuia sita sunt, factis ex frigore vehemente contingente, ac recramenta retinente: contigit & iis, quibus intestinum in scrotum vna cum stercore delapsum est, indeque violenter retrahum, ex eoque inflammatum existit. Fit interdum ob veneni portionem, & ob induratum

induratum sterco, circa tenuia intestina im pactum. Illos passio hæc pueris familiaris, & curationis naturæ beneficio, facilis: senibus autem non familiaris multum, sed difficilimæ curationis, ut ferè ab ea nunquam resurgant. Fuch. lib. tertio. de Medendis morbis, cap. xliij.

*Electrum* ἡλεκτρον, succinum est, & quarundam pipei generis arborum lachrima, non populi arboris, ut quibusdam placet, à succo succina gutta dicta ab eiusdem arboris resina: quam populum albam Dioscorides verbis sequentibus suspicatum est, sic inueniens: Resinam populus fundit, quæ in malagmata additur. Hæc quoque superaddit: Lachrimam populorum memorant, quæ in Padum flumen defluit, durat, ac cohere in succinum quod electrum vocant, alij chrysophorum, quod aurum colore imitetur. Dioscoridi C. Tacitus contradicere videtur, dum hæc inquit in libro de Germanorum moribus. Sed & Eduorum gentes Sueuorum Germaniæ populorum vicini, mare scrutantur, ac soli omnium succinum, quod Glesum vacant, inter vada, atque in ipso littore legunt: nec quæ natura, quæ uero ratio gignit, ut Barbaris quæsitum compertum uero diu sciri potuit: quinetiam inter cætera ciuitatenta maris iacebat, donec luxuria nostra dedidit nomen, ipsis in vltimo vltimo, rûde legitur, & informe perferitur, preciumque mirantes accipiunt: Succum tamen esse arborum intellegas, quia terrena quædam, atque etiam voluctria animalia plerumque interlucent, quæ mox indurescente materia eliduntur. Non ergo ex populo ad Padum fluuium, sed ex pinæ arbore ad mare lachrimati certum est hoc gummi genus. Martialis poeta.

*Quam Phæobonthea formica vagatur in umbra,*

*Implicuit tenuem succina gutta feram.*

Arabibus medicis Charabe, & Cacabre dictum est: quos rudiores Latini medici habentus sunt sequuti, & nomen permansit. Vulgus popolare, Ambrum, quod in corollis precariis frequens, vocat.

*Electaria* ἤλεκτρα, sunt medicamenta ex antidotorum speciebus, odoratisque aliis rebus, & medicamentis supplicibus in pollinem redactis, saccharo adiecto, quæ componuntur. Varietatem autem conficiendi apud Mesuem, Nicolaum, & Aetrium reperies.

*Petroselinum* ῥοδοσέλιον, quod Diosc. vocat, est id quod vulgò Apium vocamus. Petroselinum autem nostrum vulgare, est id quod ille vocat Oreoselinum, hoc est, Selinum montanum, quod in montibus, & saxosis locis potissimum crescit: unde nomen petroselino: quod est persillum nostrum: Græcis selinû. Quod autem Petroselinum nunc Macedonicum vulgò vocamus, apparètque Selino nostro maius, grande Apium nostrum est: Latini, ut placet Columellæ, Olusatrum dixerunt: Græcis, Hipposelinum dictum est. Non igitur est Oleoselinum Apium palustre, sed hortense, & domesticum. Diosc. li. ii. cap. lxij. diuersa Apiorum genera assignat, quem peres.

*Elelisphascus* ἡλεκισφάκος id est, Salvia nostra, dicta quod saluos nos seruat & efficit: quam etiam ἀλβύρα, hoc est, medendi viribus præstantem vocat Nicander in Theriacis. Est autem duplex, maior, quæ minùs efficaç est: & minor, quæ maioribus pollet viribus, à Theophrasto Sphacelus appellata: quæ à multis Lauandula suspicata est: ab aliis item Nardus Celtica putata, quæ potius psedonardus est. Dioscor. lib. iij. cap. xxxij. Apuleius Plat. lib. ij. cap. j.

*Elementum*, est ex quo primo & simplicissimo cuncta sunt facta, in quod primum & simplicissimum cuncta resoluntur: quod in calidum, frigidum, humidum & sic cum distribuitur: ex his autem primis apparentibus, & simplicissimis, & minimis homo constituitur, & in quæ vltima tandem apparentia, simplicissima, & minima resoluitur: atque hoc ἑσῶν ἥτοις Græcis dicitur, quod similiter Latinis Elementum sonat: est quidem minima rei, quam constituit, portio. Definitor Gal. lib. ij. de Elementis.

*Elementum* est prima & simplicissima pars, quæ in alias diuidi non potest: elementa vero rerum omnium cõmunia & primaria, hoc est ex quibus & in quæ simplicissima cuncta & constant, & resoluntur: quatuor existunt, ignis, aer, aqua & terra: à

quibus & temperamēta calidum, frigidum, humidum, & ficcum: hinc quoque humores, sanguis, bilis flava, pituita, & bilis atra: à quibus etiam corporis partes formantur, caro, os, cerebrum, cor, iecur, caput, manus, & huiusmodi, atque ab his facultates, animalis, vitalis, naturalis, & postremo partes spiritus à subsequētibz actionibus, vitalis & naturalis. Lege lib. de Natura humana Hippoc. Galeni li. de Temper. & de Facult. naturalibus.

*Elenium* ἐλενιον καὶ ἐρυσσον, vulgò Enula cāpana, cuius in radice vires tantum experiuntur, superuacuis flore & foliis. Conficitur radix, & conditur cum saccharo, ad thoracis robur reparandum, & vires recolligendas.

*Elegma* ἐλεγμα καὶ ἐκδημα καὶ ἐκδηρον, medicamentum est quod lingitur, & lambitur verius, quàm deuoratur, & retentum in ore aut linguę subditum paulatim liquefit tabescitvè: Loch medicorum vulgus nominat. Cōpositionis auctores sunt Aëtarius libro quinto comp. Medicament. Fuchsius libro secundo, capite vni decimo, Mesue, Nicolaus, & Syluius.

*Elephas* ἐλεphas καὶ ἐ'λεφαντίασις, vniuersi corporis tabes, siue lues: quàm Leporam falsò practici vocant. Aliquibus autem medicis corporis vniuersi canceralis verò Leporam ipsam contentio est. Id nominis nactum hoc malum, quod in eo curis corio elephanti animantis persimilis videatur. Nam maculis quibusdam ad artum colorem vergentibus inficitur: inaequaliterque aspera, crassa, ac veluti squamis feda, liuens, ferināque redditur. Quod Elephas morbus differat à lepra nihil Arabibus docet Fuchsius libr. secūdo Paradoxorū, cap. decimosexto: & Galanius in Paraphr. de Inaequali intemp. & Galenus ij. li. ad Glaucum Acakia explanat, & Plin. li. xvj.

*Elmuther* ἐ'λμυθίς, vermes sunt ex lūbricorum genere: quorum duplex est differentia, inter teretes scilicet, & latos, in intestinis ex corrupto humore nascentes: non nunquā & in ventriculi fundo vehementi cū cruciatu depræhenduntur Galeno auctore Meth. med. li. vltimo, versus fine.

*Embrocha* seu ἐ'μβροχῆ, vulgò embrocatio, est quæ ex herbarum, florum, seminum, radicū, frondium, & aliorum simplicium cum aqua aut vino, decoctio fit. Cōponitur quandoque pro capitis, aut partis arterius ardore vehementi ex aceto & oleis tantum facultate refrigerantibus: & contrà, ex calidioribus in partibus vehementer stigidatis aut refrigeratis. Nec in hoc notabor, si diligenter super vocabuli significacionem perpendat lector, quid sonet Embrocha.

*Embryo* ἐ'μβρυόν, fœtus est in vtero conceptus, antequam lineamenta suæ speciei accipiat: quod serè accidere solet circa quadagesimum secundum à conceptu diem, quo tēpore & anima illi infundi creditur. Hunc enim in procreatione hominis ordinem esse volunt, ut sex primis à conceptu diebus semen in vtero conceptum lacti simile existat: nouem proximis in sanguinem vertatur: duodecim deinde aliis in carnem: postremò quindecim aliis speciei suæ lineamenta omnia acquirat: iisque exploratis anima rationali animetur. Itaque vsque ad quadagesimū secundum à conceptu diem propriè Embryo dicitur, quòd intus in vtero alatur, non secus ac fructus in sua arbore. Gal. in libello de Conceptu, & Semine auctor est. Aristor. in lib. de Anima.

*Emicranie* ἐμικρανία, est dolorifica passio, quæ in altera duntaxat capitis parte aliquando dextra, aliquando sinistra consistens, iuxta futurā secundum longitudinem eius extensam, terminatur.

*Æmophous* ἀ'μοφῶς, sanguinis missionē sunt refugientes, ut à Erasistratei medici notabantur, sicuti in libro de sanguinis missione scriptum reliquit. Hos infestatus odio vehementi, quòd in morbis acutis viribus adhuc firmis, ægros principio morbi per sanguinis missionem purgare refugerent, sed triduo ieiunos redderent, nec nisi postea cū morte reficiebantur. Tota Galeni methodus huiusmodi reprehensionibus abundat.

*Epigenima*, est non omne symptoma, sed quod solos morbos necessariò sequitur: contrariū à symptomate aliquibus opinio est. Quā difficultatem absoluit Galenus lib. j. de Symp. differentiis.

*Empirica* hæretis, est quæ notatur concursu symptomatum: morbi cuiusque ignorantia: auxiliorum vtilium per vsum cognitio: collectione antea expertorum: a simili transgressu.

*Emmotum*, medicamentum est quod lineamentis, vel lintecolis, substantia humida suscipitur. definitore Acakia lib. ij. Galeni ad Glau.

*Emneaphyllon* ἐννεαφυλλον, Consiliginis, quoniam vrentis facultatis est, eadem Gesnero videtur: quam vulgus officinarum, & rusticorum Patam leonis, & Pomeleā vocat. Ea sanè est, quæ medicis nonnullis Elleborus niger falso suspicata est, & vsui lecta non sine mortis periculo fumentium. Quare Leontopetalon.

*Empetrum* σακίστρα est, foliis Cristæ maridæ persimilis, quod scriptum reliquimus in dict. Saxifraga.

*Empyima* ἐμπίυμα, purulenta excreatio, ac suppuratio ex pulmone est: unde ἐμπίον κοί, hoc est, suppurati nominantur. In hoc siquidem malo in vacuo inter thoracem & pulmonem spatium pus consistit: sicut scriptum reliquimus in dict. Purulenta excreatio.

*Emplastrum*, sunt quæ ex herbis, floribus, radicibus, seminibus, succis, metallis, liquoribus, speciebus, oleis, & gummi commistis vniâque coctis componuntur: quorum species leuiter contunduntur, in crassiorémque pulcrem vertuntur. Compositionis authores sunt Galenus, Aegyneta, Actuarius, & cum Aëtio, Mesue.

*Emplasticum*, id est, illinens, quod poris corporis illitum tenaciter hæret: est glutinosum, terrenum, non acre, vt butyrum, adeps, oleum, gummi: sic aloë, bolus armenia sarinæ, addito liquore emplastra euadunt. Compositionis author est Aëtius lib. i. cap. j. de Re medica.

*Empirici* ἀπὸ τῆς ἐμπειρίας, hoc est, ab experientia dicti. Hi quidem primum ad symptomatum συνδρομὴν respiciunt, & convenientem ex eis curationem accipiunt, atque obseruant: idque nec pathemare cognito, nec causa inquisita συνδρομὴν autem appellant, symptomatum, quæ in patiente sunt loco: vt docet Galenus Meth. lib. ij. & Fuchsius Comp. Medic. cap. iij.

*Emphrastica* eadem sunt quæ emplastica, poros omnes obstruentia suo lentore: quos aloë tamen sumpta amarore terget & aperit. Dulcia quoque hepar & lienem promptè obstruunt, quia seu incunda cito ab his rapiuntur ante coctionem.

*Emprosthotonus* ἐμπροσθότονος, spinæ dorsû affectus, cum scilicet illa obriguit, & inflexibilis facta est, atque ita in anteriorem partem incuruatur, vt omnino erigi non possit. Huic affectui Tetanus, & Opisthotonus parum sunt dissimiles, quod Emprosthotonus, cum in anteriorem partem spina inflexa sit, dicatur. Opisthotonus cum ea in partem posteriorem est incuruata: Tetanus autem cum recta obriguit, ita vt neque in anteriorem, neque in posteriorem partem flecti queat.

*Epimelis* ἐπιμελὶς, genus quoddam arbuti, cui eandem omnino vim Gal. & Aegyneta reddiderunt, hoc addito, quod fructum miuecyon nominant. Diosc. congenerem fecit Mespilo. Si Brassanolo credendum est, Epimelis nostras vera est. Galenus in Exegeſi vocis Hippocratis, scribit fructum huius arbotis dici ab ipso Hippocrate. μύδα, sicut reulit Scholiastes. Quare dict. Mespilus.

*Ensisformis* ἐνσιφοειδής, osi pectoris ad finem subnata cartilago est, & scutû oris stomachi, & pomû granatû, & cartilago mucronâra à Batbaris accepit nomen.

*Encorema* ἐνκόρημα, vocatur illud quod in matulæ medio innarat, quæ ad modum in summa matulæ parte cernitur, nubes appellatur: quod verò in fundo subsidet hypostasis est. Hæc Fuch. in Meth. sed Actuarius voluendus est in lib. quos inscripsit de Vrinatû notitiâ: quando nemo medicorû doctus & fidelius tradidit.

*Enarthrosis*, est cum excipiens caui ad modum altû est, caputque id in id inseritur oblongum. *Enumeratio*, est vbi singula quæ rei alicui insunt, enumerantur: vt differentiarum divisionis in sua significata, & subiecta in sua accidentia. Cuius rei desinitor Acakia super primo lib. Gal. ad Glauconem.

*Encanthus* ἐνκάνθης, morbus oculorum est, cum in maiori ipsorum angulo tuberculum enascitur, quod genas patum patitur diduci impedimento est.

*Ephemerum* ἐφμερον, liliū conuallium pro maiore mugueto interpretatur Gesnerus: at muguetum quidem radice bulbosa non est, sed rara, tenuique, quod in lilio conuallio deprehenditur. *Ephemerum* alterum, quod κόλκινός est, veneno abundat: rusticis crocus pratensis, & autumnalis vocatur. Diosc. li. iij. cap. lxxxij. & libro sexto cap. quinto.

*Epithemata*, sunt quæ ex xilooloe, santalis, ligni balzami, floribus buglosi, rosarum, torisinarini, granis rubiz rinctoris, radice tormentillæ, bolo armenica, terra sigillata, speciebus odoratis, aquis liquatarum herbarum extillatis, ætico vino, aceto, & similibus ad partes corporis animales affectas correspondentibus, prout medico placet, neque secundum veterum auctorum usum, componuntur. Vide Fuch. li. iij. cap. viij. de Composit. medicam.

*Epithymum* Γεζορον thymi flos est, satnreixque similis: huius loco si Arabum epithymo, hoc est, cassutha thymo innata, ut satnreix seu thymbræ epithymbrum Actuario dictum: & hyssopo, & maioranæ, epissopum: & orobo orobanche, & lino linanche, ut licet: quia vires cum thymi flore easdem illi solus veterum Plinius tribuit. *Epithymus* autem Arabum, ut thymus, est duplex, hortensis, & montanus. In Actuario leges sæpius κόλκινός, & κόλκινός, & κόλκινός, & κάσσιος, pro cuscuta Diosc. li. iij. cap. elix. Galenus Simpl. li. vj. & Meth. med. li. xiii. Syluius de Simpl. natura li. j.

*Epiplooele* ἐπιπλοοκὴ, herniæ species, cum omentum descendit in scrotum: cui Enterocoele etiam affinis videtur. Quære dist. Hernia.

*Epiroteia* malus, & epiroteum malum profectu, est orbiculare pomum, regionis suæ appellatione Cappenduum vocitatum videtur: aliquibus paradisi pomum, aliis item Diso Ioanni pomum nomine dicatum. Arabibus Musum quasi dulcore in succo abundet, & situpis idoneum, appellatum est.

*Epirotis* febris, est in qua simul febricitant & rigent, atque eodem tempore in omnibus corporis partibus vitæque, calorem nempe & frigus immodicum sentiunt: & hæc blandè, & leniter caesat. Galenus li. ij. de Differ. febrium, cap. vj. & vij. Aegyneta li. ij. cap. xxv.

*Epicerasia*, quæ paulatim bonū succum sufficiunt in locum sensum vacuati, unde Epicrasis Galeno li. ix. Meth. Sunt etiam quæ obtundunt aliorum malignitatem, vel morsum, ut vicia passia mordentes mediocriter stomachum humores obtundit Galeno li. li. alimentorum teste.

*Epididymis*, superior testium particula est, fortior quidem testium musculis, solidior, & siccior: quænto illa sunt vasa seminaria, mirabili opificio naturæ contexta: aliis Scrotum, id est, sacculus ille testes recipiens appellatur. Guinterius Institut. Anat. li. j.

*Epiophis*, est vbi os cum osse ad unionem coit: cui quidem apophysis contraria est. *Epiphora* ἐπιφώρα, est omnium humiorum ad oculos impetusior influxus: vel cum Celso pituitæ cum impetu discursus. Plinius li. xx. cap. ij. & xij. Columella li. vj. capit. xvj. Vide Dist. Lachrima.

*Epimedium* ἐπιμεδιόν, caulis est non magnus hederæ foliis denis, duodenisve, neque florem, neque fructum ferens, radice tenui, nigra, graui odore: quæ Romanis vindicta appellatur.

*Epimenidion*, tertium bulbi genus est, cibis gratum, angustius folij, minusque aspero, quam cæteræ Syllæ species. Descriptionis author est Plinius li. xxvij. cap. ix.

*Epilepsia* ἐπιληψία, conuulsio, & comitialis morbus, qui etiā Lunaticus appellatur, necnon gentilitius. Est totius corporis, non quidem perpetua, sed quæ ex temporum intervallis infirmitas accidit, cum mentis ac sensuum oblesione. Latinis Comitialis passio, Hebræis Lunaris, dicitur, quod hac correpti ægritudine in comitiis maxime infestantur, comitiisque quo de aliquis concidisset, interrumpabantur. Lunaticus, quod eum qui interlunio est natus, hoc malum ferè pati compertum sit: puerorum quoque morbus plerisque appellatur, quod illis usque ad pubertatem sit peccularis. Gal. Locorum affect. libro tertio, capit. quinto, & libro quinto, cap. quinto. Fuch.

curat







*Eryngium* ἑρϋγγιον, Plinio centum capita aculeatorum est, vulgaribus Myrtois Lyttingium profertur: atque carduum hunc aculeatum valde esse, ipsa etiam nouit rusticitas: radicem sodiētes praelongam quam habet, cum saccharo coniungit, plerisque remediis magnopere utilem, præsertim stomacho, & renibus frigore affectis. Diosc. lib. iij. cap. xxij. Phaonem ad amorem hac radice prouocasse Sappho poetrix refert Plinius.

*Erysimum* ἑρϋσιμόν, nobilis Eruca aliquibus suspicatur, quæ tamen si agrestis est, satius multo valentior, tum viridi herba, tum semine. Est præterea *Erysimum* cereale, nomine alio Irio, Turchicum, & Indicum milium Gesnerus interpretatur: Allobrogibus peculiarissimum. Latinis Irio, & Plinio Trio: Trionum tamen Gaza vertit apud Theophrastum. Quineriam herbariis aliquibus Sinapi sylvestre nominari solent: atque Italici nobilis eruca cognomento est. Diosc. lib. ij. cap. centesimo.

*Erythror* ἑρϋθρόν frutex, alio nomine Rhus appellatus: vulgò violua apud Gallos nomen accepit: deductum à vocabulo viburnum, quo usus est Vergilius in Buc. Vide Plinium lib. xxij. cap. xi.

*Erythrodanum* ἑρϋθρόδανον, diuum generum, agreste, & satium: nomine alio Rubia tinctoria: de qua quære dist.

*Equitatio*, est quæ mirificè aliquibus, nec plerisque intestina confirmat: nam inter exercitia hæc habetur, probaturque à C. Celso lib. iij. cap. xix. Cæterorum qui sanitatis studio tenentur, si curam exercitiorum præcipuam habebunt, quod illorum sit maxima commoditas. Est præterea exercitiorum deligenda commoditas, ut tempus, ut mensura, ut cura, quibus probè excrementa per familiares meatus expurgentur, ut corpus à lassitudine tutum reddatur. Quinetiam Hippo. Aphorismorum lib. j. Aphor. iij. hæc ait: Exercitatorum summus habitus, nec cōsistere, nec mutari in melius potest. De qua quidem materia Galenus susciūs Sanitatis tuendæ lib. iij. Fusch. in Medic. Methodo cap. de Motu, & quiete.

*Erysipelas* ἑρϋσιπέλας, tumor est Galeno ex feruente, tenuique sanguine conflat: vel ex sanguine & flaua bile calidioribus, quàm oporteat mixta, fluxio. *Erysipelas* denique vel absque exulceratione, vel vnà cum hac, accidit, & ignis facer appellatur. Quum igitur nec planè biliosa, nec sanguinea fluxio est, sed ex ambabus mixta, utique ab eo quod in mixtura exuperat, nomen ipsi inditur. Si enim sanguis excesserit, inflammatio erysipelacea vocatur: flaua verò bile exuperante, erysipelas inflammatum erit.

*Erysipelas* τρυφιδής, id est, succedens, & τολιμήσις καύρος, appellatur, est quæ ex pulmone, ventriculi, aut iecoris inflammatione accidit. Nasctur ex intemperie composita primarum qualitatum cum affluxu flauæ bilis, vlcus huius nominis, quod cum inflammatione tubor locum ambit, cum dolore vehementi procedit. Petendus est Galenus de Diff. morb. libro primo: & libro secundo, ad Glauc. cum Acaxiæ explanatione: Celsus in capit. de curatione Erysipilatum: & Aëcius libro quinto, capit. lxxxvij.

*Eschariotum*, id est, crustificum siue crustam faciens, quod modo, & cauterij corpus colliquat, & sæpe escharam facit: est calidum sircum quarto ordine, crassæ essentia, dolorificum, ut calx viua, sex vini vlti quando enim vrendo tenuiora se ipsis euaserint, crassa tamen adhuc sunt essentia. Ex Galeno hæc Syllius.

*Esebur*, siue Patifolia πατίφυλλος, roboris species ex genere glandiferarum Theophrasto. Est autem sago magnitudine, & glande inferior, duplicem producens gallam, alteram quernæ non dissimilem: alteram nigram, tingendis lanis utilem. Plinius lib. xij. cap. j. & lib. xvj. cap. iij.

*Essentia* ὁ ὕψος, rei cuiusque facultas, siue potentia, aut virtus existimatur: verbumque hoc acceptum à philosophis, & præcipuè medicis, in rebus occultis exprimendis maxime idoneum. De hac voce vide Quintilianum lib. viij. cap. iij. August. lib. xij. de Civitate Dei.

*Essentia* proprietas, est quæ plerunque patientem in corpore partem non obscure indi

indicat, vbi etiam sunt sex generales notæ, quibus patiens membri, aut partis ipsius locus depræhenditur. Dignoscitur enim à symptomatibus, ab actione læsa, excrementorum qualitate, à tumoribus præter naturam, doloribus, & coloris vitio: quæ singula accurata opera sunt expendenda, quo partium patientium cognitionem capiamus. Gal. Locor. affect. lib. i. cap. ij. & iij.

*Esthionemur* ἐσθιονερός, hoc est, vlcus exedens, est quando bilis flaua crassior fit, hæretque in parte aliqua, totam eius cutem exulcerans herpetis speciem gignit. Quòd dilutior fit, altera species nascitur, quæ quia pustulas milio similes habet, Miliaris vocatur. Esthionema cacoëthe sunt, & malorum succorum foboles. Legendus est Galenus Meth. med. lib. iij. cap. iij. & ad Glauc. lib. ij. cum explanatione Acakiz.

*Esula* Serapionis, Pityusa Diosc. & Galeni est: tota Tithymalorum modo purgans ob id etiã Tithymali species putatur. Cæteris Arabibus Esula parua, est Tithymalus paralius, siue maritimus: magna verò Tithymalus, est plattiphyllus, viribus tamè sunt iidem valētibus, scilicet in purgādo. Myrepus, cuius interpres Fuch. in vna medicamētōrū cōpos. Esulā Chamæpityn facit. Diosc. lib. iij. c. cxlvj. perlegendus est.

*Euacuatio*, est humorum in corpore redundantium inanitio: cuius quidem multa ac varia sunt genera. Vacuamus enim interdum per venæ sectionem, nunc per medicamentum purgans, subinde etiam per vomitum, scarificationem, ac cucurbitarum appositionem, inedia, & somni ab inedia repetitionem, micturitionem, sputi educationem, sanguinis è natibus profluuium, mensium, hæmorrhoidum, coitum, in sensibilemque euaporationem, quæ quidem à natura, nobis etiam quiescentibus, fieri solent: quæ sanè singula suo ordine exponemus.

*Euchyma*, id est, sanguinem bonum gignentia, videlicet rubentem, crassi & tenuis medium: cuius contrarium Cacochyma. Orribasius de Confectione ciborum libro iij. cap. de Cacochyma, inquit: Non vna species est cacochymis, alia enim sunt frigidiora, alia cholericā, alia melancholica: omnia hæc sunt, quæ sunt in cibis cacochyma: latter enim in multo tempore pessimus in venis humor collectus ex cacochymis cibis. Ex ipsa igitur modica occasione in putredinem totum conuertit sanguinem, & febres malitiosas operatur, & excitat. Quod autem in temperamento est, neque euchymum, neque cacochymū, sed medium est. Cacochymos autem vocamus, qui nō bonos succos, qui sanguinem nutriant, faciunt, sed humores: euchymos verò, qui bonos succos, vnde sanguis fit, generant.

*Eupatorium* ἐὺπατόριον, omnino Agrimonia vulgaris videtur, Diosc. eupatorii cum Serap. agrimonia, & Mesues eupatorio conferenti. Corruptum verò nomen ex Argemone apparet, quā in falsò quidam Eupatorium putarūt. Quod hepatis obstructions aperit, ipsumque roborat, nomen adinuenit: vel ab Eupatore herbe inuētore. Hanc etiam Pentaphyllon vocari, quod folio sit quinque partito, scribit Galenus lib. quinto. Comp. pharm. κατὰ γὰρ, Diosc. lib. iij. cap. xxxij.

*Euphorbium* ἐὺφορβιον, & eupherbia arbor spinosa, in Athlante monte Libico ad Mauritaniam, ferulaceæque, & ex ea conco eminus incisa liquor emanans lacteus, facultatis est causticæ, ac vrentis Diosc. sarcocollæ modo emicans: quanquam variū colore reperitur. Galenus lib. vj. Simpl. & lib. iij. idemque ix. Composit. phar. libro Diosc. lib. iij cap. lxxvij.

*Euphrasia* εὐφροσύνη, recens herbatilis inuenta, vel cognita: Græcis, & Latinis authoribus olim inaudita: neotericis ergo commendata medicis, oculorum præsertim, vel nephriticis etiam, remediis. Hanc Barbarus inter saxifraga numerat: atque de ea plura apud Syluium lib. primo de Simpl. med. natura, leges. Est & Euphrosinum Bu glossio nomen, si Plinio li. xxv. cap. ij. credendum est.

*Exasperantia*, quòd leuius, vel mediocriter in cauitatibus fuit, & excrementis: vt acerbæ, austera, cruditarum parientia, dicuntur.

*Excoriatio* ἀπορίμα, est quando casu, aut quopiam violento offensus cutis auellitur, & ei parti scabrities suboritur depillatūque: & quæ subinde cutis nascitur glabra est.

*Excretio* superfluorum, est cum excernitur flava bilis ad fel, alij fellis folliculum appellat: atra bilis in lienem: serositas sanguinis ad renesimo & una quæque pars ubi satis habuerit excrementi, quod superest, ad alias remittit partes.

*Excreſcentie*, siue eminentiæ *χρόδαλματᾶ*, sunt in sede, in callum coactæ: vel rugæ circa anum tumescentes, reduplicatis enim ani corpusculis, tuga quædam præter naturam insurgit, & intumescit: cum enim sinuosus sit anus, rugas annexas habet.

*Exercitium*, euacuationis humorum subtilium genus est, quod quidem supplet frictione: de qua rescripsimus in dict. Equitatio, & Frictio.

*Expressio oculi*, seu exitus oculi ἐκπεσμός, contraria est imminutioni passio: in ea enim sic exprimuntur oculi, ut exerti perseverent.

*Expultrix* facultas est, quæ à coctione inutilia & aliena segregat, & excrementa singula ex corporis particulis pellit, ne si diu moram in corpore traxerint, putrescunt. Hæc itidem terentrix alteratrici ministrat. Author est Galenus in lib. Facul. natural.

*Exquisita* tertiana febris intermittens, est quæ ex flava bile. per sensiles corporis partes delata, oritur: & sui ipsius naturam puram atque synceram seruat, & dignoscitur suis notis. Quære dict. Terciana exquisita.

*Extinctio*, est quæ ob naturæ perturbationem à refrigeratione oritur: suffocatio verò, cum uniuersus sanguis ad principium confluit, deferturque: ut de mortuis præ mœstitia refert Plinius de P.

Rutilio, & P. Lepido, libro septimo, capite trigesimo sexto.

De his



## De litera F.



*Faba* *χυμπος*, vulgaris notitię legūmen, neque tamen si correspondēs Diosc. Gale. Celsi & Pli. descriptioni: nam illorum authorū fabas esse rotundas, & longē minores nostratibus, ut etiam oñtodecim non sufficiant drachmę ponderi, & vna quę fuerit nostras drachmam adimpleat. Ex authorū supra citatorum monumētis cetera Lector eliciat.

*Faba* *A* *Egyptia*, quę & *Pontica*, & *colocasia*, à superiore latē differt: quę *Indica* faba Arabibus mirantur, in siliquis digitorum septem, aut ampliūs, longitudine dependet, & venenum in se habet. *Syriaca* autem faba *λατός* *δασύς* Gręcis, *Lotus* arbor Latinis authoribus dicitur: cuius quęre dict. Itaque fabę *A* *Egyptia*: eę magnitudo, obolum vñum habet, &c.

*Faba* in uerfa, *Telephyon* Dioscoridi, & *Aizoum* secundum, hoc est, semper niuū mediū est: quę quibusdā obtuberafcentes radices, *Scrofularia* est appellata, quęadmodum *Chelydonium* minus, & *Climenum*, siue *Sege* Arabibus, de quibus suo loco referemus. Est denique faba suis *ὀσχυλμος* Gręcis, appellata: cuius duę occurrunt species. *Hyofcyamus* semine albo, & altera semine nigro, vtriusque quę oportuit descripsimus.

*Facies* *πρόσωπον*, & vultus *πρόσωπον*, pars à fronte ad mentum vsque pertingens est nominata, cuius multę occurrunt partes: oculi siquidem superciliis subiacēt, quorum pars superius & inferius oculū ambiens, & interiores eius tunicas regens palpebra *βλέφαρον*, dicta est, aut gena. Pili qui extremo palpebrarum superiorum ambitui inhzrent, cilia nominantur. Alię faciei partes quę sequuntur, per seriem literarum explanabuntur.

*Faciei* nigrities seu aspredo, & scabrities, *ῥῥιδος*, est in facie ex solis ardore prognata: cui propinqua *ῥῥιδος*, id est, faciei macula nigra, lentis leguminis similitudinē ubriens, & hęc lenticula, siue lentigo faciei appellata. In facie sunt diuersę vel pafsiones, vel dedecora: pessima est, quam oris distentionē Celsus, Gręci *χύνκων σπασμους*, Barbari torturā faciei vocant. Sub oculis verò quòd vox ipsa gręca designat hypopia, quę vox prolatione quidem alteri similis est, per quam affectum significamus, quem inter oculi mala numerauimus, in quo pus scilicet sub cornea vocata tunica continetur. Sunt autē *ὕπωμα*, hęc nigriores sub oculis contingentes, à sanguine compressis venis exeunte, & sub cute permanente sugillata Latini vocāt: nec sub oculis tantū, sed quacūque parte ob istū caro liuescit. Fit pręterea in facie à crasso humore tumor exiguus, & durus: vocatus à Gręcis *οφθαλμός*, Celsus varos nuncupat, fiunt & *ογκώδεις*, quędam eminentię in loco barbę, si tenuis & acris quędam veluti sanies crassius humoribus misceatur. Nascentur & sicut, de quibus suo loco diximus.

*Facultas*, est causa, à qua procedit actio. Sunt autē numero tres diuersi inter se generis, quę animal gubernant, toti corpori ex suo quodam veluti fonte quęque distributa, animalis scilicet, vitalis, & naturalis: facultas naturalis in hepate est, per venas in totū corpus sparsa: et ita, & infima facultas vitalis, in corde est: quę per arterias in corpus vniuersum distributa, secunda & media: sed quę animalis facultas, in cerebro, spinę medulla, & per neruos in partes omnes sensu tactus, & motu voluntario pręditas delata, prima, & summa.

*Facultas* egerendi, deiiciendivē, ne destruat, totus thorax vndique valido stringitur robore, musculique omnes, qui plures sunt, iuxta aliū tenduntur in egerendo: magis qui in hypocondriis, ut est author Gal. lib. ij. de Musc. motu.

*Fagus* *φρύγος*, Eius glandes nucleis non dissimiles, cute triangula incluse legentibus apparent: & hoc fructu suę, & cum apris animantes sicures, quòd eo delectentur,

etiam sub hyemem impingantur. Neque ad rei medendæ adhuc usum transit, ut eo fructu medici utantur. Est & fagi alterum genus, Græcis ὄζυα appellatum: Latinis Scissima. Dioscorides lib. i. cap. lxxi. scribit Quercum, Fagum, & Illicem generis esse diversos, facultate tamen in fructu respondere.

*Fames* canina, siue appetentia inordinata *κατάδυσις α' πέρις*, est contraria abolitæ appetentiz passio: esuritionem enim proclivem excitat, sed ut ea laborantes, quum appetitum cohibere nequeant, in cibis ingestendis modum excedant, & gravati eorum copia paulò post euomant, atque sic se leuent, rursusque expleant, ac iterum in vomitum perinde atque canes reuertantur, unde etiam appellationem malum hoc accepit.

*Far* *χώρατος κατά τὴν*, colore rutilo, vel rubro frumentum: & est colore pullare frumentum, quod utrumque barbarum frumentum agricolæ vocant. Tertium, quod cæteris candidius videtur, clusium, & blancæ putatur. Vulgus bladam dicit. Far nonnunquam etiam pro farina usurpatur: itaque frumentum pro Secali, vel, vulgi appellatione, Siligine, coloris cinricei nigricante, interpretari absurdum suspicor.

*Farfagium* *χαυδαίου* *χρ.* pratensis farfara est, flore candido, in rotunditatem ordinato, ornata: & Nymphaeæ luteæ, nisi humilior appareret, esset similis: quæ à Tusilagine discrepat, ut loco suo scriptum reliquimus. Est præterea Farragum, vel farfugium alterum: quam herbam officinæ pedem asini pro Bechio usurpantes, appellati: quæ bechium tamen non est.

*Faseolus* *λόφος δόλυνος σιυδαζ* *καπαία*, hortensis leguminis genus. Est denique *Faseolus* *φάσπολδος*, Smilax hortensis, hoc est, pedemontanum pisum tenui pusillorū figura, & colore vario circumscriptum, Longobardicumque appellatur plebeis. Galeus lib. i. de Alimentorum facultatibus, Faseolū à Faseolo distinguit: vultque faseolū plantam hortensem esse eandem cum Smilace, cuius fructus Lobi dicuntur: & Delichii Theophrasto: Faseolū autem eundem esse cum cicerula, aut certe eius speciem, quæ etiam hodie, Fasillorum apud vulgus nomen retinuit: & hi ciceræ sublaescentes, siue subalbicantes suspicantur. Quæ Dioscoridis Smilax utraque copiarum depræhen dicitur, non adscribenda cum Faseolis, sicut loco suo meminimus, videtur: lib. iiii. cap. cxxviii.

*Fauces* *φάρυγγα*, propriè vocant spatium oris interius, quod gulæ & gutturi præfacet. Galenus principio libri octavi de Usu partium sic scriptum tradit inquit: Primum & præcipuum vocis organum, cui *φάρυγγ* est nomen, superior finis est arteriæ ad fauces quem utique etiam *φάρυγγα* nominant æquivalet, cum ea pharynge quæ laryngi incumbat portio.

*Fausid*, id est, auellana Indica, facultate sua adstringens: priscis etiam desiderata Scapioni nucis moschatæ similis, forma pyramidis, insipidus: eius desiderata loco mi scetur santalum rubrum, quod ligni orientalis generis perhibetur, & coryandri recentis dimidium.

*Fauus* *καριον*, est malum saphatto figura, & aspectu non dissimile, maiora tamen foramina habens: in quibus humor melli similis continetur, non secus quam in fauis apum, unde nomen etiam sortitum est.

*Febris*, est calor præter naturam, qui à corde initium sumens, per arterias & venas in corpus universum diffunditur, atque actiones eiusdem ledit. Februm principales differentias assignat Galenus de Diff. feb. lib. i. cap. j. & v.

*Februm* differentiz, sunt quæ ex humorū putredine in festantiū cognoscantur: sed quomobrem per circuitus repetantur febres, docet Gal. lib. ij. cap. j. de Diff. febr.

*Februm* simplicium genera tria sunt, quemadmodum etiā tria, quæ corpus hominis constituant, continentia scilicet, contenta, & impetum facientia, hoc est, solidæ partes, humores, & spiritus. ut auctor est Hippoc. Epidem. lib. vi. particula viii. cap. viii.

*Februm* genus secundum fir, dum in humoribus calor immodicus succenditur, & vocatur putrida febris, non alio sanè nomine, quam quod in ea humores

put

putrescunt, hæc est similis aquæ calidæ, quæ vas frigidum, cui infunditur, calefacit: ita etiam humores præter naturam calefacti, corpus: putrescunt autem humores intra, vel extra vasa: si intra, tum vel omnes simul, aut vnus duntaxat putrescit: quod si in omnibus vasis, ac potissimum maximis, æqualiter humores putrescunt: & fit Synochia, seu continens putrida. Quare dicit Syuochus:

*Febris continua* *συνυχοῦς*, est quæ si intra vasa vnus duntaxat humor putrescit, febrem accendit: ita autem est, quæ non desinit ad infebrecitationem: remissionem tamen in singulis accessionibus obtinet: vt declarauimus in dict. Continens, & Continua.

*Febris composita* sunt, quæ citra partis alicuius passionem in vnicem miscentur, vt tertiana, quotidiana, & quartana. Nam hæc febres quæ ob partium inflammationem accenduntur, mixturem accipiunt: quæ autem citra alicuius partis inflammationem consistunt, aliquando complicantur, aliquando verò in totum confunduntur. Cōplicatio Græcis *ἐπιπλοκή*, confusio autē *χέσσις*, nominatur. Quare dicit, Cōplicatio.

*Febrim simplicium* triui generum explicatio, est quando calor præter naturam acceditur vel in spiritibus, & fit ephemera seu diaria: quæ quidem duplex, scilicet simpliciter ephemera, seu diaria dicta, & diaria plurium dierum, alio nomine Synochus non putrida vocatur. Quæ in humoribus fit, putrida est: putrescunt autem modis duobus, vel intra vasa, idque bisariam, vel in im omnes æqualiter putrescunt, & fit Synochus putrida: vel enim humor tantum, & sic erit continua. Si enim putrescit bilis flaua, fit tertiana continua, vel ardens dicta febris: si pituita, quotidiana continua: si atrabilis, quartana continua. Qui extra vasa putrescunt humores, intermittentem consti-  
tunt: si enim putrescit flaua bilis, fit tertiana intermittens exquisita: si pituita dulcis, quotidiana intermittens exquisita: si pituita vitrea, oritur Epialos: si atra bilis, quartana intermittens. Si autem in solidis partibus, fit quidem vel hecticæ, vel quæ est senectutis Marasmus. Hæc Pechinus.

*Fel*, bilis, folliculus, id est, vesica fellis, *κυστίς κολλοδοχῆ*, Græci nominant: adhæret fibræ hepatis, & pectus sanguinis purgamentum recipit: de qua quidem materia multò plura in dict. Bilis flaua expressimus.

*Fel* animalium prædantium siue quadrupedum, siue volatilium, & in aquis degentium, caloris summi, acrimoniæque maximæ particeps collyritis, & remediis aliis comprobatur. Cætera retulimus in dict. Vesica fellis.

*Femur*, & semen *μυρὸν*, est pedis pars interior, quæ à coxis incipit, & ad genua finitur sicut exterior semen. Quin etiam semen seu femoris os coxendix est, atque superior pars ossi facto annexa caput femoris appellatur: in se & partes Trochanterum magnum, & Trochantrum paruum, atque sui ipsius collum continet.

*Ferula* *ῥαβδόχῆ*, calidis nascitur locis atque transmarina, genicularis per vices notata scapis. Duo genera Theophrastus facit: sed quæ dioscoridis ferula est, caulē proferit ternum sæpe cubitorum, folia sceniculi, longè asperiora & latiora, quæ ab imo caule vulturata Sagapeum efficitur.

*Festuca dryadifolia*, auenæ erraticæ secundum genus, folia habens tritici nostraris, sed molliora: in summo capite semina, bina ternæ rubra, quibus aristæ quasi capillaceæ, exeunt. Est & aliud genus, cui nomē Bromus, ægilopi similis, vim habens excicatoriam, quæ hic desiderantur, pete ex Diosc. lib. iij. cap. exxij.

*Fibræ* pulmonum quinque numerantur, sicut scriptum reperitur in dict. Pulmo. Nam viscerum omnium, vt cordis, jecinoris, lienis, & pulmonum extremitates fibræ appellantur.

*Fiber*, qui & Castor, vitæ acipitis animal: à quo castorium ex ipsius testibus medicamentum dictum. Qui scribit hoc animal castrare se, ne præda sit venatoribus, tota errat via: quum rem falsam esse diligenter animaduerti: quando paruos eius esse testes, substrictosque, & spiuæ adhærentes, nec adimi posse nisi cum morte credendum est. Verum folliculos geminos esse ex nexu vno dependentes, qui amputantur, capris animalibus, propter medicam vim, quæ maximè pollent. Ampliorem habes descriptionem in dict. Castor.

*Ficedula* ἡ συκαλὴ & avis, cui nomen à ficu est: quòd ea, vt testis est Varro, pingue scat, quòd factum tempore aucupetur. Vulgus Becque figue vocat, laudabilis satis in patinis, si medicis aliquibus credimus. Aristoteles lib. ix. de Historia animalium μελαγχροποι, id est attrita pillam fieri ait: vt ex eo retulit Schol.

*Ficus* vulgaris συκα: est & ficus duricorij ἀροδρ. οὐκ αὖτε & ficus Aegyptia συκαμονον, lycpomorus & Alexandrina, & Idea ficus: sicut Cyria, Indica & Arabica: regionū varietate, diuersa etiam facultate, & colore depræhenditur. Nam quæ ad mare nascitur magnitudine mediocris, ficus pelagica dicitur, & soliis vidua est. Sunt & ficus albæ συκα λευκα. Astuatio appellatur, interdum pingues: quarum apud Maubitas Rhodano vicinos populos frequentia est.

*Ficus* συκα, καὶ στικαίς, sunt tubercula vlcerosa, rotunda, subdura, rubicunda, quæ dolor comitatur, sit hoc malum magna ex parte non solum in capite, sed & reliquo etiam corpore. Barbari Talpariam dicunt.

*Figura*, est quæ termino, vel terminis clauditur: vt circulus termino, reliquæ verò figuræ terminis, nam terminū, cuique rei finis est: verum quæ planā à figura est, cuius medium neque subsultat, neque ab extremis egredietur.

*Felix* ἡ τερπία, mas, quæ Osmunda regalis officinis est: semina verò, quæ segetibus in sabuletis esse frequentes. Osmundæ filicis radix maxime utilis deiciendis lombricis, & hydropibus a mara, astringens, partum mortuum deiecit: vlcera valenter, sed siue morsu siccant imposita: hepatis meatus probe terget sine manifesta calfactione, aut refrigeratione. Gal. lib. viij. Comp. pharm. Est & filicula nomine Trychomanes, & Polypodium: cuius dict. petes.

*Filipendula* Oenanthe herba, quæ officinis Scrophularia quoque dicitur: quòd in radicis filia mens tubercula apparent: de qua quidem herba in dict. Oenanthe plura leges. Diosc. lib. iij. cap. cxv. Est & Oenanthe vna satua, altera sylvestris Labrusca: de quibus vide suo loco.

*Filius* ante patrem, aliquibus Delphynium, quòd pro Coluthea, id est, Sena nostrate, vsurpant: quæ suo loco reposita sunt omnia.

*Finis*, est cuius gratia quæ ad medendi facultatem spectant, ordinantur: & ad quæ tendunt, & referuntur quæ sunt medicæ speculationis: quòd assequuti, mederi quæritur nihil amplius.

*Finus* principij morbi adhuc futurus quinque rationibus potissimū depræhenditur: primum ex morbi ipsius natura, & differentia: febres siquidem acutæ, pleuritis, viscerum inflammationes, & passionēs similes, breuis temporis principium habent: contrā epilepsiam, coxendicium, & renū dolores, longi temporis. Sic quidē à morbis ipsi, futurus principij finis depræhenditur: secundo, à temporibus anni: tertio, ex ætate & natura laboranti: quarto, ex regione in qua ægrotans decumbit: quinto, ex vidus ratione quæ præcehit. Fuch. in Meth. med. cap. xliij.

*Fistula* amygdalis pumillis nostratibus persimiles, sed figura, non sapore, neque colore interno, qui viridis ostenditur. Inter bellaria plerique reponunt. Dioscoridi Pistacia dicuntur, quorum dict. petes loco suo repositam.

*Fistula* lachrymalis α' ὀφθαλμῷ, est abscessus, qui inter maiorem oculi angulum & nasum sit, qui rursus si negligatur, in fistulam abit vsque ad os ipsum progredientem. Verum hic abscessus prius quàm disruptus in idem vlcus abit, nomine ἄρχιδών: à quidem ἄρχιδός haud parum abest: & est naturalis circa maiorem oculi angulum caruncule supra iustum modum excresecntia, huius contrarium πύδος est, hoc est, eiusdem caruncule decresecntia.

*Flores* Latinis, ἄνθη τῶν Græcis, quasi nauigabiles pisces dicuntur: quòd in summa aqua fluitantes, mergi non possunt. Optimi generis piscium Plotæ, siue floz sunt, vt ex historiis Romanorum Consulum depræhenditur. Hæc Scholiastes.

*Feniculum* μένιστον, hoc est, satium: alterum, & tertium agrestem, ἱππομαρσπον Græcis: Latinis feniculum sylvestre.

*Fenum* græcum τῆλος, de quo alibi dictum fuit, siccum primo ordine, calidum, sec



secundo: vt est author Gal. lib. viij. Simpl. & ob id digerere dicitur, vt idē author lib. j. Compos. pharmac. affirmat: & cataplasmatris admiscetur. Diosc. lib. j. cap. xciiij.

*Folium φύλλον* Indicum appellatum, quod Malobathrum quidem est: sed arbitrantur aliqui Indici nardi folium esse, salū quadam odoris cognatione. Per multa enim sunt quæ Nardum olent, quem admodum phusafarum, niris: secus autem res se habet. Namque Malobathrum folium sui generis est, quod Indicæ gignit paludes, lentū palustribus modo iontantis aquis, sine radice. Cætera Diosc. lib. j. cap. xi. Est denique Folium φύλλον, herba mas vna, ἀπὸ τοῦ ὀνόματος: fœmina altera, θηλυγόρον, Ruell. lib. ij. cap. x.

*Fœtus* ἑμῆρος, est ex vtriusque seminis substantia maris & fœminæ, in vteri locis comprehensus, inuolutus, atque coactus: nutrimentum menstruosi sanguinis per vmbilicum, minimè quidem per os accipiens, vt author Galenus in lib. de Fœtus formatione, & in lib. de Semine. Quare subinde dicit. Embrio.

*Fomenta* seu totus πύρεξι, sunt quæ suo calore partes corporis, quibus applicantur, fouent: & arida, & hūida, prout partes exigunt, componuntur. Fuch. cap. ix. lib. iij. de Compos. medic.

*Forma*, vt est author Aristot. est transmutationum natura effectiua: nam & species, & terminus, & actus primus ac substantialis dicitur.

*Formatrix* facultas, est in fœtus generatione, quæ cōpagem, formamque partium, & interne cauitatis cauitatis speciem effingit, huic famulantur nutritrix, & auetrix.

*Formica* μύρμηκας, καὶ ἀκροχρόρδων, vtnique malū cutis exigua est excrescentia, callosa, & magna ex parte rotunda. Sed μύρμηκας a latiore basi, & sessilis est, ac in scalpendo, & attritu mordentis formicæ sensum efficit, ἀκροχρόρδων autē a angustiorē basim obtinet, vt chordæ nexu suspensa esse videatur. Latinis verruca pensilis est.

*Formicæ* ruptura μύρμηκος φάλλον, est quæ si exigua adhuc fuerit, muscæ capitis formam oculi passio præ se fert, quum amplius & eousque succreuerit, vt acinū vuez representet, καὶ φιδίωμα nomen habet, aur vuario, Latinis medicis. Si sic augetur, vt extra palpebras emineat, μύλον nominatur, siue vesicæ lisi ruptio. vbi verò obducta cī catrice obduruerit, ἡλός erit, id est, clauus. In foramine vuez, hoc est, pupillæ, hæc passiones fiunt.

*Fractura* κάταγμα, Græcis, est ossis fracti affectus: qui alioqui ruptura appellatur, Galeno teste lib. iij. Merh. medendi: & de Artis constituit. Celsus Artium lib. viij. qui de fracturis, & ipsarum curatione plenus legitur.

*Fraxinella*, aliquibus Corrigiola, Lilium conuallium, & conuallulus, suspicatur: verum quoniam sub hoc nomine Fraxinella herbæ diuersæ, innumeraque vocantur: quænam hæc sit, adhuc hæsito, quare peritiores consulendos moneo.

*Fraxinus* μύρις, hæc arbor non solum ab Homero in hastis conficiendis, sagittis, & vmbonibus, quod materia sua sit idonea, celebrata est: sed & Græcis, & Latinis pīscis & neotericis authoribus medicis, ad medendi vsum tum semen, quod officinis lingua auis, tum radicis cortex, veneratur: nam a rquatis & ventre tumentibus radicis, & arboris medianus cortex in decocto valde commendatur.

*Fragum* βοτάνη, hoc est, quinque-folium gignens fructum sui nominis. Quod autem fragum tumex, siue lapathum sit, falsum esse descriptio tota re clamat: quod denique rubus idzus, & fragum fuerint idem, quicumque credit, longè fallitur: quod Scholiastes suspicatus, asserit.

*Fremium*, versore Gaza, Anemone est, vulgò herba ventiticius genera tria à Diosc. numerantur. Quære Anemone.

*Frisio* dura, est quæ corpus cogit molli, quæ laxat, & soluit: multa, quæ extenuat, & minuit: medicorū, quæ augēdi vim obtinet: aspera, quæ ad exteriora pertrahit: leuius, quæ cutem in partibus retinet. Galenus lib. ij. Sanit. tuendæ.

*Frigilla* ἡ σπιζα, vulgò Berza: hæc auis apud Latinos, vt Festus scribit, ex eo dicta est, quod frigore hyberno cantet, & vigeat. Inter auiculas cibi melioris patinis adapatatur, & voratur.

*Fossula* siue annulus βοθρῶν, est vlcus cauum, angustum, purumque in cornea na-

tum existit oculi.

*Fornix*, ob eius scruitiā, & veluti seritatem practiciis medicis. Noli me tangerē, morbus nomen accepit: gutta rosacea longē peior, quā praeire elephantiasim solet. Est autem malignum adeo vlcus Fornix, vt ex remediis, etiam quā congrua videntur, irritetur potius, quā mitigetur, & in sanas partes depascendo vagetur. Sunt qui Canerum putent, ego ad phagedaena pertinere putauerim.

*Fucus* marinus, φῦκος θαλάσσιον, καὶ φῦκος ἀλκυονίδον, hoc est, fucus & marinus, & pelagicus, multis generibus complectitur, sicut scriptum reliquimus in dict. Phycos thalassion.

*Fulca*, vel fulix ο' χέφ'ς, vulgi appellatione Fouque: à quibusdam etiam, vt refert Scholiastes, dicitur Diabolus, quod fulua auis sit. viuit in mari, stagnis, lacubusque frequentissima tamen ad ripas maris mediterranei prope Agatham Pessulatū, ex qua venti prognosticum Aratus poeta sumit: cuius interpretēs varia & multa de hac auescribit.

*Fumaria*, & fumus terrae χαμῶς ὄψις, vulgaris notitiae herba est, purpureo flore vndique decoratur cum numerosis foliis candidioribus. Huius decoctum, siue per se, siue cum aliis, prurientibus scabie, sanguinis adusti, atque copia, hominibus benefactum certe est. Similiter qui de ea conficitur syrupus: & ipsius in aquam per imbricem vitreum extillatio, necnon quae de succo componuntur Catoporia.

*Fungus*, & boletus μύκῃς, varius ac multiplex habetur, nauseabundum cibi genus, ac letiferum: cuius non minoris aestimat facultates Dioscorides, secundum videlicet locorum natiuitates, herbarum, & arborum diuersas umbras: necnon venenatorum cauernas. Quae restant hic, reperies in dict. Boletus. Nos quoque ad amicum quod subest, Epigramma direximus vice admonitionis.

*An numeras inter fungos quod Agaricus vsu*

*Fertur, & à patria nomen habere sua.*

*Eli errare modis medica ratione pudenter*

*Te scimus, & resipis si modo fungus obest.*

*Fungus obest, virisque suum per viscera fundit:*

*In ficiis & molli cetera membra cibo.*

*Alitum contra bibitur sed Agaricus omne*

*Funeustum virus per domitiumque necat:*

*Difficile inque fugat languentem corpore febri.*

*Quam fungus tacita simplicitate fouet.*

*Furfurea* subsidencia, est quae orobea peior existit: haec enim febris ubi adipem vniuersum, & maiorem partem carnis absumpserit, atque iam profunditatem carnis & vasorum obsederit, solidasque partes corporis attigerit, apparet. Dicta est furfurea vrinae substantia à triticeae fursuris exquisitè moliti, similitudine. Interdum enim solius vesicae patientis signum est, vt quibus in vrina crassa, furfurea simul quaedam exeunt, iis vesica scabille laborat: vt scriptum reliquit Hippocr. Aphorif. lib. iij. Quare dict. La minea subsideptia.

*Furunculus* ὄσθιδ, tumor est abscessum prae se ferens, ex crassis humoribus, in carnis plerumque partibus consistēs: mitis quidem, quum in sola cute coierit: malignus autem, ubi ex alto in superficiem, & summam cutem emergit.

*Frumentum*, quicquid aristas emittit, & per hyemem in herba, Scholiaste cōiectore ex Caesaris commentariis, est. Itaque Caesar ipse frumentandi causa quandoque suos gregatim mittebat milites, vt deficientem in hybernis annonam repararet: quod intelligeret suspicor, genus omne ex segete triticum, & legumina nullam prorsus discrepantiam faciens. Quin à tritura triticum derivatum sanè est, hoc est, genus quodecunque farris, quod simpliciter non de frumento semine nobilissimo, de variis verò est intelligendum.

*De lite*

## De litera G.



**Gaiacum** lignum ἐλάγιον τὸ ἰσίδιον Dioscorid. descriptione lib. j. cap. cxj. Ebenus est: nulla etiam reclamante cœsura. Palma sancta, Lignum sanctum, & Gaiacum lignum, arboris eiusdem lignum est, neque diuersæ facultatis: quod tamen Io. Agricola in treis distinxit diuersas species, colore, pondere, & facultate dissimiles: propterea à recentioribus medicis tria varia nomina, prisca authoribus indicta quoniam incognita, tradiderit: illis quoque nominibus in treis species distinguere voluit. Habetur optimum quod nigrum est, nullos habens venarum discursus, factitij cornus lænore: cum frangitur, densum apparet, mordens gustu, atque adstringens: sufficit iucundo odore sine fumi rædio: recens autem ad ignem prolatum, ob pinguitudinem accenditur, & tritum ad cotem bluefcit. Cætera per differentias arboris ex ipso Dioscori. petes. Morbis omnibus præsertim ex humore frigido naris salubre est: nam acrimonia, & amaritudine incedit, tenuat, terget, vacuat, propterea in curanda lue Gallica, & Italica ab Hurteno, Matteolo, & Ant. Gallo commendatur. Quid autem sentiat Manardus lib. vij. Epist. iij. est consulendus.

**Gagater** lapis, colore atro est, odore dum vritur bituminis, digerit a dmotus: in collis præcariis, & salinis frequens Diosc. lib. v. cap. xcij. suffitu recreare vuluæ stragulat, & nidore serpentes fugare scribit.

**Galanga**, Actuario in plerisque Arabas imitato, est radix subrubra, geniculata, in torta, grauis, sapore acri, lingua m admodum exulcerans: calida sicca tertio ordine, odore & figura Cyperi, vnde quibusdam Cyperus Babylonicus dictus. Diosc. lib. j. cap. iij. Quære dict. Cypirus, vbi plura.

**Galbanum** γαλβανόν, minutum Muguetum repræsentat, quanquam & aliud ostenditur flore luteo: atque nomen hoc habet Dioscorid. lib. iij. cap. lxxxj. auctore, quod in contrahendo lacte coagulandoque casei vires obtrineat. Ramulos, foliaque Aparinæ habet simillima, & recta: florem in cæcumine copiosum, tenuem, densum, odoratum.

**Galbanum** γαλβανόν, liquor ferulæ Syriacæ, seu plantæ ferulacæ in Syria frequentis, nonnullis Metopium vocitarum, grauissimum reddens odorem: impositum excalfacit, vrit, extrahit, discutit, menses ac partus trahit suffitu. Cætera Diosc. docet lib. iij. cap. lxxix.

**Galioscis** γαλιόσκις, Scrophularia minor Gels. est. Scholiaste Cataria herba pingitur, videturque Labeo, id est, vrtica mortua: aliis Grypalma officinis appellata. Scrophula autem maior, ficaria, millemorbia à mustellæ aspectu retinet nomen. Dioscorides verò libro quarto, capite lxxx. fruticem, caulem, & folia in totum habere vrticæ sed leniora, & quæ grauem odorem trita reddant, scribit.

**Galena** Plinio lib. xxxiiij. cap. xvij. plumbi & argenti communis vena in mineris repta, dicitur: quæ a liquoque Græcis μολύβδαζα vocatur, & plumbago Dioscorides lib. v. cap. l.

**Galenus**, medicus insignis, & omni doctrinæ genere callens, vt superaret scientia cæteros: è Pergamo siue Troia ciuitate Asiæ emicuit Traiani temporibus vsque ad Anthonium Pium. Niconis geometræ, & architecti filius, qui compluribus voluminibus medendi artem, post Hippocratem, locupletissimam reddidit. Venisse quâdoque Romam dicitur, sicuti scriptum reliquit in lib. Meth. med. ac cœlû Romanum inconstantiz maximè accusasse. Hunc omnes medicorum, dempto Hippocrate principem appellant.

**Galie** mosehata, & Scellina, trochiscorum, hoc est, rotularum, seu pastillorum, nomina sunt: quibus raro per se vrimur, sed in alias veniunt compositiones.

**Galla** xno's, fructus est roboris, & cæterarum glandiferarum arborum: ea vel est emphacitis, id est, immatura, parua, nodosa, grauis, solida, non perforata,

sed magnitudine mediocri, ad scriptorium attramentum præsertim deligitur. Altera galla, maior, rotundiorque est, levis, laxa, perforata, flaua, non tamen improbara: quoniam in vtraque astrictiora vis pollet, ut deprehenditur Coriariis.

*Gallina* ἀλεκτορίς, familiaris & domestica avis est cuius mas Gallinaceus, & euul sis genitalibus Capus, siue capo efficitur: quod nos distico hoc allusimus:

*Quem credes Gallum patrio super alite, sester*

*Quos habet euellas, fiet & ille capus.*

Quantæ autem utilitatis avis vtraque valentibus, & valetudinariis sit tam in cibis, quam in decocto, Galenus, cum medicis posterioribus, obseruauit. Sed & inter aues omnes galinarum oua cæteris facili prætulit: phasianorum, & perdicum quanquam concoctu facilima, & nutrimenti optimi, postposuit tamen.

*Galerita*, & patrio nomine Alauda, Vergilio Syris, auicula parua est, ab Accipitre aue sæpè depressa, apicem in vertice, pavonis modo, gestans, quæ assa & in cibo sumpta, cœliacos, Dioscoridis sententia, adiuvat.

*Gallinago* ὁ σκολῶπαξ, inter phasianos secundum genus videtur: Allobrogibus Rhodanum incolentibus phasianus gentillis appellatur: cuius caro inter delicias laudatissima habetur, necnon à medicis peritioribus seculo nostro ægrotis magnopere cõmendata. Alexander Myndius ex Athenæo li. ix. Dipsosophyst. sic scriptum reliquit. Est, inquit, Scolopax Perdix paulò maior: cuius dorsum versicoloribus maculis distinctum est, testæque coloris figulinæ speciem gerit, nisi quod magis rufum est. Graui est corpore, & breuib. alis, ut à canibus facili capiat: pulueratione gaudet, & sicut gallinacei grano gaudet. Neque ergo gentillis Phasianus pro Attagena deinceps usurpabitur, quod tamen si Scholiastes ex poetâ Myndio suspicatus est: sed secundum phasinorum genus in cibis optimum.

*Gallitricum* pro gallicetro Ruellio videtur esse Horminum, hortense olitoribus orualla, & rota bona appellata, aliquibus scriptoribus verbenaca recta, ob picturæ Hormini, & rectæ verbenacæ obscuram breuitatem, iudicium difficile. Herba est foliis marrubio odorato similis, caule semicubitali, quadrangulo, circa quem eminentiæ siliquis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant, in quibus diuersum semen recluditur: siquidem in sylvestri rotundum, fuscumque inuenitur: in altero nigrum, & oblongum, cuius est vsus: agrestis magis quoque satiuo viribus pollet. Diosc. li. iij. capite cxxij.

*Galaxias* lapis, quem aliqui Morochthum vocarunt, aut Leucographida: in Aegypto nascitur, quo vtpote molli, & facili liquecente, linteones dealbandis vestibus vtuntur. Spiracula corporis obstruere videtur, conueniens iis qui sanguinem expuunt, cœliacos, & vesicæ doloribus, eum aqua potus: sanguinis fluxum impositus velletur: siue naribus, siue vuluæ, sphinterivè prolapsa: atque etiam vlcerata cohibendo explet. Est præterea Galactites lapis, qui, quod lacteum succum refudet, sic appellatur: cinerei coloris tamen est, ac gustu dulcis: ad oculorum fluxiones & vlcera conuenienter illinitur trituscum aqua & in pixide plumbacea interdum conseruatus. Diosc. li. v. cap. xliij.

*Gammacris* ὁ δαρκός, alioqui marinus Cácer appellatus. Agathænses Pessularum Langustam vocant, Masiliæ Phocensium prisca Græcorum lingua ἀγῆκας nomen hucusque retinuit. Eius cibus conficitur ad temperantiam stomacho haudquaquam imbecilli. Gillus in libello de piscibus Gallicis, est requirendus.

*Gaudium*, est non perinde atque in ira cū valido seruire ad exteriora fertur animata facultas, quin è contrario si quid antea fuit ei roboris, id nunc exoluitur, laxaturque. Quum enim nimio gaudio laxata petit exteriora, discutitur, atque dissipatur. Lege Aristot. de Polycrita nobili muliere repentino gaudio extincta: & Phylippide poetâ pari fato occubuisse: & Gellū de Diagora li. iij. cap. xv. Plin. li. ij. cap. liij. de Chilone, Sophocle, & Dionisio Siciliæ Rege: Val. Maximum de Mortib. vulganibus lib. ix. cap. xij. Pudore etiam mortuos Diodorum dialecticum, & Homerum.

*Ganglium* γανγλιόν, tumor est neruorum ex ictu, vel lassitudine proueniens in plerisque corporis partibus, præsertim verò in iis quæ mouentur, puta manibus extremis

tremis, ac pedibus: cuius quidem Celsus author est Artium lib. vij. A Egyneta lib. iiii. cap. xvi. Differt quoque à Nodis sic vocatis, quia obliquè tantum nodi mouètur, non autem versus exteriora & interiora, sicut ganglium: stupidum quoque quædam dum premuntur nodi, sensum præbent.

*Gangrena* γὰγγραινα, est quando pars aliqua corporis ob magnitudinem inflammationis, emoritur: neque tamen iam mortificationem confirmatam, sed quæ etiam num sit. Vbi verò pars per se se & in totum emortua, ac sensu vitæque desbitura fuerit, malum, non gangrena, sed σφελγος, hoc est, Syderatio vocatur: scribente sic Celso lib. v. cap. de Gangrenæ curatione.

*Garum* γαρύ, liquamè est ex intestinis piscium sale maceratis, ita dictum, quòd primum ex Garo pisce confici solet: referente Plin. lib. xxxi. cap. vii. Gal. li. iij. de Alimentorū Facul. pen. cap. & Simp. facul. lib. xi. versus finem, Diosc. li. ij. cap. xxx.

*Gargarismus*, medicamentum est, quod ex stillatitius plantarum liquoribus, aut ex iure decoctorum, addita pro affectus diuersitate compolitorum differentia, compo ni solet, ex platore Plinio li. xxi. cap. xix. & li. xxx. cap. iij. vt retulit Fuchsius lib. iij. Composi. Medicament.

*Garyophyllus* flos qui sylvestris, deprehèditur, herba Tunici Myropolis vocatur, qui in hortis, aut vasis seritur, coliturvè Verconica: vel Britànica, quòd à regione illa: peruenierit ad nos, accepit nomen. Itaq; decipiunt, qui Hyacinthum Græcorū, hoc est, Vaccinium Latinorum, Garyophyllum florem, id est Britanicam, siue verconicā, interpretantur, Diosc. & Pl. Verconicam videntur appellare, quæ Barbaro viola altis lis describitur, vulgaris plebs Armoirias vocat: à Garyophylli odore quæ spirat, ac cepit flos nomen.

*Garyophyllum*, & Caryophyllum καρυοφύλλον, frutex in Oriente nascitur, Sambuci forma, semine grano piperis grandiore, fragilioriq; ex atro rufescente, in clau modum capitato, apertis in aduersum quatuor denticulis sese stellatim decussantibus: Non desunt qui Garyophyllon repræsentent Buxi caudice, Lauri folio, sed rotundiotè. Huius nec Diosc. nec Gal. in censu Simplicium vllam fecere mentionem. Plin. in India quippiam piperis grani simile nasci tradit, quod garyophyllon vocatur, grandius, fragiliusque: atque hoc in Indico luco gignitur. Hæc Ruel. li. j. cap. xxx.

*Gazelle* animal feli domesticò persimile, sudorem reddens spumosum, calore in consueto quando agitur, inter nates præsertim, & axillis, qui sudor officinis & popu laribus Cibetta, postea appellatus, inter fragrantissimos odores excipitur venticibus, Cætera petes in dict. Cibetta.

*Genæ* seu malæ μήλα, rotundæ partes sunt inter aures & nasum ad mali speciem formæ, quæ bene coloratis, & in genuis, pudore effusis, rubent.

*Generatio*, non est simplex quædam actio naturæ, sed ex alteratione, formatio neque cõposita. Vt enim os fiat, item neruus, vena, & reliquarum quælibet, alteratam esse oportet subiectam, vnde animal fit, substantiam, Vt verò congruètem figuram, & posituram, & cauam quædam, & vel enata, vel adnata, aliâque id genus habeat, effin gi eam oportet, quæ alteratur materiam. Propriè autem generatio, est substantialis formæ in aliquo acquisitionis corruptio verò, eius deperditio: quemadmodum augmen tatio, maioris quantitatis acquisitio est: ita quoque diminutio à maiore quantitate in minorem mutatio.

*Genista*, vulgaris notitiæ frutex, quidam σπάρτος, καὶ σπάρτιος, genistam nostra tem perperam transtulerunt, vt Gesn. existimat: nam genista nostras foliosa est, spartion nequaquam: tamen vtriusque flores & succus valenter trahunt, ob idque anginis, hisciadicis salubriter ad mouentur, & hydropicis sumuntur. Diosc. Spartion à Genista vulgari differt: sed figura tantum, non autem viribus.

*Gentiana* γέντιανη, Segusianis, & Allobrogibus, quibus valdè nota habetur, non mutauit nomen: aliquibus Aloe gallica appellatur, ob præstantes ipsius cum amaritu dine vires, quibus aduersus quodcunque virus, & venenum pollet.

*Gentiana* inuentio prima assignatur Gentio Illiriorum regi, à quo cognomètum sortita est. Diosc. lib. iij. cap. iij.

*Gingiva*, carnes sunt adhaerentes maxillis, siue mandibulis, in quibus dentes infixi sunt, qui numero triginta duo, aut ad summum viginti octo existunt.

*Gingidium* γίνγιδιν, quasi χυπέφυλλον, quod foliis luxuriet, dictū: olitoribus autē Cerfoliū nomen quodidiam est: cuius vsus frequens in acetariis sanguinis aduisti extenuandi, repurgandi uē causa esitantiibus, magna stomachi utilitate: vrinam cit. decoctum ex vino potum vesicae prodest. Diosc. li. ij. cap. cxxxj.

*Geranium* γέρανιον, Amomum non est, ut quibusdam falso interpretatur legitur: nam herba haec varias in se complectitur species, qui diligenter naturam contemplatur, adoleſcentiam & maturitatem. Vulgus Herbariorum pro diuersitate figurae nunc hanc pedem colubinum, nunc illam herbam robertinam, aliam atque item altam rostrum grauis, acū pastoris, & corui- pedem, prout illis placet nomina inferunt quae facultate aliis aliae validiores experiuntur. Diosc. li. iij. cap. cxj.

*Germen* βλάστης, Graecis fucullus, Latinis Palmes est, qui ad plantae, vel arboris radices nascitur: & plerumque apud Vergiliū pro Virgulto accipi solet.

*Gerontopogon*, γερωντόπων, à Nicandro, γερωντόπων, id est barba senis à Cispanianis populis Barbula hyrcina vocatur, quae tamē differt à Tragopogone altera quoque species Senecionis apud Nicandrum videtur. In monte Catti Allobrogum copiosa inuenitur. Ruellius lib. ij. cap. cxxxvij.

*Gestatio*, quoniam in exercitiorum generibus annumeratur, est cuius quidem ope, aut factu mirum- immo dum aut morbos extenuare, aut somnos allicere veteres conabantur: quae ideo primus Asclepiades exhibuit, & lectum pensilem deinde Plin. excogitauit: nec non nostro etiam seculo, vagientibus puellulis, siue infantibus. Sub gestatione comprehenduntur equitatio, & vectatio.

*Gethyum* & gethyllis γέθυον, vulgari appellatione porreta, ciueta, ciboulla, aut si manus cepa inca pitata est: quas omnes indiscriminatim tractat Plin. li. xix. capite vj. Ruel lib. ij. cap. cxxvii.

*Gethys*, Morfus diaboli, sed falsū, quibusdam suspicatur: & apud nonnullas Gallic oras Salmunda, siue Sanamunda, appellata est, quod apud Rura incognitis medetur morbis, atque additis.

*Geum*, Brassanolo, & Gesū. Diaboli morsus non est, quibus verisimilius videtur eam esse, quae vulgō Garyophyllata, aut Sanamunda, & Oculi leporis, appellatur. Sed ad rei veritatem accedentes, Geum, laceam nigram officinis & herbariis appellatam, Diaboli morsum esse cum Ruel. li. ij. cap. cxxxvii. dicemus.

*Gibbus*, propriē est tumor dorsi, aut etiam pectoris, ex spinæ flexu enatus. In eodē enim accipitur pro quouis alio corporis tumore, ut est Celsus author li. viij. cap. j.

*Gingiuarum* inflammatio γαργαλις, est quae circa dentes non soluta putrescit: cui contraria γάργαις, id est, carnis eminentia iuxta denticum aliquem in gingiuis facta.

*Ginglymon* γίγγυμον, tertia diathroscos species est, qua ossa sese inuicem ingreditia coniungunturque admodum vertebrarum inter se, ac humeris, cubitis, qualligantur: quanquam in his quaedam sit differentia, ut Gal. author est in lib de Ossibus, γίγγυμον, nigella barbata, & quae Romana dici quoque solet, & haec hortensis: altera segetalis reperitur. Quae colitur in hortis, in medicinae vsu venit. Dioscoride auctore libro tertio, capite septuagesimo quinto. Reposimus cetera in dissectione Melanthium.

*Gladiolus* ὁ ἐξοπλός, Masiliæ regionem incolentes Imperatorem piscem hunc, à similitudine ensis imperatorij picti gerentis, appellarunt: cuius caro rara est, ideo modici alimentum vescientibus deprehenditur.

*Gladiolus* ἑξοπλός, neque iris caeruleo colore, candidovē, aut luteo, ut a corus nostrae, qui in flore spectatur, est: sed ea herba videtur, quae in altissimis groleanorum iugis sine flore, sed cuius folium in gladii formam erumpens, & tritum sortens, gignitur: retinuique ab odore male olente, sterica spatha nomē Sepalsiatis, id est, gladiolus: & aliquibus phasganion inachyronum, referente Diosc. li. iij. cap. xviii. cui florem purpureum, & semen tribuit: quod Iridi, non Xiphio, nisi Sparganium: pro spatha fertida

tida, vsurparie, ac cōmodandum potius videtur. Quæro dict. Sparganiū, & Xiphium.

*Glandula carnosā* *ωμολυγής*, corpus quoddam glandulosum, carnosumque, quod extra mesenterium est, & quasi intra lienē, ventriculū, & iecur vacuum in dorso explet.

*Glandis* magnitudo in pondere, denarii victoriatæ capie dimidium.

*Glans*, siue suppositum Barbaris, *Βαλανός*, ex mele, q̄sto & concreto, addito momento salis, & olei ut ex sola hierapicra, aut huius generis similibus, componitur: & elysmatum penuria aut difficultate iniiciendi elyssteris, imponitur. Quanta autem sagatur varietate, docent Methodici.

*Glans Βαλανός*, roboris, & quercus fructus est astrictioris facultatis: est deniq; *Ισ-  
ვის* glās, quam Castaneam, aut nucem vulgarem pleriq; interpretantur: quoniā Nux  
nomen generalis est ad quodvis genus fructus cortice duro ac lignoso vestitum: in  
quo genere Castanea comprehensa non est, cōmuniter vsurpatur. Quære dict. Nux.

*Glans* Sardiana, quæ alioqui Castanea, aut *Lepima*, aut glans Iovis appellata est, facultatis astringentis, & alimenti crassioris fluxulentiusque habetur, symplectique effe-  
ctus præbet, quæ roboris glans. Huius pulpa his qui Ephemerum biberunt, rite con-  
venit, referente Diosc. lib. i. cap. cx. iij.

*Glans* vnguentaria *ή ύψηλός* *Βαλανός*, myrobalanus officinis fructus est arboris,  
myricæ similis, magnitudine avellanæ nucis, cuius nucleus græcarum nucum more,  
tritus, humorem reddit, quo ad prædiosa vnguenta pro oleo vtuntur. Ea drachmæ pon-  
dere pota, lienem absorbet, cum etui farina & aqua mulsa, podagricis illinunt. Cate-  
ra Dioscorides li. iij. cap. cx. ij. Repete dict. Balanus, & Myrobalanus.

*Glastrum*, siue *Ιστίς* *Ιστίς*, herba quæda, & Pastellus est: duplex habetur, sativum,  
& sylvestre, vtrumque simile, atque eodem lanarum in sebores vtuntur: sed sativum  
solum habet plantaginis simile, verum pinguius, nigriusque: cuius caulis duum cubi-  
torum altitudinem excedit ad pleraque efficacissima herba experitur. Sylvestre gla-  
strum folia fert sativo maiora, la fluca ois proxima: caules pratenuer multifidos, qua-  
dam tenus rubentes vires easdem, quas sativum, pollicetur. Dioscorides sententia li.  
ij. cap. clxxvij. Plin. lib. xxij. cap. i.

*Glaucoma* *γλαυκίτις*, est chrysalini humoris passio, ubi scilicet ille ex humi-  
ditate in glaucum colorem mutatur: angulorū oculi sunt passiones. Marardus Epi-  
scopatū li. vij. Epistola ij. Plin. li. xxij. cap. i. A Egypta li. iij. cap. iij. Est autem humo-  
rum lentorum inter corneam, & crystalloidem congelatorum effusio: quæ à glauco-  
mate dissimilis perhibetur.

*Glaucium* *γλαυκίον*, Memytha officinis nominatur succus herbæ est ad Hierapo-  
tim Syriæ vrbem nascentis, foliis ferè papaveris corniculati, à quo tamen quantum  
differat, docet Diosc. li. iij. cap. lxxxvij. & ipsius quoque extrahendi succi rationem.  
Græci olim in vsu multo, & Arabibus nunc ignoratur, Gal. lib. vi. Simpl. & Plinius,  
xx. li. cap. xix.

*Glaux* *γλαύξ*, herbæ loti pratensis ramusculis, folio, flore, & siliquis in quibus fe-  
men, nisi quia crassior, & longiore discursu humi repit, similis videtur: in re medica  
nullius vsus, quam & in cibo animantia bruta dedignantur. Rura Malam domum,  
puto q̄b suæ facultatis, alimentivè inertia, dicunt. Sunt qui volunt in horde decocto  
lactis extincti reuocare vbertatem, Diosc. lib. iij. cap. cx. iij. Plin. lib. xxvij. cap. ix.

*Glauca* vrina, est quæ velut cornu lucenæ politum pellucida est, dicitur color  
hic Græcè ab omnibus Glaucus, qui Cæsius est: latius tamen patet Glaucus, nam præ-  
ter oculos nocturnos, quos omnes Glaucos esse confirmant, multa quoque dicuntur  
Glauca, vt apud doctos medicos vrina Glauca, à cornu splendore nominata: quæ in  
corpore infirmo virium prostratas facultates prorsus significat: suspecta quoque iu-  
dicatur. Thylesius hæc in lib. de Coloribus.

*Glandularum* inflammatio *ωμολυγής*, est quæ ex glandulis auribus adiacentibus  
fit, cui quidē correspondet *ωμολυγής*, hoc est, prominentes, & oblongæ in glandulis, quæ  
circa aures sunt epientæ. Cur deniq; facilius fluxiones recipiant, legendus est Aca-  
kia super Gal. lib. ij. ad Glaucō. Item Gal. lib. v. Meth.

*Glandule*



*Glandulae dētes*, sunt in gutture, sub auriculis, alis, & inguinibus, ex carne spongiosa in duriciem attractione humorū, contra fluxūque nomine alio *χολπαδες*, hoc est scrophulae vocantur, siue tumores ex pituita nascentes. Nā partes faucū, quae vrinque iuxta gargareonē sitae sunt, à Graecis *αμφοβουα* dicuntur, in recipiendis excrementis idoneae tū ob substantiae suae raritatem laxitatēque, tum quòd omnium partium fluxiones recipiunt, quia minùs moueri ad fluxum repellendum idoneae sunt: ob id quoque ad apostemata recipienda pròptiores Galeno cum *Acakia*, auihore libro secundo ad *Glauc*.

*Glenocider*, duo sunt sinus in inferiore summæ vertebræ parte leniter caui, ab ocularis sinus similitudine, appellati: sed sinus superiores cum capat ipsum excipiāt, non ab te sunt maiores, infra verò minores, qui vertebrā secundā admittant, vt scriptum reliquit Gal. in li. de Ossibus, cap. viij.

*Glessum* Germanis, vt est author C. Tacitus in libro de Germanicis moribus, Sucinū est, Gallis Ambrū: quòd nos remissimus in dict. Succina gutta, & Electrum.

*Gheyrhisa* γλυκὺ ῥρῖς, id est dulcis radix, vt Largus interpretatur, vulgus Myrtororū Liquiritia deprauato Graeco vocabulo, appellat. Fruticosa est, ramis binū cubitorū altitudine assurgentibus: foliis lentisci, flore hyacinthi, fructu pilulas platanū magnitudine, in filiquis prodeunte lentis modo, radicibus niter praelongis, coloris buxi, subacribis, & dulcibus: ex quibus succus excipitur, & dēfatur, ad arteriae asperitatis scabritie efficax habetur: vehementer sitientibus exhibetur vel in ptisana, vel in syrupo: nam & renum calori subuenit cum melierato.

*Gheysis* γλῶκκισ, casta herba Latinis appellata, *Paeonia* est, à *Paeone* denominata, postquā inuenta ab eo traditū reperitur. L. Apuleius *Aglaophotis*, & *Linæ sacra*: ea quoque ratione Lunaticos, hoc est Epilepticos, sanare experimento tradidit Galen. Patitur hæc similitudine Lunæ: crescente enim Luna, & hæc crescit: minuerente minuitur, id est viribus, non radice. Minuente Luna, si succo eius cum oliuo tesacco mixto Tertianariū, vel Quartanariū paroxysmi principio si perungas, indubitanter liberabis. Radicē autem tacentē Luna auulsam, si lunatico alliges, soluetur passio. Si quis à *Dæmone* tenebitur, incensū radicibus sufficiatur, mox *dæmon* fugabitur. Nauigantes tēpestatem si patiantur, radices pro *Thymiamate* incendiant, & sedabitur tēpestas. Illud planè obseuandum, quòd ne Luna crescente vnguas, aut suffias, siue radicē legas: nam nihil refert Lunæ vel augmentū, vel defectus, si tantūm obseruas herbarū radicis collectionem. Intelligere autem prudens potes, quòd diuersitate vsus omnis passio corporalis, necnon & animæ, per prædictū vsum potest crescere, & minui. Requirit dict. *Paeonia*.

*Glis edēus*, animal muri domestico simile, maiore tamen corpore, nutritur ac stabulatur in arborum cauernis, & bonam anni partem somno consumit: quòd non ineptè alludit *Martialis*:

*Dormitis nimum ghyei vitæque marini:*

*Non mirum est si vni crassa Minerva premis.*

Hoc animalis genus carnem suillæ proximam habet, & in vsu est Centronibus, & vicinæ quòd illic abundet: cui nomen indiderunt *Marmotanz*. *Plinius* libro octauo, cap. lvij.

*Gnapthaliū* γνὰπθάλιον, Largo Centunculum, vulgaribus Officinis *Cotonaria* appellata: de qua scripsimus in dictione Centunculum. *Dioscorides* libro tertio, capite cxij.

*Glutinium* γλῦκολλᾶ, præstantissimum quod ex coriis bubulis cōficiatur: id candidum est, & translucent, nigrum verò minus probatur, quid præstet *Dioscori*. docet lib. iij. cap. lxxxij.

*Glutinium* piscium γλῦκολλᾶ, venter est piscis cetacci: præstat candicans, minime scabrum, & quod celeritè liquefcit, emplastrisque vtile, quæ curem faciei erugant, & extendunt. *Diosc.* lib. iij. cap. lxxxij.

*Gnidium*

*Gnidium* γένιον *χόκοδος κνιδίος*, id est, fructus, Thymelææ: quæ Segusianis arbor gentilis, & Mayum, propter ipsius florum luteorum tum pulchritudinem, tum aduandantiam accepit nomen. Recentioribus medicinarum scriptoribus, Leo terræ suspicatur, sed longè à Diosco. Thymelæa differt, necnon à Chamelæa: cuius descriptionem videbis l. b. iij. cap. cliij. Cætera in dist. Thymelæa.

*Gobius*, & gobio γόβιος, piscis minutulus est, sed qui versatur in petrosi fontium aquis, optimi cibi, concoctusque facilis testis est Galiquam Hicelius mali cibi, sicut esse scribit, apud Athenæum: sed intelligendum suspicatur Scholiastes de his pisciculis, qui in fluminum ostiis versantur. De hoc pisce Ausonius scripsit non pauca in Mosella Diosc. li. ij. cap. xxxvij. de marinis pisciculis intellexit.

*Gomphosis* γόμφωσις, est cum ad instar clauis ossi infigitur: verum id iam quomodo ambigitur, propèque ad *σύνσπον* accedit, quum scilicet quippiam penitus infixum est, ut ne tantillum quidem veluti dentes dimoueat, ut Galenus scribit in Præfat. li. de Ossibus.

*Gonorrhæa* γονόρροια, nimia est præter voluntatem seminis excretio, citra pudendi tenciginem. Fit ob retentricis in vasis seminariis facultatis imbecillitatem, aut ob aliud malum, quod seminatorum vasorum facultas mouet, veluti in comitialibus, & aliis vehementioribus morbis contingit conuulsionum, oboritur & interdum ex seminatorum vasorum fluxione. Fuch. curatio docet li. ij. de Med. morb. cap. xlj.

*Gorgylon* γόργυλον ab Aegyneta, Hordylon γόργυλον à Nicandro, à Diosco. Tordylon vocatam herbam, & recentioribus herbariis Catui, & Careon agreste, interpretatum videtur, quod Creticum Sefeli est: herbula est furculosa, semine duplici, rotundo, scutulorum effigie, ut Tlaspi, odorato, subacti, cõtra vrinæ difficultatem bibitur denarij victoriati pondo cum vino. Diosc. li. iij. cap. liij.

*Gossipium* γόσπιον, lana xylina, vulgare nomen cui Cotonum, siue Bombax, & gossopium Italis appellatur. Fructum huius arboris præscribunt, qui viderunt, quantitatis esse castaneæ: cuius cortice aperto grana cotti, id est, lanugine plena sub aspectum veniunt. Pl. li. xix. cap. j. Superior pars Aegypti in Arabiam vergens gignit fruticem, quem aliqui Gossipion vocant. Plures Xylon, & ideo lina inde facta xylina.

*Gramen* γράμιον, seu gramen pecori esculentum, radice est modicè frigida, & sicca, parum mordaci, substantiæ tenuitatem sortita exigua: qua potu calculos interdum frangit. Nam gramen quod montanum est, pecora deglutendo, iugulat. Est præterea gramen arundinaceum, *χάλας γράμιον*, & gramen parnasi densius fruticem, ceteris, foliis hederæ, flore odorato, candido, semine parue non inutili: radicibus quibus aut senis, digitali crassitudine, admodum dulcibus: Arundinaceum gramen, iumenta edendo necare traditur, & cætera huiusmodi pecora herbam pascencia: id iuxta itinera & vias nascitur.

*Granatur*, ex carbunculorum genere præciosus lapis est, rubet modo balustij, transparet: cor exhilat, tristitiam pellit, ob id inrer medicamentum cardiaca miscetur. Quare Brasavolum li. de Gemmarum fragmentis.

*Grando* palpebrarum γράδα, tuberculum rotundum est, & trās lucidum, morbillique similitudine, huc atque illuc mobilis in palpebris obortum. Manardus li. vij. Epistola secunda.

*Graculus* γράκουλός, avis garrula, Monedularum genus primum, quæ vocis humanæ emulandæ studiosa est, ut & aues effingat ceteras, cibo inutilis, ideo à patinis reicitur, quia morbo comitali obnoxia.

*Granum* lupini, cum semisse in mensura siliqua est.

*Granum* tinctorium κόκκος βαφικόν, vermillio non est, quia ex luniperi planta esse gummi satis constat: neque etiam Minium, quoniam ex Minera est, cinnabaris species, sed ex stutice furculoso granum lentis effigie ramusculis adhærens, & in inficiendis lanis aptissimum. Diosc. li. iij. cap. xxix.

*Granum* Thymelææ *χόκοδος κνιδίος*, hoc est, granum gnidium, ex genere arboris gentilis, ut paulò supra diligentius exposuimus.

*Grædo* κρόνζα, humor est qui à cerebro, capitis abundantia, ad narēs defluit: cuius differentes tres insunt species, Catharrhoōs καθάρροος, Latinis Distillatio: qui sit ubi ad os ac fauces humor delabitur: altera coryza κρόνζα, quæ nostris grædo est, & sit dum ad nates decumbit humor: tertia branchos, Latinis raucodo vocatur: accidit ubi ad asperam arteriam humor distillat: ob varias causas accidere solet. Fuch. de Medend. morb. li. i. cap. xxiiij. curationis est author.

*Grossi* ὁ λυθός, quæ erinei nonnullis vocatur, & hæ sunt modica mentosæ, emplastricæ quæ de quibus Dioscor. latius lib. j. cap. cxlvj.

*Grossus* ὁ λυθός, authore Plin. li. xiiij. cap. vij. est ficus quæ nunquam maturefcit: differt quæ à carica pingui, id est, Diosc. Grosso, cuius usus in medicinis est frequentissimus.

*Grus* ὁ γέρανός, avis aucupibus valdè nota, quæ, vt anseres, gregatim regiones diuersas æstum appetens, volatu triangulari migrat. Hæc etiam per excubias, noctu, & die per vigilias secuta transmare volando iter perficit. huius quidem avis caro excrementosa est, ita quæ in uilis, vt anseris.

*Gula*, siue Meri, ὁ ῥοφάγος, communiter autem ῥόμαχος, via est quæ ab ore ad ventriculum cibum, & potum desert. Affectus gulæ explanat Gal. Locorum affect. li. v. cap. iij. Quære dicit Angina.

*Gummi* κόμμη, pro omni arborum lachrima generalius nomen est. Est præterea gummi genus cognomine Arabicum, à quibusdam Babylonium, aliis Sarracenicū, ab antiquis authoribus priuatum nominatum non inuenitur. Solus Serapio Arabs ex arbore Acacia promanare scribit, quæ spina Aegyptia est: cuius meminit Plinius lib. xiiij. cap. xj.

*Gustatiles* affectus, sunt sapores præter naturam qui nobis cōtingunt: omnes quoque distinximus in dict. Sapores: & in dict. Animalium actionum noxæ.

*Gypsum* γύψος, materia est calci aut dissimilis, modò ex lapide in fornacibus coacta, modò è terra foditur: vim habet astringendi, obstruendique sanguinis eruptiones, sudorēque cohibet: sed potum, strangulationis modo, iugulatuui remedio est butyrum liquatum & multum bibitum. si deest, oportet plurimū oliuaceum, vel aqua multa. Diosc. li. v. cap. lxxxi. & lib. vi. cap. xxiiij. Gal. li. ix. Simpl.

*Gurgulio* γόργυρεώτης, in extrema oris, & palati parte, quasi carnosâ particula, suspensus apparet: posterioribus medicis κίον, id est, columella, vna, & vuula, dicta est, huic subiacet lingua ad radicem ossi hyssidi affixa: de qua suo loco.

*Guttur* λάρυγξ, Trachetæ arteriæ caput est, id est, asperæ: constat ex tribus cartilaginibus: cui ori summo veluti operculum quoddam inserta est particula quædam ex linguæ ipsius radice profecta, quam Græci ἑπὶ γλῶττις, Latini ligulam, appellant, quod scilicet figura linguam fistulæ referat.

*Gymnasia*, motiones sunt corporis per diuersa exercitia: fortissima est enim exercitatio citata. Est & tertia, de his duabus composita, fortissimæ autem exercitationis finis est, frequens respiratio & spissa, ita vt vix respirare possint currendo. Eis necesse est, vt & sudor multus erumpat ex corpore. Hæc exercitatio illis est necessaria, qui otio vacant, & humecta videntur habere corpora. Nemo ignorat quia velocissimus curus extenuat corpora, & omnes euacuat plenitudines, & fortiora reddit viscerum membra, & rubicunda efficit, & digestionem fortiorum

ciborum facilem reddit: quod propter exalefit corpus. Hinc modis variis fit exercitatio, quæ ex Galeno describitur

apud Oribasium in libro Medicinæ

Compendium.



## De litera H.



*Habitus* bonus, est membrorum robur & integritas, seu corporis totius symmetria & robur cuius membrorum color proportio est, & decentia à natura necessariò tradita. Nam summum exercitatorum habitus nec consistere, nec mutare in melius potest: & qui ad summum bonitatis attingunt, periculosi si in extremo cõsisterint. Neque enim possunt in eodem permånere, neque quiescere: cum verò non quiescant, neque possunt proficere in melius: reliquum est igitur, vt decidãt in deterius. His de causis, bonum habitum statim soluere expedit, vt corpus rursus putriri incipiat: neque compressiones ad extremum ducendæ (periculosum enim) sed qualis fuerit natura eius qui debet perferre, ad hoc ducere conuenit. Sic & euacuaciones quæ ad extremum deducunt, periculosæ: & rursus refectiões, cum extremæ fuerint, periculosæ. Hippocrates lib. i. Aphorif. iij.

*Hælica* febris, est quæ fit quando calor in solidis corporis partibus accenditur: genusque febrium tertium est. Hæc a simili est vasi calido, quema dmodum enim hoc aquam quæ infunditur, calefacit, ita etiam Hælica quæ in solidis partibus hæret, illi quæ infixa est, omnes corporis humores calfacere valet. Plura leges in dictio. Marasmus. Curationis author est Fuch. lib. iij. de Medend. morb. cap. x. Gal. ad Glauc. li. j. & de Different. Feb. li. j. cap. x.

*Hælica* febris tres sunt species, prima, cum insitum humorem calor præter naturam iam obsedit: secunda, vbi carnosum genus occupauit, & insitum humorem iam depascit: tertia, vbi verè solidis partibus in hæsit. Quapropter febrium, quæ ex humoribus accenduntur, diuersæ habentur species: concalescens enim præter naturam sanguis, Synochon: putris verò bilis in venis quidem, assiduam in genere verò carnosum, facit tertianam. Ad eundem modum pituita, & bilis atra, varias febrium formas gignunt: vt docetur per Acaciam lib. j. ad Glauc.

*Hedera* terrestria, *γελυττωρός*, hedera humilis, & reptilis dicitur quæ quibusdam neotericis herbariis Asclepias, sed perperam, interpretata est. De ea meminimus in dictione Chamæcisus. Diosc. li. iij. cap. cx.

*Hedera xixoros*, vna candida, baccis nigris altera, & croceis acinis tertia, qua olim poetæ coronabantur: & sterilis, quæ belix: & purpureis acinis quarta. Lachrima hederæ grandioris, est velut aqueus quidam liquor, sicut alix omnes lachrimæ, calidissimæ est ab experientia facultatis. Corymbi hederæ huius per imbricem in liquorem destillati renum, & vesicæ indubitanter frangunt sine vlllo corporis interioris affectu. Quære dict. Corymbus.

*Hematiter*, à sanguinis colore lapis dictus: frigidus, astringens, ex crescentia reprimat, oculorum vulnera sanat, sanguinis ex purgatione valet, siccat humores, sed minùs, quàm Cadmia: nam ex humida substantia, non terrestri, constat: Galeno teste libro ix. Simplicium.

*Hæmorrhoidis*, & hæmorrhoidus Galeno, serpens est, nomen trahens ab effectu: cuius color pullus punctis nigris & albis insignitus: minor viperis humiliórque est, cornu gemino fultus. Hæmorrhoidis morsu sanguis fluit vndique, qui nec sisti potest quocunque a rtificio, concomitante cruciatu memorabili ad mortem: quippe percussus homines, sanguine per os, & nares, totò què corpore effuso, intereunt: vt in lib. Theriaces ad Pisonem scribit Galenus. In cuius etiam verba meminit Lucanus:

*At non stare suum miseris passura cruorem  
Squamferos ingens hæmorrhoidis explicat orbes. Et rursus.  
Impressit dentes hæmorrhoidis aspera Tullio:  
Vique soles pariter totos effundere sanguis*

*Coricil pressura croci sic omnia membra  
Emisere simul rutilo pro sanguine viuis.  
Sanguis erant lacruma quacunq; foramina nouit:  
Humor ab his largus manat cruor, ora redundant:  
Et patule naris sudor rubet: omnia plenis  
Membra fluunt: uenis totum est pro vulnere corpus.*

*Hæmorrhagia* ἡ ἡμορραγία, est copiosus, immoderatusq; sanguinis fluxus in quacunq; corporis parte. Fit autē scē tribus modis, ex vasorū videlicet ruptura, vel ex rosione eorundem, vel ex nimia apertione orificiorum in venis: nonnunquam etiam ex multa sanguinis tenuitate, cum sanguis secum magnam copiam serosi humoris habet admistam: ut author Gal. in li. de Sympt. different.

*Hæmorrhoidum* euacuatio, aliud nihil est, quàm venarum, quæ sedem ambiunt, explicatio: quòd per eas natura plerumque magnam atræ bilis copiam educit: ideoq; promanans à multis, iisque grauissimis morbis tutos, securusque nos faciunt. Quæ re A. Egyptam li. j. cap. xxxv. qui de veneris, siue stupri commoda & incommoda, post hæmorrhoidas, subtilissimè scripsit.

*Hæmorrhoides* ἡ ἡμορροΐς, venarum sunt in sese explicationes dilatationesvè à sanguinis defluxu sic appellata: harum aliz cæcæ, quæ scilicet intus mescunt, & nihil aut parum admodum sanguinis excernunt. aliz a pertæ, quæ videlicet certis quibusdam temporibus panduntur, & sanguinem emittunt. Fiuut autem hæmorrhoides propter copiam sanguinis feculentæ & melancholici, quem secur ad ipsas reponit. Quare dict. A. Emorrhoides.

*Hemerocallis* ἡ ἡμεροκάλλις Dioscoridis lilium syluestre est, solum & caulem lilij albi habens, porraceo colore, flores ex caule per singulos exortus terni quaternivè erumpunt, lilij diuisura, colore perquam pallido, radix magna est atque bulbosa. Herbarijs acotericis lilium conualium descripta legitur. Diosc. lib. ii. cap. cxvij. Plin. & cap. xxi.

*Halicacabus* ἡ ἡλικακάβος, solanum vesicarium, & alkekengi Dioscoridi, & officinis appellatur: quæ quinta solanorum species existimatur, sicuti scriptum reliquimus in dict. Solanum.

*Habica*, sit ex zea, quam dicoccon appellant: plus alit quàm oriza, aluum magis cohibet, & stomacho longè utilior. repetenda est dict. Zea, & Speltha.

*Halimus* ἡ ἡλμός, hoc est, Auro à Gaza versum: Gesnero ea creditur arbor, quæ seipimentis idonea est, in ipsisque nascitur, quam vulgus officinarum Blancamputam vocat: sed hæc planta seculo nostro ignoratur Scholiaste coniectore Dioscorid. lib. j. cap. cii.

*Halmyris* ἡ ἡλμύρις, Brassicæ genus ex Atheneco: halimus ex Aëtio accepit nomen. *Haliphleor* ἡ ἡλφλοΐς, glandiferarum omnium arbor valde deterrima, quæ nostratibus Salsicortex appellari potest: cuius glans adeo amara gustatu, ut eam præter suos, & aptos, nullum animal attingat.

*Halus*, herba est Gallis, quæ Venetis Cotonea vocatur, cunilæ bubulæ si milis, cuminumibus Tymo, dulcis & sitim compescens. Plin. xxvj. cap. vii.

*Halmader* ἡ ἡλμάδης, ut opinatus est Ruellius, oliuæ sunt, quæ coniungunt mucia: nam totæ salsuginem edendo representant.

*Ammoniacum*, liquor est resinæ, aut gummi modo stillans ex ferulacea quadam arbore Cyrenaica in Aphrica propè Iouis Ammonis oraculum, unde illi nomen. eius quoque frutex cum radice Agasyllis vocatur. Quare dict. Ammoniacum.

*Harmonia* ossium structura est, per simplicem lineam à natura tradita: sunt autem nonnulla maxillæ superioris, & quædam etiam capitis ossa ad hunc modum inter se iuncta.

*Harundo* ἡ ἡλάνδος, vulgò canna: in eatum genere quædam ἡλάνδος, id est, fractior, vocatur, ex qua sagittæ & hastæ fabricari solent: alia femina, quæ tibiæ ligulas efficiunt. alia, quòd fistulis addita sit, σφύγγις, alia crassa & concaua, quæ à quibusdam

dam Cypria, aliis donax, appellata: atque huiusmodi innumeræ habentur: quæ ex Dioscoride discuntur libro primo, capite nonagesimo septimo. Canna nostras radicem producit crassam, carnosam, & succulentam, qua optimè vitur in emplastro diapalmæum.

*Hastula* regia Apuleio Asphodelus non est, sed δὲ Ἰσφομελαχῆ, id est, rosa transmarina: malus genus præstante horris per familiaritate, vnum florem candidum, alterum rubrum autumno protumens: nonnullis malua transmarina dicitur: nullius in medicina usus. Verumta men seculi nostri omnes medici Asphodelon, Hastulam regiam interpretantur. Quare dicit Asphodelus:

*Hebdomades* circuitus dierum septem numerus est. hæc autem secundum dies creticos hoc modo numerantur. Dux quidem primæ & secundæ diducuntur, ac separantur: alterius enim hebdomadis initium octauum esse diem: tertia verò secundæ hebdomadis copulatur, vltima siquidem secundæ hebdomadis dies, tertia etiam principium existit. Repetenda dicitur est Quaternarij circuitus.

*Hecatheis* ἡ καθῆις, ἀ' κοιτῆς, neque Tora, neque para-leonis est, sed Ouidij hecathes aconitū, vulgariter *piscehiem* dictum: Ruel. Aconitum est. herba hæc quia prorsus nobis incognita, neque laboro:

*Hebetudo*, seu obscuritas visus ἀ' μωπία, est oculorum ab immanifesta causa corcepta obscuritas: cōuenit autem cum alio affectu, qui Græcis vocatur ἀ' κατ' ὁρασίς, quatenus uterque sit ab immanifesta causa. Differt verò, quoniam in hoc plenum est totius visionis impedimentum in ἀ' μωπία sola obscuratio, non plenus defectus. Manard. lib. Epist. vi. Epistola vi.

*Hedycroon* ἡ δυχρῶν, odoramenti genus est, siue potius medicamenti, quod commendatur à medicis tum veteribus, tum reuerentibus.

*Hedysmos* ἡ δυσμῆς, inquit Scholiastes, videtur ea esse mentha horrentis odoratissima, quæ caule est satis crasso: olitoribus Balsamus nominata, Galenus Simplic. libro sexto, hanc distinxit ab ea quæ inodora daptæhenditur: quoniam odor plantæ, Plinio teste, fecit, ut eam herbam, quæ μῆνῃ prius dicebatur, ἡ δυσμῆς Græci postea vocarent.

*Hedypnois* ἡ δυπνῶς, Intubi sylvestris genus est, foliis latioribus, quod quidem erudum edendo soluit: coctum verò ventriculorum dissolutum astringit.

*Hedysarum* ἡ δυσαρῶν, Securidaca, rura colentibus, cornuetam, quod flos apicem Securis, ad cornus instar, habeat, securumque integram repræsentet, appellant. nascitur ut plurimum inter segetes in aruis, flore purpureo & plurimo in stipite vno: nullus, quod sciam, usus.

*Helioscopium* ἡ λυσοκοπῖον, quartum Tirhimali genus est, foliis portulacæ, ramulis à radice stantibus quatuor, aut quinque, rubentibus, semipedali altitudine, lactei succi plenum. Plin. lib. xxvj. cap. viij.

*Helenium*, ἡ ἑλὲν, Inula, vel Enula campana vulgo appellata: hanc etiam, sunt, qui Nepenthes Plinij lib. & cap. xxi. esse putant: cuius succus vino mistus tristitia discurre dicitur, ac malorum omnium obliuionem inducere. neque tametsi buglossum est. Quare dicit Enula.

*Helioselinum* ἡ ἡλιοσέλινον, apij genus est, satiuo maius, in paludibus nascens, locisque humidis spontè proueniens.

*Helenium* Aegyptium, coniectore Gesnero, radicem esse eam, quam Ben lingua Arabum aliqui interpretantur.

*Helichrysus* ἡ ἑλῑχρυσός, corula odorata, chamæmelique species, neque ideo Amaranthus, videtur, quæ Stechas citrina spectatur, scriptore Io. Agricola. Quare dicit Stechas, & Chrysanthemon.

*Heliotropium* ἡ ἡλιότροπῶν, Solsequium maius, quando minus reperitur, Choriorum, Scorpioides, Calendula suo flore quod solem sequi dicantur, ex Heliotropiorum ordine scribuntur. Scholiastes in Heliotropij magni descriptionem detipitur, quod hæc vulgò herba Cancri dicatur, propterea quod flores in caudæ Can-

cri similitudinem flectuntur: potius cum Dioscoride, Scorpj scribendum. vnde ei Scorpioides nomen. Celsus herbam Solarem vocat.

*Herabotane* ἡραβοτάνη, id est sacra herba: Apuleio verbenaca mas, pro qua Vetonica m vsurpauit. Largus: quæ omnibus medicinz scriptoribus ipsa verbenaca est, eius pete Dist. suo loco repositam.

*Helix* Dioscoridi, squama æris discussa ex elauis Cypriore conflatis, quæ subtilissima est substantia, summâque desiccandi vim habet: referente Galeno libro Simplicii. ix.

*Hedix*, hederæ genus tertium creditur, nunquam fructum ferens, folia producens exigua, vt scribit Plin. lib. xvj. cap. xxxiij.

*Helixine* ἡλίχινη, muralis herba, & parietaria, à muris & parietibus in quibus nascitur, officina appellata est: differt tamen ab Alfine, id est, Myosotide, quæ auricula muris interpretata est: sicut scriptura habes in dictione Alfine. Est præterea Helixine cissampelos ἡλίχινη κισσαμπέλος, quoniam folijs hederæ in uineris nascitur, & uolubilis minima Gesnero dicitur.

*Hemierania*, dolorifica passio est, quæ circa dimidiam capitis partem aliquando dexteram, aliquando sinistram contingit, & iuxta suturam secundum longitudinem eius extensam terminatur. Hæc vt plurimum per circuitum exercetur, ac quibusdam extra caluariam, quibusdam in profundo capitis, alijs circa tēporum musculos dolor sentitur. Galenus Locorum affect. lib. iij. cap. ix.

*Hemina* mensura, sex impletur cyathis, id est, Sextariis tribus, vel acetabulis duobus: pondere verò denarios sexaginta. Sed Aegyptiaca hemina cyathos octo possidet, sic solidorum continet cyathos sex, mistra duodecim, cochlearia viginti, mistra parua viginti quatuor, scrupulos centum quadraginta quatuor, alibi quadraginta, vt Tryblion hemina: quæ mistra magna tria capit, acetabula quatuor: nam magnum mistrum acetabulum vnum continet, alibi libram vnam: hemiecthon capit mensuras chœnicas quatuor.

*Hemionitis*, vel hemionium ἡ ἡμιώνη, lingua ceruina est, non Scolopendri: quanquam lingua ceruina phyllitis videtur. Dioscorides libro tertio, capite centesimo decimonono.

*Hemitriteus* ἡ ἡμιτρίτιος, febris: cuius tota natura parte dimidia, alterutram tertianæ, & quotidianæ cōmixta, vel tertianæ intermittens, & quotidianæ continæ, coniunctio humorum diuersorum complicatione, fit. Gal. lib. ij. de Different. febr. cap. viij. & x.

*Hemeris* ἡ ἡμερίς, Gaza ex Theophr. Plancidam vertit: ex glandiferarum genere arbor, truncus neque erectus, neque leui, neque excelsus, sed caudice in orbem comoso, contorto, sinuosoque, ramorum alis multis concauo, glande maxima, & post sagum dulcissima, vt retulit Plin. lib. xvj. cap. vj.

*Heptaphyllon* ἡ ἑπταφυλλόν, vulgò tormentilla: à quibusdam Bistorta, quâquam & alia sit eodem nomine, Hermolaus tamen ita nominandam censuit, non legitur apud Græcos auctores, nisi sub vocabulo Pemptaphyllon.

*Hepiala* febris, est cuius calor & rigor simul in omni corporis parte sentiuntur, vt docet Galenus libro secundo de different. februm, cap. sexto. Idem ipse libro de Inæquali intemperie, in febribus verò, inquit, quas hepyalas vocant, tum ab interno, tum exiguis portionibus, eoque vniuersum corpus ambo sentire videtur. Quum enim tenuissimis portiunculis aspersum per corpus, tum calidum sit, tum frigidum, nullam sensibilem alterius portiunculam ita paruum desumas, in qua non alterum sit comprehensum. In ipsa tamen accessione inuasiōe aliqui febrientium tum rigent, tum febriunt, tum ambo sentiunt, frigus immodicum, & calorem vnâ: verum non eodem loco. Quæ restant hic scribenda, in dictione Lipyria febris petes.

*Hepar* ἡ ἡπαρ, iecur est, & sanguificationis officina, molli amplexu à dextris ventriculū confuens: intrinsecus cauum, extrinsecus gibbosum, hic chylus per venas mescit



meſeraicas, & ab inteſtiniſ per capillamenta venarum attractus in ſanguinem exco-  
quitur: inutile autem in eo in ſaniem & bilem vtramque digeritur.

*Hepatici*, ſeu lecinoroſi, quibus iecoriſ facultates imbecillæ ſont, dicuntur: atque  
quibuſcunque iecur amiſſa aut languente ſua facultate irritas proprias functiones  
obtinere, etiam ſi multus dolor, aut tumor aſſuerit. Plura leſturus apud Gal. lib. v. Lo-  
corum affect. cap. vij.

*Hepatica*, lichen eſt in roſcidis petriſ naſcens: quamvis id nomen commune cum  
aliis quibuſdam habeat, Brion tamen aliquibus nominatur. Quære Lichen.

*Hermodaſtylus* ἡρμόδακτυλος, veterum Colchicon, ſeu ephemeron, vt plerique  
hodie ſtatuunt, non videtur. A Egyneta tamen diuerſis locis, facultatibuſque, de re-  
bus tanquam diuerſis, meminit. Hermodaſtyli duo ſtaſigia ſcribuntur, vnum radice  
digitali longitudine, quod Dioſc. Ephemerum videtur, odoratum, iris agreſtis ap-  
pellatum. Alterum, radice rotunda, & ea ſoriſ vel nigra (quod Colchicon eſt epheme-  
rum, & deleterium) vel rubentes, vel alba, craſſa, ac modè dura, & ex loco edito leſta:  
calida initio ſecundi ordinis, ſiccæque, & aduerſiſſima ſtomacho eſt. Dioſc. li. iij. cap.  
lxxij. & lxxij.

*Hernia*, rames & ruptura κήλη eſt, quæ variis ſit modis, perque adiectiones re-  
rum opplentium, varias etiã appellationes accepit: quas ordine literario diſtinx-  
imus. Curat ionis author eſt Fuch. li. iij. de Morb. medendis, cap. lv.

*Herpes* ἡρπης, paſſio eſt quoties flaua bilis pura, nullòque humore alio admixto,  
excreta in aliqua parte conſiſtit: quod ſi ſubſtantia craſſior fuerit, & acrior, totam cu-  
tem ad ſubiectam uſque carnem exulcerat. Si verò tenuis, & minùs acris fuerit cali-  
dæque, exiguas puſtulas milio ſimiles per ſummam cutem excitat, ob eamque ſimili-  
tudinem κήλης ἡρπης, Latinis miliaris herpes dicitur.

*Hesperis* ἡσπερίς, viola lutea κηρίονος, ſeu κηρίον. Arabum, non eſt. heſperis au-  
tem ſos eſt colore rubicundo, candido, & interdum mixto: cuius odor quia olfa-  
centibus gratiſſimus, caryophyllique nidor ſentitur: garyophyllata nomen poſtea  
accepit. Sed quibuſdam, quia vespere plus redolet, heſperis appellata.

*Hyberis*, ſeu agriocardamum ἡβηρίς, κηρίονος καρδίου. Eſt denique hyberis, nomine  
Lepidium, hortiſ familiaris, quam ob acrem mordicationem, & guſtatu odorè haud  
in ſuauem referentem, piperatam magnam olitores appellant. Dioſc. li. ij. cap. clxvij.  
Quære diſt. Lepidium.

*Hieracium* maius ἡέρακον, Cichorea ſacra eſt, vel cichorium, quæ à cæteriſ flore lu-  
teo ſolùm diſfert: nam tres habentur in agris peregrinæ inter ſe ſpecie diſſimiles, In-  
tybum ſylueſtre, roſtrum porcinum, & dens Leonis, vt cum Ruellio coniicit Gefne-  
rus. Nomen ex eo inuenit, cõiectore Scholiaſte, quod ἡέρακον, id eſt, Accipitres, vulgò  
Sactes, ſucco herbæ huius oculorum obſcuritatem diſcutiant. Pli. li. xx. cap. vij. Eſt &  
hieracium alterum, quod & minus, id eſt, Intubum ſylueſtre, roſtrum porcinum, dens  
Leonis, & Tarthaſſacon, vulgò, vt exiſtimandum eſt, dicitur. Dioſc. libro. iij. capit.  
ſexageſimo primo.

*Hippogloſſum* ἡππογλωσσον, Laurus Alexandrina Gefnero, Bonifacia Italorum  
Ruellio: Scholiaſte Lingua pagana ad verbum interpreta ta ductio ſignificat magna,  
vel equina lingua. Itaque hæſitantium authorum varietas huius fecit, vt hæc her-  
ba in manus poſterioratũ incognita veniret. Dioſc. li. iij. cap. cxvj. fruticem eſſe ad ilea-  
tum ſcribit, & ruſci tenuis habere figuram, cum ſpiñoſa coma: & in ſummo ſeu lin-  
guas è foliis exeuntes.

*Hippocampus*, piſciſ magnitudine grandis, qui equus marinus reputatus eſt: Li-  
gñſticum, & Maſilioricum mare incolentibus Caballus marinus nominatur. Sic  
enim dictus, quòd equino collo, & à fronte tanquam iuba quẽdam propendet. Huius  
quinetiam animantis caro dura atque inſipida edentibuſ depræhẽditur: nullius quo-  
que uſus, vel rariſſimi.

*Hippolapathum* ἡππολάπαθον, pagorum lingua, vel parcella, vel patietia eſt: her-  
bariũ magnũ lapathũ, quo ſoliſ pro olere in edulũ olitores, & rura vtuntur, quibus

alus non mediocriter sine molestia soluitur, exoneraturque. Rhabarbarum monachorum hodie etiam nostratibus appellatur, à radice, prægrandi, & crassa, necnon intus colore buxco: cuius facultas ad Rha-Seniticum, vulgò Barbarum, quodammodo accedit: atque ea interdum in Zulapiorum, & apozematum decoctis utimur, & cedit ex sententia. Seculi nostri medici sunt nonnulli, qui Rha-barbarum nostrum vocent, neque sanè incommode propter eius facultates. Quare dict. Oxilapathum. Dioscorides ex generibus Rumicis oxilapathon esse scribit libro secundo, capit. centesimo septimo.

*Hippomanes* ἵππομανής, planta est fructu cucumeris erratici, folio autem nigriori, tanquam papaveris, spinoso. hæc ex Crateia Theocriti interpret. Huic enim insunt folia visis alba αἰσθητοῦ κν, & pusilli cucumeris similitudine fructus: qui cum maturuit rotus colore croceus videtur. Balzamina aliquibus poma, aliis Hierosolimitana, plerisque autem mirabilia: sed garanriam herbam vulgus, neque repugnat Gesnerus, si quis Hippomanes fruticem hunc, siue plantam hanc, esse dicat: cuius poma melensana vulgò dicta, & amoris poma, producuntur. Sunt qui & Apocynon vocent, hippomanes. Vergilius tamen usurpat Georg. li. iij. pro materia infami, & novercarum proprium venenum.

*Hippomarathrum* ἵππομαράθρον, sceniculum agreste, quod magnum appellatur: producit semen cachryi simile, cuius radix iucundo est odoratu, & in potu stranguriosis auxilio est: menses imposita fiet. Diosco. libro tertio, capit. sexagesimo sexto.

*Hilum* ἵλον, nigrum id est quod in summa faba visitur: & vñe quis dictionem calumnietur, non supremum plantæ fabæ, sed fabæ ipsius grani nigrum quod velat intrus germen est intelligendum, de his scribit Lucretius, verum aliter.

*Hippophaes* ἵπποφαῖς, lappago videtur: Plinio Asperugo. Etiam ex Tithimalo fieri optimū hippophaes apud Tegzam scribit Theophrastus. Diosco. li. iij. cap. cxliij.

*Hippophaestum* ἵπποφαῖστον, quod, ut refert Dioscorides, aliquibus hippophaes vocatur: nasciturque iisdem locis planta utraque ex genere Tithimalorum, quo eximitur succus, qui hippophaes, & hippophaestum, ex planta nomē, retinens, sillonibus deinde distus.

*Hipposelinum* ἵπποσελίνον, obusistrum, siue, ut ex Theoph. Gazæ placet, Equapiū, non quòd equis confectar, appellatum, sed à plantæ tantum magnitudine. aliquibus Alexandrinum apium, aliis Macedonicum, sicut reposuimus in dict. Apium. Diosco. li. iij. cap. lxxv. Pl. lib. xx. cap. xij.

*Hippopotami* ἵπποποτάμιος, καὶ ἵπποκαμπός, marinus equus est, capite & collo equino, rostro quoque oblongo: & sic ab eius fronte tanquam equi coma pendet: & eo loco quo equus iubam habet pilis diffuit: huius cauda draconis speciem, similitudinēque gerit. Plinius li. viij. cap. xxxv. Gillius in lib. de piscibus Gallicis, capit. viij. Diosco. li. ij. cap. xxj. Hippopotami testes exciccati, ac trixi contra serpentum morsus bibuntur.

*Hippuris* ἵππουρις, equisetum, & cauda equina: quæ duplex ostenditur, in riguis & scrobibus nascentes. cauliculi prodeunt inanes & vacui, geniculati, in se fracti, scabri, rubefcentes, & iuncta circa eos folia, exilia, & crebra. Alterum est caule unico recto, cubitali, & inani: per intervalla couis ornatur breuissimis & cæcidis. Vtriq; vires asignant similes Diosco. li. iij. cap. xxxvij. Hanc etiam Caucū καυκόν interpretatur Gesnerus: culinariis mulierculis prela habet nomen, illis multum expetita.

*Hirci* barbula ἡρκα γαρύγαν, quæ ab aliis Come vocatur: breui est caule, foliis croci latioribus, radice longa, & dulci: magno super caulem calyce, luteo flore adornato, & cum senuit in pappos euanescentes: ibique semen nigrum inuenitur, herba esui apta est. Quare dict. Tragopogon.

*Hirundinaria*, χελιδονία, hirundinum auicularum herba. Est & humile chelidonium, vulgò Scrophula appellatū: quorum remissimus in dict. Chelidonium descriptionem.

*Hirudo*, sanguisuga, hoc est, hirudinis stagnantis versicolorē, serpens dictus est: cuius longitudine cubitus est, atque in aliquod animal veneno eiacularo repentinus incredibilisque dolor sentitur, non sine cordis vegeta palpitatione, & corporis totius inflammatione, sed extremis membrorum partibus frigidissimē stupentibus & somno letali ante duas horas, qui ictus fuerit, perit. Hirudinibus stagnantibus, præsertim versicoloribus ad sanguinis euacuationem vtimur atque eas commendat Galenus in lib. de sanguinis exuberantis in venis euacuatione.

*Hirculus* τριγύς, frutex pumilus ingenti spræ, à gravitate odoris nomen accepit, eum Gallica nardo semper nascitur. Dios. li. j. cap. vj. & vij.

*Hirundo* χελιδὼν, piscis, qui Malsiliam colentibus, Lendola suo loquendi more, dicitur, & frequenti in vsu est, & editur variis culinarum, propter carnis insipidæ neglectum, condimentis.

*Hirundo* χελιδὼν, auicula transmarina, quæ inter volandum per cælum prædam venatur, gartula supramodū, ædibūque perfamiliaris, sed ingrata, domino familias insalutato, alio se recipiens, abit. Est veris prænuncia, sed medicinar mirum-immodū utilis, quam homo tamen in cibis respuit: miros habet effectus eius cremata caro, vel tota ipsa auis, necnon per imbricem extillatio.

*Hordeolum* κριθή, abscessus exiguus, & oblongus iuxta palpebræ cilium marginē ortus: τριθῆν, quod præputio similis scialio nomine dictus est hic abscessus.

*Hordeum* cereale κριθή σπορίμη, legitur & trimestre, & disticum siue Gallicum, ponderis & cædoris eximij hordeum, vt in lib. Gal. de Alimēt. vertit Greg. Martinus. Est deniq; sylvestre siue erraticū, & lexticū, id est, mundū hordeum vt vocat Gal. lia, quia folliculo castratum vel spoliatum enascitur Ex Ruell. hæc Gesnerus.

*Holostium*, vel holostem ολόστηον, καὶ ὁλόστηον, molle gramen, quod sine duritie sit, dictum: vulgaris plebs dentem caninum vocat. Graminis autem genus variū, ac multiplex: cuius quære dist.

*Homogeneus* corporis partes eas esse, quas v nigenas suspicamur, aut generis eiusdē congenitas. Galenus ὁμογενῆ vocat febrem, quæ nomine alio dicitur στυγὴς, cuius meminimus in dist. Febris continua.

*Horminum* ὄρμηον, Orulla, & Tota-bona oclitoribus, & plebeis nominatur: herba est foliis marrubio similis: caule semicubitali quadrangulo, circa quem emittentæ siliquis similes prodeunt, in quibus semen diuersum recluditur. In hormino siquidem erraticę rotundum semen, fuscūque inuenitur: in satiuo autem nigrum & oblongum, fuscūque inuenitur Dios. li. iij. cap. cxxij.

*Humeri* ὀμῶν, vt inque proniuent, pars ab summo humero ad cabitum vsq; pertingens, Græcis βραχίον, humerus, & brachiū Latinis: os adiutorij recentioribus appellatur. Caput humeri veluti in duo diuidens tubercula prominens brachij est pars, quæ Græcis ὀμὸς: processus verò interior scapulæ, græcè δ' ὕκροποιδης, καὶ ὀμῶν, quod scilicet ancoræ, vel rostro coroino similis sit.

*Humores* quatuor numero existunt, sanguis nimirum, pituita, bilis flaua, & atra: quos Galenus li. ij. de Elementis animantiū sanguine prædictorū, elementa nominat. Sanguis sanè calidus & humidus dulcisque: pituita frigida & humida, qualitatēque expers, vt aqua: bilis flaua calida & sicca, ac amara. Atra verò frigida & sicca, æterba, atque terrea. Porro cū humores hos calidos, frigidos, humidos, siccōsve dicimus, tales esse non nisi potestare dicimus. Quippe dissidet id quod actū, & secundum apparentiam tale est, ab eo quod potentia, seu facultate est. Potestare autem, quod adhuc futurum est: neque tamen subsistens. Actū enim est, quod iam præsens est. Gal. de Atra bile.

*Humores* qualitates suas seruant, cū secundum naturam se habet animal: ipsiq; humores naturales, ac salubres à medicis appellantur. humor quoque vitreus pituitæ non naturalis prima species est à Praxagora.

*Humorum* siccitatis quatuor quidē differentię, seu absumptæ hæcicæ sūt: quippe quod d seniu in sanis est, id sicca in ægris intemperies: itaque insanabilis etiam est, si profus

prorsus sit consummata, vbi solida similium partium substantia reddita est sicior.

*Humorum* siccitas secunda, cum ea quorum substantia ex humore concreto constat, sicut caro, & adeps, sunt liquata, humorum tertia siccitas, cum propria humiditas vnde partes nutriuntur, omnino est absumpta: cōtinetur ea in omnibus animalis partibus, seu tota quidam per eas sparsus humorum quarta ab his siccitas est, quæ in propriis cuiusque exilibus arteriis, venisque consistit. Gal. lib. vii. Meth.

*Humorum* oculi primus vitreus, seu vitriformis, qui ὑδαρὸς dicitur: quod scilicet vitro fuso sit similis. Glacialis humor secundus, à præcedente nutritur, qui χυρὸς ὑδαρὸς, quod nimirum glaciei modo concretus sit, nominatur. Tertius humor aqueus, qui ὑδαρὸς ὑδαρὸς, ab aquæ similitudine, appellationem habet: hic humor corneamunicam sustinet, ne in crystallinum humorem collabatur.

*Humorum* abundantia partitur in eam, quæ est omnium, vel vnius dūtaxis. Omnium humorum abundantia πολλὸς καὶ πολλοὶ, aut plenitudo, multitudoque nominatur: cuius rei Gal. lib. xii. Meth. & lib. ij, de compos. Medic. κατὰ τοιοῦς, capit. j. author est.

*Humoris* à loco in locum translatio ἀποσχημα, est quando humores qui prius vnam partem infestantes, ea relicta ad alteram transferuntur.

*Humores* purgandi sunt, qui duntaxat corpori molesti apprehenduntur: nam si pituita redundat, corpūque infestat, hanc omnino euacuare oportet: si verò bilis flaua, vel atra corpus molestat, abstinendum à pituita, & bilis infestans euacuanda. Sic vbi serosa humorum pars abundauerit, & hanc euacuare oportet. Vide Fuch. Compendij Medi. cap. xx.

*Humerus* seu brachium, adiutorios est: nam brachium constat ossē vnico, cuius supremum collum omoplattæ caput brachij appellatur: voluiturque intra concavū ossis omoplattæ, atque continetur.

*Hyacinthus* ὑακινθὸς Græcis, vaccinium Latinis appellatur: crescit enim vnà cum Saryrio in pratis, sed odoratissimum florem gerit, prope modum odore similem violæ altili, sed vehementiorem: & colore ac foliorum ordine, differt à Saryrio, est quæra dice bulbosa. Diosc. lib. iij. cap. liij. Ruell. lib. iij. cap. ciiij. Est denique hyacinthus alter, qui Græcis ὁσμωσπυδαδὸς Pausania auctore, & ex Ruell. interpretatione, flos hyacinthus dictus.

*Hyacinthus*, lapis preciosus, tuber viribus optimus: qui à fulgure, & peste, omine quoque sinistro gestantes servare creditur: miscetur inter cardiaca, hoc est, cor roborantia, vt ex Serap. testatur Syllius.

*Hymen* ὑμῆν, virginale interceprum est, in medio vteri membrana retis formā habent ex venis, & fibris cōtexta: quanquam inter rei Anatomice peritos satis cōstat in virginum dissectionibus pelliculam eiusmodi nullam inueniri.

*Hydrops* ὑδρῶς, Latinis a qua inter cutem interpretatur: cuius species tres principales habentur: vna ἀσцитὶς, altera τῦμπανι τῆς, tertia, ἀνασπαρχή: de quibus suo ordine fit explicatio. Fit sanè hydrops: ob insignem iecinoris frigiditatem, aut ob alias partes vehementer refrigeratas, quæ iecur in affectum eundem educere valent. contingit etiam ex immodica hæmorrhoidum, & menstruorum evacuatione, aut ex eorundem retentione, aut ab alia quadam magnā veteri affectione, duritie nimirum, aut simili. Curationem in integrum, & fideliter docet Fuchsius libro tertio de Medendis morbis: post Galeaum in libro secundo, ad Glauconem, cum explanatione Acakiz.

*Hydrargyrum*, ὑδραργυρὸς, metallorum omnium semen, siue germen, & pateri argentum quidem colore, liquida verò substantia aquam referens: vnde & nomē accepit. Huius duæ species sunt, vna fodinarum, altera ficitia, quæ ex Minio eximitur coctura: Diosco. cognitum utrumque Gal. fossile tantum, neque expertum. Quære Arg. Viuum.

*Hydnophylla* ὑδνοφυλλα, herba quæ super tubera crescit: quæ reperta præsertim subesse cognoscuntur: vt asserit Gesnerus. Quære dict. Tuber.

*Hydra*

*Hydrelaum* ὑδρελαῖον, oleum aquæ commistum: humectandi, mollicendi, & penetrandi vim habens, ut est author Gal. lib. iij. Simpl.

*Hydrocele* ὑδρωκελη, hernia aquosa, cum scilicet aqua in scroto colligitur. Quæ re dict. Hernia.

*Hydrocephalus* ὑδρωκεφαλός, dolor capitis nascens ex humore inter cutem, & petricranium, aut certe inter hoc & cranium collecto, ut scribit Celsus lib. iij. cap. ij.

*Hydrolapathum* ὑδρωλαπαθον, lapathi genus, quod in aqua nascitur auctore Plinio lib. xx. cap. xxj.

*Hydromeli* ὑδρομελι, aquæ mellæ genus, ex imbre purissimo & melle temperatum: & iam vetustate saporem vini referens. Nam quod recens est, & ad præsentem usum confectum melicraton potius nominatur. Hydromeli quoque ex imbre puro cum melle temperabatur olim, quod daretur appetentibus vinum ægris. Marcellus in Diosc. li. v. cap. ix. Pl. xxxj. cap. vj. Est insuper liquoris genus, quod Græcis ὑδρομελις, ex melimelis portione una, & duabus aquæ confectum, insolatis simul per canis ortum: ex Diosc. li. v. cap. xxj. Hydrophalos item, ὑδροφαλος, torpidi humoris in umbilico collectio.

*Hydrophobia* ὑδροφοβία, id est, aquæ fuga, morbi genus, cum æger supramodum aquam expauescit, quod accidere solet iis, qui à rabido cane fuerint demorsi. Hinc hydrophobii, ὑδροφοβοί dicti sunt ægri, qui aquam expauescunt, hoc est, quos canis rabidus momorderit. Pl. li. xxix. capit. quinto. De cura canis rabiosi. Dioscor. libro vj. cap. xxxvj.

*Hydropiper* ὑδροπιπερι, herba est circa stagnantes aquas, aut quæ pigro lapsu fluunt, nascens, caule geniculato, robusto, multis alis concavos foliis mentha maioribus, candidioribus, gustu piperis amaro. Fructu gerit actem in ramulis, secundum folia, continenti acinorū serie congestū, vix modo. Dictū hydropiper auctore Gal. à piperis sapore, & locis aquosis in quibus nascitur, quasi piper aquaticum. Ruel. eam esse existimat herbam, quam officinæ falso nomine Eupatorii appellant. Diosc. li. ij. cap. cliij.

*Hydrops*, ὑδρῶς, id est, aqua intercus, quod sub cute aqua nascatur, quæ corpus turgescit: huius tria sunt genera, tympanites, cum corpus spiritibus magis, quam aqua distenditur, pulsatumque tympani sonum reddit. Ascites, cum alimenta in aquam convertuntur quæ inter intestina, & tunicam, peritonæon vocatam, velut in virem colliguntur. Tertium genus omnium periculosissimū, & incutabile, hypofarca appellatū, quum solidæ corporis partes in aquam resoluuntur, ut corpus reddatur pallidum, & cadaveri simile. Celsus lib. iij. cap. xxj.

*Hydropisus* ὑδρωπισις, aqua intercus dicitur de qua copiosius in dict. Aqua intercus. Est & ὑδρωτερωνηλη, herniæ genus, quum & intestinum in scroto delabatur, & aqua ibidem colligitur.

*Hypercathartica*, id est, superpurgantia, sunt ex his valentiora viribus, aut quantitate, & quæ vacuato humore sibi familiari, cum deinde trahunt, qui ob tenuitatem, calorem, liquiditatem, est ad sequendum paratior: postremo sanguine naturæ maximè familiarè. Morfu enim suo venarum ad ventrem pertinentium ora laxant & aperiunt, vasque ipsa reddunt imbecillæ ob fatigationem & intemperiem: ex Galeno hæc Syllius.

*Hypercatharsis*, est à medicamento purgante vacuatio immodica, quæ fit ratione fumentis, medicamenti, accidentiū utrique superuenientiū: ut est author Galen. lib. iij. Simpl. cap. xxvj. & xxvij. Syllius super Mesue Theoremate iij.

*Hyoscyamus* ὑοσκαμῖος, altercum, & Apollinaris: quæ quoque Suis faba interperatur, quod eius pastus fues conuellitur, resoluanturque, nisi mox fluviatiles canes edent, ut refert Helianus. His enim fabis apros Erymæthios in Arcadia ab Hercule occisos scribit Phyllo in sua antidoto, Galeno referente lib. ix. Conipo. pharmac. Triplex inuenitur, primus, purpurascens flore, semine nigro, veneno abundans: alter, flore, & semine luteo, mitior: tertius, flore, & semine candido, ad sanationes aptissimus: frigidus ordine tertio, siccus primo. Gal. lib. iij. Meth. & viij. Simpl. Dioscorid. lib. iij. capit. lix.

*Hyperici*

*Hypericon* ὑπερικόν, aliis androsomon d' ἰσχυρόν, est, quasi sanguis hominis diceret: vulgaribus Perforata, hæc trita digiels sanguineum succum remittit, qua ex causa Androsomon vocatur: utrinam eis, menstrua pellit appositum, tertianis, & quartanis cum vino potum, liberat. Semon quadraginta diebus haustum ischiadicis medetur, & articularibus.

*Hyphæar* ὑφάαρ, viscum quercinum, cæteratūque arborum: abietis autem, & larcis lachrimam, non viscum, hyphæar esse dicitur Arcades: sic quoque llicis fructus appellatur.

*Hypocistis* ὑποκίστις, rosæ sylvestris succus, quam caninam rosam quidam vocat, referente Scrib. Largo. Hypocistis ad Cisti radices, punici flore similis, nascitur: sicat & astringit magis, quam acacia. Gal. lib. vij. Composit. pharm. Diosc. lib. 7. cap. cix. Syluius lib. j. de Simpl. med. natura.

*Hypochondria* ὑποχονδρία, præcordia, lumbi, & ilia dicuntur. Sunt enim partes laterales utrinque nothis costis subiectæ, hepaci & lieni superiacentes, & sub cartilagine sitæ, repetere dicit. Præcordia.

*Hypochima* ὑποχίμα, suffusio est, qua oculi infestantur, unde oculorum suffusio appellata est, effusio humorum lentorum inter corneam membranam, siue tunicam, & crystalloidem congelatorum, plura in dicit. Suffusio.

*Hypoglossus* ὑπογλωσσός, caruncula qua lingua inferiori parti oris coheret: sic dicta, quod sub lingua sita. sitaliquibus Ramula est, de qua in sua dicit. plura.

*Hyssopus* ὕσσωπος, aromatica herba est, & hortis perfamiliaris. Est etiam hyssopus montana super Regio lectulo abundans, non procul Bellicio ciuitate antiquis. in Segusia provincie Galliar Narb. Quædam à Dioscoride hyssopo tribuuntur, quæ in Gallico nostro desiderari videntur. Cum florum spica legendum est, aut cum turget semine. Gal. lib. viij. Simpl. Diosc. lib. iij. cap. xxvj.

*Hyporheum* ὑπορθέον, herba est in aruis, segetibusque nascens, cutæ foliis, ramis exilibus, succum emittens papaueris viribus proximum. Nomine alio hypæcon Plinio dicitur.

*Hypopion* ὑπόπιον, oculi morbus, cum pus sub cornea tunica colligitur. Est hypopion item liuor sub oculis contingens, à sanguine compressis venulis exeunte, & sub cute permanente: cuiusmodi Latini medici Sugillata appellant.

*Hyposphagma* ὑποσφάγμα, sanguinis subter cutem diffusio est, contingens ex venarum ruptura, ictu fustis, durivè iaculi alterius illati, ὑποσφάγμα Galeno sanguinez suffusiones dicuntur.

*Hyssinum* ὕσγινον, plantæ genus inter herbas, quo color tingitur coccineo similis. ut est author Plinius lib. xxvij. cap. vij.

*Hystera* ὕστερα, sunt folliculi, quibus infans volutus prodit in lucem, & quicquid infantem ex utero sequitur: hysteriæ quinetiam mulieres dicuntur, quæ veteri suffocatione laborant in quibus sensum, pulsūque per intervalla nullum, aut certe perexiguū percipere possumus: quam passionem hysteriæ appellamus. hoc est, matricis, vel uteri suffocationem.

De his



## De litera I.



**I**aculus serpens ab effectu dictus, velocissimi, funestissimiq; ictus. Is subit arbores, & vt iaculum obuianibus se obicit, & scrit, morsque repentina subsequitur. hæc Galenus in Theriacis. Solinus de laculis serpentibus hæc quoque refert inquit: laculi arbores subeunt, quibus vi maxima turbinati penetrant animal quodeunque obuii fortuna fecerit. Lucanus quoque:

*Ecce procul saeuus sterili se robore transfert:*

*Torxæ, ex immixtis: iaculum vocat Apbrica serpens.*

*Perque caput Pauli transiitque tempora fugit:*

*Nil ibi virus agit, rapuit cum vulnere fatum.*

*Ianstor* πύλινος, meatus inferior ventriculi est, qui ex fundo eius explantatur: & intestinorum principium à quo primum Duodenum intestinum est cibum post ventriculum recipiens: secundum leinum est, quod nihil retineat, appellatum: tertium ileon quod subtile sit dictum: in orbem varios implicatum: nam cum leino sibi adhærente, regionem ventris inferioris elatiorem occupat. Inibi serè Cæcū anfractuosum succedit, medio intestinorum, quod mesenterium dicitur, modicè innitens. Hoc sequitur Colon, crassum intestinum, aliis carnosius: quod à sinistro rene ad dextrū super ventriculi fundum scitur, donec sepe numero & lienem & iecur attingat. Vltimum ab ano intestinum est rectum, spinæ è directo incumbens spaciosum, excrementi receptaculum. Quoniam vltimum intestinorum est, aliquibus medicis posterioribus rectum, siue fundum, animumvè nuncupatum: in quo secundum finem musculi sunt, qui quum opus est, constringunt, materiâque retinent, deiciuntque dilatando cum opus est stercus. Gal. li. v. de Vsu partium.

*Iasminum*, & iaseminum ἰασμίν, id est, viola odoraria: frutex topiarius est qui in hortis colitur: veteribus medicinæ scriptoribus, Gesnero coniectore, ignotus: sed ab Actuario inter posteriores Græcos Zambacis dicitur: Plinio Leucanthemon, si quidem cū Car. Stephano nobis diuinare liceat, eâ herbâ fruticosam appellabimus, quæ hodiè apud nos multis in locis, pergulis rectis admoueri solet: vocat autem vulgus lasminum, si sequi Plinij descriptionem volumus li. xxxvj. cap. xij. inquietis, ramulos ei esse nunquam pauciores duobus in diuersa tendentes, florem candidum, lilio rubro similem, semine nigro, lato, ad lenticulæ dimidiæ figurâ, multo tenuiore, radice herbacei coloris: quæ omnia lasmino nostro conueniunt. Eadem, vt opinio est, videtur, quæ phalangites, & phalangion à Galeno vocatur: quod à phalangis morsis, au xilietur: quod idem nomē huic herbæ adscribit Plinius. Leucanthemi meminit Diosc. in capite designaro Anthemidi li. iij. & cap. cxxxj. cuius descriptionem fecit nullam.

*Iaspis*: lapis virens stomachum & ventriculum attractu suo iuuat. Omnes quippe iaspidis species appensæ scemoris, partum accelerare tradit Diosc. li. v. cap. xciiij. Gal. li. ix. Simpl. & x. de Compos. phar.

*Ibiscus* ἀΐθαλα, bismalua est, quæ à vulgari malua differt: & species tertia, Alcea, folia habens maluæ, sed incisa magis, ad verbenacam accedentia, caules tres, aut quatuor habet cortice canabino vestitos. communis verò malua tota supina colligitur: atqui quæ Ibiscus, in altitudinem tantam arborefcit, vt pinnulas arbores plerisque in regionibus æmuletur. Quædam est etiam, quæ flores veluti rosæ similes autumno gerit, quos vulgus vocat, *roses d'autre-mer*, vt alibi à nobis dictū est. Videto Diosc. li. iij. cap. cxxxix.

*Iberis*, siue cardamantica herba est, folia habens nasturtij, vere virentiora: caulem cubitalem, aut minorem, in incultis nascitur, æstate lacteum florem promittit: quo tem-



pore efficacior est. tota herba cum semine caustica est sinapi. Diosc. li. j. cap. vii. Quare dicit. Lepidium.

*Icterus* ἰκτερίς, bilis flauze modò, & atræ quoque, per corpus vniuersum effusio: quæ regia, seu arquata passio, & aurigo appellatur. Fit interdum iecinore nihil patiente bilis effusio ad cutem in morborum indicationibus: nonnunquam vbi citra febrē sanguis ab extraneo aliqua occasione corrumpitur, ac biliosus efficitur, sicut à venenatarum bestiarum moribus contingere consuevit: aut propter inflammationem, aut naturalis temperiei iecinoris aut lienis permutationem, aut etiam ob imbecillitatem vesicæ bilis, atque aliis diuersis causis. Vide eius species in dict. Bilis. Curationis author est Fuch. li. iij. de Meden. morbis, cap. xxj.

*Icthiocolle*, piscis cuius corium glutinosum est, quod ipsa nominis ratio ostendit, vt conicit Scholiastes: & vulgari quoque appellatione in occiduo mari Molia dicta. Ego profecto piscem referrem inter Asellos marinos, hoc est, Merulos, eorum genere quonia esse videtur, verum carnis mollioris. Diosc. li. iij. cap. lxxxiiij.

*Idea* ταξις ἰδέα, ἡ πῖς, herba idæa est, solis rusei, adhærent ei clauicula, velut pampini, è quibus flos. Ad omnia conuenit quibus adstrictione sit opus. hæc Gesnerus Diosc. li. iij. cap. xxvj.

*Iecur* ἰκτερίδιον, viscus est, & venarum omnium principium, & in dextra hypochondrio rû parte situm. Hoc in quinas magna ex parte diductum est fibras, quas ὀστέδες, Græci appellant in quibusdâ tamen ne fibras quidem habent, sed ex toto rotundum, minisque rectum: quibusdâ duas, aliis plures, multis & quatuor obtinent. Ex maiore iecinoris fibra parte cauâ, canalis vnus exiguus ibidem bilem in vesicam sibi appendulam deriuat, quam Græci χυλὸν χολῆδος, Latini vesicam bilis susceptricem, bilis folliculum, & vesicam felle nominant. Iecinoris imbecillitas ab intemperie ipsa producitur calida, frigida, humida, vel sicca: cuius curationem petes ex Fuch. li. iij. de Meden. morbis, cap. xvij. explanationem autem affectuum Locorû affect. libro quinto, cap. vi.

*Iecinoris* obstructio, est quæ fit à flatibus vaporosis, concoctûque difficilibus: interdum autem & à crasis viscosisque humoribus, in sinibus venarum ex cima iecinoris parte enatarum, per quas ex ventre & intestinis alimentum digestio ad iecur contingit. Cætera petes cum curatione ex Fuch. de Meden. morbis li. iij. cap. xix. Iecinoris scirrhosi curationem habes ex Gal. & Acakia li. ij. ad Glauconem. In iecinore perinde atque in aliis visceribus, ob eandemque causas, fit inflammatio: inflammatio autem iecinore omnibus quidem ex æquo in dextro hypochondrio dolor & grauitas est, qui supra ad ingulum vsque, infra autem ad spurias costas peruenit: tumor quoque dextri hypochondrii consequitur. Curationis author est Fuch. lib. iij. de Med. morbis.

*Iecorarius* piscis ἰκταρός, quem Galenus inter molli carne pisces reposuit: creditur esse piscis, qui alioqui Omphacinus appellatur.

*Igne* ἰγνί, apud Hippocr. Isatis, id est, quæda siue pastellus, quo lanæ in Gallia Aquitanea inficiuntur, vt suspicatur Ruell. Diosc. li. ij. cap. clxxvij. Egnem nominat. Quære dict. Glasium.

*Ignis* sacer, inter vlcera maligna numeratur, vt author est Celsus libro quinto: eius species duæ sunt, altera subrubieunda, aut mista rubore, atque pallore, exasperataque per pustulas continuas, quarum nulla altera maior est. Fit maximè in pectore, aut lateribus, aut eminentibus partibus, præcipueque in plantis. Altera autem est in summo curis exulceratione, sed sine a litrudine, latum, subliuidum, & exedens. Quære dict. Erysipelas.

*Ilex* glandifera ὀξυφύλον, gerit glandem vulgari similem: verum multò efficaciorẽ glande quercus. Ea autem ilex nostris in Gallicis regionibus rara est. Est denique aquifolia ilex, Quisquillia quæ appellata est, coccum tinctorium, Baphicum dictum, setens paruo frutice, Gesnerus Vermillionû interpretatur: & altera, quæ aquifolia magna est, Scholiastes Escarlatam, in gallia Narbonensi frequentem, esse vult: fructu hyeme copioso, sed inutili. Rusticorum vulgus Egressum vocat, sed non desunt

sunt qui referant *παλαδρον*, id est, subiferam arborem, ad ilicem.

*Illecebra* α' *νδραχνη α' γρι α'*, quibusdam Soldanella, hoc est, bralsica marina, & ter-  
tia species Sedi. sylvestris est portulacæ genus, maiori semper uiuo simile, nisi quod fo-  
lia habet pusilla, sed latiora, maculosaque nascitur in petris, & sterquiliniis. Ruel. lib.  
ij. cap. cxi.

*Iliæ*, barbarè inuolucrum: in his *ι' λειος*, id est, voluulus, crudelissimus & exitialis  
dolor consistit. Iliæ autem sunt partes imi ventris, inter costas spurias, & pubem posi-  
tæ: à quibus iliaca passio, & voluulus: cuius petes dictionem.

*Ilium* *ι' λ' ο'*, hoc est, os anchæ & coxæ amplissimum & valentissimum, atque ab  
regione illa sic nominatum. ad ischion qua recipit formosius caput, os ischii, ante ad pu-  
denda, os pubis & pectinis.

*Imbecillitas*, est quæ potentiam à suo scopo aberrare facit, quod accidit sua ipsius  
substantia læsa, aut instrumentali morbo parte obscissa, aut vnitatis solutione. Potē-  
tiæ substantia offenditur intemperie, interdum quidem nuda, interdum verò cum hu-  
more. Quære dict. Substantiæ resolutione.

*Impia* herba, Græcis auctoribus incognita: aliquibus Latinis posterioribus, ob ra-  
dicis suæ odorem respondentem caryophyllo, Caryophyllata dicta est: quanquam a-  
liæ habentur quæ caryophylli folio & radice redolent. Impia Plin. l. xxiii. cap. xix.  
vocalur Incana, torismarini aspectu, thyrsi modo vestita, inde alij tamuli assurgūt sua  
capitella gerentes: ob id impiam appellauere, quoniam liberi supra parentem excel-  
lant: vel quod nullum animal eam attingat, impiam appellare existimauerunt. Ruel.  
li. ij. cap. cxi.

*Imminutio* oculi, seu profunditas ipsius α' *τροφία* videtur, quæ totum videlicet  
oculum minorem, depressioremque reddit, vt docet Celsus li. vij. Manardus li. vij. E-  
pistola decimaquarta.

*Imus*, siue inferior venter *ι' τροφία*, & *υ' ποσάτρισον*, pars sub vmbilico incipiens ad  
pubem vsque protensa, deprehenditur: quoniam venter superior stomachus est, infe-  
rior verò venter intestina dicuntur.

*Imperatoria*, herba nonnullis est, quæ tribus vestitur foliis, quorum mediū in tres  
distinctum est partes: quæ è lateribus sunt in duas, vt medium folium coronam ferè  
imitari videatur: quam nusquam apud veteres, medici posteriores legerunt. Impera-  
toriam Leoniceus esse Ligusticum opinatus est, sed neq; ignorandū plurimas herbas  
hoc nomine apud varias gentes circumferri. Quære dict. Silphium, & Lasericium.

*Inguina* βονύ *βωνες*, dicuntur partes illæ corporis concauæ, pubi vtrinque vicinæ,  
tumoribus quibusdam contra naturam, qui etiam Bubones Græco nomine appellan-  
tur, maximè obnoxie. plura in dict. Bubones.

*Inguinalis*, Inguinalis, Bubonium, & Aster-atticus, sub nomine diuerso vna ea-  
démque plāta est: vt ad dict. Aster-atticus recurrendum. Plinius li. xxvj. cap. ix. Diof.  
li. iij. cap. cv.

*Impetigo* λει *χέν*, cutis vitium est, quod AEgyneta auctore, celeriter in pforam, &  
lepram transit. Neque is morbus est, qui aliquibus Hispana lues putatur, auctore Ca-  
lanio in li. de Inæquali intemperie. Fuch. li. ij. Parad. cap. xvij.

*Incubus*, siue Incubo *εφ' α' λ' τ' ης*, & *την γαδων* à Themisone est: malum vbi ali-  
quis noctu grandi mole opprimi, inuadique ab alio se credit, siue à suffocando, nun-  
cupatur. siquidem præfocari in ea egrotantes videntur. Curationis Fusch. author li. j.  
de Med. morb. cap. xix.

*Inedia* siue abstinentia, est qua corpus tam sanum, quàm ægrum vacuamus: eua-  
cuat non quidem per se, sed ex accidenti, nullo scilicet accedente alimento in locum  
eius quod fuit vacuatum. Primum quidem, vbi nihil prorsus vel cibi, vel potionis as-  
sumitur: deinde vbi non nisi quod oportet, & ad virtutis conseruationem satis est.  
Verum qui habent angustas venas, exigui sunt sanguinis, idèoque nec longam inediā  
ferunt, sed quibus sanguinis copia est. Gal. li. ij. de Temperamentis. Hippoc. lib. Epidē-  
miarum vi. part. iij. Aphor. xx. Plin. l. xvij. cap. v.

*Inappetentia* seu appetitus prostratus *ἀνορεξία*, est cibi, potusque omnimoda auersio: quam *ἀνορεξία*, Hippocrates appellauit: & appetitui prolapso contraria.

*Inæqualis* intemperies duplex, vna quidem, in qua alteratio solius qualitatís, vt vltio solis: altera, in qua cum qualitatibus materiæ affluxus existit, vt accidit in phlegmone: & hæc cum materia est, superior verò intemperies sine materia, vt medicis seculi nostri appellare placuit. Quare dict. Intemperies.

*Inflatio* palpebræ *ἐμπύωμα*, palpebræ tumor cedematoides, hoc est, laxis & dolore vacans. Est præterea inflatio, siue apostema vento plenum, secundum barbarorum locutionem, cum spiritus flatuosus nunc sub cute, nunc sub membranis quæ ossibus circumfunduntur, aut musculus ambientibus, coaceruatur. Porro est colligitur interdum in ventre, & intestinis: itémque in medio horum (spatio, & peritonei.

*Inflammatiō*, est quando purioris sanguinis, & mediocritis defluxio, eam inflammationis speciem, quæ totius generis nomen adoptans, parit: nam tumorum inflammationis petenda est in dict. Plegmone,

*Infinītum*, est quod fini nulli obnoxium apparet, vt summum Ens tēporis præscriptione non eget, quoniam Deus solus & æternus ipse est: sed quicquid fini alicui obnoxium semper est. Aristoteles infinitum multipliciter in libris physicorum sumit, & accipit.

*Infusio* seu dilutum, est liquor, in quo aliquid certo tēpore citra elixationem maceratur. Diluta itaq; purgatoria, sunt liquores in quibus medicamenta purgantia concisa, trita, vel in puluerē redacta, vel solida etiam, integræque macerantur: & tenerioribus, & delicatioribus varij robotis hominibus exhibentur, quod eorum vsus tutior putatur. Fuch. comp. medic. li. ij. cap. viij.

*Infusio* altera præterea est, qua medicamentum fit melius: facultatem eius nunc maiorem auferendo, nunc bonam augendo, nunc in liquorem cui infunditur, transferendo, nunc nouam vt lubricam impatiendo: nec tamen omnis medicamenti virtus sola in eum cui infunditur liquorem, transit: sed cuiusdam, vt cæcis fistularis, Tamaris Indici, & similibus aliqua quoque substantia.

*Inflantia* *πνέουσα*, fit vbi flaua bilis supramodum exulta in nigram conuertitur. Hac corcepti serarum modo reddunt effrenes: vt etiam eos qui imprudens illis occurrunt, male tractant. Differt à phrenitide, quod hæc enim citra febrem accidit: illa verò cum febre. Quare dict. Phrenitis.

*Inseſſus* siue infessio *ἐγκαθίσταμα*, est qui ex herbis, floribus, radicibus, seminibus, aliisque eius generis medicamentis ex aqua & vino decoctis, factitur: cui æger infidet propter balnearum defectum, aut ægrotantis imbecillitatem. Vtuntur his quin etiam in renum, & vesicæ, coli, sphynctis, & vteri malis. Compositionis est author Fuch. li. iij. Compos. medic. cap. xij.

*Inſtitæ* *καίρια*, alterius generis lombricorum sunt, qui lati videntur: vocanturque à similitudine quam obtinent. *Ταίρια* etiam, hoc est, fasciæ, à latitudine sua, & longitudine vocantur. Tricenum pedum aut amplius deiectæ sunt ab aluo visæ. Plin. li. xj. cap. xxxij.

*Instrumentaria* corporis pars ab instrumento differt, quod partes etiā nonnullæ similes instrumenta sint. Instrumentum enim vocatur quælibet animalis pars, quæ perfectam edere actionem potest. Sic arteria, vena, & nervus sunt instrumenta, non verò instrumentariæ partes.

*Instrumentariarum* partium tres principes sunt vocatæ, cerebrum, cor, iecur: & quarta, testes, eò quod ad speciei conseruationem faciant. Prædictis quatuor, aliz quatuor subministrant, vt pote nervi cerebro, venæ iecinori, vasa seminaria testibus. Gal. li. j. Meth. Fuch. Compend. medic. li. j. cap. xj. Alex. Benedict. li. j. Anat.

*Intemperies* morbosa *ποσάδης, δυσκρασία*, quod in similibus sit partibus, dicitur: evenitque vbi qualitates primæ, seu elementa ipsa, à naturali symmetria commoderatione deſeſcunt.

*Intemperies* morbosa alia, est cum animal intemperamenti vicio ægrotat: & hæc quidem

quidem duplex, æqualis scilicet, & inæqualis. A Equalis est quæ in omnibus intemperanter affecti corporis partibus æqualiter inest. Talis quidem intemperies Hædica febris est: omnes enim solidæ corporis partes æquè exalfectæ sunt: itaque doloris expertus est. Inæqualis est, quæ non in omnibus intemperanter affecti corporis partibus æqualiter inest: hæc aliàs in toto animalis corpore fit, veluti in ea hydropisis species, quæ *διστροφία*, vocatur: & febribus iis quas Epialas appellant, ferèque reliquis omnibus, exceptis Hædiciis.

*Intemperies* duplex est, vna enim sanitatis seu naturalis, quæ à media tēperie paululum abest: vel in qua nulla functio animalis adhuc manifestè læditur: hinc perspicuum fit, sanitatis esse latitudinem quandā. Si enim sanus quispiā imbecillius quàm alius secunda valetudine præditus functiones obeat, nondum verò læsas obtineat, intemperantior sanè est, sed nondum ægrotat. Quòd si verò ex sanis alios temperatos, alios intemperatos statuere conipiam non placet, is alterum duorum cogetur fateri vel omnes semper ægrotare, vel vnam omnium esse intemperiem, quòd credere absurdum est. Vide Gal. li. ij. de Temper. li. j. Sani. tuen. & cap. viij. libri de Cōstit. artis.

*Intemperies* vna quidem simplex, quæ vbi vna qualitas duntaxat à modo naturæ recessit: altera composita, vbi complures qualitates à naturali habitu, & symmetria aberrant, vt si totum corpus, aut particula aliqua simul calefit & refrigeratur. Gal. lib. de Inæquali intemp. eiusque interpres Calanius.

*Intertrigines* sen attritus *παράτριμματα*, sunt attrētibus & vtrētibz in itinere pedes angustis calceis, confricatisque longa equi vocatione scæminibus, & in summa ex mutuo partium inter se affricatu nata, atque inter vlcera adnumerantur.

*Intestinæ* sex numero sunt: primum & inferius rectum & longo *α' πεύθουσιον*, vocatur, porrigitur ad sedem vsque, quæ anus & podex, ex Græcis *ε' σφα* dicitur. Hoc sequitur colon, crassum intestinum, & aliis carnosius: atque huic Cæcum coniūgitur intestinum *τυφλόν* dictum: aliis monocolum. Post tria crassa intestina hæc, sequuntur tenuia quorum tenue, aut gracile *λεπτόν* Græcis, appellatur. Sequitur hoc ieium, aut *πικτόν* nomine: atque vltimum occurrit duodenum intestinum, à lōgitudine duodecim digitorum dictum. Græci etiā *δωδεκά δακτύλιον*, & *ε' κεφωρί* appellatū, potest quocumque die exortus quorū principiū est à pyloro, hoc est portionario, seu vtriculi fundi exortus. De quibus supra paulò aliter diximus in dict. ieium.

*Intestinarum* leuor *λεῖπτρις*, palsio est, per quam cibi donec coquantur non retinentur, sed celeritè prius, quàm mutationem faciant, dilabuntur. Intestinarū difficultas, & tormen, quòd in hoc malo vehementissimo torqueantur dolore, appellari potest. Gal. author est li. ij. de Sympt. causis. Repetenda est dict. Luenteria suo loco descripta.

*Intermittens*, siue interpolata deficiensvè, est quæ si extra vasa putrescit humor, suscitatur: quòd eius accessio non perpetuò duret, sed remissionem habeat, & ad infestationem desinat. Ex se autem gignit alias tres, inter se differentes: Tertianam scilicet, quotidianam & quattanam. harnm febrium est explanator super Gal. ad Glauconem li. j. Acakia: & de Diff. febr. li. ij. cap. ij. Quare dict. febris: & Terciana exquisita.

*Intybus*, & latubum satinum *κρχύβρον κυπυτοί, καὶ η' σείρις*, vulgare cichoriū. Est intubus quoque erraticus subamarus: cui nomen commune, quo Schariolas, Am bubeias, cichorias, voce rustica, Endiuia intelligimus: de qua supra in dictione sua rationem reddidimus: & in dict. Cichorium.

*Inturus* *καππαρίς*, Græca imitatione olitoribus quoque vulgare nomen est, & plebeiis, aculeatus frutex est, qui in terra stratus magis in orbem euagatur: spinas vtrubus habet, in hami modum aduncas: folia mali cotōnez, rotunda, fructum oleæ similem. Plura lecturus in dict. Capparis. Dios. lib. ij. cap. elxvj.

*Intula* *ε' λανόν*, enula campana officinis dicitur, & primum lenij genus: cuius repetes dict. & Dios. lib. j. cap. xxvj.

*Inustio*, siue vlcus oculi *ε' ποναμία*, sordidum vlcus est, impurum, & crustosum. In his autem oculorum vlcibus quatuor Galeni auctoritate sunt genera: quæ in su-

perficie dicit contingere: cum tamen primum, & secundum non inter vlcera reponatur, sed ex humiditate corneæ fieri scribat Gal. lib. ij. de Sympto. causis: vt veluti per nebulam, vel caliginem, vel vaporem, vel fumum fiat visio: tertium, & quartum ad ea quæ profunda vocat, pertineant. Vide Manardum Epist. lib. vij. Epistola secunda.

*Ion*, id est, viola omnis, & præcipue nigra seu purpurea: quanquam in eodem genere est etiam alba, vulgò Martia, quod Martio mense floreat, dicitur. Est & multiflorum, ob id *διωτὰ ποδὶν* Græcis dictum, concolor priore, sed plenior. Est quoque eius generis sylvestris toto habitu strigiosiore, magis serpens, flore purpureo in albū lani guescente, inodoro. Has omnes sequitur viola lutea odoratissima, quæ officinis Keiri barbaro vocabulo appellatur, in medicina vsus frequens. Quære dict. Viola. Diosc. libro tertio, capit. centesimodecimo octauo, & lib. iij. cap. centesimoseptimo. Syluius lib. j. de Simpl. medic. natura.

*Ionis* flos *διὸς ἀνθός*, coccolourda, vel passa-rosa plerisque herbariis suspicatur: aliquibus carduus non aculeatus Plinij descriptione: sed Phanorini Camertis aculeis armata sic legitur *διὸς ἀνθός*: *φουρὸν ἀκανθώδες*, coniectore Gesnero.

*Ionis* glans, & luglans Castanea vulgaris putatur, quæ à Galeno τὸ κατὰ τὸν nominatur: Dioscorides tamen Sardinias glandes Castaneas appellat: quas plerique alij Lopima, & Iouis glandes, esse voluerunt: lib. j. cap. cxxij.

*Ionis* flamma *διὸς κωνίδιον*, Iouis flamma Plinij, vt quibusdam placet, non est. Hæc in arborem altam, proferamvè, & frondibus elatam expanditur perpetuis, semperque virentibus, vt in rusco maiore, non aculeatis: & hyeme media fructu rotundo in rubedinem versante turgere. Ruell. lib. j. cap. xci.

*Ionis* faba *διὸς σκουμὸς*, à quibusdam hæc dictio pro hyosciamo vsurpatur: quam res diuersas esse postea viderit lector in Ruell. lib. ij. cap. xxxix.

*Ips* siue ipes, vermiculus est vitium oculos, vel botros erodens: Rhomanensibus Allobrogum Serpillerius vocatus. vt Cisfrumenta, Trips ligna, Sis vestes, Midas fabam, Ips vites absumit.

*Ira*, est quæ spiritum, & sanguinem intendit, fundit, & calefacit: quineriam cordis, & arteriarum pulsationes apparent maximæ, & validissimæ in iracis. Siquidem ira neminem hominem mortuum apud grauissimos auctores legitur. Quære suo loco dict. Verecundia.

*Irio* ἢ *ῥιριον*, herba est, quæ iuxta vrbes, ruitera, hortosque nascitur, & familiaris Parrhisiorum pomeriis: folijs Erucae sylvestris, cauliculis in lori modum lentis & obsequiosis, floribus luteis, siliquis in cacumine gracilibus, corniculatis, semine nasturtij, exiguo, vrentis gustus. Est præterea Irio sercalis ἢ *ῥιριον*, cuius in dict. Frumentum explicatio est. Diosc. li. ij. cap. cl.

*Iris* ἢ *ῖρις*, cum radice vulgaris notitiæ herba omnibus est: gladiolus à foliorum figura plebeis appellata. Eius flos nunc albus, nunc cæruleus: sed qui cælestis in purpureū tendens color quia cernitur varius, quemadmodum in Iri cælesti, à flore sumpsit sibi herba cum radice, postquam arida facta est, nomen Inter Irides præfertur Illyrica, quam Illyridem vocare consuevit Andromachus, Gallica quæ alba est, præfertur Lybica, vsurpaturque à Gal. lib. viij. Comp. pharmac. sed passim nobis hodie Florétina pro Illyrica obiicitur. Diosc. lib. j. cap. j.

*Iris* agrestis *ἔνυρις*, officinis Iris sylvestris, & segetalis est: copiosa in Rhomanensium aruis, altera gladioli montani species. Præterea Iris sylvestris radix Gal. li. ij. Comp. pharmac. pro Ephemeris radice videtur vsurpanda: de qua in dict. Hermodactilus, & Gladiolus.

*Istati* sativa *ἰστίαν ἡμπερὶς*, fullones ea lanam tingentes quædam herbam esse asserunt. Est insuper erraticæ siue sylvestris Istatis, superiore multò inferior. De vtraque meminimus in dict. Glastrum.

*Iscbia*, ossa duo dicuntur in posteriore hominis parte ossi sacro, in anteriori mutuo κατὰ συνῆψιν coheretia: Latini medici coxædices appellant. Horū ossiū vtrūque grádi concavatum acerbulo est, in quo insertum scemoris caput circumuoluitur.

*Iscbia*

*Iscaidicus* dolor grauissimus *ἰσχίος*, est circa iuncturam *ἰσχίον*, id est, ancham, accidit. Interdum & locus, & dolor coxendix dicitur. Contingit ob crassum, pituitosumque humorem, qui in coxarum articulo concretus insidet: ideoque malum hoc assidue cruditates, & immodicus rei venereæ usus, aliquando etiam deambulationes concitiores, & hæmorrhoides suppressæ, & vomendi consuetudo intermissa, & purgationes menstruarum, & excretiones impeditæ, & exercitiorum neglectus, conciliant. *AEgyneta* li. vi. cap. lxxvi. *Fuch.* li. iij. de *Med. morb.* cap. liij.

*Isebas* *ἰσχός*, *Apios*, id est, *raphanus* agrestis, quod apium nonnulli syluestre esse opinantur *Plinio* auctor. Radix hæc iuncos duos siue tres spargit, rubros, tenues, qui à terra parum attolluntur foliis rutz, oblongioribus tamen, & angustioribus, herbaceis: semine paruo, radice hastulæ regiz, in formam pyri turbinata, rotundior etiam, succi foecunda, iatus habet corpus candidum, extra cortices nigros. Isto seculo medici ad emouendos sudores & vomitum tempore inediz vtuntur. Teuimus de ea in dict. *Apios*. *Diosc.* li. iij. cap. clvj. *Ruel.* li. ij. cap. cl.

*Isebias* *ἰσχίος*, herba est radice cyperi, nisi quia colore nigro est, huius verò candido: quæ commenducata dentium dolores cedat. Atque hæc aliquibus *Leuca cantha*, alius autem polygonatum describitur. *Plin.* li. xxij. cap. xvi.

*Iscinnum*, frutex est præstantissimi odoris, in iisdem regionibus proueniens, in quibus cinna momum, & casia: quæ, *Galeno* referente, in verum cinna momum mi grat. *Pl.* li. xij. cap. xx.

*Iseburia* seu vrinæ suppressio *ἰσχυρία*, est malū, in quo ægris in totum vrina sup primitur, & cohibetur. Accidit interdum ob imbecillitatem, vesica ea quæ in ipsa continetur, arctè completi ac exprimere non potente: aut eius ceruicis meatu à crassis humoribus, aut lapide obturato: aut propter inflā mationem, schirrhum, tumorem, carūculam, callum, pus crassum à renibus aut iecore in vesica concretum, fieri solet. Curationem docet *Fuch.* lib. iij. de *Med. morb.* cap. xxxix.

*Iso pyrum* *ἰσσυρόν*, phasiolus *Gesl.* suspicatur: sed vt docet *Scholias*tes, *Iso pyru* est folio aniso simili, semine gustu referente *Melanthium*. *Diosc.* li. iij. cap. cvj.

*Iua* arthetica *χιδναίτις*, Latinis *Ainga*, & *Abiga* appellata est. Regulimus de ea quæ oportet in dict. *Chamaepitys*, & *Ainga*.

*Iuba* *φελών*, florum milij nostri forma, ab equorum iubæ similitudine nominatur: & quæcunque comam miliaceam gerunt, pro luba nomine habentur. *Gesnerus*.

*Iuglans* *καρυὸν βασιλικόν*, nux regia est: nam quæ *καρυὸν* Græcis est, Latinis nux vulgaris: ab *Aëtuario* nux Indica dicitur. Nux *iuglans* dicit *Diosc.* li. j. cap. cxlj. Quære dict. Nux.

*Iuinbe* *Ζιζιφᾶ*, & *Serica* Græcis vt *Aëtua*. placet fructus affinis *Myxariis* facultate: duplex quoque occurrit, Sericū scilicet, quod est rufum, nobis frequens: & candidum adhuc regionibus nostris ignotum. pro alimento à *Gal.* li. ij. Alimentorum, danatur fructus: nostra tamen ætas in zula piorum vsum recepit frequentissimum.

*Iulus* *ἰούλος*, nucamentum floris loco depēdens in Corylo & regia nuce, necnon in Alno arbore alioqui sterili, qui dependet in vulgari nuce nostra *iulus*, in maximo vfu est ad promouenda mulierum menstrua.

*Iudicium* *κρίσις*, in præsentia non est nisi subita, & præceps in morbo mutatio. Porro mutatio hæc repentina modis quatuor fieri solet, aut enim confestim liberantur à morbis ægri, aut magnam in melius mutationem obtinent, aut statim moriuntur, aut multo deteriores euadunt. *Gal.* de *Crisibus*: & li. ij. *Aphorif.* *Hippocr.* *Commentario* xij. & xxij. & li. j. *Epidimiatum*, comment. iij. Quære dict. *Crisis*.

*Iuncus* *σχάβος*, quod ex eo, inquit *Scholias*tes, fumes fiāt, Græcis dictus est. Multiplex autem reperitur, vnus erasitudine & magnitudine insigni, fungosæque medulla in aqua viuens, *Pli.* *Mariscus* dictus. alius est de quo fiunt *lychnia* pro lampadibus, atq; hunc *Scirpum* appellamus: is verò de quo textur fuscæ, *Olofchaenos* dicitur. alius item *Melanctanis*, id est nigrum capitulum habens, fructum ramorum coherentium modo gerens, atque alius *Iuncus palustris* *σχάβος ἑλκός* dictus.

*Iuncus* odoratus, qui & rotundus  $\sigma\chi\tilde{\alpha}\nu\sigma$ , officinarum squinanthum est,  $\sigma\chi\tilde{\alpha}\nu\sigma$   $\alpha\tilde{\nu}\theta\sigma$ , id est, iunci flos, quo Cameli animâtes quia vescuntur, palea Camelorum Myro-  
ropolis postea dictus est: sed ab eo differt iuncus mariscus, Græcis  $\delta'\lambda\alpha\sigma\chi\tilde{\alpha}\nu\sigma$  appel-  
latus. Diosc. li. iij. cap. xlij.

*Iuncus* triangularis  $\chi\tilde{\alpha}\nu\pi\epsilon\upsilon\sigma$ , Cyperus, & vulgati appellatione Parrhisiorum So-  
chetum effertur. Verùm Cyperus Babylonicus, vt doctis plerisque placet medicis,  
Galanga suspicatur. Cyperus Indicus Pharmacopolarum Terra merida vocatur,  
Quære dicit Cyperus.

*Iuncus* marinus, Gallis somarinus appellatur, cui paliuro frutici, vt suspicatur,  
Gesnerus, declinatio saure aliquantulum viderur: an tamen paliurus sit, non audet  
affirmare, quoniam in eo pro folio spina deprehenditur. Hanc plantam, Gesnero  
prorsus incognitam, tertiam Iuniperi speciem esse, sed infrugiferam, humilioremque  
est coniiciendum. Ruell. li. iij. cap. xcix.

*Iuniperus* grâdior  $\alpha\tilde{\nu}\pi\epsilon\upsilon\theta\iota\sigma$ , alter humilior, quòd duùm sit generum, putat Ges-  
nerus Baceas siue arborescat, siue humi serpat, Iuniperus profert  $\alpha\tilde{\nu}\pi\epsilon\upsilon\theta\iota\sigma$  dictas, ex  
quibus oleum exprimitur: ex viridi ligno per scrobes in fornaces actas de vrendo ma-  
nar copiosa lachrima, quæ veriùs gummi, quàm liquor oleagineus, repræsentatur.  
Gummi Iuniperi ab Hermolao vernigo, & plebeis vernix dicitur.

*Ixias*  $\iota\tilde{\xi}\alpha\varsigma$ , venenum, quod vlophonum etiam profertur: quidam vt  
author est Largus, Chamæleon haz laticem existimant. Ixi-  
ne verò  $\eta\iota\tilde{\xi}\omega\eta\ \alpha\tilde{\nu}\kappa\alpha\theta\eta\lambda$ , achanthus feminalis est. Diosc.

libro tertio, capite octauo, & libro sexto,  
capite vigesimo primo.

*De*





## De litera L.



*Abco yadu' o'las*, vulgò vrtica mortua: quibusdam Lamium videtur: frutex in totum caulem & folia habet vrticæ, leuiora, & quæ grauem odorem ita reddant: purpureo flore, tenui. nascitur circa sepès, ædificiorum areas, æc semitas vbique. Eius etiam meminimus sub vocabulo Galioptis. Diosc. lib. iiii. cap. lxxx.

*Labdoides*, est os posterioris capitis, id est, occipitis, simile Λ, literæ græcæ. Quod secundum naturā in capite habetur, priorem & posteriorem partem prominentiorem ostendit, in eo tres suturæ sunt, ac duæ quidem transuersæ: quarum altera in occipitio est, in synepite altera, tertia à medio posterioris, per capitis longitudinem, ad mediam vsque anteriorem extenditur. Anteriorem coronalem vocant, quandoquidem in ea coronæ potissimum capitis parte collocantur. Posteriorem à literæ, Λ, similitudine lambdoideæ nominant. harum suturarum figura, H, literæ præcipue similis est. Galenus libro de Ossibus, capite j. Cætera in dictione Caput petes.

*Labrum veneris* δ' *Ἰαχός*, vulgò carduus cardarius, & virga pastoris officinis vocatur. Videtur & alterum esse genus, quod carduo sillonum ex Dioscori scriptis minime respòdeat, li. iij. cap. xi. Aculeatarum generis est, caulem habet altum, spinis horridum, foliis laetucæ, spinosis, binis, genicula singula complectentibus, prælongis, seu quasdam bullas intus & extra aculeatas, in dorsū medio habentibus, concauo alarum sinus, in quo imber, aut ros asseruetur. in cacumine caulis capitula insunt echinata spinis. Cætera ex ipso Dioscotide elicies.

*Labrusca* δ' *μυρτὸς ἀγρία*, vitis syluestris dicitur. Est & alia exulceratoria labrusca, quæ οἰνὸν Græcis quoque vocatur. Vitis syluestris cum floret, ænanthe vocatur fructus: hinc racemi suo tempore prodeunt, in quibus vis est astringentia, & refrigerans. Diosc. li. iiii. cap. iij. Quæ labrusca exulceratoria est, fert racemum, & corymbos hederæ: vocatq; eam vulgus Solanum lignosum, quòd fructum, & folia hortensii solano similia habeat: præterea sarmenta prælonga ostentat instar vitis vnam ferentis, lignosa tamen, aspera, & corticem rimosum habentia. Quære dicit. Vitis.

*Labrunum* arbor olim doctoribus medicis incognita, nisi vni Plinio, qui ipsam alpinam arborem vocat, materia dura & candida: cuius florem cubitalem longitudine apes non attingunt. hoc in siccis montium rupibus Segusiz prouenit familiarissima dependente flore luteo pedem longiore, forma qua genistarum flores subnascens: siliquis: cui folia terna sicut in Loto pratensi, sed maiora & albescens. Vulgus Segusiz, & Allobrogum Mayum, & Leuitum, appellat.

*Lacaphthum* δ' *καφθόν*, memoratur inter ea ab Aegyptia, quæ in heliaco vel magno cyphy adiiciuntur: & cortex picæ, vel alterius arboris existimatur. Ruel. lacaphthum cum nascaphtho confundit. Vide in dict. Nascaphthum.

*Lacomne* in vniuersum boni succi est. corpus alit, aluū emollit, stomachū & intestina inflatione vexat. vernū tamen dilutius æstiuo habetur, & è viridi pabulo aluū magis emollit. Probatum autè candidū æquali crassitudine, quod vngui instillatū cogitur. Aluū minus tētat caprinū, quoniā hoc pecus astringentibus pabulis magna ex parte vescitur. Ouillū autè dulce, crassum, pingue, & stomacho parū vtile: bubulum tamen, equinū, asininū vētri magis idoneū: sed ipsum turbat. Cætera Diosc. li. ij. cap. lxij.

*Lacca* gūmi gen<sup>o</sup> inter cœcetes medicinas pleriq; reputatur, atq; inter eas præcipue Arab. inuētās. Verū tamen collatis Diosc. & Serap. vnā sentētis, Cāchamon Arab. Lacca coniectore lo. Agric. deprehendetur. Vterq; enim lacrimā esse in Arabia nascētis arboris insinuat, quæ habeat aliquā myrrhæ similitudinē, & quòd viroso odore in gustu sentiatur, ad odorem incendi. Repete Diosc. lib. j. cap. xxij. & dict. Cāchamon.

*Lactis* serum, aquosum quod intra se continet quodcunque implicatum est: quod vbi serosa aqua à lacte discessit, multò potentissima ad purgationes redditur. Datur quibus

quibus sine acrimonia volumus deiectionem moliri, vt melancholicis, comitialibus, leprosis, elephantiasis, & erumpentibus toto corpore papulis. Lac recens ac emulchum nuper efficax est cōtra erosiones malorum medicamentorum exhibitum potum, & per clystrem iniectum Humanum lac dulcissimum est, & maxime alit. Lac omne respuendum est splenicis, hepaticis, comitialibus, vertiginosis, & neruorum vitio laborantibus, febriculosis, & capite dolentibus: nisi si quis purgationis gratia interdum schistum ex lacte paratum præbeat, vt docet Dioscori. li. ij. cap. lxij.

*Lactis* defectus, est propter siccam mamillarum, aut totius corporis intemperiem aut propter sanguinis boni paucitatem, & quia intans imbecillis non probè ex māmīs fugit, quantò enim plus sugendo ex illis admittit, tantò magis extrahitur. Curationem petes ex Fuch. li. ij. de med. mor. cap. xij.

*Lactis* redundantia *σπάργανσις*, est quæ fit boni sanguinis copia. Accidit interdum ob lactis redundantiam vt mamillæ tumefactæ repleantur, & sic extendantur, vt copiâ eius vix ferre queat: qui sanè affectus grauis quidem periculosusq; est, si in inflammationem pergat negligentia. Curatione est apud Fuch. li. ij. de med. mor. cap. xij.

*Lactis* grumescencia *θροώσις*, est quum lac interdum in casei formam trāsfit: quæ nimirum fit ob lactis abundantiam, quando è māmīs minùs fugitur: & deinceps à nimia caliditate, quod in eo tenuium erat partium digesto, quod reliquum est, concresecit. Idem etiam à frigiditate, vel à suapte natura glutinosum lac, accidere solet. Fuch. curationis est auctor li. ij. de med. mor. cap. xliij.

*Lachryma* oculi seu influxus, & pituitæ cursus, *ἐπιπόρρα*, est humorum omnium ad oculos impetuofus fluxus: ad hos quoque oculorum angulos spectare delationes rheumatum videntur, quæ pituitæ cursum Celsus, Plinius de lachrymationes, aliam rem putasse videtur ab Epiphoris: & certè latius patet *ἐπιπόρρα* nomen apud Græcos: cōprehendit enim quæcunq; humiditatum ad oculos delationem, siue per angulos, siue per totum oculum fiat. Est & vbi Plin. lachrimosos oculos nominat, & lachrimantes. Latini tantum lachrimas vocant. Si quidem videntur aliquādo oculorum anguli vel luti erosi *καταβρομεύουσιν* vocant Græci medici. Manard. li. vij. Epist. ij.

*Lachryma* arborum *δάκρυον κόμμι*, dicuntur, quæ vbi destillant, in gummi concrescunt: sed lachrymationum saluæ, humores ex arboribus & herbis destillantes.

*Lactea* vrina, est quæ lacti similis est, meliôrque aquosa & crystallina existit: quæ autem intensæ albedinis habentur, summæ cruditatis indices sunt. A summa siquidem albedine parum recedunt lactea, glauca, & charopa vocatæ vrinæ. De singulis vrinæ coloribus suo loco transtulimus diuersitatem.

*Lactaria* *τιθυμαλλοί*, quoniam lacteo succo manant, Latinis tithymalli omnes dicuntur: de quibus suo ordine.

*Lactoris* plena lactis, hæc & lactaria, & anabula nunc dicitur. Huic est congener, inquit Gesnerus, *ἐ'ρρος παδα*: oleæ folio, sed minore, flore luteo. Sunt qui Dioscoridis erinon faciant: sed congenere non eadem videntur ipsi Gesne. Vide Plin. li. xxix. cap. xvij. Diosc. li. iij. cap. xxv.

*Lactes*, sunt intestina tenuiora siue graciliora, per quæ cibis labitur, quæ tria sunt, atque iter se distinguunt, tenue, ieiunum, & pylorus: inuoluunturq; mesenterio, vt à spinæ cōtactu duro, munitiora, tutioraq; reddantur. Pl. existimat Lactes tantum in hominibus, & ouibus dici, in cæteris autè animalibus Ille appellari. Vide dict. Intestina.

*Lactuca* *οπίδαξ*. Est præterea laticaulis lactuca, & sessilis, tum denique ex caulibus hæc astylis mulieribus appellatur. Quæ Laconica lactuca, vulgò capitata dicitur. Est etiam lactuca crispifolia, inquit Columel. cap. iij. li. xi. quæ Cecilliana, & Betica à regionibus in quibus provenit, appellata est.

*Lactuca* syluestris *οπίδαξ α'γρος*, plures habet differentias: sed omnes lacteo seu co, acri, medicato, caule candido, interdum cubitali, foliis scabris. Earum caprina vnâ secunda efopos, & in aruis nascitur: alia meconis, sed amara.

*Lactuca* syluestris, coniectore Scholiaste simpl. sponte nascēs, vulgi appellatione Tartaracō videtur: alij pro erratica Lactuca eam sumunt herbam, quæ Endimia vocatur di

ra dicitur alii Chondrillam, Lactucæ sylvaricæ etiam speciem volunt esse, quam populari voce apud Gallos Celtas, & Sequanos, Lacteronam, siue etiam Lanceronam nominant. Quòd autem lacte abundat Lactuca, ideo sic dicta est itaque somnifera.

*Lacerta* terrestre animal quidem est, quatuor insitit pedibus, licet inter reptilia reponatur. Duum generum esse videtur, alterum cinericij, atque alterum viridis coloris, sed vtrunque in dentibus habet venenum mortiferum. Dioscorides tamen lib. secundo, capite quinquagesimo sexto, de eo sic scribit: Lacertæ caput intritum & impositum aculeos, & omnia corpori infixà extrahit: si diuulsa admoueat, istis à scori pio leuamenrum præstat.

*Lada* vel ledon *διδων*, cistum ladanifera, ex qua ladanum colligitur: quod officinis præscum seruat nomen. Quidam Cistum rosam caninam esse volunt.

*Ladanon* Gal. li. j. c. ij. *καταπόρος*, barbæ hircinæ sordes appellatum fuisse testatur. Erenim generatio ipsius ex hircorsæ barbis in quibusdā regionibus accidit. Duo Cisti occurrunt genera, vnum nomine Citharon, aut cissarò: ramosus frutex est, sed improcerus, foliosus, saxosis locis nascens: foliis rotundis, acerbis, hirsutis. Flos masculo, vt mali punice, foemine albet, & vertice vis astringens. A cisto hypocistis, quòd in ipsius radicibus nascitur, floris punici similitudineat hypocistis quedam flaua, altera virens, tertia candida. Secundum cisti genus est, Ledon à nonnullis appellatum, frutex simili modo nascens vt superior, longioribus ramen foliis, & nigrioribusque verno répute quedam cōtrahunt pingue: sique ex eo quod Ladanum dicitur. Maxime probatur odoratum, subuiride, facile molefcens, pingue, resinofum: sed quòd arenas non collegerit. Quære Diosc. li. j. cap. ex.

*Lanaria* herba *σπονδύριον* & radicula Diosc. vulgaribus insectoribus lanarum Fulionum herba, & officinis Saponaria. Vide in dict. Struthion.

*Lagopus*, *λαγώπους*, καὶ *λαγώπορος* Hippocrati, leporinus pes est. vulgò herba trinitatis: quanquam disseniunt erudiri inter se, dicentes Chariophylatam esse, alij Dentem leonis Dioscorides non depinxit herbam, sed vires tantum libro quarto, capite decimoquinto. Ruellius libro tertio, capite lxxv. leporis cuminum, & nasci in legetibus scribunt: & trifolij humilis genus. differtque multum à Caryophyllata herba vulgò dicta, & à Sanamunda officinis nominata.

*Lagopus* item, auis Alpinas, de qua scriptum reperies apud Plin. li. x. cap. xlviii. Aliquibus tamen hæc auis Lagois putatur.

*Lagophthalmos* oculorum vitium, cum superior palpebra non descendit. Cui vitio contrarium est Ectropium, cum inferior palpebra parum sursum attollitur, nec cum superiore cōmittitur. Accidit etiā aliquo casu vt palpebra superior, aut raso inferiori, aut oculi albo, aut corneæ tunice ita agglutinetur, vt aperiri oculus nō possit: *οφθαλμικός* Aegypti *καὶ κυλοῦ δὲ φάρμακον*, Celus vocat, hoc est, inuiscationem. Cætera in dict. Oculus.

*Lamia* ex genere viticarum mortuarum est: Lamium, & auonium, & vulgò archangelica: Græcis *γαλάνος* dicitur. Diosc. li. iiii. cap. lxxx. Sub dict. Garioplis: quam reperes. Ruel. li. iij. cap. cxviii. Quære dict. *Αχαλφον*, & vitrica.

*Lamina* subsidéria *καταλῦδης*, squamis similis apparetur: ea est, quæ foliorum plātatum, aut squamarum, aut laminarū instar lata & reuulsa existit. Hæc fir vbi solida corporis partes tabescere incipiunt: & quum quis sanguinem, aut pus minxerit, aut squamulas, & grauis odor adsit, vesicæ vlcerationem significat. Quære Hippo. Aph. lib. iiii. Vide etiam in dict. Similacea subsidientia.

*Lampetra*, non nisi carne differt à Mustella pisce, qui Græcè *γαλιν* dicitur. Est autem, vt refert Scholiastes, piscis longus, tenuis, & lubricus, sine pinnis, Murenæ similis, colore nigricans, brachiis detectis instar foraminum, quæ septem vtrinque habet.

*Lamproia* nostras vulgaris est. Plura de ea Aufonius in Mosella.

*Lampyriz*, vermiculus noctu lucens: nonnulli Noctilucam, alij Nitēdulam appellant, Cicindela m. Latini. Vide Plin. lib. xi. cap. xxviii.

*Lepathum* vel lapathus *λαπάθος*, latinis rumex: generale nomē ad multas herbas. Est hortense, folio lōgo & lato, herbaceo colore, & gustatu acido: itaq; edulis miscetur, estur

esturque praesentim in Segusiae regionibus. Radix huius quia in altum terrae longitudine & crassitudine sua sponte nascendo porrigitur, atque euulsa foris subrufa, intus verò crocea vel fulua in rubedinem tendens apparet, plerique nostri seculi medici etiam docti alterum Rhabbarbarum, ac pro vero videntes suspicati sunt. Ceterum quod genuini rhabbarbari facultas abesset, nec ex sententia porrigentibus cederet, olitoribus remissus hortis iterum desidet. Omnium siquidem generum Lapathi foliis decoctis aluus mollitur & inanitur: Rumex Latinis dicitur, cuius petes dictionē. Dioscorid. li. ij. cap. cvij.

*Lapathum* agreste λαπάθον ἀγρίον est & acutum gustatu, non aculeis, quod οξυ λαπάθον dicitur: equinum ἰππολάπαθον à magnitudine, irrigua colit, & ἰθρολάπαθον dictum. Sed oxalis grandior ὡξάλις, inter lapathorum species numeratur. Vltimum βουλάπαθος, id est bouis rumex, appellatur. Post Dioscoridem, quare Galenum libro septimo, simpl. & Syluium libro primo de Simpli. medic. natura: & Plin. li. xx. cap. xxi.

*Lapidosa* seu petrosa ossa duo sunt, Graecis λιθιδία dicta: & χροταρία, id est, temporales: vel lapidoides, id est, squamosae & mendoae temporum tabulae. Gal. in libro de Ossibus, cap. iij.

*Lapidato* palpebrae λιθιασίς, est cum in palpebris gignuntur candicantia quaedam & aspera lapidis instar oculum prementia: cuius contraria passio est ἰπποραβ ortu oculi nascens, ob quam instabiles semper sunt palpebrae.

*Lapis Armenius*, quo finguntur cataportia laborantibus bile atra, praefertur laevis, colore caeruleo, per quam aequabilis, calculo carens, & friabilis. Eadem quae Chrysocolia praestat: sed inefficacius quinetiam usum habet ad pilos in palpebris alendos. Cyaneus lapis, vulgò Lazulij, ad eadem praestat, quae, sed inefficacius multò, Armenius lapis, congestus in catapotijis Arabum inuentione. Manardus libro tertio, Epistola quarta.

*Lapis* Spongiae tritus, ex vino potus, lapides renium rumpit, non autem vesicae, quia tenuioris est essentiae siue insigni calore. Vesicae autem calculos rumpere scribit Dioscorides, si ex vino bibatur. Quare Galenum libro nono Simpl. & libro decimo comp. pharmac.

*Lapidum* quinque preciosorum, sapphiri, hyacinthi, sardiois, granati, smaragdi genera, cor multum iuuare creduntur: ob id cardiacis miscentur. Vires autem roborandi stomachi in iaspide viridi, si probauit Gal. potuerunt Arabes horum quinque Lapidum vires in cordis affectibus probasse, quos ob id posteritas est sequuta. haec Syluius. Quare vnunquenque in suo ordine.

*Lapis Iudaicus*, quia in Iudea nascitur, leuissimè tritus, potus renium lapides frangit, addunt quidam & vesicae. Est nobis multus, Diosc. elegantem picturam explens. Gal. lib. ix. simpl.

*Lappa* maior τῶρος ὤπιον, alioqui Personata, quod ex ea laruae personae fingerentur. Vide in dict. Bardana, & Arction. Dioscorides distinxit Arction à Lappa siue Personata, & Petasite, id est, vulgò Bardana, proprijs capitibus, li. iij. de quibus suo loco tractamus.

*Lappa* ἑσπεριος lappa minor est: cui aparine etiam venit eodem nomine. Est & Lappago, ἰπποφάσις Graecis. Diosc. lib. iij. cap. cxxii. sub dict. Zanthium.

*Lappago* herba est similis Anagallidi, nisi esset ramosior, ac pluribus folijs, aspera, rugosa, asperioris succi, grauis odoris: sed quae talis est Mollugo appellatur: similis, sed non asperioribus folijs est Asperugo.

*Lampsanum* λαμψάνον olus syluestre, rusticis rauonella, & napus erraticus, trium foliorum tantum ut vult Plin. lib. xx. cap. xj. Dioscor. li. ij. cap. cvij. Lampsanam olus syluestre facit: & tamquam vulgare & cognitum omnibus hoc olus est, descriptionem nullā tradidit. Radix, ut rapi, rotunda turbinatāque, cum tribus ad summum folijs eruitur, & ut napus coquitur, & editur. plus alit, quam rumex, aut napus, rapum vè: & stomacho vtilius: cuius folia, caulēque coquantur in edulijs. Copiosa in cauarum

conuallibus inuenitur.

*Larix* λαρὶξ, καὶ πινύς, hoc est, picearum arborum species: cuius à radice prorumpit agaticus in Alpinarum montibus. Vide Pl. xvj. cap. x. Ex Theophrasto arboris genus est cognatum Abieti & pino, nullam quantumuis longa senecta cariem sentiens, neque ignem per se cōcipiens, neque vlla ratione ardens, eo quod plurimum terrestris & aqueæ habeat substantiæ, minimum autem igneæ aut aëriæ. Abūdat circa Eridani ripas, & maris Adriatici littora: vix alibi nota.

*Laser* σίλφιον, laserpitium est neque verò herba, neque succus.

*Laseris* liquor duplex: prior quidem assa odorata, Gale. liquor sirenaicus dictus, & Beniuinum vulgaribus medicis: alter assa sœrida ab odor e officinis etiam cognominatus. Ergo ex arbore, aut serulaceo frutice, non ex herba erumpit: vtraque lachryma, siue liquor: cum plerumque cortex adhærens visatur: quod nusquam apprehenditur in herbarum succis, nisi adulteratis impostorum malicia. Vide Pl. lib. xix. cap. iij. Diosc. li. iij. cap. lxxvj.

*Laserpitium* gallicum λασσαρον γαλτικον, καὶ συλφιόν, herba in Gallia cognita: cuius vulgaris appellatio apud herbarios Angelica, Imperatoria, & eius species Austriæ herba Allobrogibus nuncupata. Ex huius culmo exudat succus rosceus, quem vocat Laser, excellens in medicamentis, & in Cirenaica prouincia laudatissimum. Caulem Laserpitij Magudatim vocari author est Gale. quāquam non desunt, qui ipsum etiam semen eodem nomine appellent. Plin. li. xvij. cap. xxx. Quare dict. Magudaris.

*Lathyrus* siue espurgia λαθυρίς, vulgaris cataputia minor est: aliquibus Tithymalus appellatur: eaque inter tithymalorum genera numeratur: Lathyrus caulem emittit cubiti altitudine, & digitali crassitudine, inanem huius radix nullius vsus. totus frutex lacteo succo turget, vti tithymalus. Diosc. li. iij. cap. cl.

*Lathyrum* λαθυρος, cicerculam doctioribus interpretari placuit: folio non rotundo, vt plurima leguminum, sed oblongo: caulis humi repens, vt piso, quaternis, & inæquales grano sunt anguli vt scribit Plin. Gale. ochris, & phaselis non longè dissimili natura lathyrone consistere prodidit. Ruell. li. ij. cap. xxxvj.

*Latifolia* πλατύφυλλος, arboris glandis feræ genus ex Theoph. quā nonnulli eandem putant cum Esculo, à latitudine foliorum nomen habens. Plin. li. xvj. cap. vj.

*Lauer* sine sium ξίρη, berula quibusdam creditur: quoniam sium nasturcium aquaticum, id est, in fontium aquis nascens crescio videatur. Lauer itaque pro Berula, vt Sium pro Crescione, vel nasturcio fontano, peritotum sententiā, comprobatur. Plin. li. xxvj. cap. viij. Diosc. li. ij. cap. cx.

*Laurus* δάφνη arbor mas & scemina. Maris bacea δαφνός est Græcis. Est præterea Laurus latifolia, & Alexandrina, nomine alio Idæa dicta, plerisque pagana lingua. Vide in dict. Idæa.

*Laureola*, id est Laurus sylvestris, frutex est ramosus, crassiore ac molliore, quàm laurus folio, & cuius gustatu accendatur os, bacis è nigro rufis. Siquidem Laureola frutex nascitur ramosus, cubitalis, molliori angustiorique quàm Laurus folio, tristij aspectu, flexilibus virgis, supramodum viscosis, versus cacumen foliosis, flore candido, bacca atrii coloris natura, fronde fractu cōtumaci, cuius gustatu mordeatur os, incensumque guttur vellicetur. Solut a luum intollerabilius. Ruell. lib. iij. cap. cxxxvj. Quare dict. Daphnoides.

*Lecisbon* siue aracum λαιβόν, pisi genus. Gal. autem apud Hipp. pro lente interpretatus est. Alij, inquit Gesnerus, genus ad pisum, & aracum faciunt. Athenæus edulium ex araco & phace sic vocat. Ruell. li. ij. cap. xxxvj.

*Lens* φακός, & lenticula φακός, leguminis genus. Alba & subnigra offenditur: vtraque calido frigido temperata, sicca secundo ordine, valenter astringit, ob id ventrem sistit, abiecta priore aqua aluum mouente. hæc Syl. Diosc. libro secundo, cap. xcix.

*Lens* palustris, & lenticula aquatica φακός ἐπὶ τὴν τελευτήται: inuenitur in aqua non fluente, muscus lenticulæ similis, refrigeratoriæ facultatis: propterea igni

facro, collectionibus, & podagris illinitur per se, & cū polēta glutinat & procidentia puerorum interanea. Diofcl. li. iij. cap. lxxvj.

*Lentifens* σχῖνος: nam σχοῖνος diphthongo scripta vox iuncum significat. Lentifcus frutex arborefcit cultura addita, à quo lētīfcina lachrima ματίχης nomine, vt officinis hodie mastiche, & mastich. Vide in diēt. Mastiche. Diofcl. li. j. cap. lxxv.

*Lepra* λέπρα καὶ ψώρα, passio vtraque, & summæ cutis asperitudo est, cum pruritu & absumptione corporis. Verūm differunt inter se, quod lepra altius circularibusque erosionibus cutem depascit, & piscium modo scamulas ex se remittit. Pfora verò, hoc est, scabies, summam corporis cutem exedit, & varias habet figuras, & sursum magis ac se corpusecula ædit. Vide in diēt. Elephas.

*Lenientia* asperatas cavitates, sunt oua mollia recētiana item dulcia asperā arteriam leuem faciunt, & cācani herbæ radix, gummi, tragacantha, glycyrrhiza, vina dulcia.

*Leontice*, vel cacalia κακαλία ὀσά, careum agreste in segetibus, & pratis siccioribus passim nascens. Vide Pl. li. xxv. cap. xj. qui scribit ita: Leontice, siue cacalia semen est margaritis minutis simile, dependens inter folia grandia in montibus ferē. Officinis carui agreste dicitur. Cacalia caucamum Galenus vocauit. Ruel. li. ij. cap. cxlj. Quare diēt. Careum, & Cacalia.

*Leontopetalon* λεοντοπέταλον, pata leonis quibusdam: herba est emittens caulem dodrantalem plurimis alis concuum, & in cacumine semina parua duo aut tria, eaque in siliquis ciceris modoflores punice coloris, anemonæ similes: folia brasiæ nigra, sed papaueris diuisura, radibus nigris, sed rapis similibus. Lege Pl. li. xxvij. cap. xj. Diofcl. li. iij. cap. xcij.

*Leontopodium* λεοντοπόδιον, herbariis aliquibus cruciata: quæ tamen Alisso Diofco. respōdet: nonnulli autem medici ex recētioribus Garyophyllatam, herbā trinitaris vulgò appellatā esse suspiciunt. Scholiasti simpl. Calēdula videtur, frequēs in hortis. Triū Leontopodii olet sinapi, & illius ac piperis acrimoniā habet. Diofco. lib. iij. cap. cxv.

*Lepidium* satium λεπίδιον χηπείον, Iberis maior: nec est, vt placet quibusdā, raphanus, folio rumicis acuti, nisi per ambitū serratum asperūq; esset totum, videtur: sapore fetuido, & mordicante, vt sinapi est. At Lepidium siue Iberis, pseudocostum folio in totum æmulatur, sed semine rasi in siliquis rotundis. Iterum Lepidii radix rara tota & lignosa, nulliusque vfus: quod in raphani videtur contrarium foliis & radice: Nullius enim est vfus solum, sed radix: Brionæ radice in totum æmula: nisi quod facultate fetuidior, ingneam vim representans, cōperitur. Allucinantur qui radiculam pro raphano sumunt, quoniam raphanus in cibus, vt radícula condita sale, oleo & aceto, non estur: & decepti simplicium ignorantia, alterum pro altero in medicamentis vsurpant. Diofcl. li. ij. cap. clxvij.

*Lepidium* syuestre λεπίδιον ἀγρίον, Iberis altera, sed in totum minor: secundam verbenacæ speciem, foliis tamen minoribus multò, & semine tlaspi, referens. AEgypti Lepidium, Iberidem, & ἀγριοκαρδιμον, cōiectore Scholiaste, eandem plantam facit. Cæterum vtrumque dictum est, quod λεπίδας, hoc est in facie maculas abstergeat. Ruel. li. ij. cap. cv.

*Leucanthemis*, herba est, quæ & anthemis, & leucanthemum à nonnullis vocatur: ab aliis chamæmellon, eo quod mali odorem spiret. Officinis Chamomilla est. Vide Plin. li. xxij. cap. xxj. Diofcl. li. iij. cap. cxxxi. sub diēt. Anthemis: cuius locum repetes. Ruel. li. iij. cap. lxxvij.

*Lepiocarya* λεπτοκάρυα, nuces ponticæ, pondus antidotorum apud veteres grecos & latinos medicos representantes. Vulgus auellanas vocat.

*Leucacantha* λευκακάνθα, alba spina: cuius radis cypero similis amara solidaque est. Differt ab ea, quæ λευκή λευκή diuisis vocibus, id est, spina alba nominatur. Nā superior species cardui est, laetuceæ folia, sed latiora longioraque, habens: in quibus maculae albæ sunt conspersæ. Aliquibus perperam Rhannus appellatur. Vide Diofcl. li. iij. cap. xxj. Pl. li. xxij. cap. xvj.

*Leucoium* Theophrasti Massario est, quod circa medium Decembrem, etiam summis frigoribus, floret passim in syluis, nunc etiam in hortis. Quare, dictionem Massarion.

*Leucoium* λευκόιον, viola alba: nostris gyrophlea, sed falsò, appellatur. Leucoium quamuis violam albam significet, ad omnes tamen violas præsertim eas, quæ primo vere nascuntur, siue albæ, siue luteæ, seu purpureæ fuerint, seu nigrae cum Hippoc. seu cæruleæ, ut quidam Diosc. codices habent, extèditur. In his efficacissimæ sunt luteæ, Keiri Arabib. dictæ. Vide Syl. li. j. de simpl. med. natuta.

*Libadium* λιβάνιον, centaurium minus, quoniam secundum fontes nascitur, appellatum est: aliis Linuesion, quòd propter lacus in riguis vbertim profiliat, dictum. Latinis fel tertæ propter amaritudinem summam, nonnullis febrifuga vocatur, huius res occurrunt species apud Ruel. li. iij. cap. vii. apud Diosc. duæ tantum. Quare dict. Centaurium.

*Letbargus* seu obliuio, vide in dict. phrenitis, & in dict. Obliuio. De stultitia, sopore, lethargo, phrenitide, & inania li. iij. loc. affect. cap. v. tractat Gal. Quare dict. Obliuio, & Phrenitis.

*Leuce* λεύκη, populus alba Latinis est: Gallis à frondium mobilitate Tremula appellatur. Vide plura infra in dict. Populus.

*Leuce*, herba est mercuriali simillima, nisi quod per medium solum linea alba transcurrat, unde Mesoleucon nominata auctore Plin. li. xxvij. cap. xi.

*Leuce* morbi genus est, quod Latini medici vitiliginem albam appellarunt. Celsus vim vocis sequutus, albam, λεύκαν ἀ' λ' φρον: nigram μελαν nominauit: Est & altera, Leuce Celfo appellata, medicis popularibus Albaras dicta. Manardus li. vij. Epistola secunda.

*Leucographis*, herba est quam memorat Plin. li. xxxvij. cap. ix. ad sanguinem excreantibus valde utilis.

*Libanus* λίβανός, arbor thurifera, & ipsius lachrimæ nomine: quam Gale. mannam, id est, synceram thuris lachrimam vocauit: officinæ olibanum, quòd à crassiore thure differret, hætenus appellarunt. Esfinxit quidam lachrimæ thuris hoc nomen Libanotus λίβανότης. Diosc. li. j. cap. lxx. sub dict. Thus.

*Leucophlegmatia* hydrops species. Cum igitur vniuersum corporis habitum occupat, eam hydrops speciem generat, quæ hypofarcidiosis, vel anarsaca dicitur: cum verò intra pentonaxum, & subiectas partes collectus est humor, ab utris similitudine ascites dictus, procreat. Si verò humor paucus, flatus autem multus contineatur, à tympani sonitu, tympanites appellatus. Quare dict. Hydrops.

*Libra*, quæ & pondo dicitur, in duodecim vncias, recta vtendi apud medicos forma, neque in sedecim, diuiditur. Libræ quadrans, hoc est pars libræ quarta, trium constat vnciarum: triens, quatuor vnciarum, hoc est, libræ medicinalis tertia pars: Sextans, duarum vnciarum. Vide in dict. Vncia.

*Libra* Romana, duodecim vncias constat: Attica, decem duntaxat vncias continet.

*Libra* liquidorum Romæ ex cornu constabat, quod lineas duodecim orbiculatim ipsum secantes habebat, singulas vncias significantes, unde dicta est libra mensuralis: nam alia est ponderalis. Porro variant pondera & mēsuræ pro diuersitate nationum. Sed Græci & Romani, illo modo quem in his nostris exercitamentis inserui, seruauerunt perpetuò, uti apud Aegyptum scriptum fusiùs reperies.

*Libanotis* λίβανότης, frutex scilicet nostras rosmarinus: sed ensensariam herbam, quòd radix ihus, id est, incensum vulgò redolet, esse scribit Gesnerus: differri quæ à vulgari roremarino asitmat.

*Libanotis* semen cachrys καλχρυσ, est. Eius tres sunt species, quas describit Dioscorides li. iij. cap. liij. sub dict. Rosmarinus.

*Lichen* λειχένια, herba in roscidis petris nascens, vulgò dicta hepatica, aliquibus Brion appellata: saxi familiaris, & asperiginosis adhærens. Quoniam autem contra Lichenas, hoc est impetigines, remediis omnibus anteponitur, sic dicta est: quòd dicitur



rum Iecoris inflammationi succurrit, similisque fibris ipsius Iecoris aspicitur, Iecoraria & hepatica denominata venit. Neque morbus omnibus hepatis conuenit contra non paucorum medicorum sententiam: & si Serapio Ictericis, quæ vera res est, prodesse tradit, propterea quòd morbus regius plerumque ab hepate, nonnunquam & à Liene, fieri solet: hinc arbitratur est sortitam hoc nomen Hepatica.

*Lien* seu splen σπλην, viscus est, in sinistra animantis parte consistens. Inflammatum lien ut reliquæ corporis partes, quoties sanguis præter naturam ad eum confluit: quod cognoscitur grauitate & tumore hypochondrii, qui ad tactum non cedit, dolore & distensione loci, febre & æstui: irruentis denique humoris copia, ex magnitudine, & velocitate generationis ipsius inflammationis. Fuch. docet curationem li. iij. de Medendis morbis cap. xxvij. xxviij. Lienis affectus describuntur à Gale. loc. affect. li. vj. cap. i.

*Lienosis* σπληνίτις, quibus lien obstruso obseptoque in eo atræ bilis excremento, aut ab inflammatione induruit: aut qui induratum lienis passionem obtinent. Quem admodum reliquæ corporis partes octo intemperierum generibus affliguntur, ita & lien. verum sæpenumero frigidam & humidam substat intemperiem. Pete Gale. li. de morb. causis: cap. i. ij. & iij. Curatio est apud Fuch. li. iij. de med. mor. cap. xxvj. Lienis scirrhi ex Gal. li. ij. ad Glau. & Acakiz comment. curat. petes.

*Lignum* aloes α' γα' λλοχον, τασον, καί ζυλαλον, agalochum lignum hoc Græcorum primus Aëtius appellauit. Coëtaneus Aëtij AEgypta odorum indicum lignum esse demonstrationibus affirmavit. In quatuor secernitur fastigia, Indicum, Sapphicum, Speon, & Hygron: quod rursum in species conciditur. Illud tantum in vfu est, quod cariei nulli obnoctum deprehenditur. Diosco. li. j. cap. xxj.

*Ligusticum* λγυστικός, καί λεγυστικός, Galenus libysticum dixit: quod à Leuistico officinarum differri contendit Gesnerus. Ligusticum à Ligusticis alpinis, in quibus frequens nascitur, Gal. & Actuarius vnus literæ mutatione Lybisticum, vsurpauit sibi semen & nomen Manardus: cuius etiam radix Imperatoria vocatur.

*Leoniceo*, & Musc. Vulgatum autem Leuisticum aut Smyrnum cum Ruell. aut apij aut dauci genus: cum Manardo Smyrnum, putante Petroselinum Alexandrinum vel Mecedonicum. Sylu. quem videbis li. j. de medicam. Simpl. natura. Quineriam verum Ligusticū ignorari, rectius fatebimur: & nostræ Leuechiz Smyrnum conuenire affirmabimus.

*Ligustrum* φιλύρα, non est Cyprus frutex, ut quibusdam placuit, sed qui perperam apud Allobrogas Caprifolium dicitur: nam caprifolium esse aliud suo loco docuimus. Cæterum φιλύρα Græcis, tilia latinis, neque ligustrum interpretanda est. hæc ex Massario Gesnerus. Est præterea ligustrum Scribonio oleastrum cum vulgò appellatum, bene faciens ad cancerum in ore, sui li. cap. lxij. Segusiani Belliciorum variatis literis Frisillion communiter vocant: cuius flores studiose legunt destillationi aduersus omnia oris viciati vlcera etiam maligna. Nam & hic frutex Oleaster est: cuius vide dict.

*Lilium* κρίνον, vnum genus est, quod Vere cum Narcisso emicat: alterum, æstate: cerinthumque esse suspicatur. Est aliud λεύριον Græcis dictum, autū no flore emicans. Fit hominum etiā arte vel industria rubēs, & purpureū lilium: sed omnium primum quia hortense, commune hominibus est. Pete. post Diosc. Galenum li. vj. simplic. & in fine li. com phar. & Syl. li. j. de med. simpl. natura.

*Lingua* γλωττα, ad radicem ossi hyoidi affixa est. Sic autem dictum est hoc os, quòd instat v aut λ literarum sit bifurcatum: hinc etiam à nonnullis λευκοειδές appellatum. de linguae affectibus petendus est Gal. li. iij. loc. affect. cap. ij.

*Lingua* auis medicis recentioribus semen arboris fraxini foliaceum in lingæ speciem figuratum, amarum, intelligitur: cui vim calculos in renibus frangendi etiam tribuunt. Apud Serapio. in confect. testicul. vulpis vbi legitur lingua auis, salacissima tum auicularum de lingua non intelligitur, sed de fraxini semine.

*Limonium* λευκονιον, Bistorta est: non beta prætensis. Vide in dict. Bistorta. Plin. Betam

Beatam syluestrem appellat li.xx.cap.vii.

*Lilium* conualium, planta ea est, quam vulgus muguetum vocat: dissidetque omni no ab Hemerocalle herba, sed non multum à Fraxinella, id est, ut vulgus officinarum vocat, Sigillum Salomonis, Græcis pariter ac Latinis Polygonatum, & genicū latam herbam: Secacul autem Arabibus.

*Linonia* λῆμονια ἀνεμόνη. Vide in dict. Anemone. Pl.li.xxj.cap.xj.

*Linca*, est quæ punctis duobus finitur recta, quæ ex æquo sua puncta interiacet.

*Linaria* herba, Olyris Dioscoridis suspicatur: differt autem ab Efula, cuius dict. petes.

*Linoſtrophum* λινόςτροφον παρασίον, hoc est, martubium: de quo Diosc.li.iiij. cap. c' fecit duplex genus: vnum album, alterum nigrum. Quæze Prasium.

*Linozostis* λινόζωστις, mercurialis. huius herbæ vires reddidimus sub dict. Mercurialis. Diosc.li.iiij.cap.clix.

*Limones* fructus sunt, qui ad lauticiem mensis expetuntur, & sub nomine Citri à priscis authoribus comprehenduntur. Huius fructus meminit Manardus libro decimo quinto, epistola tertia. Repete dictio. Citrum malum, & Malum medicum.

*Linum* λινόν, cuius semen humido & sicco quodāmodo temperatum, calidum autem quodammodo ordine primo: flatuosum est etiam si frigatur, adeo plenum est humiditate recrementitia. Vide plura ex Syllu. libro j. de simpl. medica. natura post Diosc. & Gale.

*Linum* viuum λινόν ἀσβεστόν, ignibus non vritur: sed magis sordibus exustis elucet: & in Indiæ desertis, adustisque Sole locis nascitur. hæc Gesnerus.

*Pistacia* λινάκιον, καὶ ἰσσητάκιον, Latini cum Syris pistacia: officinæ fistica & fistos, vocant. Quæ constat in Syria gigni, inquit Dioscorides, pineis nucibus sunt similia, & stomacho amica. trita cum vino contra serpentium ictus profunt, siue edantur, siue bibantur. Si cognita Dioscoridi pistacia fuerint, ex ipsius scriptis non satis constat: quando amygdala breuiora, magis representant, quàm nucem pineam: nisi pro nucleo nucleum assumilet: quum longè sua forma differant. Vnum hoc affirmare audeo, pistacea amygdala syluestria esse, & amygdalis nostris congenera. Quære dict. Pistacia.

*Ligula* ἐπιγλωττίδα. Græci appellant, gutturi ori summo veluti operculum quoddam incerta est. ex linguz ipsius radice profecta, sicque dicta, quod scilicet figura linguā fistulæ referat. In intima oris parte, vbi gulæ & asperæ arteriæ principium, particula est à Græcis γλῶσσοειδής dicta, veluti plectrum vocis existens: & iuxta eam vtrinque vocata περισθῆμα. Gargareon hic fluxionem à capite suscipiens, longus & tenuis fiat, καὶ ὤρι, vel καὶ ὤρις, id est, columna, vel columella dicitur. Inferiore eius parte crassa, & orbiculari facta σφαυρὴ, id est, vva: περισθῆμα verò inflammata, & superaurata ἀίτνιαδες vocantur, Barbaris medicis amygdalæ: γλῶσσοειδής, vva Parithmia, & eorum inflammatio, à Celso tonsillæ nominantur.

*Lingua*, leuissimum membrum est, hæc atque illac cogitationum cordis, & animi cuncta proficiens atque testimonium hoc de ea passim fertur:

*Lingua quid melius: lingua quid peius eadem?* Hæc ad radicem qua osi hyoidi fixa est, valida magnâque firmitatis gratia apparet: tenuis autem ad extremum, nimirum quò celerius moveatur, tunica ori communi vestita. Linguz proprium quid euenit, quòd A Egyneta ἀγκυλόγλωσσοι vocat: sub hoc breuior fieri lingua videtur duratis, diminutisque membranis linguam continentibus, aut duriore cicatrice ex vlcere derelicta. Nascitur & sub ea tumor cum inflammatione præcipuè in pueris, βέλτραχος Græci vocant: nos ranullam. Eidem alij quoque affectus accidunt, resolutio videlicet, conuulsio, excellens magnitudo, prominensia, vitio, chagada, & tumorum omnia genera, de quibus propria capita Methodici posteriores scripserunt.

*Linimenta*, sunt quæ ex iisdem setè rebus quibus vauenta, cera dempta, componuntur. Siquidem eum oleis, aliisque liquoribus in vnguentorum consistentiam molliorem liquidioremve, coeunt: id quod ex formulis apud probatos auctores: stu-

dioscorus lector, maximè recentiores Mesuem Syluij perceptoris, Nycolaum restitutum, & Fuch. li. iij. comp. med. cap. ij. apprehendet.

*Lippitudo* ὀφθαλμία, est membranae adnatae, quam coniunctiuam vocant, inflammatio, quae vera quidem ophthalmia est. Adnata autem dicta propterea, quod aliis, quae oculum ipsum constituunt, tunicis forissecus adnata sit, ligamentum existens toti oculo ad circumiacentia ossa: ideoque ambientes oculorum patres vsque ad malas nonnunquam in vehementiori lippitudine simul attolluntur. Curationem explanatam quare ex Fuch. li. j. de medendis morbis cap. xxiii. & ex Gal. cognitionem lib. ij. de diff. feb. cap. xij. & xiii.

*Lipothymia* λιποθυμία, καὶ λιποθυμία, Latinis medicis defectus animi interpretatur, siue animi deliquium, & animae defectio. Nam animi defectus, & syncope, ut magnam inter se habent cognationem, sic inter se differunt: quod ille sit spirituum, praeteritum animalium, vehemens, subitūque motus: cum enim relicta sede ad locum aliquem confluunt aut pereunt, animalis facultas tantisper consternatur ac excidit, sensusque omnes intercipiuntur, dum ad suam originem spiritus redierint, aut noui procreati sint. Mouentur enim interdum spiritus circa iacturam, aut saltem magnam, ut in dolore, & animi tum affectibus tum actionibus. Syncope autem, est vniuersarum virium praecipue, subitūque ruina, hoc est, κατάπτωσις ὅτι καὶ ἀπὸ τοῦ πτώματος, quae contingit, & interceptis sensibus, & liberis. Hanc autem animi defectus saepe antecedit, aliquando comitatur, aliquando solus affligit. Caetera petes ex Acahia super libro primo Gal. ad Glauc.

*Lipyrria* febris est, ex qua intus & in ipsis visceribus calor sentitur: in externis partibus verò vniuersis frigus. In ipsa tamen accessionis inuasione, aliqui febricitantium tum rigent, tum verò febtiunt, tum ambo sentiunt, frigus immodicum & calorem vnā: verum non eodem loco. quippe cum possint quae excalfacunt partes, manifestè à refrigeratis discernere: nam intus & in ipsis visceribus calorem sentiunt, in externis partibus vniuersis, ut diximus, frigus. Tales perpetuae febres sunt, & quae Graece lipyrriae vocantur: praeterea ardentium quoddam febrium perniciosum genus. Galenus in libro de Inaequali intemperie docet caetera.

*Lixinium*, ablutio est cuiuscunque materiae, quae in cinerem sit redacta, abstertione & excitatione reliquis omnibus praestat: quod ex cinere ficus, aut tithymalli sit, ut poepe iam putrefaciendi vires attingat. Tenuis partes lixinium habet, atque indolenter vrit. Aëtius li. j. Simpl. medic.

*Liquor* seu lachrima ὀπός καὶ δάκρυος, humor est qui ex planta sponte sua defluit, aut ex secto, terebratoque caudice, vel ramo, vel ligno profilit concretus, & praedensus. Cyrenaeus tamen liquor omnibus calidior est, substantiaque tenuior: ac propterea magis discutit. Veruntamen alij quo liquores calidi sunt ac flatuosi, sicut Medicus, & Syriacus, quae Laferem vocat. Haec Aëtius li. j. Simpl. Fuch. Compositionis medic. li. j.

*Lithargyros*, Spuma argentea Graecis ex Largo dicitur, est purgantissimum igni materiam vitium, seu feruescentis spuma, ut scoria iam purgatae sex est, ex plumbo molybdis seu molybdena, ex argento ἀργυρίτις, ex auro χρυσότις omnium optima, praecipue quae foliata est. haec ex Dioscoride, Plinio, Gal. Hermolaus: ex ipso Sylu. lib. j. de simpl. medic. natura: medicamentariam rem excipies.

*Lithocolla* glutinū, quo lapides coniunguntur: confatur autem ex marmore, lapide Pario, & taurino glutine. Potest candente specillo ad motū, in modum oculis pilos replicare. Diosc. li. v. cap. xcij.

*Lithospermum* λιθοσπέρμιον, petrosum semen: vulgò millum solis: & herba Herculeae alioqui vocata, incomparabilis utilitatis. A seminis ducitur nomen accipit. foliis est oleae longioribus, ramulis surculosis, in quorum cacumine semen vniuersi simile.

*Lithiasis* λίθιασις, est calculi in vesica generatio, unde vtiq; excretio prohibetur.

Fit

Fit præterea cum in palpebris gignuntur albicantia quædam, & dura tubercula, lapillorum figura.

*Linida* vrina, est quæ interdum plagas, & verbera incussa homini indicat: alias semper frigiditatem, atque adeo coloris natui mortificationem, portendit. Fuch. Comp. med. lib. ij. cap. xliij. Quære dict. Vrina.

*Lobia* λῶβια, sinilicis hortensis fructus, qui & lobi, & phasioli dicuntur. Lobæ dicuntur etiam miliorum culmi, qui sua figura arundines representant.

*Locusta* insecti genus est, infirmas habēs alas, tam modicis se volatibus à terra attollēs, vt saltare potius, quàm volare videatur. Locusta etiā piscis est ex genere crusta torū, corpore lōgo, cornua ante oculos bina, lōga, & aspera habet. vide Plin. lib. ix. cap. trigésimo.

*Locus*, est extrinsecus terminus corporis alterum continentis: sed naturalis, in quo res naturales natura quiescunt. In eo enim natura quiescunt, in quo conseruari natæ sunt. Cæterum locus violentus, est in quo res naturalis minimè natura quiescit.

*Lolium* λῖπα, zizania interpretatur. Grannm est imbrium abundantia ex puro seminis frumento in deterius cōuersum: quod rura Yureum, quasi inebrians & summum dolorem capiti inferens edentibus, vocant. Eius farina in medicamentis, emplasticis commendatur, quod nimirum deterforiæ, & simul adstrictoriæ sit facultatis: sed in pane fermentando ad esum inutilis. Dioscorides libro secundo, capite nonagesimo secundo. Ruell. ij. capit. trigésimo. Galenus libro sexto. Simpl. medicam. sub dict. A Era.

*Lancebitis* λανχίτις, à Græco nomine Latinis Lanceolata dicitur: folia habet porri, latiora, rubentia, plurima, ad radicem circumfracta: in caule flores nigri, & è ritu albam exerentes velut linguam, quæ ad labrum inferius spectet: semen inuolucris clausum lanceæ simile. Cætera Diosc. lib. iij. cap. cxxxix.

*Lonchitis* altera λανχίτις ἐτέρα, nō est bursa pastoris vulgariter dicta, quā asperam aliqui faciunt: folia scolopendrij emittit, sed asperiora, maioræque, ac multò magis diuisa.

*Longæo* siue Imus venter, & longano, quibusdam intestinum rectum, à crasso intestino quod κῶλον appellatur Græcis medicis, ad sedem vsque porrectum, spinæ è directo incumbens & πύτυσµενον ἐν τέρει, nullis orbibus implicitum, vt cætera intestina. Quære dict. Intestina.

*Lomentum*, farina fabacea est, qua ad eruganda corpora vsa est antiquitas. Medici omnes ad tumores emolliendos & apperiendos pro cataplasmate vtuntur. Vide Plin. xxij. cap. xxv.

*Lobro*, λωβρός similis est Sepiæ, nisi paulò videretur longior: & quod illa rubrū, hæc nigrum in timore humorem fundat: vulgi quoque appellatione Calamariū nomen patitur, & à Mafsiliz populis Tante, vocem Græcam imitantibus, appellatur. Ab atramento, hoc est, à liquore atro effundente, non à Calamarij scriptorij forma, piscis dictus est. Hic piscis, vt Galenus scriptum reliquit, etsi tangentibus mollis est, carne tamen durus, vt ad conficiendum stomacho cuius sit difficilis.

*Lotio* est, quæ medicamentum multis modis melius reddit, nunc acrimoniā eius superficialiam auferendo: nunc facultatem eius maligniorem auferendo, salubriorē vterò relinquendo: nunc facultatem eius valentiorē efficiendo: nunc partes impuras auferendo. Quibus autē medicamenti virtus in superficie est, illa lotionē dissipatur: cætera magis & minus lauentur, quatenus scilicet eorum virtus ferre potest.

*Lotus* arbor λωτός, δειδρόν, Latinis faba Græca: pifcis Italis faba Syriaca, recetio ribus vterò bacca fytiaica: Gallis autem Alisum, & aliserum est. Ex Diosc. lib. primo, cap. cxxxiiij. Lotus arbor est vastæ magnitudinis, ferens baccam pipere maiorem, dulcem, cibis gratam, stomacho facilem, ramentorum ligni decoctum, siue potu, siue infusione dysentericis auxilio est. citam aluum, vt bæccæ ipsius cōhibet. Lotus vrba nā aliquibus trifolium est, & hortis familiaris.

*Lorus* λωτός ἡ μέγας herba satiuæ est & syluestris, & pratenfis sub nomine trifolij, necnon alia quæ etiam in aquis prouenit. Aegyptia herbariis appellata. Est præterea Lorus inter pratenses herbas tertia ex Athenæo lib. xiiij. Dipnosophist. quæstio.

*Lorus* syluestris, quam trifolium minus appellant, caule bicubitali, & sæpe maiore, alis multis, folijs trifolij pratensis, semine for nigraei, multo minore, gustu medicaro. Dios. lib. iij. cap. xcvij.

*Lucius* piscis, vulgata Gallica voce Brochetus nomen retinuit. Pifeis est medicorum sententia ἐν πικρῷ, optimi succi alimentique. Præfertur à Gallis qui in Rhodano piscatur.

*Lumbi*, dicuntur parres inferiores spinæ dorsii quinque constans vertebra, quæ medix sunt inter os sacrum & vertebra. Vidè plura in Anarom. sectione Galeni.

*Luscinia* auis, quæ quasi perpetuò canens ubi semel inceperit, à Græcis λυδὴν appellata est vulgò Rosisignolus. A poetis, vr Ouidio Philomela. De ea aue vide quàm plurima apud Arist. lib. iij. & ix. de Historia animalium, & Plin. lib. xvj cap. xxix.

*Lumbri* ἐν ἄνθρωπῳ sunt intestinorum, atque ipsorum tria genera. Primi autè generis sunt, qui rotundi seu teretes à figura dieuntur, secundum enim crassitudinē rotundi sunt, longitudine verò palmares, & nonnunquam longiores. Ii gracilibus plerumque intestinis consistunt, & superiorem ventriculum subeunt, idè quæ sæpè numero per os reiciuntur, quibusdam & è naribus redduntur. Atque hoc genus infanribus & pueris, atque his qui ad pubertatem accedunt, peculiare est. Vide secundum & tertium genus per seriem dictionum, Institæ, & Ascarides. Cutatio integra est apud Fuch. lib. iij. de med. morb. cap. xiiij.

*Lumbri*, hoc est, terræ vermes, ad hæc quod neruorum vulneribus insigniter cōferunt, ex iis oleum componitur, quod Lumbricoum Myropolis nuncupatur: & inter medicamenta, præcipuè memorantur. Olei autem compositionem habes tum apud Mesuem, tum etiam apud Nycolaum restitutos.

*Luna*, corpus est dẽsum, & minimè translucidũ: nec à se ipsa lumen, sed à Sole accipere: longèq; terrā esse luna maiorem. Luna, inquit Macrobius, dispensationibus septenariis luminis sui vices sempiterna lege variãdo disponit. Primis septẽ diebus dimidiata semiorbẽ ostendit: secundis totum orbem cõplet, sitq; pleniluniũ: tertiis rursus δυχὸς totius efficitur: quartis sit totius lunæ cũ Sole, quod interluniũ vocant, & silentẽ lunam, & intermenstruã: græcè σὺν ὁδῷ dicitur. Hinc plenilunium, quod est cũ luna quintadecima & rotũda est, Solique ex diametro opponitur. Plin. li. xvij. Quũm verò occidente Sole orierur Luna ex aduerso, ita vr pariter aspiciantur, tunc erit pleniluniũ: interluniũ, quũm apparere desierit, & noua sit, & cõuere vel silẽte luna: vnde de Lunæ coniunctio dicitur dies silentis lunæ Item Plin. lib. ij cap. xcvij.

*Luna*, planerarum omnium infima est, terræq; finitima, & eorum omnium radiis subiecta, celeritè orbe suũ percurrit: breui tẽpore cũ multis syderibus coit, eorũq; vires recipit: quas nobis refundit. Quare nõ immeritò his inferioribus regẽdis destinata est: & quò plenior est lumine, eò potentiũs hũc orbẽ in mutat. Ipsa enim suapte natura opaca est, sed suo ad Solem accessu, ac ab eo recessu, nunc tota lucet, nunc dimidiata, nunc corniculata, nunc verò rumentior ac velut incurua apparet: sed ob splendoris, calorũque exiguitatem res facilius. moderationis moderatur, & corporis humores excitat, non quidem omnes, sed qui sua natura facillè mouẽtur. Igitur in acutis morbis imperiũ potiũs obtinet, q̃ scilicet leui occasione moueatur, idq; intuitu vel aduerso, ei loco in quo æger ægrotare cepit, vel vtriq; quadrangulo dextro vel sinistro, vel quadranguli medio. Docet cætera Acakia super lib. j. Gal. ad Glauconem.

*Lunaticus* morbus, est comitialis ἐπιληψία Græcis, conuulsio totius corporis est, non quidem perpetua, sed quæ ex temporum interuallis accidit, enim mentis ac sensuum obliuio. Alio nomine Sacer morbus vocatur, propter grauitatem, quoniam homo eo correptus subito concidit. Quære diũ. Epilepsia.

*Lupus* piscis ὁ λαγοειδής, quibusdã etiã doctis videtur esse vulgaris Mulus. Lup⁹ aliorũ pisciũ maxima vorago est: itaq; ab impetu & voracitate accepit nomẽ. Hui⁹ meminere

Plin

Plinius, Aufonius, Ionius, Gillius, & Massarius. Plura quoque de eo scribit Athenæus ex Aristophanis commemoratione.

*Lupini* θέριμαίος, leguminis genus. Lupinus est satius idemque vel dulcis, vel amarus: agrestis verò minor sed amarior, & ad omnia valentior domestico. Syluius lib. broj. de medicam. simpl. natura. Diosc. lib. ij. cap. cij.

*Lupus* salictarius βρύον, vulgo Lupulus: cuius floribus maceratis cetrusia apud Belgas commendatur. Fit denique ex herbæ succo syrupus atra bile vexatis non ineptus: ad eandemque rem ex tota cum flore herba aqua extillatur: sed in decoctū apozematis tota planta reiecta radice excipitur. Ruell. lib. ij. cap. cxlj.

*Lusciopitas* μυρτιάσις, καὶ ἡ μυρτιάς, vitium est, per quod accidit, ut ab ineunte ætate pusilla quidem propè videantur, remota verò, etiam si magna fuerint, non item, hoc correpti vitio Lusci, & Luscioli vocantur.

*Lutea* ἡ χλωρὴ σάνις, videtur esse scemina Vereonis, id est, Lorioli. Sic autem dicta est, quod partem inferiorem pallidam habeat, hæc Scholiastes.

*Lutra*, vel *Lutris* ἐνδρὶς piscis, qui etiam peculiariter imitata voce latina, Louttra dicitur. Est præterea Lutra animal fibro non dissimile excepta cauda, quæ ex piscium genere & natura est, solum differt. Plin. lib. viij. cap. xxx.

*Lycanthropia* λύκωθροπία, passio est, qua correpti sese in lupos esse conuersos imaginantur. Proinde noctu domo egressi, lupos per omnia imitantur, & donec dies illucescat, circa monumenta defunctorum vagantur, adeo ut minimè fabulosum existat mutari in lupos homines, veluti suspicatus est Plin. lib. viij. cap. xxij.

*Lienteria*, passio est cum vehementi intestinorū dolore, veluti per cicatrices quædam & tubera agitata: ut necesse sit ante ciborum ingestorum cōcoctionem, sed quales æger vorauerit, raptim deciantur. Oritur autem frequenter, dysenteria magna præcedente & ex profunda vlcératione, cicatrice leui & densa succedente, quæ deinde ob densitatem suam, ciborum per corpus digestionem fieri non permittit, sed dilabi finit. Curationis Fuch. est autor lib. iij. de med. morb. cap. ix. *ἡ γὰρ ἐκ ἀπὸ τῆς ἐνδοῦς*

*Lycotanon*, aconiti genus Diosc. libro quarto, capit. sexagesimo sexto, pardalianchem, & aconitum vocat, folio est cyclamini, aut cucumeris, sed minore, aut subhirsuto, caule palmum alto: radice scorpij caudâ zemulante, & splendente alabastrini modo. Quære dist. Aconitum.

*Lychnis* sylvæstris λυχνίς ἀγρία, herba lucernis apta: quam in corollario herbæ Lichenes, pro hepatica perperam interpretatus est: Hermolaus quæ secus à Io. Agricola describitur. Duplicem describit Dioscorid. libro tertio, capit. nonagesimo sexto, coronariam scilicet, quæ est flore albæ violæ similis: & sylvæstrem vrbanz similem Galli cadclariam vocant: nam hæc fruticosa est, lanuginosis flagellis, foliis angustis & canis, flore purpureo, & inodoro, violæ natalis effigie, flammeo colore. hinc coronis insecta, igneo micans aspectu, oculorum aciem obtundit. Ruell. libro iij. capit. quinquagesimo septimo.

*Lychmitis* λυχνίτις, θριῶλλις, verbascum est stolonem cubitorum diuum, quandoque trium altitudinem æquantem, refertum flore luteo, producentem. Tapus barbatus officinis dictus, & vulgò tedaria. Dioscorides libro quarto, capite octogesimo nono. Ruell. libro tertio, capit. centesimo vigesimo secundo. Quære dist. Verbascum.

*Lycium* frutex πυξυάνθη: cuius quoque succus lycium λυκίον habet nomē. Lycium à Lycia regione dictum, & delatum, succus est pyxiacanthæ Diosc. & Gal. liquidus, quo utebantur ad suggillata. Succo ex baccis pericyli meni id apud nostros metimur. Vide Syl. lib. j. de simpl. medicam. natura. & Gal. lib. vij. simpl.

*Lycopsis* λυκοψίς, anchusatum quarta species: quam Ruellius linguam canis secus à diudicat, Gazzæ autoritate cultus. foliis laetæ longioribus est, asperioribus, latioribusque, ad radicis caput recidentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis multis: flore paruo, purpureo: radice rubra. nascitur in campestribus. Diosc. lib. iij. capit. xxij.

*Lycopus*

*Lycopus λυκόπους*, marthubio sylvestri similis, grauis odore, caule quadrato geniculatōque, fungosa intus medulla, radice frequenti capillamento fibrata. Præter hæc, refert de ea Gesnerus, folia trita præsentaneo remedio esse imposita dissoluto stomacho: vnde fit vt cardiaca herba vocetur. Longè aliud est aconitum, quod & ipsum patam lupinam vocant. Vide in dict. Aconitum.

*Lycos, πῆγρος λυγρός*, vitex est, officinis agnus castus: frutex est in arborem assurgens: ramos gerit prælongos fractu pernicaces: folia oliuæ, sed molliora, habet. Duo genera eius, vnum, album florem mittit cum purpureo: alterum, tantùm purpureum, & semen vtriusque vt pipet, vites habens excalfactorias. Dioscorid. lib. primo, capit. cxvj.

*Lysimachia λίσμαχίον*, flore fuluo herba est, aliquibus pestifuga, quod pestem facultate sua arceat vbi exposita est, vocatur. Nonnulli Vitrium Luteam, & Lysimachion esse eandem contendunt. Corneola vulgo appellatur. Reperitur interdum Lysimachia flore purpureo, lineamentis superiore quidem similibus.

A Lysimacho rege inuentore accepit nomen  
& retinuit, vt quibusdam placet. De  
hac herba vide, post Dioscori.  
apud Plinium miras  
facultates.



*Macer*





## De litera M.



*Macer*, & *macir* μακίς, vulgò *Macis*, nucis myristicæ corticosum inuolutum est: atque vocabulum hoc confusum apud non paucos medicinarum professores est explanandum. Ita que *Macer* Dioscoridi libro primo, cap. nonagesimo quinto, cortex est flauescens, siue, cum Plinio, rubens, radice magnæ, nomine suæ arboris incognitæ nobis, crassus, gustu perquam astringens, ex Barbaria allatus. Gal. autem lib. vij. Simpl. cortex est gustu multum acerbus, cum leui quâdam acrimonia, odorem non ingratum spirans, vt pleraque aromata.

*Macis* Arabum, membrana est extrema nucem myristicam propè totam vestiens, tenuis, rufa, aut flaua, interdum nigricans aromatica. Ex quibus liquet *Macis*, & *Macer* res planè diuersas: licet odore, e colore quadantenus eueniant, verum temperamento tamen differant, nisi quis contendat in Dioscorid. & Gale. eodiceibus, mendum esse quod vix quidem possit demonstrari. Quòd si res diuersæ sunt, vt ex Plinio patet, *Macer* hodie est incognitum: tamen pro *Macis* Arabum μακίς Actuarius reponit. hæc Sylius.

*Madonais* μαδωνίς, Nymphæ utriusque nomen est, luteæ videlicet, & albæ: herbariis autem *Nenuphar*: de quibus suo loco diligenter scripsimus.

*Mene* αἰ μακίς, quibusdam suspicantur pisces, qui Saleculæ, hoc est, alecæ pusilli, quales, qui Parthisinis Celerini, & Sardini Provincialibus, appellationem acciperunt, sub Autumno piscantur. Meminit Diosc. lib. ij. cap. xxvij. Gillius in lib. de Piscibus Gallicis cap. lix.

*Macula* oculi, siue suggillatio ὀφθαλμική καὶ ὑπόπτιον, est quâdo propter idum aliquem fractis, aut contusis vas, intra tunicas oculorum sanguis colligitur: & in extrema parte veluti sanguinis puncta apparent.

*Maguderis* μαγυδαρίς ex Theophrasto genus *Lasertij* suspicatur, radice simili, minus crassum, minusque vehemens, fungum sum, sine succo: natura ei quæ Silphio. Quidam tamen Silphij radicem, quidam semen, alij denique caulem magudarim esse affirmant. Plinius libro decimonono, cap. ij. Columell. libro sexto, capite decimo-sexto. Dioscorid. lib. iij. cap. septuagesimo sexto. Quare paulò supra dict. *Lasertij*.

*Maiores*, vel *Sampfuchum* σάμψυχον, καὶ ἀμαράκτον cuius plantæ descriptionem fecimus in dict. *Amaracus*, & *Sampfuchum*.

*Mala*, sunt eminentes faciei partes inter oculum utrumque, nasum, & buccam: quæ & genæ dicuntur: ita appellatæ, quòd rotundam speciem mali præ se ferant. Celsus lib. viij. cap. primo inquit: Et malæ quoque in summa parte singulas transuersas futuras habent, à mediis que naribus aut superiorum dentium gingiuis per medium palatum vna procedit, aliæque transuersa idem palatum secant.

*Mainium*, vel *marulium* θρίδαξ, ἢ ἰριδακίτη, καὶ μαλιούδιον: recentiores Græci, vt Psellus, *lastruca* vocat: de qua quare descriptionem suo loco.

*Malache* μαλάχη vulgaris malua est: nā hortulana rarò nobis succrescere tradit Cordus: proinde & rara visu & propè ignota plerisque. Appellatur autē malua Romana, quā Malachē Diosc. li. ij. cap. cxj. vocat. Manardus venetiis arborefcere scriptū reliquit. Quæ hortensis malua est μαλάχη κατὰ α. Cordus Romanā dieit appellari, quòd pro olere eam in eduliis vsurpet. Est & erratica, sed dum generū maior autem differtur causa μαλοχὴ à Græcis quibusdam dicitur, vt differat à minore. Verum quæ facitua est δισδρομαλόχην, hoc est, arborefcēs malua, vulgò *Rosa trāsmarina* suspicatur.

*Malicorium* αἰ δίων, punici mali, id est, granati puta men & cortex: Cyreni autem, vt Celsus lib. v. docet, capitula punici mali sunt, id est, primus huius mali partus florere incipientis, & planè flores sunt ipsi ex Diosc. vbi cyrenios flores ipsius mali punici appella

appellauit. Repete dict. Cytinus, post Diof. lib. j. cap. cxxvij.

*Malabathrum* μαλαβαθρον, folium Indicum est officinis nominatum: quod in India paludibus aquosis absque radice palustris lenticule modo innatans, gignitur. Plinius scribit ex siriaca arbore legi: vtriusque tamen authoris malabathrum innotum nobis est, fortassis & ipsi Plinio. Tertium genus a pud officinas deprætheoditur, quod ex cinamomo arbore legi asserunt, & folium Indicum nominant: sed Brasauolus caryophylli folium esse scribit. Diof. lib. j. cap. xj. Gal. lib. j. compos. pharmac. & liiij. Simpl. Aduarius ex Serap. lib. v. Compos. pharmac.

*Malleolus* μίσχυμα, nouellus est palmes innatus prioris anni flagello, cognominatus à similitudine rei, quod capitulatus vtrinque & furculatus solebat feri. Differt à sarmento, sicut pars à toto, quia rostrata m ostendit imaginem virga mallearis. Vultus rusticorum vineam nouissimè plantatam, à mutuatìs vitis senioris furculis, vocat. Gesnerus.

*Malus* μήλα pro arbore, & malum μήλον pro fructu generalius est nomen. Est præterea malus Afsiria ή κίτρος, citrus, siue malus medica arbor, cuius fructus κίτρον, pro citro & malo medico, siue ureo: quanquam inter arbores ex fructu ipso non parua cognoscitur differentia. Aureum malum, & citrum modò Afsirium, modò Hispanicum pro fructu arboris vtriusque varium nomen, ut videre est, vsurpatur. Arangia, & Limona siue Citra in Gallia vocantur. Item Malum aureū, χρυσόμηλον, quibusdam placet Vergilium poetam pro cotoneo malo vsurpasse in hoc versu:

*Aurea mala decem misi, etas altera mittam:* quum intellexerit de Malo medico, siue Citro, à vulgari parrix appellatione refragari noluens. Aurea siquidem mala, & arangia voce corrupta differantium facit.

*Malus* cotonea, vel Cydonia κύδων ή μήλα, vulgaris arbor, à qua malum cotoneum, vel Cydonium μήλον κύδωνιον, pro fructu arboris. Hinc mala struthia μήλα στρουθία, καί στρουθιομήλα, è cotoneorum genere habetur. Aëtius struthia vocat, quæ magna fuerint, & suauiora, minorique placeant acerbitate. Est insuper Melimelon μέλιμηλον, hoc est, malum muscum, è cotoneorum genere præcoxius, & tempestiuus: quod mellitum, & dulce malum dicimus. Diof. lib. j. cap. cxxxij.

*Malus* punica ρόϊα ή, καί σίδη, vulgò granata arbor: à qua etiam malum granatum, hoc est, punicum pomum à patriæ siue regionis nomine vocitatum, & à granis quibus est refertum. Variat dulcedine & austeritate acuta eius liquorem fructus. Diof. lib. j. cap. cxxvij. Galenus lib. viij. Simpl. & vj. Compos. pharmac.

*Malus* persica μήλε α. παρσίκη καί μήλον παρσίκον, hoc est, malum Persicum: & præcoquum è persicorū genere, quod vulgus Abricoccū vocat: aliquibus vero Avianpersicum, quod Rhodacenum alijs, alijs Armenicum malum appellare, sed delicatis auribus libuit. Est denique Epirotica malus. ή πειρώτικη μήλεα arbor, καί ή πειρωτική μήλον, olitores, & cætera turba pomum paradisi: Latini autem orbiculata mala, & præcoxia appellant. Diof. lib. j. cap. cxxxvij.

*Malum* terræ αριστολογία ή στρογγύλη, aristolochia rotunda est: quam Cyclaminum, in vertendis Theoph. libris, Gaza voluit. Largus autem malum terræ Aristolochiam, quam rotundam intellexit, interpretatus est cap. ccij. in emplastro Maictis chirurgi: & malum terræ alterum, cuius sarmentis vnguentarii vtuntur, ipse Largus Aristolochiam Clematitem appellauit cap. ccvi. in emplastro viridi Gliconis chirurgi. Quare dict. Aristolochia.

*Malus* habitus καρχήσα, est in quo alimentum corporis corrumpitur, principiumque aquarum cutem subeuntium AEgyneta tradit. Nam mali succi habitus καρχήσα est, quæ ad gignendos morbos vim maximam habet: quæ non aliundè magis quam ex mali & viscosi succi alimentis conciliatur. Circa hæc habenda est consideratio bonitatis, mensuræ, qualitatis, consuetudinis, delectationis, ordinis, temporis, horæ, & ætatis. Author Galenus in lib. de Boni & mali succi: & in libro de Aliment. facultatib.

*Magnes*, lapis ex minerais eruitur, probaturque qui in coruleum colorem non ferrugi

ferrugineum declinat: facultate sua ferrum ad se experimento attrahit: hinc matite modo emplastris admiscetur. Magni est miraculi in eo tanquam mundo aliquo polorum celi rationem inesse. Diosc. lib. v. cap. xcij.

*Malagma*, somētum est quod cuti integræ ad apostemata imponitur, alioſvè tumores præter naturam molliendos. Quomodo autem differant malagma ab emplastris, & pastillis, docet Celsus libro v. capit. xvij. sic scribens: Malagma maximè ex floribus, eorumque surculis, emplastra pastillique magis ex quibusdam metallicis fiunt.

*Mammaria* *μαρμαρία*, doricū est Romanum ut Ruellius interpretatur: ab AEgyptea autem radícula herbæ frequentibus tuberculis intumescens describitur, quæ cicatrices & albugines emendare, ac extenuare creditur. Quære dictionem Doricū.

*Mamma* *μαῖς* *τῆς* *θῆλης*, Græcis dicitur, in media serè thoracis regione sita: quarum summum & apex papilla *θηλή* dicitur: circulus verò ambiens papillam, qui nigret, *πίος* Græcis vocatur.

*Mammæ* inflammatio, est quæ propter defluxum sanguinis copiosi & calidi ad mammas, uti aliz inflammationes, accidit: & ob id lac easi modo coactum, atque subinde suppuratum concreſcit. Curationis author est Fuch. lib. secundo, cap. xv. de Medend. morb.

*Manatia* capitis vlcera *ἀχνοῦς*, Saphatum Arabibus, & Barbaris medicis, appellata. Græcis *κρίνα*. Sunt autem *ἀκρόπυς* Galeno, & AEgyptea, cutis capitis cum tumore vlcera foraminulenta, è quibus sanies manat tenax, non aquosa, sed nec ut mel crassa *κρίνον* achori simile maioribus foraminibus, in quibus sanies melli similis, instar saui apum continetur. Ficus, vlcerosa quædam eruptiones, rotundæ, subduræ, rubræ, quas dolor comitatur, & maiori ex parte capiti, sed interdum reliquo corpori contingunt. Manardus libro septimo, Epistola secunda. Quære dictionem Achoros.

a quocumque  
pago.

*Manipulus*, seu fasciculus, herbarum id omne est quod manu altera comprehenditur, & complexi potest: differtque à pugillo, nam pugillus id totum quod digitis tribus, longioribus cum pollice, complexitur, est: ut in apprehendendis floribus, & seminibus cum tenuissimo pulvere quopiam. Est præterea in classibus exercituum Manipulus milium, qui describitur à Vegetio in lib. de Arte militari.

*Manus* pars interior iuxta pollicem assurgens vsque ad indicem, palma *θεῖα* vocatur: opposita verò eius *ὀπίσθησις*: media & concava manus pars, vola proprie nominatur. Nodi, & articuli digitorum *κορυδαί* appellantur: digitorum maximus *ἄρτι* *χειρ*, seu pollex, quod scilicet toti summæ manui cooperans æquipollat. post hunc *δευτέρος* siue index, nomen ab usu, ut apparet, fortitus: dein medicinalis, qui & annularis appellatus, sequitur: postremus quod omnibus & corpore, & virtute inferior sit, minimus cæpit nomen. Galenus de Vsu partium lib. i. Theopylus de Hominis fabrica lib. i.

*Manusprator*, est qui manu pudendo ad mota venerem exercet: perinde ac si nulla esset ei voluptas conjugata: id quod etiam apparet de Diogene Cynico, qui meretrici Laidi, illam ad coitum expectans, sic respondisse fertur: Manus mea hymenæum celebrando te præuenit. Author est Galenus Locorum affect. libro sexto, capite quinto.

*Mandragora* *μανδραγόρας* *ἀνδρῶν*, radix hominis effigiem præstans: non secus quam quæ scemina *μανδραγόρας* *θηλέης* mulieris figuram. Neque id equidem est quod plerisque Manus gloriæ suspicatur, opilionibus sua infamia deſtandâ progenitum. Et quoniam dictu horrendum est quo modo proveniat, descriptione nulla eget: & liberioribus scribendum relinquo. Hermolaus Barbarus refert mala insana, hoc est, poma amoris dicata libidinoso, ad Mandragoram pertinere: cuius mas *μαῖς*, scemina *θηῖ* dicitur. Dioscorid. libro iij. cap. sexagesimo quinto. Est Mandtagoras aliquibus Circea vocata, quoniam videatur radix ad amato-

ria condncere:cuius duo genera,nigra,quæ femina existimatur: alioqui ὀπ' ὀδυνη: altera candida,nonnullis μασπ' or appellata,mas est.Cætera ex ipso auctore sunt petenda.Apuleius lib.de Viribus herb.primo,cap.cxxxj.

*Manna*,id est,pollen Thuris,μάννα Græci dicunt:est tenuissimus pollen seu flos, ac pars subtilissima eius thuris à cortice discreta: quo vocabulo Galenus sæpius libro quinto Methodi medend.& passim alibi, vritur Manna pro subtili thure. Quære Thus,& Olibanum.Diosc.lib.i.cap.lxx. & lxxi. lxxij. lxxij. differentias percipies, earumque medicamenta.

*Manna* μάννα ἀπομύλην, Galeno aëreū mel,cæleste mel, & manna cælestis: ros est condensatus descendens in locis quibusdam vnde colligitur, in emolliendis hominum ventribus accommodata.

*Marum* μαρόν, amaraco simile nisi esset odoratius ex Galeni sententia: herba furculosa est vulgò cognita, flore origani sed odoratiore, foliis multò cædidioribus. Suspicio est Mastich plan tam esse olitoribus, & officinis Maron, maioranzæ simillimam, flore ramentum musculo in pappos abeunte postquam senuit.Dioscorid.libro tertio,capit.xl.

*Mariſca* μαρόν σῦχλ, ficus fatua, & lycomorus, & lycaminus Celso, appellatur: quæ præ pinguedine aperitur, & semen ostendit. Plinius libro xv. capit. xvij. Columel. libro decimo.

*Marasmius* μαρσμός Græcis, significat tabes medicis Latinis: hoc est, rotius corporis, vel partis alicuius siccitas, quæ solet accidere humore nativo vi caloris absum pro. Hinc febris marasmodis, quæ est febris hæticæ species, ex febris ardente adeo propagata, ut humorem totius corporis absumat. Vide Galenū lib.i. de Differentiæ febr. cap.x. Quære diſt. Febres.

*Marathrum* μαράθρον, feniculus & feniculum Latinis est, solet dum adhuc ténellum est, necdum in caulem assurrexit, in acetariis appeti. non enim altè assurgit, appellaturque feniculum dulce: quæ quidem dulcedo inest semini, rum à solo, tum etiam à ratione. Est & aliud feniculum maius scilicet, quod veluti arboreſcit, & à Græcis hyppomarathrum ὑππομαράθρον fertur: officinis autem vulgaribus feniculum tortuosum. Quinetiam aliam quandā herbam pratensem, daucum Creticū, & folio, & umbella, referentē, feniculū potcinum appellari audio, quòd folia feniculo similia habeat, & porcis saginandis proſit: quæ ea herba est Dioscoridi Pensedanū appellata: Latinis herba stataria. Quære diſt. Feniculū.

*Mariſca* σῦχα, Latinis ficus: tuberculū est in ano siue sede prominentiore, apparens, ex genere hæmorrhoidū, sed sanguinè non effundit nisi cū purulenta materia. Vide plura in diſt. Hæmorrhoides, & Ficus.

*Margarita*, sunt vniones, vulgò perle, in conchis Ostreorum generi similibus Plinio dicuntur. Inveniuntur & in conchis mytilorum maris interni, sed parvæ & exiles. Dos autem earum omnis in candore, magnitudine, orbe, & pondere: intactæ item & pellucidæ, perforatis, rufis, obscuris sunt meliores: ob id mīſcētur cardiacis aromaticis, & febricitantiū imbecillorū remediis.

*Mater. fylva* Scrib. Largo, est τριπλόφυλλον Græcorū, & Caprifoliū Latinorū. Dicitur etiā Inuolucrū maius interprete Musa. Quære diſt. Caprifoliū.

*Marrubium* μαράθρον, frutex est ab radice ramosus, cædicās, subhirsutus, quadrā gularibus ramis. foliū pollicē æquat, subrotundū, hispīdū, rugosum, gustu amaro, odorū, calidū ordine secundo, siccum tertio: ad quamplurima vtilissimū Galen. libro octavo Simpl. assignatur. semen in caulibus, & ex intervallis, flores verticillato ambitu asperi. Est & nigrū Marrubii, nomine alio, Ballore vocatū: caules edit nigros, subhirsutos, quadrangulos, complures ex vna radice: foliis hispīdis intercedente spatīo, subrotundis, graue olentibus, apiaſtro proximis. vix eius effīcax aduersus canis morsus, foliis ex sale illitis. Diosc. lib. iij. cap. xviij. & centesimo.

*Mespitem* μάσπετον, Laserpicij caulis cum foliis, est: cuius gratia copiosius scriptum reliquimus in diſt. Laser: & Laserpitium.

*Mastiche* μαστική, resina, siue lachrima ex Lentisco frutice vulnerato, erumpens: quæ lentisœina cognominatur, & ab aliquibus Mastiche. Conficiendi modum docet Diofcorid. libro primo, capit. septuagesimo quinto. Quære dictionem Lentiscus.

*Matricaria* πικρήν'or, aliqui Amara cum vocant: foliis est coriandri, tenuibus: flore per ambitum albo, intus melino, odore graui, sapore amaro. Longè differt à ea herba, quæ olitoribus Athanasia, siue athanacetum, appellata est, cuius suo loco petes dist.

*Matrix* μηδὸς, μήτρα, non tantum mulierum est locus conceptui aptus: sed & pro medulla in stirpibus vsurpatur. nam matrix arbor est, à qua surculi insitionibus idonei prodeunt. De mulierum matrice retulimus in dist. Vulua.

*Materia*, est natura, quæ unicuique transmutationi subiecta esse nata est: estque subiectum rei sine potentia subiectiua, vt in Phisicis author est Aristoteles.

*Masticatoria* ἀπορρηγματισμοί, sunt medicamenta quæ in ore retenta & commandatâ per emissaria palati pituitam, & qui in capite concreuerunt, humores noxios eliciunt. Fiunt ex sinapi, mastiche, pyrethro, pipere, staphide agria, quæ vna taminea est, & zingibere. Adhibentur ad omnes vetustos capitis affectus, linguæ resolutiones, & oculorum, & dentium hebetudinem.

*Medicina* ἰατρική. Hippocrate in libro de Flatibus authore, est adiectio deficientium & redundantium detractio: cuius quidem finis est sanitas: nam medicinæ artis intentio est sanitas, finis autem, sanitatis adeptio. Hanc definitionem Galen. Method. medendi libro vndecimo, nullam aliam secutus comprobauit: tamen plerique medici posteriores pro suo arbitrio variarunt, vt Herophilus in hunc modum: Medicina est scientia salubrium & insalubrium, & neutrorum. Hanc vsurpauit etiam Galenus capit. vndecimo, artis meden. non quod eam vsquequaque prober, sed veluti valde notam, nomen scientiæ cum arte communiter significaret non propriè accipiendū. Ex quibus satis perspicuum fit, medicinam artem, & non scientiam esse. Ammonius in libro Diuisionum sic ait, Omnis ars subiectum habet, & finem: itaque medicina subiectum habet corpora atque medicamina: finem verò ad sanitatem corpora perducere.

*Medicina*, diuiditur in speculandi vim, & agendi: speculandi quidem vis diuiditur in naturæ, & causæ & signorum explicationem: agendi autem vis, in sanatile, & curatile: sed naturæ explicatio diuiditur in elementa, temperamenta, potentias, humores, & membrorum particulas. Causæ explicatio, in proposita, & capitularia, & comprehensa: signorum explicatio, in recordatile, & discretile, & futurorum præsigium, quod πρόσητον Græci vocant. Sanatile, est in cohibendo, nutricando, & expellendo. Curatile in remedia adhibendo, victum deligendo, & chirurgiam exercendo. Hæc sunt, quæ Ammonius.

*Medicinæ* primariæ partes sunt quinque, quæ à Græcis his appellantur nominibus, φυσιολογική, ὕγιαν, ἀντιλογική, σημειωτική, καὶ θεῖα ρατῶν. φυσιολογική autem dicitur pars, in qua de hominis natura atque constitutione discribitur. Ad eam medicinæ partem spectant naturales libri Hippocratis, Platonis, Aristotelis, Galeni, & aliorum. ὕγιαν verò, est quæ sanitatem pollicetur, ac tuetur, præcauetque quod minus corpora in morbos incidant. Ἀντιλογική, quæ etiam ἀπολογική dicitur, est quæ causas & symptomata inquirat, σημειωτική, est quæ cognitionem præteritorum, inspectionem præsentium, & futurorum prædictionem continet. θεῖα ρατῶν, est in qua medendi ratio docetur. Atque hæc deducitur in partes tres, nempe διαγνωτική, φάρμακευτική, καὶ χειρουργική: prima, est quæ victus ratione morbis mederi debet: altera, quæ medicamentis intra & extra ad motus medetur: tertia, quæ manibus operam dat.

*Medicina* cognitio prima, est vt cuiusque partis, potissimum verò eius quæ sensum effugit, atque adeo cuius passionibus difficillimè deprehenduntur, morbos, ac mala promptissimè dignoscant.

*Medicine* cognitio altera, est prædicendorum præteritum, præsentium, & futurorum: quod ægrotantes huic qui præsentia, præterita, & futura coram illis præferat, libentius pareant, eique audentius sese committant, atque adeo strenuè in oppugnando morbo iuuent.

*Medicine* cognitio tertia, est cuius prædictione consequitur utilitas, quod is qui victuros, moriturosque prædixerit, nouiis crimine prorsus vacabit. Sic per præfagia medicum à morbis crimine vindicare, ægròsque reddere obtemperantes. Galenus auctor est in libello de Constitutione artis.

*Medicamenta* motu pigra sunt, quæ partium crassitie pollent, viscosæque existunt: ideo primis partibus hærent, in quibus natium experta calorem, vim suam exerunt.

*Medicamenta* tenuia sunt, quæ celeriter in longinquas partes perueniunt, antequàm in actum reducantur, ubi vim suam exercent. Cætera ex Acakia super Galenoad Glauclib. i.

*Medicamenta* composituro cognoscenda certa methodo, sunt tria: affectus omnes corporis præter naturam, in quos medicamenta cõponimus: corporis ipsius natura, sine qua affectus illos ad vnguem nosse, nec probè tutò vti medicamento queas: tertio simplicium omnium medicamentorù facultates pernoscentæ sunt, primæ, secundæ, tertiæ, quartæ, id est, ipsorum causæ effectrices, seu naturales eorum quædam potentie corpus nostrum immutantes.

*Medicamentum*, est quod corporis nostri naturam alterare potest, ac immutare primæ, secundæ, tertiæ, quartæ, facultate, seu tota sua substantia: idque ad sanitatem faciendam, siue ipsum sumatur, siue admoveatur. hæc Galenus initio lib. primi Simpl.

*Medicamentum* simplex seu immixtum, est quod secundum suam naturam hoc est, substantiam seu essentiam, syncerum, & à mixtura alterius medicamenti alienum. Gal. lib. i. de Simpl. medic. facult. cap. i. & iiij.

*Medicamentum* compositum, est id cuius substantia syncera non est, sed cū substantia alterius medicamenti, vel plurium, commixta est. Omnia propemodum medicamenta hoc sensu simplicia apparent, natura tamen, id est, facultate, esse composita. Gal. lib. iij. Simpl. med. cap. xij.

*Medicamentorum* simplicium materię quædā proueniunt à planis, & arboribus: ab animantibus quædam, è terra, mari, & aquis etiam quædam. Gal. simpl. facult. lib. vj. cap. ij. & lib. j. Compos. medic. secundum genera, cap. i. & ij.

*Medicamentorum* purgantium, quæ *καὶ πρὸς ἴκκα* nominantur, variz formæ exco-gitantur, ita men haud secus atque antidota, quæ in diuersis morbis exhibentur, duplici potissimum modo effinguntur: aut enim liquida forma, aut solida formantur, & in usum reposita in officinis seruantur.

*Medicine* principia tria sunt, vnū inuentionis: alterū constitutionis: tertium interpretationis: inuentionis medicinz principium vetustissimū planè, citràque rationē experientia est: constitutionis autē, sicut Asclepiadū medicinz, ratio, & experientia: interpretationis vel traditionis initium, naturalis est speculatio. Hippocrate verò desinacore, medicinz rationis iniciū primum natura est. &c. Gal. in lib. Introductorij, seu medicus.

*Medicamentum* purgatorium, est non à tēperamento, neque vt contrariū agens in contrarium, quatenus contrarium: neque vt simile trahens & euellens alterū, aut vt contrariū: neque vt leue sursum, graue deorsum, agens purgandā materiam: sed quia talem coelitus est sortitum calorem.

*Medicamentum* bene olens, est quod salubrius æstimatur: quandoquidem odor ille bonus, partes principes facultatum, seu fontes roborat, spiritus instaurat, facultates, animamque exhilarat: grauis odor contra, ob id effecta molesta, & difficilia illi succedunt.

*Medicamentum* acre, est quod faciliè inflammatur, mordet, pēnēt rat, aperit, vrit vlcerat, flatus dissipat, tennat, incidit, resoluit, è longinquo attrahit, siccāt, emaciat, sitim

litim mouet: ob hæc omnia citò, & valenter agit: & sua tenui essentia amarū medicamentorum, & cætera imbecilliter, aut tardè purgantia celerat, & purgantiora reddit.

*Medicamentum* amatum, est quod siccatur, consumitur, vlcera, aperit orificia venarum, hæmorrhogiam mouet, à putredine vindicat, terget, incidit, torminosum est, conturbat, resoluit, attrahit, sed tardiùs, quàm acere medicamentum: flatus dissipat, sitim excitat, valenter agit, sed tardè, suâque crassa substantia acere obtundit.

*Medicamentum* salsum, est quod incidit, terget, tenuat, liquat, mordet, à putredine vindicat, conturbat, subuertit ventriculum, & ad vomitum impellit, siccatur, sitim excitat, asperat, expurgat radendo, aperit, & hæc omnia opera imbecillia & tarda efficit: ob hæc suâque mediocrem substantiam, omnia imbecilliter, & tardè soluentia roborat.

*Medicamentum* vinctuosum, est quod lenit, lubricat, laxat, mollit, a bominabile est, & nausea bûdum, flatus gignit, obstruit. hæc omnia imbecilliter & tardè perficit: suâque mediocri substantia acere, amarum, salsum reprimat.

*Medicamentum* dulce, est quod lauat, lenit, obstruit, flatu lentum est: omnia autem hæc præstat imbecilliter, nec citò, nec tardè, sed in horum medio: acere autè, amarum, salsum quoque reprimat, sed insipidum roborat.

*Medicamentum* acidum, est quod penetrat, aperit, incidit, diuidit, tenuat, terget, densat, asperat, extinguit calorem, citò agit hæc opera: sed in medio valentium, & imbecillium, est: sua denique substantia tenui obrundit acere, dulci, & insipido vigorem addit.

*Medicamentum* stipticum, est quod intro agit, densat, repellit, roborat, diuisa glutinat, tardè & imbecilliter agit, suâque substantia crassa prædicta omnia obrundit, quibus acere, amarum, & salsum, vites addunt.

*Medicamentum* insipidum, est quod lubricat, flatulentum est, obstruit, densat, congelat, calorem extinguit: & hæc omnia tardè, & debilitat: sua tamen substantia mediocri acere, amarum, salsum, acidum reprimat.

*Medicamentum* purgans, est quod à nostro calore in energiam reductum motu violento vacuat: neque enim vacuaret, nisi naturæ vim afferret: vacuat autem proprium, & familiarem sibi humorem, non etiam alium quemuis, nisi actio eius, ob quantitatem iniustam, & qualitatem alienam effrenis ac immodica, euaserit.

*Maxille* seu mandibulæ *σιναι* sunt ossa quibus dentes insuntur: atque harum duarum inferior in omni animantium genere, præter: quàm in Crocodillo, & Lacerto maiore, sola mouetur. Quære dict. Dentes.

*Medicus* prudens, & peritus, est qui nouit naturam affectuum, atque eorum curationem, ægri naturam, & medicamentorum facultates, non in genere solum, sed secundum quantitatem, id est, quanto recessu calidum, frigidum, humidum, siccum, tergens, & cætera: vt quotidie coniciat, quali remedio opus est: vt præcedens medicamentum intendas, vel dissoluas, quantum affectus requirit: & sic curatio legitime absoluitur. Neque enim sufficit nosse hoc, calfaciendi, aut refrigerandi facultatem habere: sed quo recessu, siue quantum habeat eam facultatem, definite oportet.

*Medicus* rationalis, est qui naturæ rationem præbet: morborum causas inquirat signis ad illarum inuentiorem vtitur: curationem capit à contrario. Itaque medicus perfectus est, qui feliciter, fideliterque se praxi exercet: qui que cuncta operatur in mendum facultate, vsu, & experientia.

*Medulle* spinæ cerebro posteriori adiacet, neruus sexaginta duos, per singulorum vertebrarum foramina, singulos emittens.

*Medulla* spinæ dorsalis à Platone in Timæo, Hippocratis sententiam qui sequitur est, genitalis appellata auctor est Galenus super eodem Timæo: sensu isque à dorsali medulla semen ad maris pudendum descendere: cum & hæc veterum sit opinio. Est denique medulla *ὁ μυελός, ἢ μύττα, καρδίᾳ*, etiam in plantis appella-



tur, & eor, & matrix à Theophrasto.

*Meacaphrodites* με'καφροδιδης, herbula est, quam Ruellius papauer spumeum suspicatur: atque ipsum Aëtius in potu contra vipetas commendat. Quære dict. Papauer.

*Meconium* με'κωνιον, nigri papaveris succus in pastillos digestus, multum ignavio opio. με'κωνιον, κα' με'κωνιος ο'πος. Pharmac. secundum genera libro primo Gal. succus ex foliis & calice papaveris tuis expressus, pro opio à plebisque supponitur alia eius adnetheria Dioscorides. Diversa facit ex Asclepiade Galenus libro secundo antid. Est præterea Meconis με'κωνιος, sylvestris lactucæ species, & amata. Quære dict. Opium.

*Medica* herba μεδικη ποδ., trifolium grande, & scœnum, vel scœnacia herba dicitur: quæ cum recensit prodit, foliis, & caule trifolio pratensis similis est. procedens vero folia contrahit, caules edens trifoliis, & siliquis corniculorum modo intortas, in quibus semen lentis magnitudine dependet. herba tota pro gramine vtuntur qui pecora alunt.

*Medimus*, genus mensuræ, centum & duobus sextariis valet apud alios nonnullas libras capit quinquaginta octo.

*Medum* herba μεδμη ποδ., in petrosis, vmbrosisque locis quæ nascitur: & trifolium odoratum plerisque creditur, quod acutum Largo est. Meminit huius Dioscorides lib. ii. cap. xvj.

*Melancholia* μελαγχολια, id est, bilis atra, est desipientia sine febre: sed mania μενι'α sit ubi flava bilis supra modum exulta in nigram mutatur. Latinis insania dicitur. Hac correpti serarum modo redduntur effrenes, vt etiam eos qui imprudētius illis occurrunt, male tractent.

*Melampyllum* μελαμυρρον, κα' με'σπρος, species acanthi, sine spinis, & aculeis: quæ pederota, id est, Branca vrsina, vulgò appellata, humilior existimatur. Quære dict. Acanthus.

*Melandrum* μελανδρον, medulla roboris Gesnero videtur: Plinio herba in segetibus nascente, æ prarix, flore albo, odorato. Aliquibus roboris genus est: aliis ex Plinio, melampyrum esse contentio est.

*Melampyrum* μελαμυρον, κα' με'σπρος, surculosa planta est, tripedanea, foliis rubic pallidis, semine scœnigræci, oleoso. Latinis vocabulū hoc frumētū nigū sonat, quod suspicor ego Iouis triticum vulgò appellatum. Rura autem rogetā esse volūt.

*Melampodium* μελαμποδιον, Elleborus niger est, à Melampode pastore inuentore, dictus: veratrum nigrum alioqui existimatum reperitur. Quære dict. Elleborus.

*Melanthium* μελανθιον, gith, id est, nigella Romana, quamnis flore sit ex occurreo albicante: semine nunc nigro, nunc rufio, calidum siccum tertio ordine. Quod vero in segetibus altius adolefcit, nigella rusticis dicta, inodora, vt gythago vocari possit. Diosc. lib. iij. cap. lxxv. perlegendus est.

*Meleagris*, pauo Africanus est, non gallina regionis eiusdem, vt scribit Scholiastes: & quia avis utraque nobis notissima apparet, facilè intelligitur, discerniturque ex specie differentia: & mensis non solum utraque, sed & cibis qui facillimè stomacho conficiuntur, aptissima. Vide Aelianum plura scribentem.

*Melilotus* μελιωτος, festula campana, siue corona regia, & pratellum, quod pratis sit familiare, & segetibus, dicitur: cuius autem color est vicinus croco, & boni odoris eligitur: sed colore in luteum languescente, & odore infirmo, ad medicamenta imbecillior est. Diosc. lib. iij. cap. xxxix. Galenus Simpl. lib. vij. & Compos. medic. libro quarto.

*Melo-Indur*, Anguria olitoribus dictus: aliis botheca, viridi cortice vestitus, interlinearibus figuris candidis adornatus, oblongus, magnus, & interdum ex globoso turbinatus: nunc in Gallia nostra frequēs. Quoniam itaq; multa sunt genera, ab ipsorum sapore, & figuris sunt pereda. Quas differentias inter se habeat Melones, pepones, melope

Iopepones, & citrulli, Car. Stephanus in lib. de Re hortensi, se ad verum docebit.

*Meliceris* μέλις, ex abscessuum genere est, qui mellis modo, ac similitudine humorem in se habet. nam in abscessuum genere tria sunt frequentissima, nempe Stateoma, Atheroma, & Meliceris: à similitudine contentorum in his corporum dicta, vt Galenus docet. In Stateomate enim seuo, in Atheromate pulticulæ, in Meliceride verò melli similis materia continetur: quibus omnibus commune est, vt quod continetur, vel digeratur, vel putre reddatur, vel ferro excidatur. Quibus autem remediis hæc fiant, ex Aegynete libro quarto petendum est: & ex li. ij. ad Glau. Galeni, cum Aca kiz diligenti explanatione. Quære dict. Abscessus.

*Meliceratum* μέλις, est potus ex melle, aqua, cinamomo paucis, seminibus frigidis maioribus, & quandoque radice, vel rusci, vel graminis adiecta, prout ægritudo postulat, exequitur. aliquibus etiam aqua mulsa dicitur. Apud Mesuem restitutum compositionem habes integram.

*Melissa* μέλισση, id est, apum folium, siue apiastrum, & citra go plerisque dici placet. Huius genus est & alterum, inquit Gesnerus, foliis herbaceis, incisuris altioribus, quod herbariis prasiuum viride est. Dioscorides libro tertio, cap. xci. Gal. li. vij. Simpl.

*Melones* μήλοες, à rotunda mali figura nominati: præstantes dulcedine, succini: & fragranti odore, moschari: nomen ipsi hætenus durauit: & à peponibus videntur bonitate in totum differri. Quære Carolū Stephanum in libro de Re hortensi.

*Mel* μέλι, in succorum sensum referri potest, ex Apum arte & solertia collectum, & conerctum: colore flauescens & candicans quod efficacissimum deprehenditur: estque medicamentosum, & in alimentum verti non dedignatur: temperatura calidum humidum: atque ex sanguine in bilem conuersum, longa continuatione esum, conuertitur: sed sumptum intra corpus est oliuo salubrius, extra verò corpus olium. Galenus li. vij. Simpl. & Sanitat. tuend. li. iij. & Temperament. li. iij. Dios. li. ij. cap. lxxiij.

*Mel* vino quarta parte grauius est, continet enim ipsius mensuram integram, & trientem insuper. Cæterum scire conuenit liquores grauitate inrer se differri.

*Membrana* cerebrum velantes μήνιγγα, vocantur: quatum exterior crassior validiorque est, atque adeo cerebri contra caluariz occurfus propugnaculum, recentiores medici duram matrem nominauerunt, natura prouida dedit. Hæc perforata est iuxta ossa, quæ quia coli seu cribri instar foraminata σπινθηρ, & quod veluti spongiæ foramina multa habent σπόγγουδι, dicuntur. Basilaria & colatoria ossa Latinis appellata. Membrana tenuior penitus cerebro coniuncta secundæ similis est: ei quoque nomen vulgare pia mater: Græcis autem χοροειδης accipit nomenclaturam.

*Membrana*, quæ ab interiore parte costas cingit, & ambit ὑπερώϊα appellatur: ex hac aliz membranæ duæ vtræque parte singulæ medium thoracem intercipientes nascuntur, quæ διαφραγματος, nominantur: Barbari medici mediastinum vocant.

*Memoria* μνήμη, est retentio seu comprehensio, & quasi possessio atque seruatio eorum, quæ vel dicta, vel excogitata fuerunt in animæ operationibus ad intellectus repetiti reminentia. De memoria deperdita, de quæ affectibus aliis, qui eicæ principem animæ facultatem euenire possunt, Gal. li. iij. Locor. affect. cap. iij. quia fufissimè docet, ideo petendus.

*Mentha* Glauciū est, succus herbæ nostro orbi ignotæ, sed ad Hierapolim Syriæ nasci scribit Dioscor. lib. iij. cap. lxxij. foliis serè corniculati papaueris, sed pinguioribus, in terram sparsis, odoris terri, gustus amari. tota croceo succo madet: cuius vsus ad oculorum medicamenta conducit.

*Mentis* partes sunt, contéplatiua, & consultatoria: contéplatiua, vt scientiæ intellectus, & sapientiæ cognitio: consultatoria, vt artis, & prudentiæ actio, quarū finis est.

*Mentis alienatio* seu melancholia aut desipientia sine febre, est quæ interdum fit vniuerso in venis sanguine melancholico effecto, ob cõmune sanè vitiũ, cerebro quoque ipso simul læso, nõnunquam verò quando reliqui corporis sanguis prorsus innoctus est, solus autem is, qui in cerebro contentus est, alteratur: sed duobus modis. hæc docet in huius morbi curatione Fuch. l. ij. de Med. morb. cap. xx.

*Mensum γένειον*, id omne est quod labro inferiori longa orbiculari figura subiacet: à quo mentagra morbus, qui sub nomine Lichen cõprehenditur, & describitur.

*Meninge μνίγγει*, cerebri totius vela menta sunt: quæ membranz, id est, vt chirurgorum vulgus appellat, mater veraque, dura scilicet, & pia, de qua re vide paulò supra.

*Mensis illuminationis*, est quando diebus triginta, aut viginti nouem cum semisse Luna ad solem remeat: sed occultationis tempus, quod ferè dictum trium est, extricenis demperis dies septem & viginti: si ex viceois-nouenis cum semisse, dies sex & viginti cum semisse remanent, quod tempus mensis illuminationis est, quod scilicet Luna tunc nobis manifestè illucescat.

*Mensis reuolutionis*, est cum Luna ex opposito, quadrangulo, vel quadranguli medio locum inspiciat: à quo quum morbus cœpit, egressa est: quodq; duplici nomine in morbis, præcipuè acutis, imperium Luna habet, nempe lumine, & configurationibus. Itaque mensis reuolutionis ex septem & viginti diebus trientèque constat.

*Mensis medius*, seu criticus, est qui ex mensibus illuminationis & reuolutionis simul copulatis, & in duo æqua diuisis, sortitur: nempe illustrationis & configurationis facultatibus pœtetur.

*Menses* in mulieribus, muliebria alioqui dicta, in primis sensim mensibus singulis erumpunt ab ipso iecinore, velut per quædam interualla, donec peruentum sit ad illa super primum cervicis vuluz exortum acetabula, quos hæc quasi hiant & apertore effundunt: vt videre est in Icone appposito.

*Menses*, sunt qui vel naturaliter, vel præter naturam quibusdam mulieribus supprimuntur: naturaliter, quòd mulier nulla inde molestia vel totius corporis, vel vteri afficiatur: ætatis itaque ratione plurimis menses quartodecimo anno fluere incipiunt, paucissimis ante decimumtertium aut duodecimum erumpunt: desinunt verò aliis circa quinquagesimum annum, vel paulò post: vel vsque ad sexagesimum durant. Steriles etiam mulieres præter naturam detinentur. Sunt præterea vise mihi mulieres, quæ vndecimo ætatis anno peperere puerculas. Neque Plinij reiticienda sententia est, qui asserit, quod ego ipse probaui verum, nullum certum tempus pariendi mulieribus constitutum, quum mense septimo alia, alia atque alia modo nono mense, decimo, vndecimo, decimotertio, & decimoquinto sicuti illis placitum est, pariunt: mortalibus quoridiana quæ res, siue naturæ miraculo, est.

*Mensium profluuium*, est quod statis temporibus mulieribus euenit, vt eo ipso vniuersum corpus expurgeretur, atque adeo sanitas rueretur. Si itaque extra conceptionem, & id tempus lactatur infans, menses suppressi fuerint, bonam corporis valetudinem planè destruant, perinde atque vbi plus iusto permanarint. Hippocrates libro Aphorismorum quinto, Aphorif. lvij. & Epidimia libro sexto, partis primæ aphorif. vi.

*Mensium redundantia* in mulieribus, est quando vltra consuetum tempus purgationis magna copia affluerit: tempus autem vnicuique purgationis statutum, & ordinatum non est: nisi vris, & simiis sceminei sexus, quæ suos tempore constituto susciunt menses.

*Menses mouentia*, sunt medicamenta magis calida, quàm læ gignentia, & sicca modicè vt sabina, daucus, pulegium, calamintha, & alia permulta.

*Mesenterium μιστερριον, καὶ μισορριον*, pars quæ media inter intestina sita est, cæqi dorso alligat, vocatur. Sed & mesenterium à siu, in medio siquidè intestinorum situ m

firmum: Mesareum autem à propria substantia, quia ex tenuibus ac angustis venis constat. In eo enim venæ sunt, quæ ex iecinoris porta, vbi inuicem coeunt, & ad vnum principium perueniunt, in ipsum descendunt, quibus iecur veluti manibus, quæ ei est, tum ex venericulo afferant, vititur, & mesentericæ, seu meseraicæ dicuntur: & hic porta iecinoris est.

*Mergus* ὁ ἰσχυρὸς αἰς, auis vulgò plingion dicta, ex qua tempestatem prænoscimus. Mergus autem dicitur, vt Vatro author est, quòd cibum captas se subinde in aquam immergat. huius caro quia pèssimè conficitur, à medicis peritioribus in cibis damnata est.

*Mercurialis* mas ἐρμίου παρὰ καὶ λυροζώτης, suum nomen vulgare, apud plebeios hætenus retinuit: notitiæque per familiaris, & in medicina frequētissimæ vsus. Est & mercurialis scemina λυροζώτης θύλαξ. Diosc. li. iij. cap. clxix.

*Merula* ὁ κίττυρος, cuius hominum auis nota, cuius caro durior multò, quàm perdicis vtriusque, aut sturdi, non autagenis: cuius cibus parum salubris contra multorum sententiam.

*Mespilus* urbana μεσπιλον, fruticosa arbor notitiæque vulgaris verum sylvestris mespili fructus urbane sunt odoratiore, & si non mitiores, tamen frugaliore. Interpretantur quidam sylvestrem mespilum Crætzgum: sed mespilus Dioscoridis descriptione, arbor est aculeata, triccocum ferens fructum, qualis est quæ Azarobum Neapolitanis dicta profert. Mespilus autem nostras, Dioscoridis vera Epimelis est, li. i. cap. cxxxiiij.

*Methodus* μεθοδος, est vniuersalis medendi viâ ac ratio, ex principio aliquo ad singula peragenda aliquo ordine perducit: docendo quid primum, quid secundum, quid tertium, & deinceps: & quid siue quo curationem efflagitet: & qua ratione ea perfici possit.

*Methodicorum* notæ, sunt similium in euidentibus consideratio: particularium ad generalia rednctio, ex communium indicatione curatio accepta.

*Mentha* μένθη, quibusdâ Diosco. Calaminthe suspicatur: aliquibus Symbriū. Mentha quidem frigida non est, nec humanam genituram edētibz absumit: quemadmodum Problemate vltimo sectionis decimæ quartæ scriptum reliquit Aristoteles. Mentha multiplex quidem est ἡδισμός Græcis dicta, hoc est, suaue olens, & suo odore mentem quòd excitet, mentha appellata nonnullorū sententia. Sed quæ vera, est folio pusillo, nigriore, & longiore, caule rubro, neque adeo fruticat: atque hæc verus Balzamus dicitur. Menthastrum autem est caule altiore & latioribus foliis, sed lanugineis. Est & mentha aquatica, quæ à Diosc. Cysimbrium dicitur libro tertio, cap. cxxxiiij.

*Metrenchiser*, instrumentum est quo vteris colluitur: & tantum sonat Latine quasi dicas vterinū elysterem: μετρησεν enim matricem, & χέειν fundere valet Græcis. Catheter autem, siue Syphon rectus neotericorum Chirurgorum voce Argalia vocitatur: estque ænea fistula, per quam vrina elicitur suppressa, aut qua medicamentum in vesicam infunditur foratâ per indirectum.

*Metopium* μετόπιον, arbor ammomacam guttam stillans: quibusdâ Galbani fetula parens suspicatur. Dioscorides libro primo, cap. lx. refert vaguentum fieri in Aegypto, quod metopium patrio nomine appellatur, propter Galbani missionem. nam lignum in quo Galbanum enascitur, vocant metopium. Quære dict. Ammoniacum, & Galbanum.

*Metreta*, mensuræ genus, sextariis septuaginta duobus valet: apud Syros autem centum & viginti. Vasis genus constans ex duobus baris μετρησεν. Quod Dioscorides metretam dixit, Plinius cadum transulit, quod & ipsum Græcum est, sed utroque Latini vtuntur. Est autem congiarum decem, vt author est Diosc. li. v. decem autem congi sexaginta sextarios valent, id est amphoram & quadrantem.

*Meum* μέν καὶ ἡ μένον, officinis meum, & auethum sylvestre, & tortuosum appellationem habet: & quod nobis frequens Diosc. picturam explet, lib. i. cap. iij. tamen præstan

præstantius Macedonicum, aut Hispanum: sed & Athamanticum laudatur ab Andromacho in sua Theriace, Galeno referente li. i. Antidot. & li. ix. comp. Pharmac. similiter li. vij. Simpl.

*Miliaria* herba, *βοτάνη τις ἐν χεγχρῶ γινομένη, καὶ τὰ ἐμπλήκειν αὐτὸν βλάπτουσα*, id est, Milio gentilis est, hinc miliatia ex eo dicta, quod milium implicando enecet. Eadem fortassis Cuscutæ iam dictæ fuerit, verû Linodoræ Theophrasti, quâ rura corrigiolam vocant, potiùs, Gesnero coniectore, suspicabitur.

*Milium* *κέγχρῶς, καὶ πείσων*, Straboni *κεγχρῶς*, Hippocrati *πυλὸς παλὴ*: vulgare granum habetur vbiq; gentium. In panes coactum minus alit cæteris frugibus. sistit pulve sua aluum, vrinam cit: mouetque sudores eius decoctum cum saccharo in sirupum conuersum, & mox bibitum.

*Milium Indicum* *κέγχρῶς Ἰνδοῦς*, nostratibus Gallis hodie frumentû Turchicum est: sublauum colore granum tyrsio turbinato affixum, copiosum, amplum, arundineo culmo, altitudine ad pedes septem. Omnium enim frugum fertilissimû, quod ex grano vno terni sextarii, gignuntur: ob idque Nerone imperante in Italiam conuectum satûque subinde est. In Gallia seritur nisi in hortis ostentationis gratia.

*Milium. Solis* *λίθος περιμυρῖν*, à seminis duritia nomen accepit, foliis est oleæ longioribus, & latioribus, mollibus iacent humi, quæ ab radice exiliunt: ramulis furculo sis, tenuibus, rectis, firmis, crassitudine acuti iunci, interque parum semen, rotundum, erui magnitudine, duritia lapidea, vim habet vt calculos in renibus moueat, & frangat, forasque per vrinam propellat. Diosc. li. iij. cap. cxxv.

*Millepedæ*, vermiculi sunt, Aselli alioqui nominati sub vase aquario delitescetes: quorum medicinæ facultas à Diosc. describitur hoc modo: Animalia sunt multis pedibus nirentia, quæ contracta manu contrahuntur in orbem. hæ ex vino potæ difficili vrinæ, & regio morbo, auxiliantur: anginis cum melle illitis vtilissimû, horum meminit & Serib. Largus. Quære dict. Aselli.

*Millefolium* *μύριον φύλλον*, herba est tenui à lateribus capillamenti modo folio, eximij vsus ad vulnera, & neruus præcisos addita xungia. præcipitatis in potu cum aqua & sale datur. Aliam præterea describit ex Ruel. Gesnerus, quâ & millefolium *χύλων φύλλον*, inter Syderitides herbam, Achileiam, nomine alio appellatam, describit. Est & Stratiotes *χύλων φύλλον*, id est, millefolia herba, quæ Achileis suspicari potest. Quære dict. Stratiotes.

*Militaris* herba *ἐ'ρως*, aut eius species Gesnero creditur, & eadem quæ Lætoris. dicta militaris, quoniam vulnera recentia ex oleo quopiam imposita intra dies paucos sanat. Quære dict. Lætoris.

*Mezereon*, nonnulli cû Laureola confundunt, ac si vnum sint, quû duo & longè diuersa esse oporteat: quoniam laureola, quæ Daphnis est, lacte careat: mezereon eo abundet, vt illi Arabes imponunt. Nam Diosc. & Plin. Chamæleam & Thymæleam duas herbas faciunt, vt verè sunt: manifestèque colligitur Arabum, mezereon, esse chamæleam & thymæleam Diosc. ac Plinij.

*Milvus* *ἰ'κτινός*, auis notâ: quâ Aelianus vsq; adeo rapacem esse scribit, vt carnes & extra ex macello auferat, tamen ex Olympicis aris eas nunquam attingit. Significatrix belli, & epidimicæ, morborumq; peragantium est, & portetorum nonnunquam præsagiorum id ipsum circum vrbes & oppida versari eius consuetudo est.

*Mina* quam Græci *μινά* vocant, multiplex est: alia nâque Romana, alia Attica, Aegyptiaca alia, atque alia Alexandrina. Romana testibus Galeno, & Aegyptiaca, vincti vncius cernitur: Attica & Aegyptiaca sexdecim vnciis constat. Cætera reposuimus in dict. Libra.

*Minium*, arboris Gaditanæ gummi est. Strabo versus finem libri quinti hoc scriptum reliquit de hac arbore, inquit: Gaditanæ verò arbori & illud innatum esse traditur, quod vno fracto ramo lac effluit: quod si radicem abscideris, Minij humor exudat. Diosc. li. v. cap. lix. de Minio aliter sentit sic scribens: Minium enim in Hispanijs ex lapide quodam argenteæ arenæ permixto, temperari solet: a liquo non dignoscitur

scitur. fornacibus autem in florentissimum flagrantissimumque colorem permutat. in metallis verò strangulantem halitum eructat. Apertè adeò Minium Dio. nō nouisse docent ipsius scripta, vt qui uis doctus iudiciū serat sine inuidia. Quare dicit. Ciurabaris.

*Mirach* Arabibus, id est, panniculus carnosus, Larinis Abdomen nuncupatur: quod octo musculis constat, & pinguitudine si qua reperitur. Sunt autem hi octo, duo sanè recti, à pectore vsque ad pubis ossa, per totius ventris medium maximè exporrecti. Duo autè transversi in latum procedunt, rectum cum prædictis efficientes angulum. Quatuor verò obliqui, quorum duo à præcordiis, versus ilium ossa tendunt: reliqui duo ab iliis ad costas profecti, Quare dicit. Abdomen.

*Misodulum* μισοδύλον, ocimum appellari Diophanes scripsit, à cæco illo odio quo maximè sceminis id aduersari testatur. Nam si pultario subiectum sit in scia muliere, futurum vt uouquam cibo manus admoliat, prius quàm subductum sit ocimum. hæc ex Dioph. Gesnerus.

*Mistrum*, mensuræ genus, per se drachmas quinque pædet: duplex est, minus mistru: olei drachmas sex recipit, vini scrupula viginti, mellis drachmas nouem, maius mistru, olei quadrantem capit, vini tres vicias, & octo scrupula, mellis trientem, id est, vicias quatuor.

*Mitridatium* μιτριδάτιον, plautæ genus, folia habens, inquit Plinius, duo à radice Acantho similia, caulis inter vitæque sustinens florem roseum. Gesnerus.

*Mina* Arabibus, fructuum succū significat, eo modo coctum vt in formam sapæ, vel mellis condenseretur. habes plura ex Mesue, & Nicolao nuper restituta.

*Mola* μύλη, est tumor induratus interim in vuluæ ostiolo, interim in toto ipso utero prominens, ad radicē ferè lapidosus: ac cum demittitur caro, informis apparet. Nomen autem à motus difficultate & grauitate assumptis, quam sentiunt quæ malo hoc afficiuntur mulieres. Causas explanat Gale. lib. xiiij. Meth. med. & curationem Fuch. li. iij. cap. xlix. de Med. morbis.

*Modius*, siue medimus Attic⁹, hæc triēta capit duodecim, cætera in dict. Medimus.

*Mollugo* ῥιπποφάρον, καὶ ῥιπποφάρι, cardui species coniectoris nonnullis videtur, sicut retulimus in dictione Hippophæstum.

*Molluscum*, vt docet Gesnerus, acris arboris tuber est, brusco quod intortius & crispum est, multò præstantius, simplicius sparsum. haud dubiè citro præferretur, si mensarium amplitudinem caperet.

*Molon* μολόν, καὶ σκυρον Plinio, caule est striato, foliis mollibus, paruis, radice quadrantali, in qua per extremum alij caput exuberat. Est quoque Moly μῶλυ, καὶ, μύλη herba, cuius nomen idem Rutæ syluestri applicatur: molónque esse suspicio est. nam Molochi μῶλοχῆ, malua procerior, quæ Apuleio hastula regia, sed perperam, nominata est: vulgaribus autem Rosa transmarina.

*Misy* μισύ, ex fodinis in Cypro insula eruitur, auti simile, durum, quod friando auti colorem imitatur, & stellæ modo splendet. Sunt qui P. foricum, alij Chalcitidem & Chalcanthum esse voluerunt, sed horum nullum est, quoniam sui generis Misi-geleba est Diof. li. v. cap. lxxvj.

*Morbus*, est affectus præter naturā à quo primum viriatur actio morbus differt à causa, quòd hæc est præter naturam sit affectus, actionem tamen non primum per se, sed morbo interueniente, vitiat. Gale. Artis medic. cap. lxxxviiij. & de Symp. causis li. j. & de Symp. differ. Fuch. Paradox. li. ij. cap. j. Quare dictionem Affectus, Actio, & Causa.

*Morborum* tria sunt genera, vnum, quod in similibus alterum, quod in iustru mentariis: tertium, quod in vtrisque partibus consistit. Morbi genus alterum, est quod in instrumentariis duntaxat partibus consistit, & mala constitutio seu compositio appellatur. ab imperitis verò morbus officialis. Morbi genus tertium, est quod similibus, & instrumentariis commune est: & solutio continuitatis siue vnitaris dicitur. Quare dicit. Solutio continui.

*Morbi*

*Morbi* instrumentalium partium duplices sunt, aliqui enim simplices, & hi numero sunt quatuor: unus in conformatione incedēti spectatur, alter in particularum numero: tertius in magnitudine seu quantitate cuiusque observatur: & quartus in compositione.

*Morbus* conformationis accidit ob indecentem figurā connatam, vel aduētitiā, concavitatem immodicē patentem, aut obstructam: item asperitatem, aut lenitatem partium. Morbus numeri, quū partes vel abundant, vel deficiūt. morbus magnitudinis, est propter diminutionem, aut auētionē connatam, vel partium aduētitiā. morbus cōpositionis, est cū vel positura seu situs partium à naturali euariat, vel eandem consensus à natura recedit.

*Morborum* trium generū, nonnulli sunt peracuti, nonnulli acuti, aliqui verò longi. morbi acuti duplices sunt, acuti simpliciter, qui in quatuordecim diebus integre iudicantur: alij acuti ex degeneratione mutationē vè à specie in speciem dicuntur. morbi longi, & diuturni, sunt quicunque acutorum terminum transcendunt, diēque quadragesimum excedunt. morbi peracuti, sunt qui circa quatuor primos dies, vel paulò vlteriùs in summo vigore consistunt. Gal. libro primo, Aphorif. Hippocr. Comment. vij.

*Morbi* acuti & febres acutæ, à calidis humoribus, sanguine nimirum, & flaua bile magna ex parte oriuntur: sic diuturni à frigidis, pituita & atra bile, vt in Crano ne antiqui dolores frigidi, noui verò calidi, quod scriptum reliquit Hippoc. libro vi. Epid. patr. prima aphor. vij.

*Morbi* vulgates, sunt qui secundum quædam tempora, eodem in loco multos mortalium inuadunt, vt pestis: quæ in omnes animantes sæuens ab aëris corruptione initium habens. Sic quoque de peracutis, & peragrantibus morbis suspicandum est.

*Morborum* genera, speciēsque in oculis à natura, à non natura, & præter naturam, peiendus est Galenus in libro de Oculis, theor. tertio, capite primo, secundo & tertio.

*Morbilli*, variolæque vulgò dictæ, ἑρπηματὰ à Galeno, Latinis pustulæ, dicuntur. Variolæ ei, im, sunt pustulæ sanguineæ, morbili verò sunt ex bilis, sanguinisque mixtione: variolæ ergo fiunt à materia crassiore, morbili autem à tenuiore, & herpetes nominantur: variolæ quidem esthymata. Manardus libro vij. Epistola secunda.

*Monedula* ὁ κοκοῖος, cornicis species: furatur aurum, argentum, cæteramque pecuniam quam obuiam sibi habet: vt Cicero in oratione pro Flacco: Non plus aurum tibi, quàm monedula cōmitterebat. Cæteriù tota clamosa avis est, tēpestatis, & fulgetri monitrix: crunibus, & rostro rubris, sed plumis maxime nitet nigris: cornicæque paulò inferior: & in medicina, & cibus nullius vsus.

*Mors*, est rerum omnium lineæ finis, ac exireum: seculique huius inter corpus & animam dissolutio: ipsius destructio quoque, ac deperditio ad æternam vitam resurrectionis. Quoniam mortem interdum pro fato, & euentu philosophi, & poëtæ vsurpant, quod longè discrepat à Christiana fide, sed nihil ad medendi vsu facit hæc definitio.

*Mortis* dies prænotificatur, quando superat materiam morbus, considerando & grauiores accessiones inspicendo. Si enim effatu dignus fuerit accessus, & parum adhuc resistere vis naturæ videatur, mors cito subsequutura est: si verò contraria affuerint, tardius. Fuch. Comp. Medicinæ cap. xliij.

*Molybdæna* μολυβδαία, plumbago est, & ex sodinis materia: substantiæ crassioris & frigidioris, quàm λίθαρχυρον: non terget tamen, licet varium colorem afferat. Diosco. libro quarto. cap. l. Gall. ij. Compos. pharmac. & li. ix. Simpl.

*Molybdæna* μολυβδαία ποτα, herba est alioqui dicta plumbago Plinio: in aruis nascitur, folio lapathi, radice crassa, hispida, qua contrita, & oculis plumbagine, quod vitij genus est, capitis imposita, feliciter quidem medetur. Ea creditur quæ officinis Persicaria maior, ob fuscā in solij medio maculam, vocitata est: cæque de causa Plumbago dicta.

*Molyza.*



*Moliza* μολιζα Hippocrati, alij corua cum capite solo, id est, cum capite & foliis, vox viurpata est.

*Morion* μωριον, mandragora mas describitur: vt copiosius de vtraque radice in dict. Mandrag. docuimus.

*Motus*, est cui quies opponitur, & contra: verum hoc in loco omnis generis exercitia intellige, vt est saltus, lamarum, discique iactus, cursus, pilæ ludus, equitatio, sulcatio, venatio, & eiusmodi: qualia Gall. li. ij. de Sanitate commemorat. Hos etiam inter motus commemoratur frictio, cuius frequens apud veteres vsus fuit: cuius sunt in vniuersum sex differentie, dura scilicet, mollis, multa, mediocris, aspera, & levis: quarum omnium vberiore explicationem ex Galeni loco iam citato, petes.

*Motus*, est alicuius in aliquo, aut acquisitio, aut deperditio. Dicitur autem acquisitio, aut deperditio, quandiu rei aliquid acquiritur, aut deperditur: nam motus est varius, multiplexque.

*Motus* transitiuus vniuersorum cum voluntate, est cum imperat princeps animæ pars, & spiritus qui in neruis est, suffragatur, & inferuit, membra extendit, transfertque.

*Morus* arbor, ἡ μορεὰ, καὶ ἡ σὺκαμάρς: cuius morum σὺκαμάρς fructus est. Morus alba Græcis veteribus indicta videtur, & Latinis præter, quam Ouidio: fortè quia per insitionem in populo alba gignitur. Sed Morus nigra, cuius foliis Bombices pastisericum nent pulchrius & splendidius, laudatissima est.

*Morus* A Egyptia, aut ficus A Egyptia, morofycus, vel fycomorus Celfo est: & ficus A Egyptia, quæ κίρωνα appellata est. Item morus vaticana βάλτος, rubus in aruis ex sentibus reptans: vulgaris quoque noritæ.

*Moscharyon* μωσχάρων, Gesnero καὶ κάρων ἀρωματιών, nux vnguentaria, & myristica, vulgi appellatione Moschata, à miro videlicet odore quem spirat nomen retinuit. Apud Diosc. & ceteros veteres nihil de ea reperitur: recentiores autem κάρων μωριτικόν, id est, nux moschata appellant: atque ex hac prodiri macim certum est. Atque hi sunt decepti, qui glandem vnguentariam nucem moschatam putauerunt quorum differentia Diosc. li. iij. te absoluet. Quære dict. Glaus vnguentaria.

*Mucus* seu mucus, excrementum est quod à cerebro destillat ad nares, & ad fauces gutturis. propriè nec pituitam quis appellabit.

*Mucago* siue mucillago Græcis χυλος, id est, succus, seu mucago, ac lentor quidam: sicuti mucus, ac mucago sit in fufis quibusdam seminibus in liquore calfacto sole vel igne cuiusmodi semen psilij, cytoniorum, scenigreci, lini, althææ, ex quibus iugem facere expressionem, contra falsam Arabum opinionem, ac dubita.

*Mulus*, ἡ τρεψιδά, à colore muleorum calceorum apud Latinos dictus est. Scholiastes vult esse Rogetum piscem Parthisinis vulgariter dictum: Barbatulum verò à Cicerone appellatum, nobilitatūque in deliciis. Adhuc apud Græcos retinet nomen Trigla: Liguribus corruptè Triga. Huius caro firmissima, cãdidissimaque est, friabilis, copiosissimèque alit: & inter pisces mediocritatem tenere scribit Celsus.

*Mumia*, nomen & res sunt barbara, mortuorum scilicet sepulchris conseruatum diu cadaverum liquamen, aloë, myrrha, balzamo, & thure. Aliquibus autem Mumia est pissasphaltum, conflatum pice & bitumine Iudaico, quod hæc redoleat scribit Dioscorides li. j. cap. lxxxiiij.

*Murena* μωραῖνα, alia colore subnigro, luteis maculis distincto: alia albo, nigris maculis vario, oris rictu: non aliter quàm anseres, largissimo: foraminibusque his caret, quibus Lampræta est prædita: nullasque habet branchias, neque pinnas. Dentibus malefica est, atque carniuora: cuius caro non dissimilis est Lamprætæ carni, aut anguillæ. hæc Scholiastes.

*Murena* fluuiatilis omnino lampræta nostras est, cuius carnes non minùs alunt nuttiuntvè, quàm anguillarum & Congrorum: verum ob duriciem quandam innatam, & humorem tenacem viscidumque ægrè satis conficiuntur.

*Murex* in plantis αωθα τριβωλιδης, interprete Gesnero, paucioribus, quàm

Echinus aculeis scruit, Carduis muricata sunt cacumina, & multa spinaceorum genera mucicatis minantur verticibus.

*Muscus* marinus *Ερύνιον θαλασσίον*: Græci isto seculo, ut Gesnasserit, *σχολιότονον*, peculia sua lingua vocant: in myropolarum officinis Corallina est, quia ut corallus in aqua nascitur, & eodem cum corallis loco, unde forsitan aliqui falsi, & folia corallorum esse rati, nomen hoc indiderunt. Diosc. li. i. cap. xciii.

*Muscus* *Ερύνιον*, à quibusdam splachnum *σπλαχνόν* appellatur. in cedro arbore, populo alba, & quercu inuenitur. In dist. Bryon cætera reperies. Diosc. li. i. cap. xx.

*Mustelle* vulgaris, est quæ in domibus nostris versatur, oberâtque: atque ut feles hæc mures non solum venatur, sed cum galinis earum etiam oua. Ipsius sterces postquam aridum factum est, moschum vehementer redolet, adeo ut mulierculæ pro suffitu in vestimetis sæpius utantur. Præter hæc Diosc. li. ij. cap. xxij. docet vires mirificas.

*Myda*, midæ *οἱ ἐν χυμῶσι σκώλπες*, vermes in fabis dicuntur, quia in fabis ipsis nascuntur.

*Myle*, & epigonatis, seu parella, & rotula, os in genu est orbis latioris minimæque globati rotunditatem repræsentans.

*Myle* *μύλη*, καὶ *μύλη* herba, cuius radix exiguo bulbo non est dissimilis: soluta cogit, uterum apertum & dehiscens claudit. Hæc, inquit Gesnerus, Galeni sunt verba Dioscoridem testem citantis, apud quem tamen nihil de Myle, sed eadem omnia de Moly herba reperiuntur.

*Myosotis* *μυδοῦντις*, καὶ ἡ *μυδοῦσα*, muris auricula est herba: ea existimatur quam vulgares betam agrestem nominant, floribus cæruleis: diuersam à pirola tamen. Differt à Anagallide, sicut scriptum reliquit Diosc. li. ij. cap. clxxv. & li. iij. cap. lxxiii. lxxv.

*Myosotum* *ἀκοντίου μύσχοτον*, aconiri genus pessimum est, murium nempe, atque animantium cæterorum perniciis: Lupinariam, & patâ lupinâ vulgus appellat.

*Myrapidia* *μύραπιδία*, pyra odorata dicuntur, nimirum quæ vulgò moschata habentur: quibusdam Chiottica præcocia sunt, & fere omnium prima, unde præcocia dicta. Cæterum myrapidiorum appellatio Græca indicat odorata simul, exiguaque pyra. Hæc Gesnerus.

*Myrmecia* *μύρμηκας*, verrucæ sunt in palmis mannû, & plantis pedum: nonnunquam & in facie nascentes: ita verò appellatæ, quod in morem formicæ pungant. Sed harum species describuntur à C. Celso lib. v. cap. vltimo.

*Myrica* *μυρίκη*, tamarix, & tamariscus, arbor vulgò cognita, cum apud pigras & stagnantes aquas enascatur, fructum quasi florem serens compage muscoli. Dioscorides lib. i. cap. xcix. Est præterea myrica sylvestris, siue brya, vulgò brnyeria sterilis, quæ esse humilis eryca videtur: nam altera quoniam fruticosa arborefcit: cuius flore apes reptobum mel efficiunt.

*Myrobalanus* *μύροβαλάνος*, quasi nux vnguentaria dicatur: Arabes Ben vocant: (nam behen eorum lingua herbæ ignotæ nobis radix est) eius glans myrobalanum genere neutro effertur. Myrobalana alia addiderunt Arabes, de quibus nulla veteribus Græcis mentio est: in quinque fastigia discreta: quorû hæc sunt nomina: Myrobalana lutea, quæ & flaua *ξανθά*: Inda seu damafonia *δαμαζώνια*: Cepulea siue Cebula *κεπούλα*: Empelitica vel Embeleza *ἐμπελιτικά*: Beletzica siue Bellefica *βελεζικά*. Fructus sunt nobiles, qui ad nos ex Aegypto, Syriâque deportantur, callo corporis cõpactili, osse intus ligoso: & sicut diuersitate distinguitur, ita quoque differunt viribus. Flaua enim eò quod herbaceo colore flauescant, dicta, sunt spissa, ponderosa, exili nucleo, cute crassa: peculiariter superuacuum capitis humorẽ educunt, & corporis estus refrigerant, bilem etiam flauam purgant. Inda seu nigra, solida & sine nucleis, sunt oliuæ formæ: tristitiâ discutiunt, quartanas sanant, lepras purgant, colorẽque corporis restituunt. Cepulæ cæteris ampliora, grauiorâque, ex fusco rubescētia, carnosæ: aciem oculorû illustrant, pectus repurgant, sicim sedant, coctiones iunant, quæ inter cutem, & longis febribus auxiliantur. Empelitica seu emblica cute osibus hæretela pillorû pene figura,

ra, colore in cinereū languente, angustiora quàm Beletzica, pituitam trahūt, mentis aciem exacuunt, ventriculū purgant, sitim sedant, comprimunt vomitus. Beletzica maiora Empeleticis, rotunda instar pyri existunt: atque iisdem pollent facultatibus, purulentis medentur excretionibus, & venis sedis sanguinem profundentibus in myreporum officinis Bellirica vocantur.

*Myrsitica* nux *μυρεϊκόν καρύον*, recentioribus Moschata nux interpretata est: myrepicam aliqui esse volunt. sed de ea paulò supra in dict. Moscharium quæ visa sunt veta, scripsimus.

*Myracanthos* *μυρακάνθος*, carduus qui inter aculeatos numeratur: peritioribus medicis Eringium, & ut Plinio placet, Centum-capita, videtur. Repetes dictionem Eringium.

*Myosotonas* *μυοκτόνος, καὶ μυοφόρος* ex herba aconitū est, quod ex longinquo mures, cæteròsque animantes, vt ante diximus, interficit. Huius herbe meminit Plinius lib. xxvij, cap. iij. & lib. xj, cap. ix.

*Myriophyllum* *μυριόφυλλον*, Romanis millefolium: quæ herba Diofco. Achillea appellata videtur: sed ignoratur vt conicit Scholiastes, quibusdam tamen placet Anethum sylvestre esse, aliis Cuminum pariter sylvestre.

*Myrrhis* *μύρρις* Diofco. à Manardo Cherefolium interpretatur. Plinius facit speciem Geranii: aliis placet pedem colimbinum, & veneris pectinem aliis nonnullis item aliis quam Cicutariam faciunt: atque tum hanc ipsam vulgus Persillum asininū vocat. Myrrhis similima est cicuta, caulæ foliisque radix ei lōga, mollis, rotunda, cibo non insuavis, quæ ad multa, variæque remedia ex Diofco. poller. lib. iij, cap. cj.

*Myagrum* *μυαγρόν*, vulgarem Chamælinam Scholiastes esse scribit, aliqui prætereā *μέλαμπερον* dicunt. herba est succulacea, foliis rōbuz, pallidis, tripedanea. semen oleosum, sænogræco simile, quod confusum igni torrent, perunctisque virgis ligneis ad lucernarum lumina rusticolæ vtuntur. Diofco. lib. iij, cap. cij.

*Myrrha* Bæotica, dissecta radix est arboris cuiusdam in Bæotia nascētis. melior est quæ myrrham odore repræsentat. vis ei calfactoria inest, emollit, discutitque, & suffitu apta.

*Myrrha* stacte, id est, stillata ex myrrha recente, pingui, & solo lactiore nata, eadem præstat, quæ myrrha, sed imbecillius: cuius sex Stryax rubra dicitur.

*Myrrha*, arboris Arabicæ lachryma est: variatur Aëtuario in rubram & fluorescentem: omnibus à nescitur Troglodytica, viridis, pellucida, mordax: nigra mala est: media Bdellij modo tenuis, a pricis nascens. Improbatur Diofcoridi Myrrha nomine Aminea: Galeno autem eligitur Troglodytis. Myrrhæ igitur officinarum omnino adulteratæ parum tutus est vsus in medicamentis. Diofco. lib. i, cap. lxvij. hæc de Myrrha scribens ait: lachryma est arboris, quæ in Arabia gignitur, Aegyptiæ spinæ non dissimilis, & cuius vulnere desinit lachryma in subiectas tegetes, alia circum candiem concrefcit: Omnium prima, est quæ Troglodytica appellatur, splendens, subviridis, ac mordens, est alia Bdellij modo mollis, odore grauifcula, a pricis nascens, omnium deterrima, quæ nigra, aut fusca apparet.

*Myrtus* nemoralis *δρυοκάρυς*, arbor aculeata, & proceræ, foliis perpetuò virentibus, & inciduis. rudioribus Egrestus nominatur. Differt à louisflamma arbore, vt exi stimat Ruellius, soliotum tantum aculeo, frequentissima vtræque in Allobrogum iugis. hyeme fructum profert inter folia rubrum, copiosum, durum, & astringens. Est denique Myrtus sylvestris, nomine aliqui Ruscus: qui aliquibus Oxymyrcine est, & Myrtacantha appellatur. folium stuticis myrti odorati fert, latius, in formam lanceæ mucronatum. Bacce per maturitatem rubescunt foliis appensæ, osseo intus nucleo. in asperis & præcipitibus nascitur locis: cuius radices vsus ad varia & multa medicamina. Diofco. lib. iij, cap. cxxix.

*Myrtus* satina humilis frutex est, nigra scilicet, & alba: vtræque in coronis mulierculæ præfertim hyeme dum magis viret, vtuntur. Myrtus satina vtilior est nigra medicinz quàm candida, & in hoc genere magis montana. semen tamen imbecil-

lius parit. Vis myrti & seminis astringit, utrumque siue aridum, siue fuerit viride, tum oleum compositum, vnguentum, & sirupus, Diosc. li i. cap. cxxviii. Plin. lib. xvi. cap. xix. Gal. Simpl. lib. vii.

*Myrtidantum* Dioscoridi lib. i. cap. cxxviii. appellatur virgultum myrto agnoscens, nodosum, inæquale, verrucosum, concolor, quod perinde quasi mannis myrti caudicem amplectitur. Nonnullis dicitur soboles adnata myrto, aliis significat filia quæ inoluuit myrtum. Gal. Sobolem myrti: Plinius ex myrti baccis factum vinum, Myrdanum vocat.

*Myxa* *μύξα*, propriè pituitæ destillantis è naribus est excrementum, mucor & mucus alioqui dictus: vt seminū radicum viscositas mucago Latinis medicis vocatur.

*Myxa* siue myxa, & myxaria Aëtuario, tum Græcis etiam aliis quibusdam recentioribus, *ἀπὸ τῆς μύξης*, id est, à mucro lento è naribus fluente: cùm simili hi fructus abundant, bilem detrudere, & sitim sedare dicuntur. Sebastrum sunt, & officinis corruptè Sebesten. nam & hoc nomine Sebastrum olim in Augusti honorem *μύξα* appellabantur. Nusquam apud Diosc. Myxa pro Sebastris reperire cõgite, nisi in genere prunorum contineri videatur: est enim pruni simile: nisi a pud posteriores Græcos auctores, pro quibus sunt gratiæ Arabibus reddendæ.

*Mytuli* *μύτες*, ex duabus conchis nigrescentibus inuoluti pisciculi, Celso musculi vocati: & vulgari incolarum lingua Moles vsquehuc nomen retinuerunt: quorum aluus iussulo concitatur. Athenæus ex Diphilo Mytulos omnium optimos, & saluberrimos esse scriptum monumentis reliquit.

*Moscu* Aetio, AEGynetz & Aëtuario cum Arabibus, animalis Gazellæ appellati, Dorcadi similis, pus est in umbilico maturum certo tempore effusum: Græcis, & Latinis veteribus incognitum. Cætera in dict. Cibeta sunt petenda.

*Musculus*, est corpus ex carne & neruo cõpositum, ad motum & inclinationem partium corporis necessariò inferuiens. Vide Gal. in li. de Muscul. motu.

*Musculus* *μύς*, ex conchularum genere pisciculus depræhenditur, qui & Mytulus dicitur: vt paulò ante relatum à nobis est. Est præterea Musculus, alio nomine Sores, à Mure animante grandiore deriuatum nomen. Prodest torrefactus, & esus diabeteticæ passioni, id est, his qui retinere vrinam non possunt.

*Mustum*, est liquor recens maturimi racemi in vinum facta nondum ebullitione, conuersus: qui & succus quod ex fructu exeat, appellari ex Aëtuario etiam potest. Sapa verò ex eo fit ad partem etiam decocto, vinum quoque coctum appellatur.

*Mundus* omnis, qui ex elementis quatuor parte corruptibili est, & cælis vnde cüm parte incorruptibili, secundum substantiam continetur. Sciendum itaque mundum vniuersum totū esse, ac omnes eius principales partes numero quindecim, vbi superius corpus perpetuò circundat inferius omni ex parte: sicut tunica superiores in oculis circundant inferiores. Est autem corpus infimum terra, quæ grauitate sua pressa, ad contrum immota recumbit. Deinde alia hoc ordine ascendendo, aqua,

aër, ignis, sphaera Lunæ, Mercurij, Veneris, Solis, Martis, Iouis, Saturni, cælum stellatum, in quo sunt omnes stellæ, exceptis septem Planetis: po-

sum cælum, quod stellis omnibus caret: decimum quod &

primum mobile, & ipsum absque stellis est: vnde ci-

um, quod cælum Empyræum à Theolo-

gis nominatur. Cætera habentur

in dictione Sphaera.

*Deh*



## De litera N.



*Narcosica* medicamenta, sunt quæ temperiem fortiuntur, vel aduer-  
sam, iis quæ reuera sunt a nodina: refrigerant siquidem omnia cor-  
pus, & sensum eousque stupefaciunt, vt si paulò liberalius ebi-  
bantur, mortem: aut parti corporis admoveantur, stuporem afferant.  
Author Galenus κατὰ τὸ πρός lib. vii. cap. quinto.

*Nardum νάρδος*, Theophrasto aromaticum est: neque vllam plan-  
tam esse suspicatur Gesnerus, quàm Nardim, hoc est, nardum montanum, copiosam  
in Segufiæ Belliciorum iugis.

*Nardus ὁ ὑπεραρωματιστος*, corporis insigne est, seu genitiua pro genuina macula:  
quæ sæpenumero in hominum mulierumque facie non inueniuntur: depræhēduntur:  
veneri quoque esse dicatas quæ narduo in facie signantur mulieres. atque sententiæ  
huius testis est Plinius li. xxi. cap. xxv.

*Napus βοῦνις*: Herbarij duo genera faciunt, vnum vocātes Binium, intus ex can-  
dido flauum, cuius quoque cortex niger inuenitur, atque eius subinde decoctum pur-  
gationibus vecicæ, & vrinæ vtile est. Alterū genus Bunias est, raphano & rapæ simi-  
le, cortice subfuluo extra, & intus subpalescente colore: cuius semen contra venena  
præstantissimum legitur, sed radix elixa inflat, minusque, quàm rapa nutrit. Diosco.  
lib. ij. cap. ciij.

*Naphtha νάφθα*, bitumen est quod ex Babylone collectum ad nos vehitur. Eius  
tanta est cum igne affinitas, vt flamma transfiliat in eam vndeunque visam. Ex hoc  
conficitur ignis, qui vix estingui, nisi aut oleo, aut vino, & aceto potest. Diosco. li. j. cap.  
lxxxv. Plin. li. ii. cap. cv.

*Narium* profluuium ἀνωμαλία, simpliciter & sine adiectione alicuius partis  
posita, sanguinis ex naribus profluuium significat: aliis enim semper cum partium  
vnde sanguis promanat, appellationibus coheret.

*Nasus*, eminentior faciei pars est, cuius quidem partes vtrinque sitæ, quibus aë-  
rem reddunt & accipiuntur animantia, μυκτῆρες, ἢ μυζοτῆρες nares appellantur. Ex-  
teriores partes quæ mouentur, pinnulæ siue alæ πτερυγία nominantur: pars autem  
interna cartilaginosa quæ nares discriminat, interseptū est. Cæterum nasi ossa duo  
sunt, quæ futuris à medio superfilliorum descendentibus discernuntur. Galenus lib.  
de Ossibus, cap. iij.

*Nasalia* seu caput purgia sternutamenta ὀσπύρα, sunt quæ vel in oblongam ac  
pyramidis formam coacta, vel liquida, vel sicca, naribus aut induntur, aut infun-  
duntur, aut insufflantur. Errhinorum vsus est in diuturnis capitis affectibus, morbo  
cunctiali, oculorum hebetudini, narium obstructioni, conuulsioni, & morbo regio.  
De quibus autem componuntur ex Gal. in lib. κατὰ τὸ πρός, & ex Fuchio lib. ij.  
Compos. medic. cap. xxv. scies.

*Narcaphothum νάρκαφθον* idem nascaphtho Diosco. li. j. cap. xxij. cuius cortex, Ma-  
nardo teste, odoratus est, eius vsus in suffumentis pergratus. Tignamen pro Thymia-  
ma corrupta voce dictum, verum Nasca phrhum esse Manardus existimat. Meminit  
Ægypti in lib. Simpl. sub nomine Cipheos Niliaci.

*Narcissus νάρκισσος* à sopore & torpore, quod eius odor si diutius naso admovea-  
tur, mentis torporem inferat, dictus. Est autem dodrantali altitudine, folio porraceo,  
caule herbaceo, flore albo vt plurimum, calicemque veluti purpureum habet, & radi-  
cem bulbosam. Narcissi genera duo facit Plin. sed huic florem nigrum tribuit Theo-  
phrastus. Diosco. lib. iij. cap. cxlij.

*Nardus νάρδος*, spica nardi officinis est: nam Lauandula, & aspicum pseudo-nar-  
dus creditur, quæ quidem nardus Celtica vera est, & antiquis authoribus celebrata:  
quæ tota etiam Gallia nunc suo odore spirat. Est insuper Nardus montana νάρδος

*ῥ'πειν, ῥ'πις*, id est, neris thylacitis, & pyritisea est multiplex, præstantissima Indica: secundo loco Gallica, post Cretica, & quæ apud nos montana ex Cilicia, & nardina herba potius, quàm nardus, vocatur. Diosco. lib. primo, cap. vij. sic scribit: Celticum nardum nascitur in Liguriæ alpidibus, Salinuca partio nomine appellatum: quo etiam vocabulo Largus vsus est: exiguè fruticat, folia habet oblonga, colore inflauum lauguido, florem luteum, in quo odoris suauitas. huic responderet hirculus herba odore nisi grauis esset. Montanum nardum surculo & foliis est Eryngio similibus, minoribus, minimè tamen spinosis asperisque, radicibus binis nectitur, aut pluribus, nigris, odoratis. neque caulē, neque fructum profert.

*Ναρθήκη* *ναρθήκη*, & nartheca, serula rectè assurgens: sed narthecia semper est humilis, hi fructes trans mare locis solatis, & austro affectis, nascuntur narthex autem arbuscula est lignum foris corticis loco habens, iatus verò ligni loco fungosam medullam. Pl. li. xij. cap. xxij.

*Νατρίξ* *νατρίξ*, suo qui veneno in aquis versantes nando inficit: de quo sic Lucas, & natrix violator a quæ, &c. Diosco. li. vj. cap. xxxvij. de natrice hæc refert: Ab natrice demorsus vlcus dilatur, & liuidum, ac ingēs euadit. sanies ex eo multa & atra, & malè olens, non secus atque iis quæ serpunt vlcēribus, expuitur. Serpentis huius curationem apud eundem Diosco. habes libri supra citati paulò infra. Est item natrix herba, cuius radix a uulsa virus hirci redolet: de qua Plin. lib. xxvij. cap. xij.

*Ναστurtium* *καρδωμύς* hortense & erraticum est, utrūque ex semine medicamentis vtilissimum: sed hortense Alennicum appellatur. Est & alterū nasturtium album nominatum, quod Tlaspi putatur. Nasturtiū Varrone auctore, & Plin. à torquēdis naribus dictum *καρδωμύς* autem *ἀπὸ τῆς καρδίας*, quòd multū valēt in syncope cardiaca, vel quasi *καρδωμύς*, quòd vi sua & acrimonia caput tenter, est author Scholias tes. Est & aquaticum nasturtium Cardamine appellatum, quod sapore sit cardamo simili: quibusdam Sion Græcorum, Lauer Latinorum, videtur. Diosco. li. ij. cap. xlvij.

*Νатура* *φύσις*, finitore Aristotele, est substantiale principium, quod vnicuique trāsmutationi subiectū esse natum est, aut trāsmutationis effectiuum. Aliter: Natura, est simplicium omnium, & cōpositorum formatrix, & calefcentis spiritus essentiz diuinæ ancillatrix. Atque aliter Galeno lib. iij. Temperamentorum: Natura, est quæ vniuersam substantiam ac temperiem, quæ ex primis conflat elementis, significat.

*Naturæ* rerum primus ordo est, ex quibus corpus humanum compactum & constitutum est: & quæ corpus nostrum constituunt res naturales vocantur, quod scilicet ad humani corporis perfectionem atque naturam concurrerent. Secundus ordo eorum rerum est quibus corpus humanum fouetur, vt sanum permaneat. Tertius earum rerum est quæ corpus humanum lædunt, atque corrumpunt, & hæ præter naturam nuncupantur, & superiores dicuntur non naturales: quòd nimirum humani corporis naturæ ex diametro pugnent. Gale. lib. ij. Meth. vocat affectus præter naturam, quod scilicet corpus nostrum præter naturam afficiant. Quæ autem sit natura secundum Ethnicos, & sacros Theologos, Plato, Aristot. Laërtius, & August. contra Manicheos sunt legendi.

*Natura* asciticia, est quæ si in melius seu in deterius, citra actionum offensionem, mutata est, asciticia appellatur. Quod si tantus ab æqualitate mutationis sit recessus, vt corporis functiones lædantur, eam neque simpliciter naturam, neque aduentitiam, sed morbum dicemus. Acakia super Gal. ad Glauconem libro primo, capite primo.

*Naturalis* facultas, est quæ ex iecinore per venas omnibus corporis partibus alimoniam præbet. alio nomine concupiscibilis, seu appetitrix, & alitrix, & *τρεπτική*, καὶ ἐπιθυμητική, vocatur: ea quadruplex est, attractrix, concoctrix seu alteratrix, & expultrix.

*Naturalis* spiritus in iecinore & venis, est modò aliquis sit spiritus naturalis. neque enim necessarius est spiritus naturalis, qui nutriendi vim ad partes corporis deferat, non secus quàm Magneti lapidi vis trahendi ferrum, sit cognita, & nutrimentum absque spiritus naturalis influxu suppetat. Accedit quòd iecori etiam desit materia,

tetia, ex qua naturalis spiritus generari possit. Gal. locorum affectuum lib. j. cap. vlt. & lib. xij. Meth. medendi.

*Naturalis actio*, seu voluntatis expert, ex vena & arteria procedit: & est quæ nō pēdet à consilio, aut electio & arbitrio, sed sponte & naturaliter fit, vt motus cordis & arteriarum, quem pulsus nominant: hunc enim neque sedare, neque excitare, neque tardiores, neque crebriores, neque rariorem efficere licebit. Ea tamen actio quæ ab arteria fit ζώοτης, id est, vitalem peculiari nomine lib. j. de Difficult. spirandi. Gale. appellat. Inter actiones naturæ connumeratur generatio, actio, nutritio, formatio, alteratio, appetentia, attractio, concoctio, retentio, distributio, excretio, & similes quæ per seriem explanabuntur.

*Naturales facultates primæ*, ac principes, sunt generatrix, auctrix, & nutritrix: quæ potentiz vegetatrices ab Aristotele de Anima lib. ij. cap. iij. dicuntur. Gal. lib. j. de Facult. Natur.

*Naturalium actionum noxx*, sunt appetentia, concoctio, digestio, pulsatio, attractio, alteratio, retentio, expulsio abolita, imbecilla vel deprauata. Quare dicit. Affectus corporis.

*Naturæ actiones siue functiones*, sunt quæ ab origine, & ab æditis esse imaginantur: ab origine impregnatio, conceptio opus naturæ, in quo vtriusq; semen viri & mulieris concurrat: à conformatione, vbi clausus ex arte est uterus, compinguntur quædam velut lineamenta rudia ab vtriusque semine: quæ postquam illa formata satis sunt, confirmatio dicitur, opus quoque naturæ. Quare dictionem AÆditis.

*Natex* ἡ κριπτή, coelea marina magnitudine exigua, turbinati generis, leui testa, ampla, & rotunda: vulgo à loci incolis Limax nominata. Et hæc est mensis delicatioribus frequenter petita, quòd alimenti, succique boni sit.

*Nuci* τῆς περὶ ἡμᾶς, putamen nucis, siue oleæ nucleus seu etiā membranula quæ in nucis iuglandis est medio: & macis myrsicorum appellatione, in moschata nuce.

*Nausea vatriæ*, est irritus ad vomitiones præter voluntatē agitata conatus: siue stomachi ad vomitū ex graui odore perturbatio, & concitatio: ex cuius quoq; frequēti & inordinato motu, subuertitur stomachus, & ad vomitum cōcitatur: cui succedit molestia, & fastidiū pleriq; etiā grauissimū. Plin. lib. xx. cap. xiiij. Gal. Nat. facult. li. iij.

*Nervi* νῆρες, prima sunt in corpore animalis sensus motusq; instrumenta, à cerebro & spinali medulla orta, totius corporis mēbris mouēdi sentiēdiq; vim cōferētia.

*Nervorum* ex cerebro natorum septem sunt paria: horum primi duo netui ad oculos pertinent, videndi facultatem illis impartientes, vnde optici, hoc est, visorij illis nomen. Nervorum omnium caui, ac mollissimi hi existunt, & in vnum cōeunt, & rursus ante quàm oculos ingrediantur, dirimuntur, & eorum figuræ χ litteræ Græcæ similis est. Gal. de Oculis Theor. ij. cap. ij. & iij.

*Nervorum* quidam à cerebro & spinali medulla prodeunt: atque hi proptij: quidam ex musculis, vt tendines quidam ex ossibus, vt ligamēta. Qui ex cerebro & meningibus sunt profeeti, sicciore, & paulò minùs calidiores venis ipsis, & arterijs magis sensu præditi: qui orti ex ossibus, colligunt & continent artuum & membrorū, iuncturas, ac complexus. De quibus rebus Gale. videndus in lib. de Ossibus, cap. j. & in lib. de Oculis Theoremate ij. cap. j.

*Nepa* ὁ σκορπιός, ex Theophrasto aconitum primum est: nostro sanè seculo producitur herba quædam nomine Nepa, quæ alioqui Tora plenisque herbarijs suspicatur. Quare dicit. Scorpius.

*Nepeta*, vel nepita καλαμίνθη, quam quidam medicorum non indocti Galeni Mentham suspicari sunt. Diosc. lib. iij. cap. xxiiij. hoc pacto Calaminthas discriminat: Ex Calaminthæ generibus quædam montibus familiaris, folia ocimi habēs, incaua, surculos aridos, caules angulosos, & purpureum florem: altera pulegio propè similis, sed maior, quam syluestre pulegium ideo appellarunt, quòd odore ipsum æmuletur: Nepetam Latini vocant: tertia Menthastrum cognata est, folijs oblongioribus, caule & ramis maioribus quàm superioris, sed viribus inefficacior. &c. Quare dicit. Calamintha.



*Neposes* αἱ παρὰ τὰς ῥίζας, καὶ ἡ παλαιὴ οὐ ἐκφυσις, id est, germina lateralìa ex Gaza interpretante Gesnero, dicuntur: qui ab radice arborum scætura præpingui profiliunt, appellari sentinaleoli. Quare dicit. Malleolus.

*Nerion* νήριον, frutex qui & rhododendron, hoc est, rossago, interpretatur: Officinae autem Oleandrum appellantur, de qua planta meminit Plin. lib. xiiij. cap. xj. Dioscor. lib. iij. cap. lxx. Nerion frutex est longioribus quàm amygdala foliis, asperiotibúsque, flore in rosam conformato, fructu nuci græcæ simili, corniculato, qui patefactus quâdam sanosam naturam ostendit, spinarum pappos, representantem: radice lōga, acuta liguosa, gustanti salsa, nascitur in amœnis, maritimis, & secus amnes. Rura Rosaginé vocant: tota gustantibus ipsam damnosa est. Ruel. li. i. cap. cxxiiiij.

*Neris* ἡ πῖς, νάρδος ἀρενή, mōtana nardus est: de qua dictum supra abundè satis in dicit. Nardus.

*Neuras* νευράς, nomine alio Poterion herba dicta est: de qua non pauca retulit Plin. li. xxv. cap. x. Sub nomine Poterion Dioscor. li. iij. cap. xv. sic describit: Poterjō lones Neurada vocant, largè fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridum, lanugine spissâ, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, tragacanthæ proximis, foliis parvis, rotundis: flore exiguo, candidi coloris, semine gustu acuto & odorato. Nasctur in aquis & mollibus. &c. Cætera in dict. Poterium.

*Nicolaos* νικολάοι, maximas pulcherrimâsque palmas, siue palmulas, hoc est, dactylos grâdes officinis in Nicolai Peripatetici philosophi honorem, què amore singulari prosequeretur, ab Augusto Octavio imperatore, appellatas. hæc Gesnerus.

*Nigella* μελάθυον: & Nigella foliosa ἀνθεὸν φύλλον, interpretè Gaza: qui ἀνθεὸν pro μελάθυον, in Theophrasto legit. Gith. & Melanthium Dioscor. lib. iij. cap. lxxv. Nigella appellata est. Quare dicit. Melanthium.

*Nexus* seu præclusio ἀνέως καὶ φαιώσις, vitium illud, quando glans ita contracta est, ut nudari non possit. Est & clausura muliebrium locorum, quod fit in illorum ostio ex præcedente vlcératione, aut durata illic inflammatione: huic cōtrarium malum ἀνερρημῖσις, aut rectius ἀνερρημῖσις, in quo propter cutem breuem, aut retro abactam, glans tegi non potest. Celsus lib. vij. cap. xxv.

*Nigra* vrina, est quæ extincti lignorū carbonis calore obtinet: sed quæ liuida vrina est, cinerū, vel plūbi colorem refert: atque hæc medicorū quidā luridā appellantur. Huius interdū caloris ad extremū profecti indicium est, & hoc quidē si viridis præcesserit. Interdum etiā extremam frigiditatem significat, idque vbi veneta, aut liuida antecesserit, utraque enim mortalis existit, neque vnquam salutaris, nisi cūm passiones quæ originem ab atra bile traxerunt, processerint.

*Nitrum*, aliud minerale, aliud artificiale. optimū laminosum est, fragile, & in fracturis lucidum, leue, spongiosum, ex rubro & purpureo albū, salum, mordax. Artificiale imbecillius naturali, & nieri spuma dicitur, alba, levis, salsa, mordax. Est præterea alterū artificiale sios parietis, vel sal-petræ appellatū, nitro valentius: nitrum & nieri spuma vires salī similes habent: vera autem nitra spuma naturalis est Dioscor. libro v. cap. lxxviij. & Gal. lib. ix. Simpl. medicam.

*Nephritis* νεφρίτις, quodvis serè renum vitium est, ut nephritici sint qui ex renibus quoquo modo laborāt: calculo vexatis hoc tamen propriū est nomē. Quinetiā renū calculis ptouecti homines frequētius, quam pueri apprehenduntur: generatur autē assiduus cruditatibus, unde humoris crasis & terrei multitudo congregatur, & ardor igneus circa renes humores adassans, eos cogit, in lapides indurat, ad modum totorum qui in aquis reperiuntur. Lege Gal. librum de Renium curatione.

*Nodi*, aut calli siue callosæ concretiones κόρυλλοί, sunt qui in digitis manuum, & articulorum pedum euenientes, dicuntur. Itaque ad tumores pituitæ pertinent nōnulli tumores sub apostematis nomine à Græcis compræhēsi, quos vulgus nodos vocat: quorum iuxta diuersas materias in eis contentas, diuersæ sunt species. Si enim veluti adeps sit, quod continetur γασθρίκινα à Græcis, Latinis a dipinus nodus nominatur. Si veluti mel, μελάει πῖς ab eis, à nostratis nielleus: nodus: si veluti puls, ἀθρημῖα ab illis dicitur. Manar. lib. vij. Episto. ij.

*Noma* *νομή*, vlcus est purulentum, putredini quoque proximum, quod ad sanas membri partes pascendo, serpit: cuius species est *φάρμακον*, vlcus comedens carnē subiectā, & circumstātem corrūpens, factum à materia quæ est media inter materiā quæ facit herpeta, quæ tenuissima est, & eam quæ facit cancrum, quæ crassima est.

*Nucamenta* *κνύτρεα*, καὶ κνύτρεα, Græcis nominantur, quæ callo squamaticum compactili pendunt è ramis nucem, roborum, corylorum, picearum, & cæterarum iuglandum: quod in nucibus apertissimè nunc primum nascentibus propendere cernuntur. vulgaris nucis nucamentum medicinæ aptum est.

*Nucleus* *κνύτρεα*, quod tenetum in nuce includitur, sed præter, quàm in fructibus, in aliis rebus etiam *χορδός* appellatur. Dicuntur etiam in alij capite bulbi coherentes ex Largo spicæ, & nuclei, Græcis *κνύτρεα*, καὶ *κνύτρεα*. Dicitur præterea nucleus de testa & fetto interior materia quæ probior est, ac resistens hæc Gesnerus.

*Nucleus* pineus *κνύτρεα* *κνύτρεα* *κνύτρεα* *κνύτρεα*, id est, ex Hippocrate, è nuce pinea nucleus, vel strobilus qui emittitur: de qua re sic Martialis.

*Poma sumus Sybeles procul hinc discede Viator,*

*Nec cadas in tenerum nostra ruina caput.*

*Nux* *καρπὸν ἀροσπύρον*, pro omni fructu qui cortice habet lignosum, sumitur: ut nux basilica *καρπὸν βαστανίδης*, id est, iuglans Persica: nux auellana *καρπὸν ἀντιόχου*, *ἀντιόχου* *καρπὸν*, pontica nux tum arbor, tum fructus dicuntur. Nucis ponticæ in pondere medicamentorum pro siliquis octodecim accipi solet: sicut nucis iuglantis magnitudo, est siliquarum duarum & septuaginta: vel denarium septem pondus. Nux quoque amygdala *ἀμυγδαλή* quæ & Græca, & Thasia.

*Nux* Indica *καρπὸν Ἰνδικόν* Arabum inuentum est: quoniam Græcis incognita videtur. Ex India parte orientali Venetias: deinde Londunum aduehitur: cuius oleū bonitate butyro respondere experitur.

*Nux* mollusca, ex Macrobio, persicum est, quæ cæteris omnibus mollior sit. Quibusdam placet nucem molliscam, inter iuglandes adnumerandā, quæ mollior sit, & putamen eius de se fiseat, aperiaturvè, ut in persicis nueis manifestè apprehenditur.

*Nux* vomica, persicis auctoribus Græcis nusquam visa, sed solis tantum Arabibus in usum tradita est: cui similem nucem alteram nomine Methel iidem tradunt: prior nobis cognita: hæc nondum nostro orbi visa est.

*Nux* Tarentina è iuglandum genere, nuda cortice, vel molli, ac putamine fragili prodit. Qualiter autem sit facienda, docuit Columella. Aliqui pinæ nucis genus putamine digitis fragili esse volunt. hæc Gesnerus.

*Nux* moschata *μύσχαρον*, *μύσχαρον*, καὶ *καρπὸν ἀρωματικό*, à plerisque iam myrsipica nux dici cœpit: verum à Balano myrsipico longè discrepat. Quibusdam aliis nux moschata videtur Græcorum Chrysobalanus: sed parum scienter. Quære dict. Moscharium, & Chrysobalanus.

*Nux* pinea *κνύτρεα* *κνύτρεα*, cuius genera quatuor describuntur: Durum, quod & vulgare tenerum & putamine digitis fragili, ideo quæ auribus expositum, Tarentinā prisca vocabant: tertium è picea sativa, nucleorum cute verius, quàm putamine, adeo molli ut simul mandatur, sapineum Plinius vocat: quartum pitydas vocant è pinastris, singularis remedij aduersus tussim.

*Nuptiale* pomum *κνύτρεα*, idem citrio vel medio, id est, arancio, & limone. Tellurem enim nunciato Iouis & Iunonis connubio id ædificasse poëtæ fabulantur. Quære dict. Malum medicum.

*Nubecula* *νεφέλη*, eiusdem generis vlcus est cuius caligo, sed profundius & angustius colore candicans: atque huius duæ occurrunt species. si Auicennæ credimus, vtri quæ membranz oculi communes, tenuem ut nubeculam, & crassam quam albuginē. Quam distinctionem aliter Aegyneta hoc pacto facit: Oculi cicatricum, alia tenuis, in superficie apparens, quæ generale cicatricis nomen seruat, & à quibusdam dicitur nebula: alia profunda, quæ *νεφέλη* nuncupatur, Latinis medicis hodie vltarum vocabulum. Manardus lib. vij. Epist. ij.

*Nutritio*, est quæ comprehensionem & latitudinem habens, appositio corporibus efficitur: vel, est quæ per venas mittitur ab hepate, & quod familiare sibi est, partes corporis accipiunt: vt refatciant simile quod perdiderāt. quippe corporis partes semper immutari percipiuntur. Sed ex Gal. & Fuchſio nutritio aliud nihil est, quàm perfecta assimilatio, quæ tamen vt fiat, necessum est vt agglutinatio siue adhærentia præcedat: sicuti vt etiam illa fiat, appositio. Postquam enim succus is: qui omnem animalis particulam nutriturus est, à vasīs excidit, in totam eam primum dispergitur, mox adiungitur, deinde agglutinetur, demū assimilatur. Atque iam dictæ actiones primæ, ac veluti capita sunt. desiderant tamen tum ipsatum inter se, tum aliarum ministerium. Vide Fuch. Compendij medic. cap. xiii.

*Nyctegretion* νύκτεγρετον, herba coloris ignei, foliis spinæ, nec à terra se extollens, neque ea est, quam Chymistæ Lunariam maiorem quærunt: sed quam prouinciales malam herbam vocantes habent: ea nimirum ipsa calcata pedibus quouis etiam infuso, fame ad deliquium concutit, nisi confestim cum pane succurratur: atque mox discutitur. Hæc, vt Gesnerus scriptum reliquit, eruitur post æquinoctium vernum radicitus, siccaturque ad Lunam triginta diebus, ita lucens noctibus. Sub nomine Baāras Iosephus lib. vii. Belli Iudaici, cap. xxv. hanc describit: Quidam locus Baāras appellatur, vbi radix eodem nomine gignitur, quæ flammæ quidem assimilis est colore, circa vesperam verò veluti iubare fulgurans, accedentibus eamque euellere cupientibus facilis non est: sed tandiu refugit, nec prius manet, quàm si quis vrinam muliebrem, vel menstruum sanguinem super eam suderit, quinetiam tunc si quis eam tetigerit, mors certa est, nisi fortè illam ipsam radicem ferat de manu pendentem. Capitur autem alio quoque modo sine periculo, qui talis est: Totam enim circumsodiunt, ita vt minimum ex radice terra sit conditum, deinde ab ea religant canem illoque sequi cum à quo religatus est cupiente, radix quidem facile euellitur: canis verò continuo moritur, tanquam eius vice à quo herba tollenda erat, traditus. nullus enim postea accipientibus merus est. Tantis autem periculis propter vnam vim capi eam operæ pretium est. Nam quæ vocantur Dæmonia, pessimorum hominum spiritus, viuis immersa, eosque necantia quibus subuentum non fuerit: hæc radix citò, etiam si tantummodò admoueatur egrotantibus, abigit. Atque hæc Iosephus. Eandem nonnulli vocari censent νύκτελῦπα, quoniam è longinquo noctibus fulgeat.

*Nyctridem* νύκτεριδα commendauit Aëtius ad oculorum caligines, quam pro Anagallide, hoc est, morſum gallinæ, accipiendam, Gesneri sententia, reliquit: quoniam hæc eius appellatio inter plantas cæteras apud Diosc. legitur.

*Nymphæa* νύμφαι, ἢ ἐπιδέρις, ἢ κλητορίς, in extremo cornicis ore, vbi conſidua labra rimam relinquunt, tanquam propugnaculum quoddam, & munimentum regens, & refrigerari prohibens, hæc cornicula est subsultans & extrescens.

*Nymphæa* νύμφαι, quòd aquosa amat, dicta: vulgò nemphar: vna est flore lacteo, radice nigra, & semine nigro: altera, flore luteo, radice alba, vt ius-

que radix, & semen a lui profluuiis, & dysenterias cohibet: sperma

immodicè profluens siue per insomnia, siue aliter, retinetur ex

vino austero pota: in id efficacior lutea, vt medeatur mu-

liebri profluuiio: ad tergendas maculas, & loculos al-

ba præpoller: de cuius flore componitur Siru-

pus in febrium ardoribus compescendis,

præstantis. Diosc. lib. iij. cap. cxxvj.

Gale. lib. viij. Simpl. medic.

Ruellius libro iij.

cap. lxxvij.

## De litera O.



*Oblivio* λήθη, passio est phrenitidi contraria: siquidem in ea marcor, & inexpugnabilis penè dormiendi cupiditas, necessitasque. Sic dicta, quòd ea correptis omnium rerum obliuio accidit. causa eius est pituita, quia frigore nimio & humiditate cerebrum posterius imbut. Lethargicos comiratur febris lenta. putrescit enim humor pituitosus in hoc morbo cum profunda in somnum delatione, Gal. docente Mech. medendi lib. xij. Curationis auctor est Fuch. lib. j. cap. xij. de Medendis morb. præterea vide quæ restant in dict. Lethargus.

*Obolus*, dimidium scrupuli est, & si liquas tres capit: siue calchos octo cõtinet. Scrupuli tres drachmam complet: drachmæ octo, vnciam: libram verò medicinalem vnciæ duodecim perficiunt: nam quæ est sexdecim vnciarum libra, Attica est, & mercibus pendendis quæ conuenit.

*Ochra*, ex genere lapidum leuissima probatur, & omnino quæ lutea est, & friabilis, careatque calculis: cuiusmodi Attica. similes Cadmiae vites habet, nam adstringit, erodit, collectiones, & tubercula dissipat, exetescentiisque reprimat, caua vlcera explendo Diof. lib. v. cap. lviij.

*Ochros* ὀχρὸς, leguminis generis cicerculæ simillimum, folio longo, vermiculis obnoxio, ut cicercula secutis post imbres caloribus. Sunt etiam qui hoc genus phasiolum appellati volunt. Gaza modò cicercam, modò eruiam interpretatur. hæc Gesnerus.

*Ocimi* ὀκνυῖν, pabuli genus à celeritate nascendi dictum, est id quod in tritico & fegitibus succrescit, ac sæpius ipsas segetes suffocat: estque lenticula & vitia simul cõmissa, Vulgus Gallicum, *dragee aux cheuaux*, vocat. Varro de Re rustica lib. j. cap. xxxj.

*Ocimum*, vulgò Basilicum, sunt qui sic scribendum volunt, Ozymon: neque tamē vites variat: flagrantis odore herba est, ut sæpius olfacta cerebrum obtundat: quoniam iam est notitiæ vulgaris descriptionem nullam fecit Diofcorides, sed vires tantum tradidit lib. ij. cap. cx xxv. Semen cardiacum est.

*Ocimoides* ὀκνυῖν, quibusdā ocimastrum putatur, vulgaribus Iacea alba, officinis ben albū, & potularia, quod poculorum similitudinē pericarpia gerant, ex Rnello. Viderut Gesnero Ocimoides, quam hodie plerique Ben rubrum vocant, ob floris colorem: quamquam & albus inuenitur: non de radice quidem vult intelligere, quam sat sò officinæ sic vocant, quoniam longè differt ab Arabum descriptione. Ocimoides Latinis Ocimastrum est: folia sett ocimi, & ramos dodrãtales, hirsutos; siliquas hyoscyamo similes, semine, ut gith, nigro prægnantes. Diof. lib. iij. cap. xxiiij.

*Oculus*, præter suam quæ naturalē habet cõpositionē, duos possidet angulos, quorum vnus magnus dicitur, qui iuxta nasum est: alter parvus, iuxta tempora locatus.

*Oculus* cõstat tunicis septē, & tribus humoribus: prima tunica ex visorio neruo amplificata, & dilatata nascitur, & retiformis ἀμφιδωροειδής, nominata est: quæ reti sit persimilis. huic connectitur altera tunica, araneæ telis persimilis, atque adeo tenuissima ἀράχνη, aranea dicta est. Tertia tunica, vasorum est multorum vinculum & ligamentum, quale χόρδον, quod est fortis inuolucrum, hinc χόρδοις vocatur: quia ex tenui membrana ortum habet: vulgus chirurgicū secundinā appellat. Quarta tunica, quæ vena πύλωις, seu acinosa dicitur: hæc ex χόρδοις membrana nascitur. Quinta tunica dura σκληρὴ, ex duriori cerebri membrana producta, membranas sub se omnes, humorisque vitreæ & cristallinæ in posteriori parte vestit, ac ne distringatur cõtinet ac firmat. Sexta tunica ex dura, cui iuncta est, nascitur, & cornibus in laminas præterennes distinctis persimilis est: idēque cornea χερσινειδής vocata est. Septima tunica est adnata nomine, & ἐπιπεφυκός, ex pericranio ducit originem, eo quòd aliis quæ oculum constit

constituunt tunicis extrinsecus adnascatur: & hæc coniunctina vulgariter dicitur. Ex his connatis septem sunt orbes, seu circuli, qui in ea parte quæ iris & corona vocatur *ῥῆς καὶ περὶ τὴν* conveniunt: sic verò nominatur locus ubi album nigro copulatur. De affectis autem partibus in oculorum morbis: de quælateutibus in manifestos dividit Gal. Locorum affect. lib. iij. cap. j. & in lib. de Oculi humorib. Theor. primo, cap. j. ij. iij. & iij. Item morbi in oculis medicam. Theor. mate v. cap. j. ij. iij. & iij. Fuch. Compendij medic. cap. xxvij. lib. primi.

*Oculi* leporis *ὀφθαλμοὶ* dicitur qui sursum detracta palpebra superiore, oculis a peccis perinde atque lepores dormiunt. Quære dicit. Lagophthalmos.

*Odor*, est quo vi naturæ distinguit odoratum ab inodorato animans, authores sunt Aristoteles, & Aelianus. De odoribus autem de sensilium corporum temperatura, coniecturam sumere non est securum. nam inodora, crassam quidem esse præcipiam obtinent, sed non ita constat quo sint calore, & frigore prædita. At quæ odorata sunt, tenuia quodam modo sunt, & calida: verum eius tenuitatis, caliditatisque quantitas non iudicatur. Causa veri maxima, & potissima, quam obrem nihil certi de temperamenti ex odore iudicari possit, inæqualitas est substantiæ. Neque enim omnes eius partes evaporant, nec perinde ut in gustu sensum movent: in gustu enim omnes similiter gustabilium corporum particule linguae offeruntur, sensumque mouet pro sua natura singulæ, hoc est, facultate. hæc Fuch. Compos. medic. cap. ix.

*Odor* viræ sædus, vel fetens, aut putredinem aliquam vehementem interioris partis, aut mortificationem totius corporis, maxime si cum substantia & contentis prævis fuerit, præ se fert. Fuch. Compositionis medic. cap. xliij.

*Odoramenta*, sunt omnia medicamenta tam simplicia, quam composita, quæ citra ignis accensionem suo odore cerebrum arterare, aut grauem odorem, aut pestilentem auram depellere possunt. Medicamenta quæ ad compositionis odoramentorum adhibent, sunt moschus, ambar, nigella, garyophylli, stirax, stacte, zadura, spica nardi, natidus Celtica, agalochon, ladanum, rosa, viola, nymphaea, sanctali, caphura, botrys, atque id genus: quæ ex authorum formulis deprehenduntur, passim à Syllio, & Fuchio restitutis.

*Odontides* *ὀδοντιδης*, dentaria herba, quod dentes eius decoctum in vino austero confirmet, doloræque leuet, dicta est. Fœni quidem genus, fruticosum, triangulis flagellis, geniculatis, nigro articulorum nodo, foliis polygono longioribus, hordei semine in alis, flore purpureo, pusillo nascitur in pratis. hæc Gesnerus.

*Odymene* *ὀδυνη πορ*, Græcis authoribus vocabulum per familiare, id est, dolorificum quicquid affatim alterat, aut continuum soluit. soluere autem continuum, est ex vulnere in membrum quodpiam illato contiguum representare, donec iterum cum cicatrice pars vulnerata, uniat. Fuch.

*Ὀδὴ καὶ ὁ καρπὸς οὐα* Græcis, Sorbus arbor Latinis. Gesnerus in vulgari interperatationum nomen elatura Cornum fruticem, pro Sorbo arbore *ὀδὴ καὶ οὐα* trā stulit. Quære dicit. Cornus, & Sorbus.

*Ὀνάνθεος* *ὀνάνθεος*, ea est herba, quæ vulgaribus herbariis hodie philipêdula, officinis scrophularia, & hæmorrhoidaria dicitur. Eius radix in multa capitella veluti per filum transfixa pendent, & seu oliuæ fructus extuberant. Ex vino tota cum radice herba stranguriæ subuenit, & hæmorrhoidibus appositæ. Diosc. lib. iij. cap. cxv.

*Ὀνάνθεος* *ὀνάνθεος*, labrusca est Vergilio, & vitis sylvestris fructus cum flore Dioscoridi. *Ὀνάνθεος* autem vitis agrestis ac erraticæ flos cum germine alstringens in vfu est frequentior apud medicos. Diosc. lib. v. cap. iij. Galinitio libri octavi Compos. phatma. & lib. vij. Metho.

*Oculus* catti, Antirrhinum, siue Anarrhinum, hoc est, secundum communem officinarum appellationem, Morio violetus, Anagallidis species altera, vocatur. Quære dicit. Anagallis.

*Ὀξύρις*, vnguentariis yssopus humida, succidarum lanarum pinguitudo, quæ lana etiam succida, & sordida appellationem habet: & hæc cōfus valde utilis ob oesypum,

pum, hoc est, suum lentorem: lota verò est vice linamenti carpti: vsta autem acris, calida sicca, tenuium patrum. ὁ ἰσσοπός Galeno semper cum Diofcoride, quod ὁ ἰσσοπός ὕγρον AEgyptetz, dicitur. Nam succidæ lanæ molles è collo feminibûsque laudatissimæ habentur: quarum pinguitudo ὁ ἰσσοπός Græcis, nostris Lana succida. Diof. lib. ij. cap. lxv. & lxvj.

*Olea* ἐλαιά, oliua arbor, & bacca, id est, eius fructus: cuius arboris morbus olla, ἡ λαπαῖς à Gaza interpretatur. Ex ea & oleastro funditur lachrima Scammonio similis, fulua, stillis exilibus constans, mordax. Similis autem Ammoniaco, vel gummi, colore nigricans, morfus expers, inutilis. Ab elæa gummi elemi corruptè pro eniazum appellatum. hæc Syluius Diof. lib. j. cap. cxvij. affirmat aliquos syluestrem oleâ appellari Oleastrum, AEthiopicam oleam aliosque longè differt à vulgari nostro Oleastello, hoc est, Ligustrum: quam arbusculam, acinos suo tempore producentem, of ficinæ Caprifolium album à suo flore albo vocant: arque in vsu frequentissimo est. Quæze di&. Ligustrum.

*Oleaster* χαῖτος, ἡ ἀγριελῆος Græcis dicitur, Latinis verò sylvestris olea, alioquin AEthiopica appellata: quæ tota vis astrictioris foliis, & fructu est. Ruell. libro primo, capit. ciiij.

*Oleconitis* ὁ λοκονίτις, sylvestris oleris genus apud Hippocratem legitur, dulci, bulbo simili radice, verum parua, & oliuæ magnitudine, ad secundas trahendas utili. Gesnero videtur, quæ Galeno Myle, & nostris Moly appellatur.

*Olus* λαχανόν herbarum hortensium generalius nomen, earum præsertim quæ in cibos veniunt: ob idque ab olla olus dictum ut Varroni placet: Brasica verò peculiariter nomine oleris venit, siue à magnitudine, siue potius remediorum excellentia & numero. De Brasica Pythagorea quàmplurima, & notatu digna scripsit Caro in lib. de Rustici. cap. clxvij. Quæze di&. Brasica.

*Olusastrum* ὁ πικροελῆος, id est, interprete Gaza, Equapium, quod Apium magnū significat: est id quod vulgò Petroselinum Macedonicum dicitur. Quod autem Olusastrum Columella usurpat, Ruellio Acheputatur: sed Gesnero id esse petroselinum, quod Alpinaribus, & Allobrogibus Ostrurium dici solet: & ad omne genus morbi communicari, Petroselinum veterum, vulgarem Pimpinellam, quam veram Saxifragam crediderim. Hieron. Tragus esse contendit. Quæze di&. Apium.

*Olynthi* ὁ λυθός, grossi sunt, siue ficuum flores primique fructus, qui ad maturitatem nunquam perveniunt. Ficus agrestes, & immaturas appellamus.

*Olyra* ὁ λυρά, siligo est, non vulgaris frumeti genus, ut quibusdā placuit scriptoribus: verum tritici genus albū, & altero minus: quo panis candidus pinfatur, frugalissimæ estur.

*Oloschanos* ὁ λασχάνος, Iunci genus tertium est: primū quidem genus, est leue, sic nominatur: alterum, acutum in mucronemque fastigiatur: cuius etiā duo assignatur genera, vñ sterile: alterum fert semen nigrum, rotundum, & crassiore constar calamo, carpi fioréque. Sed genus tertium prioribus carnosius, asperiusque est: is similem supra dicto fructum in cacumine parit, qui vires cum altero habet astrictorias. Cætera ex Diof. lib. iij. cap. xlij.

*Olor* χυρός Græcorum imitatione avis appellata est: atque huic tanta est, Poëtarum descriptione, extremo vitæ spiritu tranquillitas, ut sibi tanquam iam defuncto nemini canter. Quanquam ego, post Alexandrum Myndium, morientem Cygnos in Heluetiorum regionibus, ubi toto anno frequētes apparent, affectatussum: eorū tamen cantum ante mortem propinquam non audiui. Huius quoque avis caro est in cibis qualis Anseris, aut gruis, quia laboriose stomacho conficitur.

*Oromelides* ὁ οἰμνίδης, ἡ οἰμνίς, καὶ ἡ πικροελῆος, pyri agrestis genus quibusdā suspicio est: atque ex Aselepiade Oromelides, non pyra, sed mala sylvestria & mōrana, quæ Theophrastus Oromelidas cum ficu maturefcencia esse scriptum reliquit. hæc ex Arhenzo, & Pamphilo, Ruellij descriptione, Gesnerus.

*Omphacium* ὁ μύρακος, ex labruscæ vva, vvis immaturis, vel oxalide herba, succusest: qui culinariis vulgari triuialique quadā appellatione veritū dicitur: Myro-

polis vuz acerbæ succus, liquorius de agreſta: vnde ſirup. de agreſta accepit nomen. Dioſc. lib. v. cap. iij. Omphacion ſuecu acerbæ vuz, nondum matureſcentis è Thaſia vitz, aut Aminza: aliquibus ſuceus è labruſca eſt. Omphacium enim tam à vino diſſert, quantum omphacinum oleum à dulci.

*Omphacitis* *ὀμφακίτις* ὀμφακίτις, galla quæ immatura, acerbæ necdum perforata, eſt. Quæte diſt. Galla.

*Omphacomelites*, ex melle, & omphacio ſic fit: acerbæ vuz adhuc immaturæ, & diebus tribus inſolatæ exprimuntur, & ad tertias ſucci partes, mellis optimi deſpuma ei ſingulæ partes adiiciuntur, & inſolatur in vaſa tranſuſum. Eius uſus eſt poſt annū his qui ſtomachi imbecillitate inſtantur, & coeliacis. Dioſc. lib. v. cap. xx.

*Oedema* ὀἰδήμα, tumor eſt laxus mollisvè, ac dolore vacans: hac ſiquidem in ſignificatione uſurpatur à Galeno, ac aliis hunc ſequutis medicis Græcis. Hippocrates tamen omnes præter naturam tumores ὀἰδήματα nominauit. Oedema igitur, Gale- no ſenior lib. ij. ad Glaucōnem, eſt fungoſus, & abſque doloris ſenſu tumor, qui ex picuiſo humore cōſtare depræhenditur: aut vaporoso ſpiritu, qualis in cadaueribus euenit, & in pedibus ſæpè ac curtibz eorum qui aqua interente, tabe, & alio vitiato corporis habitu, laborant. Verū in illis periculoſis affectibus cuiusmodi oedema ſym- ptoma eſt, nullam propriam præcipuamque curationem requirens.

*Oleacea* vrina, eſt quæ colote iuglandium oleum repræſentat: & hæc colliquatio- nis totius corporis, aut renum tantum ſignum eſt. Quære Hippo. lib. ij. Pronoſt. pro- noſtico xxxv. & diſt. Vrina.

*Oleum*, liquor eſt manans ex granis, ſeminibus, nucibus, iuglandibus, & fruſtuū durioribus nucleis rotulari expreſſis. Eſt & ex ſontibus rupium ſcaturiens oleū, ap- pellatone ſuz natiuitatis Petroleum, naturæ miraculo in Italia ſcotalibus ad ſani- tatis uſum productum. De hoc oleo inter cæteros, Manaſſus vir doctrina atque ex- perientia inſignis diligenter ſcripſiſſe legitur. Variatur oleum apud authores medi- cos ſecundum diuerſa ſimplicium compoſitorum. vè genera inſuſa, atque facultatū eorum particeps eſt.

*Oleum* melle dēmidia parte minūſ pondetoſum quidem eſt: quippe capir totum eius modum, & ſemiſſem.

*Oſſefiles* affectus, ſunt ſcetores aurium, narium, maxillatū, inguium, & aliarum partium putreſcentium, cunctus ſumoſi, ſcetentes, & quæ ſtriſta oua ſapiunt ſpiritus anhclantia. Gal. lib. iij. Locorum affect. capite vndecimo. Quære diſt. Guſtatiles af- ſectus.

*Onagra*, ὀνῶρα, ὀνῶρα, aut onutis, frutex eſt arboris inſtar, pergrandis, amy- gdalino folio, ſed latiore, lilio non diſſimili: flore roſaceo, magno: radice candida, lon- ga, cum ſiccata eſt, vinum olente, naſcitur in montibus herbæ illitu tetra vlcera mul- cet. Aqua in qua radix maduerit, in potu data, homines & ſeras mitigat, & ſicut ſa- cit. Dioſc. lib. v. cap. c. iij. Ruell. lib. iij. cap. cxxvj.

*Onitis* ὀνίτις, origani genus, quod Arabicā ſticadem ex Ruellio ſcribit Geſnerus: eandem nequæ tamē aſſeruat. Nicander Onopetalon dixit, quod folium aſinis pabulo gratum eſſet. Quæ Dioſc. lib. iij. cap. xxvii. Onitis appellatur, candidiore eſt folio, & hyſſopo ſimilior: ſemen veluti cōiunctos corymbos habet, quæ quidem deſcriptio Arabicæ ſticadi minūſ respondere videtur, vt Onitis ſticæ Arabica non fuerit.

*Onobletum* ὀνοβλετόν, herba Hippocrati linguæ ſimilis: quæ contra ſceminarum profluuiā ex tomento apponitur. Eam imaginari in mentem venit, quam Apuleius neruariā, & nerualem, id eſt, plantaginē neruoſam, velut in linguæ formam figuratā, ad profluuiā mulierum efficaciffimā, appellat. Officinæ plantaginē longā, & quinqueneruā, ob latioris plantaginē diſſentiam, communiter eſſerunt.

*Onobrychis* ὀνοβρυχίς, quæ herba ſit, adhuc certus non ſum: verū Geſneri deſcri- ptione ex Ruell. folio lentis, longiore paulò, flore puniceo, Dioſcorides purpureo, cau- le ſemipedali, radice exigua: dilutis & incultis naſcitur: Plinio, circa fontes: & quod aſi- norum delicatiſſimum pabulum ſit, retinuit nomen. Dioſc. lib. iij. cap. cxlvj. Ruell. lib. iij. cap. lxxiij.



*Onoclea* α' γχοῦσα, *orchaneta* rusticis appellata, ex *anchusatū* genere est. Sed *Onochelis*, quæ & *onochelos* α' γχοῦσα α' τῆρα, suspicatur. Quære dicit. *Anchusa*.

*Onocrotalus* *avis*, vulgò *Butor*, similitudinē cū *Ardea*, non cum *Olore*, habet: nisi quod plimum colore pullo tinctis vestitur, & cum collo rostrum in aquæ stagnantis profundum immergit, velot asini ruditu mœdit: vnde quāsi asini clamor, *avis* dicta.

*Anonis* Dioscoridi ο' ανῆς, Galeno *Anonis* α' ανῆς, herbariis vulgaribus *Acutella*: rusticis verò *Reſſa*-*bouis*, & *remora* attriti, nominata est: eius decoctum maiorem in modum equis, vt hominibus, vrinam vi reddentibus confert. Laudatur contra calculum renū, & vtererum, in quibus expertissima perhibetur, quoniam cruciatui præsentaneo est remedio. Diosc. lib. iij. cap. xvij. Ruell. lib. iij. cap. xvij.

*Anosma* ο' ανοςμα, herbariis vulgaribus *Parthiniſis* *Leprosaria*, & *anchusæ* genus: oblonga folia habet longitudine quatuor digitorum, & amplius, & vnus latitudine, mollia, in tetram iacētia, sine caule, sine semine, sine flore, radice nititur infirma, oblonga, rubefcente, gignitur in asperis. Diosc. lib. iij. cap. cxxv.

*Onyx* ο' ονυξ, siue vnguis, conchylij tegumentum est, ei simile quo purpura tingitur, quod in Indiæ nardiferis lacubus inuenitur, suauem ideo spirans odorē, quod conchylija inibi nardi pabulo vescantur. Colligitur postea quā stagnantes aquæ æstiuus caloribus inaruerunt. Officinis vnguis odoratus, & aromaticus dicitur. Diosc. lib. ij. cap. vij. & lib. v. cap. xcij.

*Ophioscorodon* ο' φιοσχορδοῦν, serpentinum allium, sed syneſtre, segetibus quoque familiaritate, foliis prælongis teretibus, intus canis iuncem. speciem representantibus: caule procero, leni, purpureos flores ostentante: radice capitata, nucleis spicatum compactilibus intumefcente: summo vertice capillamentis fibrato. Ex Ruell. hæc Gesnerus. Diosc. lib. ij. cap. cxlv.

*Ophites* lapillus, cuius genera plurima: quidam ponderosus & niger: alter cinereo colore spectatur, punctis distinctus: tertius, lineis quibusdam candidis interiectus est. Omnes alligati contra capitis dolores, & serpentum ictus profunt. feruntur qui lineas habent, lethargo, & capitis doloribus auxiliari. Diosc. libro quinto, capite nonagesimo tertio.

*Opium* ο' οπίον, est vulneratis papaueris nigri codiis, id est, capitulis fluit, nomēque in officinis hætenus seruat. Cū multi sint ο' οπίον, id est, liquores, solius papaueris: οπῶς, neutro genere οπῶν a medicis propriè nominati solet. Dioscorid. libro quarto, capite lv. Gale. lib. ix. Composit. pharmac. Quære dicit. *Meconium*.

*Opor* ο' οπός in genere Græcis, herbæ cuiusque manans succus est, vulneratæ: sed absolute pronuntiatus *Laſer*, præcipuè *Cyrenaicum*, deinde *Medicum* à Media regione, & *Syriacum*, indicat.

*Opobalzamum*, balzami arboris vulneratæ lachrima est, nostratibus *Myropolis* incognita: atque interim pro vera balzami lachrima, suppositicia vendi solet. Diosc. lib. j. cap. xvij. Quære dicit. *Balzamus*.

*Opopanax* ο' οπῶπαναξ, Herculei panacis succus, retinuitque ad hoc tēpus nomē: in officinis. Foliis herba est aspetis, in terra iacentibus, herbacei coloris, multum ad fœculnea accedentibus, in ambitu quinquepartito diuisa: caule, vt ferulæ, altissimo, qui lanugine quadam incanescit, foliis etiam minutioribus obitus, muscariis, ceu anethi in cacumine: flore luteo, & semine odorato feruenteque. Radices habet multas ab origine vna, candidas, graueolentes, crassi corticis, & subamari gustus. Nostra mō rana panax videtur. Diosc. lib. iij. cap. xlvj.

*Opora* ο' οπῶρα. Democrito, Latinis pomum est, vt quicquid herbaceo fructu viret, lignosi nihil exteriùs habens, veluti poma, pyra, cerasa, pruna, opora dicitur: & eius contraria significatio atrodyis, vt in nuce, iuglande, castanea, pistaciis, a migdalibus, & huiusmodi similibus, appellabitur.

*Ophthalmia* ο' οφθαλμία, est membranz adnatæ, vel cornæ, inflāmatio: quæ Latinis *Lippitudo* vocatur. *Taraxis* ο' οφθαλμία quoque dici potest, quia humiditas oculi cum rubore & calore præter naturam, non ex corpore, sed forinsecus a dueniente causa aliqua, produciētur: vt fumo, sole, puluere, aut oleo, atque huiusmodi. Et hæc perturbatio

oculi, & vacillatio, quæ alioqui ο'φθαλμια non vera nominatur. Fuch. lib. j. Cōp. medic. cap. xxvij. Gal. lib. ij. ad Glauca. & in li. de Oculis Theoremate iiii. cap. vj. & Theor. vj. cap. v. & vi.

*Obſtructio* ſive oppillatio ipſa motus eſt, ſucci verò cauſæ morbi ſitque nonnūquam a dauſti caloris cauſſa, quo minùs per corpus alimentū defferri, digerique poſſit. Obſtructio quinetiam ex eod: m genere ægri tudinum eſt, quæ ex lenis, & craſſis humoribus fit vnam & ipſam habens intentionem morbo contrariam, id eſt, aper-tionem.

*Omentum* ε' πεπλοος, & ε' πεπλοῦς, poſt peritoneum occurrat, veluti quoddam corpus, quod à ſimilitudine etiam rete appellatur: & zibus chirurgis vulgaribus. Ex duabus tunicis, denſis, ſubtilibus mutuo ſibi incumbentibus, multis præterea venis & arteriis, pinguitudine non pauca contextū, vt ventrē, cuius fundo inſidet, ſoueat, in-natūmque calorem per incediam tueatur. Inſtitution. Anatomic. lib. j. Guinterius.

*Omphala* ſeu ſcopululum opertum, ſcapula eſt: vulgò os ſpathulæ, ſive ipſa ſpa-thula: cuius proceſſus ſuperior Aſtoniū eſt ibique clauicula, hoc eſt, oſi ſcutulæ an-ne ſit, vt ex parte altera Thoraci clauicula. Gal. de Anatom. adminiſtrat.

*Ophiæſis* ο'φιας, à ſerpentis nomine ο'φίς, ſerpigo latinè quidem dici poteſt, non autem barbarorum more Tyriænam ſub Tyri nomine ſerpentes omnes, & viperæ cō-præhenduntur. Eſt autem paſſio, quæ partem capitis læſam, ſerpentis moræ, glabram oſtendit. Fuch. lib. j. de Medend. morb. cap. j.

*Opus, ὀπυς*, eſt quod iam factum atque completum per actionem, veluti ſanguis, caro, neruus. Et actionem quidem licet quoddam naturæ opus appelles, ſeu conco-ctionem, digeſtionem, & ſanguificationem, non tamen contra licet opus actionē om-nino voce: ſiquidem caro naturæ opus eſt, non tamen eſt actio. Quære dict. Actio.

*Oreofelinum*, caule eſt dodrantem alto, ab radice tenui exeunte: per cuius ambitū rami, & capitula cicutæ, multò tamen tenuiora: ſemine cumini, oblongo, acuti, & odo-rato, tenui. naſcitur in petroſis, & montibus. Vrinam ciet, ſemine ac radice in vino po-tis: antidotis excaſfactoriis inſeritur. Nec hallucinari nos oportet, exiſtimantes oreo-felinum eſſe quod in ſaxis prouenit. aliud enim petroſelinū eſt. Quære dict. Apium.

*Orchis* ο'ρχις, καὶ κύριος ὀρχίς, plerique canis teſticularis, & officiis improprie Sa-tyrion: foliis circiter caulem intum in terra ſtratis, oleæ molli ſimilibus, longioribus, anguſtiſ læuibas, caule ſemipetali, floribus in vertice purpureis, radice bulbola, oblō-ga in modū oliuæ gemina, ſuperiore quæ durior, & calloſior, inferiore quæ mollior & rugoſa. Atq; hic mas eſt, & ſœmina eiufdē nominis, quæ diſtinguitur internodiſ, & ramoſiore frutice, radice ſaccinis vtili. De hac radice ſit compoſitio apud myropolas, quæ ſuo more Diaſatyron appellatur. Ruell. li. iij. cap. lxxv. Eſt præterea Orchis, nomi-ne alio Serapias: de qua in dict. Satyrion. Occurrit Orchis vel Orchas ο'ρχις, oliuæ ge-nus grande, cibo commodius, quàm oleo: à ſimilitudine teſticularum vocata.

*Origanum* heracleoticum, vel heracleum ο'ρεγανον ἡρακλεῶνος, καὶ ἡρακλεωτικόν, καὶ ο'ριγανός Dioſcoridi: Cunila gallinacea Plinio: Eſt inſuper ſylueſtre origanū, Cunila Bubula vulgò, dictum: atque aliud ſub nomine Onitis, vt ſupra paulò expoſuimus: necquò Origanis, vel Marò ο'ρεγάνης, καὶ μάρον. Quære dict. Marò, & Onitis.

*Origanum* autem quia triplex in differentia eſt: ſic diſtinguitur: primum nempe Hetacleoticum, folia hyſſopi produ-cens, & odorem eundem: Secundum, quod agreſte vocatur, folio eſt prioris origani: & utroque caremus: Tercium verò, quod Onitis ſive praſion dicitur, maioranz ſatiuz ſolum habet: vnde vulgus noſtrum vocat Ma-ioranam Anglicam, quòd frequentiffima illic proueniat. eſt tamen ſi vulgare noſtras Origanum hæc Car. Stephanus. Dioſc. lib. iij. cap. xxvij.

*Orminum* ο'ρμιον, καὶ α' σπαράγος ἀγρίος Græcis, id eſt, ſylueſtris Aſparagus, Corruda Latinis. Eſt & hortenſe Orminum, Græcis ο'ρμιον κηρύκον: noſtris Galli-tricum ſatium: & populati lingua Tota-bona appellata. Eſt item Orminum ſylue-ſtre ſuperioris nomen retinens Gallitricum, vulgò Oruala.

*Orneogloſſum* ο'ρνεωγλωσσον, id eſt, Lingua-avis arbor eſt vlmī ſpecie, foliis amy-gdalæ, prælonginquis ſiliquis, in ſarculorum cacumine prodeſtibus, oleagina ma-

gnitudine, in quibus medulla inest linguae a vis similis, exterius rubra, intus ex cando re in luteum vergens sapore acri, vellicante linguam cum nonnulla amaritudine. Lin guam a vis Officinis vulgarem atque veram, ex fraxino arbore, semen, non illius Ruel lii arboris, esse constat experientia ipsa.

*Ornithogalon* ὀρνιθογáλον, vulgus Gallicum *churles* vocat, est caule tenero. à ru sticis eruitur passim rotunda radice bulbacea, è cuius medio cauliculus exit, tribus aut quatuor appendicibus in cacumine, foliis extenuatis, floribus extra herbaceis, in tra albicantibus: semen cum pane coquitur vt melanthium. radix bulbosa, cruda & cocta manditur. Diosc. lib. ij. cap. cxxxviii. Ruel. lib. ij. cap. lxxvij.

*Ornithogalum* ὀρνιθογáλον, vt plerisque placet, non est, sed μάλα ἀγρία, vel βουμέλα, ex Gesne ro nomen accipit: Columellæ fraxinus sylvestris: Gallis autem fraxinus cāpestis. AEmulatur enim Fraxinum effugie tota, foliis quàm cæteræ fraxini latioribus. Quæ re dict. Fraxinus.

*Orobanchæ* ὀροβανχῆ, quod eruum strangulet, accepit nomen: herbariis populari bus, & officinis volubilis, & corrigiola, rusticis verò tineæ. Αὐτοζωτῆρος eadem sus picatur, quæ Orobanchæ, vulgò Tinca, *ήγνη*, etiam Gesnero: etiam Ruellii sententia, quorundam absurditate hypocistis nuncupata. Orobanchæ cauliculus est sesqui peda lis, & interdum maior, subrubet, hirsutus, tener, sine folio, pinguis: flore subalbido, & in luteum vergente: radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccesit, caulis, sistu losa. Estur, vt olus, cruda, & in patinis, asparagi modo, decocta, legumentis addita, co ctionem accelerare creditur. Diosc. lib. ij. cap. cxxxvi.

*Orobanchæ* ὀροβανχῆ, Eruum, & Vicia, leguminis genus, videtur: quod ab eo tamen dif fect. Orobo si cortice deglubas, candidum: Eruo, instar vitelli flauum videbis. neq; officinæ adhuc verum eruo vtuntur. Quæ re dict. Eruum.

*Oryza* ὀρυζά, Sylicienſe hordeum est: frugum generis est, in palustribus riguis que nascens, mediocriter alit, sed aluum supprimit: prodèstque cum amygdalino di sentericis. Ager. Arpinas hac fruge abundat.

*Ortyxomera* ὀρτυγομέτρα, Coturnicem rex. a vis est turturis magnitudine, lon gis cruribus, colore inter croceum & viridem medio. Ex Myndio hæc Scholias tes.

*Ossifragus* Dioscoridi, a vis si nuncupata: cuius venter particulatim potus cū di luto quopiam, calculos cum lotio pellere proditur. Nisi a vis hæc Sturdus sit, diuina re nescio: nam neque Galerita, neque, quæ vulgò Cauda-tremula auicula est appella ta, videtur.

*Osteocollon* ὀστέονλλον, polygonium medici, Talantion alij, vulgus symphyton dicit. herba saxis, & mœnibus persamiliaris, perpetuo foliis vidua, & virens: ramulis instar lunci pensilibus, tenuioribus procerebibusque, spartij similibus passim sparsis. Hac tradunt, inquit Gesnerus, cruda carnes dissectas coalescere, si coquat ur vnâ, iti dem ossa fracta ferruminari. Ruell. lib. ij. cap. cxliij.

*Ostracites* ὀστράκιτης, lapis testæ similitudinem habens, crustosus, & in laminas fissilis, quo mulieres ad detrahendos pilos pro punice vtuntur. Menses drach. ponde re potus ex vino, sistit. si quatuor diebus à purgatione bibatur sicili pondere, semi nis præstari ne concipiant, cum melle autem impositus, māmarn inflammationes lenit, & nomas cohibet. Diosc. lib. v. cap. xciiij.

*Ostrya* ὀστρία, liparia officinarum est. frutex niger, ramos serens tenues, lentos, fractusque contumaces, & in his folia quaternâ, quina, senavè, seu linij, nigra in initio, dein colore mutato rubescunt. Decoctum eius potu iuuat arquatos. hæc ipsa est, quæ ab Esula laetis succo differt: cuius suo loco vide descriptionē. Diosc. lib. iij. cap. cxxvj.

*Or*, hoc est, Bucca, faciei pars est per quam cibi, & potus in stomachum ingressus fit. Inde oris pars extrema labium, seu labrum est: secaturque in infimum, & superius. Labrum superius *μύστωκα* ὀππὴ, id est, in barbani & pilos labri superioris. Oris pars superior ὀππὴ καὶ ὀυρανίσκος, palatum dicitur atque in extrema oris, & palati parte carnea quædam particula suspensa apparet, quam gurgulionem veteres, γούργουλινα: posteriores verò columellam, vualam, & vualam appellant.

Oris ulcerationes seu alcola α'φται, sunt quæ in oris superficie accidunt, igneæ caliditatis quippiam habentes: nunc subalbidæ, nunc subrubræ sunt: aliæ crustæ modo nigrescunt, & hæc periculossimæ omnium existunt. Curationis author est Fuch. lib. j. Medend. artis, cap. xxx.

Oris resolutio, seu tortura κνιχὸς σπασμὸς, est quum in utramlibet partem faciei deprauatio sequitur: quod in ea passione cum motu quodam peruertatur.

Oris fetor, est ipsius oris molestus odor, grauisque, primum ob putrescentes gingiuas, dentes, aut ciborum reliquias illic decentas accidit: deinde propter oris eutis calidam intemperiem humiditatem, quæ in eo multa est, corrumpentem: interdum etiã ob humorem corruptum, aut putrefactum, in ore ventriculi hærentem, oris, pulmonisque exulceratione fit, vt molestus sit oris halitus, siue spiritus.

Ors adiutor ij, brachium ipsum est, siue humerus: constatq; osse vnicò. Quære dict. Humerus.

Ossa, corpora sunt sicca, frigida, terrestria, & sensus expertia, in quorum concuitate medulla pinguis, sine sensu, contenta est.


Ossa inter homœomeria, firmissimæ sunt materiz, totamq; corporis molē sustinent, plurima carne adoperta, & σφαιρα, Græcis dicitur. Quære Gal. li. xj. de Vsu part.

Ossium ceruices, sunt processus tenues: extremum verò ceruicium, quod crassius, & orbiculatum est, caput nominatur: cum verò in mucronem processus definit, non ceruix, sed corone nuncupatur. hæc Gal. de Ossibus.

Ossa membranæ περιρριζα, sunt quasi, vt ossa, in se vndique continentes: at osteome, Galeno definitore, est ossium corporis humani diuisio.

Osmunda σπυγδαίς, arborea vna, quæ polypodii dicitur: altera humi, vel in arborū radicibus, radice crassior, pilosiorq; & in clauæ formam intumescens, nascitur atq; hæc osmunda regalis herbariis habet nomen. Quære dict. Dryperis.

Ostrea, & ostreū ancipiti generis cōcha vel cochlea: est ergo generis cōcharū nobilissima Ostrea, Græcis, pariter ac Latinis nomē retinēs: & testā scaberrā habet, quæ inter lautissimos cibos est recepta. De ea Pharisæes populi fidem in mensis faciunt.

 Oxalis ο'ξάλις, à sapore acetoso quem habet, acetosa appellatur: multiplex quidē est, latiuia, quæ latiora, lōgioraq; habet folia, caulē versus pediculū rubescentem: atq; ea tum in acetariis, tum etiam in iusculis vsus est. Est & species altera hortensis, cuius rotunda sunt sermē folia, superiorēque delicatior in iure, & acetariis. Præterea tertia, cæteris tenuior, quam vulgus vocat *uinerse*, à succo quodam vinoso: ea quinetiam vitimar in febrium ardoribus carpo cum salis momento, tanquam amuletum, apposita. Oxys denique, vt author est Plinius, ternis foliis constans, quæ putatur Oxytriphylum ο'ξυτριφυλλον, trifoliū simile est: longis tantum pediculis, tria summatis folia proferentibus, acido sapore, flore luteo, interdum candido, rufo in lunatis filiquis sortu. Vulgus panem cuculli appellat: officinæ. Trifoliū acetosum: & Alleluia. Ruell. ex Plinio, lib. ij. cap. cxlvi.

Oxylapathum ο'ξυλαπαθον, à sapore acido, vt in acetosa herba, & à foliorū acuto rū figura, nominatur: cuius variū quidē genus, multiplexq; est. Quære Lapathum.

Oxyacantha, & oxyacanthus ο'ξυακανθα, καὶ ο'ξυακανθος, Græcis. spina acuta Latinis, frutex notitiæ vulgaris inter spineta & sepes nascens, spinis aculeatis fultus. Berberis officinis ei nomē peculiare est. Ex eius acinorum maturorum liquore sirupus cōponitur febre ardente affectis, & alui fluxu correptis, gratissimus, vtilissimūsq; est. Spina-vineta Gallis, à foliorū, & fructus aciditate, non autem à spinis, aculeisvè quibus horret, vestiturque, habet nomen. Fructus sed falsò, aliquibus Ribez putabatur, qui racematim in frutice Rhamno aculeis, spinisq; carente, coheret: & prius quam maturui, herbacei coloris est, verum ad maturitatem vbi peruenit, rubescit. Ex eo fructu fit sirupus vexatis cholera, & ardore, aptissimus, & optatissimus. Diosco. lib. j. cap. cv. & cij. Quære dict. Rhamnus.

Oxymyrsine ο'ξυμυρσίνη, Ruscus nostras est, & officinis bruscus: est enim myrthi quidem folio, sed aculeato, vnde tractum ei nomen: Scopa regia Largo est, cap. cliij. ad calc

ad cabulos experta tantum radix. Diosco. libro quarto, cap. cxxix.

*Oxyme* Græcis acida muriâ Latinis: contra nomas foru, putrida vlcera, eanum morbus, & venenatus ictus auxilio est. sanguinis fluxiones post excisos calculos sistit, si statim calida in vulnus iniiciatur. procidua sedem reprimir, dysentericis, si nomas sentiant, infunditur. Diosc. lib. v. cap. xiiij.

*Oxythymix* ὀξυθυμίζ, ab acido fructus sapore, nascique in palma sylvestri existimatur & palmæ genus credibile. Tama-Indum isto seculo ab Arabibus ei datum nomen est, & apud officinas hætenus retinuit. plurima palma sylvestris in India nascitur, vnde frequens ad nos mittitur: atque eius vsus in medicina creberrimus. Diosc. lib. i. cap. cxxv.

*Oxytriphylum* ὀξυτριφυλλον, idem quod Triplium acutum, siue acetosum. Differt autem ab eo quod Largus lanuginosum, & quasi aculeatum in folij extremo habere scribit: cuius semen, vt herba ipsa, nidore acutum, non autem aculeatum, reperitur. hæc herba in Rhomanensium scriptis habetur frequentissima: cuius descriptio nem ex Largo, cap. clxij. petes.

*Ouum* volucrum, vnde natum est, naturam fortitur: vnde etiam ouum ouo aliud melius, vtiliusque est: nam melliculum plus alit forbilli: & molle plus duro. Dioscor. lib. ij. cap. xliij.

*Oxos* ὀξος, acetum dicitur, quod quatuor in rebus medicinæ recipitur, & à sua voce denominationem tradit. Oxymeli simplex, & cõpositum: Oxy sacchara, & oxymeli Scylliticum: necnon Scylliticum acetum, compositionem ex aceto accipiunt. Quæ re dictionem Acetum.

*Oxena* ὀξενή, ex graueolentium genere narium vlcus est, polypo vlcere non inferius, cum generis eiusdem sit: nam profundū, & putridum, naribus inuenitur: ex quo ingratus, & fortens exhalatur odor. Fuch. Compendij.

Medic. cap. xxix.



## De lutea P.

**A**Ederota ἀκρότης, officinis Branca-vrsina, nascitur in fortis petrosi, & riguis. folia habet lactucaeis multo maiora, latiora, & longiora, crux diuisura, nigricantia, pinguis, leuia: caulem linum cubitorum, digitali crassitudine, prope verticem nucamenta quendam oblonga: ex quibus flos prodit albus: semen oblongum, luteum: caput tyrsi specie. radicibus nititur longis, mucosis, rubris & glutinosis. Est & sylvestris acanthus, scholimo similis, aculeatus, breuior quam satiuus: & ad eadem quæ superior, prodest. Dios. libro tertio, capite decimo octauo. Quære dist. Acanthus.

*Peonia* πᾶν ὄντα ἀπὸ ὕλης, mas est: semina alia πᾶν ὄντα θῶλεα, siue glycyfide γλυκύσιν Græcis dicitur. caulis altitudine sesquipedis adolescit, comitis atibus multis folionibus. mas folia iuglandis habet: in semina smyrnij more diuiditur summo caulē siliquis emittit, veluti græcas nuces: in quibus cum dehiscit, multa granula rubra inueniuntur: & in medio nigra, quinque aut sex purpurea. radix maris longa, alchææ & mulæcōtra epilepsiam, & melancholiam recens collo appensæ finire morbum scribit Gal. li. vj. Simpl. est quoque semine radicis efficacior. grana rubra siue purpurea mouent menses muliebres: nigra verò sistunt. Diosc. lib. iij. cap. cxxxiii.

*Paguri* πᾶν γούρι, ex cancerorum genere, dorso aliquanto leuiore, quam ceteri cancræ chelis ita magnis muniti sunt, ut quicquid corripuerint, astringendo retineant. Hi sunt admodum in cibis grati, quod stomacho dum conficiuntur, minus aduersantur. Quære dist. Cancer.

*Paliurus* πᾶν λουρὸς, strutex est pinosus, Albus pinus vulgò dictus: hæc esse Gesnerus copitice, nullis serè reclamantibus notis, paliurum Africanam, eam præsertim quæ non siliquetur, hætenus incognita mihi: nisi fuerit ex Theophrasto, quam veram affirmat Ruellius, quum descriptioni Theophr. tota nostra subiaceat Paliurus, vulgi nomenclatura, Albus pinus, cum suis bacculis, diuo Martino sub pyrorum nomine dicaris appellatus. Diuersam descriptionem facit, ab ea quæ Theophr. est Dioscor. lib. j. cap. ciiij.

*Palma* φοῖνιξ, arbor, à qua palmula siue dactylus, à digiti similitudine dictus, fructus: palmulis caryotæ, vel caryotides celebrantur in cibis, quas dattas, & ficus regias dicunt. harum quoque genera tria sunt, Nicolai, a delphides, id est, sorores, & pareri. Aristoteles genus palmularum quoddam Eunucū vocat, quod alij enorchum, & spadonium. Plinius Margaides facit palmas breues, candidas, rotundas, acinis, quàm balanis, similiores, à margaritis quoque appellatas. Theophr. lib. ij. cap. viij. Dioscor. li. j. cap. cxxv. Plinius lib. xij. cap. iij. Gal. de Alimentor. facult. libro secundo, cap. xxvj.

*Palma* in vite, quasi parilema, inquit Gesnerus, à pariendo nuncupatur: parit enim quidem uvas, propter infirmitatem tamen vitem elicere minimè potest. Aliquibus autem, palma est maior vitis pars, unde vix nascuntur: quædam modum minor flagella.

*Palme* pampinariæ in vite κλῆμα ἵλον ἐν τῇ ἀκαρπῶν, id est, quia plerunque tenetis est instugifer, appellatus: fructuarius autem palmes ex anniculo palmitē fit, fructūque induitur. sed focaceus palmes vocatur, qui solet in bifurco medius proropere. hæc Gesnerus.

*Palpebra* inuersio ἐκ τροπίον, fit propter cicatricem, carnis excrescentiam: cui τράχημα, hoc est, interna palpebrarum scabrities, & asperitas occurrit. Nā quando augetur, ac intenditur veluti in incisuras σκῆδου, dicitur, id est, ficiosa palpebra: cum verò iam inueterata fuerit, & in callum abierit τῷ λωσῖς, nuncupatur. Sequitur etiam

πῶν λωσῖς

*παλιδος*, hoc est, crassities palpebrarum callosa, rubicunda, quibus accidit saepe pilorum defluxus. Gal. in li. de Ocul. Theorem. iij. cap. j. iij. & ix.

*Talpitasio* seu tremor cordis. *παλιδος*, differt ab ea passione, quæ cardiaca nuncupatur: proinde hallucinantur præceos scriptores, qui *καρδιακος* pro cordis tremore interpretantur. Est autem passio quæ duobus perficitur motibus: vno dum cogitur, mæbrum ob morbum, atque grauitatem, ad inferiora repere altero, dum sursum à saeuitate fertur. Fuch. li. j. morb. medeud. cap. xxij.

*Palide* vrina, est quæ quia tincturam aliquam accipit, à summa cruda non nihil discedit: quæ dum pallescit magis bilis serosæ plus humiditati miscetur. Hanc sequitur subrufa vrina cum plus tincturæ accedit si concoctio præcesserit, & hanc mediocrem & temperatam esse Aëtius docet. Quare dicit. Rufa vrina.

*Panaces* *παλιδος*, nominis cõmunioris est pluribus herbis appellatio, vt Cētaurio, Lignifico, Tithymallo, Origano Heracleotico: sed Dios. capitibus priuatim discriminat tria hæc solū genera: Panaces Heracleum, Asclepium, & Chironium, quod Apuleio Enula cāpana vocatur: quorū vide diuersitatem apud Dios. li. iij. capit. xlvj. xlvij. & xlvij.

*Panaces* ad verbum, inquit Scholiastes, significat valēs aduersus omnes morbos quod nomen quanquam cõmune est Centaurio, & aliis suprà enumeratis, tamen propriè tribuitur Panaci. Neque est verisimile plantam, quam Galli paneam dicunt, esse verum Panacem, nisi similitudine aliqua Asclepium.

*Panacratium* *παλιδος*, scylla segetalis, quam Rura cepam anguinæ vocant. Myropolæ aliquod ex Dioscoride iam didicere pro maritima Scylla, Panacratio vt, Dios. li. ij. cap. cxv.

*Panicum* *ο έλιδος*, καί *ο μελιδος*, frumētaceis seminibus adnumeratur, milio simile eodēque modo in panes subigitur. eodē habet vsus: minùs tamen nutrit, & stringit. hæc Dios. li. ij. cap. xc.

*Papauer* spumeum. Gale. authore, propterea quòd totum album sit, & spuma plenum, videtur appellatum. Est autem humile genus papaueris inter segetes natum.

*Papauer* satiuum *μυκων κηποιος*, albū papauer in cultis locis nascēs, vel in hortis dum fertur, est calice grādi, flore, & semine albo, minùs frigidū, ob id esculētum, & mediocriter somniferū. Syluestre, flore ad medium nigricante, calice minore, semine nigro, admodum frigido. Tertiū etiā syluestre procerius, calice lōgiore, omnīne nigro, admodum, proinde stupefacit. Sunt genera sex papaueris Dios. & Gal. propriis singulis capitibus. Est item erraticū papauer, thœas dictum, *μυκων η' ροιως*, rubro, vel phœniceo flore, semine intus nigro, postquam maturum est, frequēs inter segetes inuenitur, quod idem aliquibus papauer cornutum notatur.

*Pappus* *παπιδος*, est lanugo ex plantarum nonnullarum floribus decidua, vt in carduis, senecione, condrylla, vento minimo agitatīs post maturitatem.

*Papyrus* *παπυρος*, arbor, quæ chartæ sunt, nostris ignota regionibus, præcipuè in medicina vtilitatis, ad laxādas fistulas, habet nescio quid alimenti radix. itaq; Aegyptiæ mādunt, succū tantum deuorantes: & mansam expuūt: ipsi radicibus pro ligno vtuntur. Crematæ papyri cinis depascētia vlcera cū omnium partium, rū oris maximè cohibet. verū melius id cōbusta charta præstat Dios. li. j. cap. xcviij.

*Pardalianches* *παρδαλιανχες*, *α' κοντο*, aconiti genus primū, vulgò Tora, quæ à Chymistis pro maiore Lunaria falsò vsurpatur. Pardalianches, vt est Scholiastes author, videtur Aconitum, quod officinæ Napellum vocant: aliis Lupara. Quare dicit. Lycottonum.

*Paralios* *παρπαλιος*, ex genere Tithymallorum est: nascitur in maritimis, ramis subrubentibus, palmum à lrisquinis senisvè à radice exeuntibus, foliis lini angustis, paruis, oblongis, in versis quosdam digestis: capite in cacumine orbiculari, in quo semen: vterumque, vario colore emicat, flos albus. Frutex totus cum radice, lacteo succo turget. Similes ad vsus, ad quos Tithymallus, reconditur. Vulgus officinarum Esulam coronatam vocat. Quare dictionem Tithymallus.



*Paronichia* τριφυλία, herba odorata in montium saxis quae nascitur tota patet, foliis peply, radice hirsuta. Ignari chymistae Lunariam minorem suspicantur. Illita paronythiis, atque duritiis remedium est: unde nomen traxit. Dioscorides li. iij. cap. xliij.

*Parthenium* τριφύλιον, hoc est, herba virginea, officinis vero matricaria: cuius etiam scribuntur genera: unum sub nomine hoc, Matricaria: quae etiam muliericulis febrefuga dicitur: secundum Thanacrum, vel Athanasia: tertium autem genus, Chamaemelum, Anthemis Dioscoridi vocatum. Quae parthenium vocatur, foliis est coryandri, sicut Thanacetum, & Anthemis, tenuibus, flore per ambitum albo, intus melino, odore grauius Thanaceti, & Anthemidis, grato, & iucundo sapore amaro omni bustamen mitiore in Thanaceto: quando cum ex alide pro omphacio misceatur, & estur, pro lombricis, & platis extra stomachum, & intestina extirpandis. Matricaria vero à cibis reicitur, vellicationis ad nauseam causa: verum suspiciosi, & melancholicis pro pharmacopota prodest. item mulierum vuluis induratis. Dioscorides li. iij. cap. cxxxij.

*Parthenium*, inquit Scholiastes, nomen ambiguum est apud Graecos, & Latini auctores: aliquando enim est Anthemis, id est, Chamaemilla nostras, aliquando Mercurialis, aliquando Parietaria, ut Celsus, & Gaza: qui Mutalem Parthenium interpretantur, quia muris plerumque adnascitur. Quibusdam placet esse Matricariam, vulgo Espargottam: aliis Cotula foetida appellatur. at nos hic accipimus Parthenium pro Espargotta, & Matricaria, haecenus Scholiastes.

*Parthenis*, id est, Artemisia τριφύλις, καὶ ἀρτεμισία, vulgi appellatione Armoyfia accepit nomen: cuius loco suo petes dicit.

*Tanaricium* Chiturgis barbaris, Reduiz Latinis: τριφυλία vero Graecis medicis, est abscessus circa radices unguium, digitorum manuum, & pedum articulorum, consistens.

*Paralysis* ἀπαλυσίς Graecè, Resolutio est Latine, est: Galeno auctore li. iij. cap. x. de loc. affect. ubi alterum latus, aut dextrum, aut sinistrum, sensum & motum amittit. Interdum etiam una duntaxat parte, manu, scilicet, lingua, crure, accidit. Quum vero per resolutionem interdum sensus duntaxat, interdum motus, nonnunquam ambo simul peteant, nequorum resolutio potissimum dicitur, ubi motus deperditus est. Gal. li. j. de Sympt. causis cap. iij.

*Paralysis* generatur à multis crasis, & viscidis humoribus, nervos obstruentibus, impediens ubique ne animalis facultas à parte principe ad membra delabatur. hac ratione refrigeratio ex niue, compressio nervorum, corporum, resolutionem efficit: & possunt. Fuch. li. j. de Medend. morb. cap. xvij.

*Panniculus* carnosus, seu membrana carnosus, est quae veluti musculi speciem, praese ferit: & Abdomen dicitur Latinis Arabibus Myrach. Quae dicit. Abdomen.

*Pannus* πυγιδίου Celsus, glandulae tumor est non altus, sed latus atque patens: in quo quiddam pustulae simile est, panis similitudinem referens. hinc Latini pannum etiam appellant.

*Palumbus*, & palumbes quattuor, ex columborum genere maior, quam vinago, Graecè θύλας τρυγών: quas voces Gaza vertens Turturam pro vinagine reddidit. Aquitani autem, ut refert Scholiastes, sicut distinctae aves sunt, ita diuersis nominibus eas appellant. Columborum vero species quinque reperies apud Aristot. lib. viij. de Natura animalium, παλ, quattuor, τρυγών, θύλας, τρυγών, καὶ παλ.

*Papulae* ἀκνιδία, pruritus sunt eruptiones, & duplices apprehenduntur: quaedam enim sublimis, quaedam vero latae. Sublimis à calidiore, & tenuiore humore sunt, pruridiumque excitant: quae neoterics morbilli vocantur. Latae & humiles à frigidityte & crassiore humore oriuntur: neque prurium concitant, & variolae dicuntur. Quae dicit. Morbilli.

*Parotides* τριφυλίδες, sunt inflammationes in glandulis auribus adiacentibus quae oriuntur Gal. li. ij. ad Glaucum explanatione Acaki. Curationis autem Fuch. lib. j. cap. xxvij. Medend. morb. Quae dicit. Bubones.

*Partio*, est aut totius, aut compositi in suas partes distributio: vt corpus in caput, thoracem, ventrem, manus, pedes: &c. vel, Medicina, est quæ in scientiam salubrium, morbosorum, & neutrorum per differentiam enumeratur. Quare dictio- nem Enumerationis.

*Partus* difficilis, est qui aut vitio parentis, aut fortis, aut secundarum, aut extrinsecus aduenientium accidit.

*Parturiens* quidem, si crassa, obesaque est, aut animo pusillo, & dolorum inexper- ta, aut vterus totus exiguus, aut naturaliter imbecillis sit, vt fortis propellere ne- queat, aut ante tempus pariat. Curarionis author est Fuch. li. iij. de Medend. morb. cap. lii.

*Partus* gerendi, & pariendi cæteris animantibus statutum tempus certum qui- dem est: homo toto anno & incerto gignitur spatio. Alius septimo mense, alius octa- vo, & vsque ad initia decimi, vndecimique. Antequam septimum mensem haud vquam vitalis est: septimo, non nisi pridie, postero vè plenilunij die, aut interlunio concepti nascuntur. Sed iam quidem tales partus septimo, & octauo mense, natos contra pri- scorum opinionem, vitales esse vbique recipitur: quarto autem mense, & sexto, letales in iis abortus. Sed quom coram L. Papyrio prætoris maris partum xij. mensibus di- ceret tulisse, quoniam videlicet nullum mulieribus certum tempus pariendi statu- rum crederetur, Legem Papyrius tulit. Plin. li. vij. cap. v.

*Passæ* vrina, est quæ maximè passio, hoc est, vino cocto, similis apprehenditur: vel, quæ similis cerasi nigriori fructus colori est. Passæ vrina, biliosum humorem aduri, exassarivè ostendit: quæ si sic perseverauerit, at quantum morbum adesse mon- strat. Quare dict. Vrina.

*Passer* ἡ ἰστέρα piscis, qui à Rhôbo solo corporis situ differt: & quod Rhombus sit Passeri amplior. Nam passer doctis quibusdam Pleza nostra est, aliis barbua puta- tur: quam Rhôbi formam aliqui culmarij vocant. Piscis hic mollem carnem habet, & quæ stomacho confici facile potest hæc Scholiastes.

*Passer* ὁ σπούδης, vulgaris, & penè domestica avis, ad parietum domus foramina nidificat, paritq. Huic auculæ, vt scriptū reliquit Plin. propter vehementē salacitatē, annū vnum rātum viuere authores retulerūt. Est item Passer mōticola Solitarius no- mine, Galeritæ magnitudine: cuius Actuarius Regaliū sermonum li. ij. sic meminit: Est autem passer magnus terrestris, non in arboribus, neq. in domibus habitat, verū in summis virgultis desidet, voce admodum garrula, colore & magnitudine alaude, & hyeme nusquam apparer. Porro, inquit Scholiastes, τῶν σπούδων nomine, auicu- las omnes in dumis versantes Galenus serè intelligit.

*Passinaca* marina, στυγυῖον, cartilagineus piscis est, qui ab Agathensibus incolis Gloriosa appellatur. Gerit hic piscis in cauda, quo nihil pestilentiùs mare generat. Carnem habet mollem, ac delectabilem, nec concoctu planè difficilem. Gillius in li. de Piscibus Gallicis.

*Passinaca* στυγυῖος κρηναῖος, duūm generum offenditur vbique, & satius vtra que, rubra scilicet, & sublaui in album tendens: Parthisinis populis Echarrōta vtra- que est. Segusiā, & Allobrogas incolentibus, Pastenada vocari iandudum cœpit. Re- peritur & agrestis, quæ Daucus imaginatur: medicamentis superiore longè vtilior in vrinæ à renibus purgatione.

*Pastillus* seu trochiscus τροχίσκος, est medicamentum planum in toræ, aut cir- culi formā coactum: nonnunquam antidoris, succis medicaris, saccharē, melle, catapo- tiis, clysmatibus, vnguentis, aliisq. eius generis miscetur. Pastillorum, qui citra alio- rum medicamentorum cōmitionem sumuntur, pōdus non excedat drach. ynam, vel scsq. drach. & ij. sanè quorum compositionem opium ingreditur, pondere scrupuli vnus, aut semidrach. Actuarius auctor est lib. v. Composit. medicament.

*Passio* παθὸς, est omnis alteratio circa materiam, aut motus qui adhuc sit: vel motus rei quæ afficitur. proinde pathos non habet essentiam nisi dum conuer- titur, mutatur, aueratur, mouetur: ideoque ab affectu speciatim sumpto differt, qui

qui nihil aliud est, nisi alteratio in re quæ perpessa est permanens.

*Pediculus palpebræ* *ῥθειπιδος*, est ubi palpebrarum pilos exigui pediculi, perinde atque in cæteris partibus obsænis, aliisque brachiorum infestant. hinc *μυδαρῶσις*, καὶ *μυδαρῶσις* pilorum palpebræ pediculorum partim vi desuviium vocaturque locus palpebrarum glabrics.

*Pediculus* soliorum, vel fructus *μοσχῶς*, καὶ *μίσχος*, hoc est, frondium, & fructuum perpendiculum: ut in foliis albæ populi arboris, & betulæ, appellatur: vulgò cauda folij, & cauda fructus. Est tamen pedunculus animalculum vice vermiculi, pigros infestans homines, unde pyriasis morbus de quo suprà dictum fuit.

*Pecten* veneris, radice candida, coliculis semipedem altis, foliis pastinacæ, sed tenuioribus, flore albo, exili, dependentibus summamque pluribus rostellis in mucronem turbinatis, & pectinatim inter se disjunctis. inter segetes copiosa nascitur. Radix cum malua tusa omnia corpori infixæ extrahit. Ex Ruellio hæc Gesnerus.

*Petfines* ὀΐ κτίεις, piscatorum vulgus *Petones* vocat: sunt ex genere testaceorum, quæ sanguinem carent, noménque ex eo habent, quòd striati, pectinatimque rugis quibusdam diuisi sunt. Huius generis quidam Conchas eas arbitrantur, quæ ex diuo Iacobo ad nos à peregrinis deferuntur. Eorum, ut omnium scilicet concharum, ad ciendam aluum confert. Athenæus li. iij. Dipnosophyst. quæst.

*Pelamides* αΐΐ θαλαμῖδης, parui Thumni sunt, laudatissimis piscibus non cedere: quem ad modum ab Athenæo scribitur Dipnosophyst. li. viij.

*Pelecnus* πείλεκυς, ἢ *δυσπεδός*, securidaca, & hedisarum peritioribus de generatione quadam lentius nascitur. aliquibus faba lupina, aliis herbum, rura gramam, quòd cum tritico, & hordeo quibuscum alitur, suo complexu grauis sit, atque molesta. hæc ex Ruell. Gesnerus.

*Penis* κἀνδρῶς, coles, viridis virga, priapus, & mentula dicitur: cuius summum & extremum *βαλάνος* balanus, seu glans est. huius curicula qua tegitur, præputium est, Græcis *πρόσθῃ*, spatium seu sutura penem & anum intercedens *πρόσθιον* Græcis, Latinis vacat nomine. Duos habet insignes meatus, alterum urinatum, seminarium alterum: quibus cum opus natura utitur. Pudendorum, ac naturalium viscera citra inflammationem abortu, medicamentis indigent, quæ vehementer resiccant. Esturationis author Fuchsius de Med. morb. li. iij. cap. xlij.

*Penis* in feretro *σφαγῶνος*, καὶ *σφακῶς* *ῥυόν*, muscus è ramis eius, & cortice dependens odoratus, cubitali magnitudine. dicitur & pennis, vulgò vna dæmonum. Quid sit, incertus non ausim affirmare. Atque hæc ex Ruell. Gesnerus.

*Pentaphyllum*, vel pentapetes *πένταφυλλον*, hæc quique folium, quæ Tormentilla officinis creditur: quæ modò quinque folia, modò septem sæpe visa est: ut & Eupatorium, quod etiam pentaphyllum Galeno lib. v. Compos. pharmac. dicitur. Tormentillæ radix venenis & pesti resistere iudandum expertum est: ut si non sit quæ scribitur Gal. hæc eius loco usurpari potest.

*Peplos* πείπλις, herba maritima, quæ & peplion, & portulaca sylvestris dicitur: frutex est lactei succi plenus, foliis paruis, ut rutæ, paulò latioribus: rotunda coma, humi respersa, semine sub foliis rotundo, minore quàm candidi papaueris, pluribus pollet auxiliis. nascitur inrer vites, & in hortis. colligitur mensibus. Seplasiariis hodie Efula rotunda, siue coronaria, quæ inter Tichimallos miscetur. Est præterea peplis, quæ & Dios. peplus, id est, portulaca sylvestris. Hipp. verò pepliò: maritimis maximè nascitur, latè opaco frutice, candidi succi pleno: foliis satius portulacæ, rotundis, infernè rubentibus: semine sub foliis rotundo, seruente gustu: iisdè sacularibus, quibus peplis pollet. Diosc. li. iij. cap. cxlix. & cl.

*Pepo* πείπον, eius generis vnam, ob dulcedinem, odoremve gratum spirantem, saccharinum vocatur: alterum, satium simpliciter appellatum: vox quoque Pepo, est quæ intelliguntur fructus Autumnales, dum maturuerunt: tamen propriè pepon, Columellæ Melopepo nuncupatur. St. Carolus requirendus est.

*Perca* ἡ περκα, alia marina, alia fluuiatilis: marinam loco inter sexatiles reposuit Galenus: & quæ, quam fluuiatilis, laudabilior esu agnoscitur.

*Perdicium*, & helxine περδικιον, καὶ ἐλξιν, parietaria, & muralis herba: ea namque perdicæ ad purgationem oblectantur: vnde nomen ei quoque contractum. Quæ re dict. Helxine.

*Pericarpum* περκαρπος, bnlbi genus est, cuius species duæ: cortice rubro alterum, alterum nigro, papaueri simile sed vis maior, quàm priori: vtrique autem exal-faciendi facultas eadem: idè contra cicutam ex diluto quopiam bibuntur, ex Plinio Gesnerus.

*Periclymenum* περικλυμένον, Latinis vulgaribus Caprifolium: Largo Matris sylua interpretatur: & si nomen hoc à nonnullis confusum legitur. Simplex fruticat, ex interuallis parua folia habens, ipsum amplectentia, subcandida, hederacea. inter folia furculi exeunt, in quibus bæcæ, hederæ similes: flos sabæ, candidus, quasi in solium procumbens: semen durum, difficilè que eruitur. nascitur in sepibus peculiari-ter. Diosco. li. iij. cap. xij. Quæ re dict. Caprifolium.

*Perispermum* περισπέρμα, verbenaca, quæ duplex effertur, recta scilicet, & supina: nascitur vtraque in triuiis, & a quolis, dodrantis magnitudine, & interdum amplius adolefcit, sed quæ sacra herba vocatur, ramulos emittit cubitales, aut maiores, angulosos, in quibus ex interuallis folia quercus, sed minora, angustiora que, colore aliquatenus cæcisio, flores purpurei, graciles. Dios. li. iij. cap. l. & l. Quæ re dictionem Verbenaca, & Sacra herba.

*Persea* πέρσεια, alia à persico arbor est, aliquibus Rhodacena interpretata, sed nostro orbi incognita, AEGypto persa miliaris: hæc tamen lo. Agricola nostram persi cum pomiferam esse contendit. Dios. li. j. cap. cxlvij. Quæ re dict. Malus persica.

*Personata*, siue personatia ἀρκαῖον, ἀρκτηον, καὶ προσωπίον, Diosc. Arcion: vulgò Lappa maior, & Bardana. folia habet cucurbitæ, maiora, & hirsutiora, nigriora, & crassiora, caulem albicantem, quanquam interdum vidua: radice intus candida, foris nigra. Sed persites pediculos cubito maiores habet, crassitudine pollicis, à quo præ-grande folium, galeri modò amplum, seu fundus dependet. A Dios. species differen-tes li. iij. cap. xcij. Quæ re dict. Arcion.

*Petasites* πέτασις Bardana grandior, rusticis Glaterona: cuius foliorum pedi-culi crudi cum sale Gallis, & Italis eduntur. extillata herbæ huius aqua ad secundas post partum, & alui torminibus, necnon colyca vexatis benefacere experimento est. substituitur quoque eius semen ad vnius drach. pondus cum vino albo potum.

*Pes leporis* λαγωπούς, καὶ λαγύπυρος, hoc est, leporum herba: lanuginosa flo-ris panicula, leporis imitans pedem: quæ est trifolij specie. in arvis segetum persami-liaris: herba Trinitatis: atque tum Hippocrates eam Lagopyrum descripsit. Quæ re dict. Lagopus.

*Pes miluinus* Gesnero κορυμπρούς, à Columella qualis sit, quasi vulgaris omni-bus, non docetur. Ruell. herbam cornucervinam olitoribus dictam, hodiè que aceta-tiis familiarè, suspicatur. Gesnerus verò Cornucervinam, Coronopodem, & rectè quantum consilio, interpretatus est. Quæ re dict. Coronopus.

*Petilius* flos, memoratur à Plinio tantum, quod ad tempora nostra fuerit incogni-tus: verum quantum conicio, flos ille est in Gallicis hortis sub nomine Gyrophleæ Arpinatum, omnibus valde cognitus graui odore, & implacido: colore croceo veriùs, quàm citrino, vel flauo: ad coronas tantum communis. Cæterum odoranti men-tem obtundit, & ad vertiginè paulatim eius rei ignarè inducit epilepsià quoque mouet.

*Peganon* πηγανον, Ruta vtræque, mas scilicet & femina. Plinius li. xx. cap. xij. Est item ruta satiaua omnibus nota, quæ odore & gustu, pestilenti aëris inspirationi mede-tur: præterea etiam agrestis ruta, quæ est tetri admodum odoris. Diosc. sub hoc nomi-ne Ruta, vtræque sub cap. duobus & diuersis scripsit. li. iij. cap. xliij. & xliij. Quæ re dict. Ruta.

*Petroselinum* πέρσινον, in petris, & montium præruptis nascens apium, non

hortense hoc nomine appellatum, cum id simpliciter apium sit. Petroselinum hodie Ostrucium, siue Imperatoria, in montibus, & saxosis nascens, ex hortensis apij figura videtur: atque inter apij genera omnia amarissimum, acerrimūque gustatur. quod Galde petro Macedonico, & Estreatico scribit, idē huic accidit. Ea sēdem omnino vires vulgus nostrum de eo pollicetur, quas de petroselino veteres. Allobroges, vt Alpini, ad omne morborum genus, quasi panacea, vtuntur: quæ morbis omnibus remedium pollicetur. Diosc. li. iij. cap. lxx. Quære dist. Apium & Imperatoria.

*Pencedanum* *περιένδιον* apud Diosc. li. iij. cap. lxxxij. conuenit aliquatenus vulgato fœniculo porcino, dicto officinis: aliis Empetro, siue Saxifrago. Quære dist. iōnem Empetrum.

*Pericardium* *περικαρδιον*, inuolucrum est quod circunquaq; tegendo cor ipsum ambrat, & causa refrigerationis, humectationisq; aqua plenum: cutis radix non ex ipso cordis corpore, sed ex vasis inde procedentibus oritur, quorum alterum est maxima arteriarum sinistra parte positum: alterū vna ē iecinore sursum versus per dextram regionem tendens, & pectori connexum est: qua maximē ipsius vertex, & quædam vtrinque verticis partes habentur, non autem cordi coheret: verum quædam parua regio intermedia est motui cordis accommodata, in quam aquea quædam humiditas colligitur: interim tam copiosa, vt cordis palpitationem, quam Græci *πυλμων* vocant, excitet.

*Pectus* *πτερὸν* in medio quidē costarū adiacet, quod costas veras excipit, nominatur medicis. Alij inferiorem pectoris partem sic appellant, superiorem verō *επὶ θώρα*.

*Pericranium* *περικρανιον*, membranula nervosa est, totam comprehendens caluariam. Quære dist. Caluaria.

*Peritoncum* *περιτοναϊον*, membrana prætenuis, latis aranearum telis simillima apparet: post abdominis musculos, qui octo numero, sequitur.

*Peripneumonia* *περιπνευμονια*, inflammatio pulmonis est, quam quādoque sequitur sanguinis aut excreatio, *ἀμικπτοῖς, καὶ ἀμικπτύσις*. Hæc plurimum ex valentibus in pulmonem destillationibus, aut angina, aut asthma, aut pleuritide, aliisve morbis contrahitur. Aliquando etiam ipsa inflammatio passionis origo est. Fuch. de Med. morb. li. ij. cap. vi.

*Perniones* *χρῆματα*, vlcera sunt quæ hyberno tempore in manuum, pedūque digitis, nec minus in posteriore calcaneo, hoc est, talo, oriuntur.

*Periscaria* *κράταυρον*, καὶ *πύλκρινον* Hippocrati, καὶ *πύλινον* *ἀρπιν*, vt alijs legitur, herba dicta est: & vulgō Curaygia. Quære dist. Cratæogonum.

*Pauo* auis ambigui generis, *ὁ πάυς* dicitur Græcis, *πῶς τῶν παρῶν τισὶς*, id est, ab epandendis alis. Galenus scribit huius auis carnem, quā phasianorum, & Atragenum duriorē, fibrosiorēque, & ad coquendum difficiliorem esse.

*Pestilens* febris inter putridas numeratur, quæ ab inspiratione aëris pestilentis fit: & quod ex putredine ortum habeat: circūstās enim aër à putrescibili euaporatione vitiat, humores corporis etiam putrescere facit. Gal. li. ij. cap. vi. de Different. febr.

*Perdis* *ὁ περδὶς*, καὶ *καρχαδῆς*, ab Athenæo auis hæc dicitur cuius caro à Galinæ ea, quæ ad coquēdum sunt facillima, refertur. Duplex habetur genus, vnū rostro, & pedibus rubris: plumis croceo, & cinetico colore intermixtis vestitū, magnitudine, & nutrimento genus alterū exuperans: verū quod est ei corpore inferius, carne multo delicatius odentibus perhibetur. Quantæ sic salacitatis perdis grandior febre continua agitatis, qui eius carnem gustarunt, aucto mox calore vehemēti satis exponiuntur suo cum magno malo. Super quare in-quendam sic allusimus:

*Perdici quam tecum censenda faciles*

*Contendo, cum plus passere crede, salax.*

*Qualiter bine luxu tecum passereulus ardet.*

*Perdici pariter dum furis, ardet amor.*

*Nodum denodans, auis est febrientibus inquis*

*Congrua quam rursus continuisque moneri.*

Ergo

*Ergo eris agrotis, censes quos febre vagari,*

*Perdici proprius lesa per ora cibis.*

*Periodus* περιόδος, est ex intensione & remissione, in quacunque ægritudine tem-  
pus: nam in intermittentibus febribus medici periodum appellant spacium illud à  
principio vnius paroxyismi ad initium alterius: unde periodice febres sumptæ sunt no-  
men. Quære dist. Febris.

*Pessus* seu pessariū πισσός, est lana cōcerpta, & ad digiti formā rotunda, in qua me-  
dicamenta excipiuntur, æ genitalibus mulierū partibus induntur. Fit pessus ex cera,  
oleis, anseris, aut anatis, gallinæ vè pingui, butyro insulso, resina, medulla, & odoratis  
partim medicamentis calorem mouentibus, partim astringentibus, æ simul refrige-  
rantibus: nōnullis etiam superflua educētibz pro morbi varietate postulant. Fuch.  
Compof. medica. li. ij. cap. xxiii.

*Paroxysmus* παροξυσμός, febris exacerbatio est, nam febris cuiuscunque concita-  
tionem medici omnes accessum vocant, hoc est, exasperationem: quæ status temporis  
huc fieri consuevit. quædam Acautis febribz.

*Paroxysmos* materiz longiores, ampliores, frigidiores, crassæ, viscosæque operan-  
tur: pauciores verò subtiliores, & calidiores breuiores. Rarum quidem corpus quan-  
tum in seipso breuiores operatur paroxysmos, dentius verò longiores: robur quoque  
virium breuiores operatur paroxysmos: imbecillitas autem proluxiores. Nam sortis  
virtus, & exquisita patatiūs à se ipsa, quod alienum expellit: eorporis autem raritas  
non detinet quod fertur. Paroxysmi itaque omnes quæstifariam diuiduntur, in prin-  
cipium scilicet, augmentum, statum, & inclinationem: at vnus quandoque paroxys-  
mus comprehendit principium, augmentum statum eius. Est ergo paroxysmorum  
febris status, residentia paroxysmi febris secundum dispositionem vnā, vel alte-  
ram. Gal. ij. li. de Different. febr. cap. xi.

*Phaca* αγρῆστis φακή ἀγρία, id est, lens syluestris, siue lentis palustris genus: ma-  
ior ea, catens similiter folio, non in aqua, sed vliginosis dilutisque nascens. Est quoque  
phacos ὁ ἐπὶ τῶν τελευτῶν, lens palustris, vulgò lenticula aquatica nuncupata.  
Diosc. lib. iij. cap. lxxvj.

*Phacor* φακός, leguminis genus cōmune: frequenti cibo æciem oculorum obrun-  
dit. ægrè concoquitur. Stomachum malè habet: eumque & intestina inflat, sed aluum  
eum corrice cōcta sistit. aliorum spicis iniectis coquendo corrigitur. Diosc. li. ij. cap.  
xcix. Quære dist. Lens, & Lenticula.

*Phalangium* φάλαγγιον, à phalangio serpente, & scorpio, quorum venenis subue-  
nit, sumptis herba nomen: ramuli sunt ei duo, aut tres, pluresvè in diuersa tendentes:  
flos candidus, lilio similis, multas incisuras habens, semine nigro, lato, ad lenticulæ  
dimidiatæ figuram, multò tenuiore: radice parua, tenui, herbacei coloris, dum à tex-  
ta eruitur. Diosc. li. iij. cap. c. Est item phalangium vermiculus in eruo legumine in-  
uentus: atque aliud serpentis genus, de cuius morsu curatione, idem Diosc. lib. vj.  
cap. xxxvii. & xxxix. Est phalangium nomine Isosminum strutex.

*Phalaris* φάλαρις, seges est cauliculos zææ seu speltæ quæ emittit culmis similes,  
minoris æ nullius vus radibus, multos, duum palmorum, graculis cinctos, graci-  
liores tamen, ac dulces: semen candidum, oblongum, milij magnitudine. Diosc. li. iij.  
cap. xxxvj. Ruel. li. iij. cap. lxxi.

*Pharicem* φάρικον, veneni genus ab Athenæo est, quod apud Diosc. li. vj. cap. xix.  
sapore sylvestre nardum imitatur. Resolutionem neruorum potum affert, eum con-  
uulsione, & delirio sed vinum absinthites potum soluit.

*Phasioli* φάσιλοι, Galeno, & Aëtio φάσιλοι, leguminis genus est: Eruiia, & Smi-  
lax Latinis. phasioli infant, spiritus cient, ægrè coquuntur, virides cibo aluum emol-  
liunt, ad vomitiones idonei. Quære dist. Smilax.

*Thasnia* φάτινια, ossa sunt quibus dentes continentur: quæ subeunt foramina,  
Bothria appellata. Gal. de Ossibus.

*Thellandrium* θέλλανδριον, heleoselinum, hoc est, apium nascens in locis palu-

stribus:cuius bibitur semen propter vsciez, & renum calculos, & eorum quoque incommoda, vt Plinius scriptum reliquit. Neque pro Lauere, neque pro phylipendula herbarius vulgaribus vocata, sed pro silere aquatico, id est, apio palustri, folio apij horrensis æmulum, ex Ruell. Phellandrium suspicandum est.

*Phellos* φελος, suber est: à sua nimirum leuitate Ligerium vulgò dictum. Plinius phellodytn suber esse, aut ab eo nihil differre, contra Theophrasti sententiam, scripsit. Quare dict. Suber.

*Phlomis*, & phlomidis φλομῖς, καὶ φλομίδης, Diosc. verbascum est li. iiii. cap. xc. quod & officinæ Tapsum barbatum appellant. Quare dict. Lychnitis Thryallis, & Verbascum.

*Phylanthropos* φυλάνθρωπος, a parine herba, mulierculis gratterona vocitata: ramis multis, & paruis fruticæ, asperis, quadrágulis, per interualla orbiculato foliorum ambitu, vt in Rubia. flos albus, semen durum, rotundum, concuum, album, vmbilici figura, asperitate vestitum tenaci. Quare dict. A parine, post Diosc. li. iij. cap. lxxxvj.

*Phyladelphum* φύλαδελφός, floris genus in Parthis tradit nasci Apollodorus, quoniam rami eius ex interuallo sponte coeant, seu animantes, post digrediuntur, concipiant, & pariant. huius tenuissimis virgis reticulatim compositis, atque ita confixis horum septa impenetrabili compage fieri. Atque hæc vniuersa descriptio Iesmino Gallico videtur congruere, vtrum tamen phyladelphum Iesminum sit, non ausim asfirmare. Quare dict. Iesminum.

*Phylipendula*, Diosc. Oenanthe est: quâ suo loco descriptam reposuimus, requires.

*Phleum* φλόν, aliqui ex Theophrasto, & Plinio, stebem esse volūt: in folio & cau Iespinam fert, radice non in profundū acta. Strabo in Aethiopia Arabiæ aduersa nasci testibit: & in Orehomenio lacu copiosum id haberi, à quo nomen. Nam φλεὺν fecundum & copiosum interpretatur. hæc ex Ruell. Gesnerus.

*Phlum* φλόυμ, phleon non est, sed cuius lanugine ad lixiuam mulieres vtuntur, molle, & placentarum figura, colore rubicundo non discrepans. Fœmina sterilis est, ad nexus idonea: sed mas inutilis: pueris tamen pars herbæ huius à radice cibo grata est: atque radix ipsa pecudum pabulo vellitur. Phlum, vnde vestes phlonias, ex Herodoto, & Pausania; Pollux nominauit. ex Ruell. Gesnerus.

*Phoenix* φῶνιξ, palma arbor, à qua phœnicobalanus, φῶνικος βαλανός, δακτύλος, id est, palmæ arboris glans, & palmla, siue etiam dactilus, seu ficus regia appellata est. Verum phœnicobalanus Dioscoridis Tamar Indus Manardo videtur, contra Io. Agricola sententiam. Palma Arabici Myrobalani similis, colore viridi, & odore mali coronel: quod si ad maturitatem peruenit sinatur, phœnicobalanus fiet: acerbæ est, & astringens in Aegypto gignitur. Sed quæ Elate aut Spaltha appellatur, fructus palmarum adhuc florentium, inuolucrum est calyxque, quo in spissamenta vnguētarij vtuntur. Diosc. lib. j. cap. cxxvj.

*Phoenix* φῶνιξ, herba quæ hordeum murium vocatur: nascitur frequentissima in triuitorum locis: folio hordeaceo tora herba spectatur, & spica minoris spelte non dissimilis, aut folij. Diosc. lib. iij. cap. xxxv.

*Phormion* φῶρμιον, orualla, & tota bona olitoribus: cuius Gal. in Simpl. intelligentia ad oculorum albugines, benefacere & infixa tela corpori educenda, meminit. Aegyneta Horminij, & Phormij speciatim facultates discriminat. Quare dictionem Orminum.

*Phrenitis* φρενίτις, cerebri aut mēbranarum eius inflammatio est, cuius res precipue oriuntur differētiæ: aut enim imaginatrix sola facultas est seruata illa, aut ratio tantū patitur salua imaginatione: aut media cerebri parte patiēte, rationandi vi euersa: aut et summum imaginatio simul, & ratio læduntur. Quare Gal. li. ij. de Symp. causis, & de Symp. differ. item de Locis affect. lib. iij. cap. j. Curationis integre author Fuch. li. j. de Medend. morb. cap. xij.

*Phryodes* φρύκοδης, sebris est quæ admixtam habet frigori caliditatem & pusillus est valde debilis, vt: pote ad tactum qui vix perueniat, aut non cadat sub sensum, sed est penè extinctus: venter tumefactus sublatrat & instrepit: lingua humida valde, aridum



dum quiddam, & amarulentum, veluti maris spuma lota, habet.

*Phyma quidam*, ex Galeno glandium inflammatio est quæ citò augetur, & ad suppurationem festinat. Aliquibus verò, communiter omnes præter naturam è quacunque particula corporis erumpentes tumidi abscessus, seu tumores, phymata, siue tubercula nuncupantur.

*Phagedæna* quædam, vlcus est quod serpendo propinquas, adiacentisque partes sanas corporis excedit. Est item Phagedæna dispositio, in qua cibi plurimum appetimus, immodicèque sumimus, nec potest contineri, sed delicitur, atque denuò assumitur ex appetitu vehementi.

*Phæreas* serpens, qui reliqua corporis eleuata parte, sola serpit cauda: vt author est Lucanus, inquit:

*Est contentus iter cauda sulcare Phæreas.* Quare Gal. in Theriaca ad Pisonem.

*Phlegma* est non aquea serosâque humiditas, sed siccâ, & retorrîda, crassâque pituita: inarescit enim ac crassescit febriū longitudo, quales errant, vagæque sunt. Gal. ad Glauclij.

*Phasianus*, cuius caro quoddam concoctionem & nutritionem attinet, gallinarum carni similis, nisi delicatior esset, voluptatē quoque in ædêdo superat. Huius tres sunt ex specie differentiæ: vna nâque Bruyanorum, secunda Gentilium, sed tertia Gallinaginum phasianorum in ædendo delicatissimorum est. Quare dicit. Gallinago.

*Phlegmone* φλεγμονή, inflammatio est, quæ supra feruorē, & effernescentiâ, tumorē rubentē, dolentē, durū, & tactui renitentē, significat. Verū vox Phlegmone aliquādo cōmuniter sumitur pro omnibus calidis, & dolorosis cū feruore tumoribus: quæ in significatione φλογώσε accipi solet. Sic sane Erysipelata, herpes, & carbunculi, phlegmones dicuntur. hoc in significatu ab Hippocrate, & aliis veteribus medicinarum scriptoribus, vox vsurpata est. Quare Gal. lib. ij. ad Glauclij, cū explanatione Acakiz.

*Phu* φῦν, Valeriana est, quam quidam in marem; & feminam diuiserūt. Dioscor. cæterorūque Græcorum scripta valerianæ nostratis plurimū exprimunt, nisi florum, qui moscario pusilli habentur, magnitudo desideretur. Phu Ponticum aliquid habet simile Nardo, & Petroselino, seminibus quoque cæteris vrinam mouentibus. Gal. lib. viij. & ix. Compositi. pharmacorum antidotis inferitur. Diosc. lib. i. cap. x.

*Phrygius* lapis, quo insectores in Phrygia vtuntur, vnde ei nomen: gignitur in Capadocia. Optimus habetur pallidus, modicè grauis, non solida corporis compage, intercedentibus albis fegmentis, vt in Cadmia. Vis crudus, vtrōque adstrictoria, expurgans. Lauatur vt Cadmia. Diosc. lib. v. cap. lxxxvij.

*Phycos* θαλάσσιον quædam θαλασσινόν, id est, fucus marinus: cuius genus vnū latiore folio, prasiū à colore dictum: alterum longius, prasiū etiam appellatum: tertiū gramini simile est. Pelagicū autem folio crispo lactuæ, in altis rupibus, & ædicit, filli eibūsque enatum: Feulū rusticis, quasi fucum appellatum: & Democrito pseudo conchylion, hoc est, conchilij æmulum. Quare dicit. Conchylion.

*Phoca* φαῖς, vitulus marinus, ex genere Cetaceorum: ob id carnem habet duram, extremitatūque.

*Phyllon* herba φύλλον ποτὶ καὶ ἐλαφύλλον, vocatur: nascitur in saxosis duū generū est. quod autē theligonū θηλυγονία appellant, vnas habet floribus oleæ similes, sed pallidiores. Sed arthegonum ἀρθηγόνον solo fructu distat: habet enim racemosum quiddam deflorentibus oleis non dissimile horum Cratænas author est. Est præterea phyllon Lybicum, & Aethyopicum, quod vtrūque Hippocrates Silphij semen appellat. Quare dicit. Folium.

*Phyllitis* φύλλιτις, hemyonium, id est, Lingua ceruina cum eordo quandoque visâ est: nō verò hemyonium, siue hemyonitis Lingua cerui cum Ruell. Dioscoridis descriptione, deprehenditur. Diosc. li. iij. cap. cij. Quare dicit. Hemyonium.

*Picea* πικρία Theophrasto arbor à pino paulū degenerans, & figura, & altitudinē quæ pix resina illachrimatur. Est & piceaster πικρὸν ἄγρια, id est, pini sylvestris altera, familiaris in Seguciæ Belliciorum iugis ob lachrimæ frequentiam & quæstum: Quare dicit. Abies.

*Picra* τικρά, id est, amara, unde hiera picra, hoc est, excellentē amara: aduersus humores qui altius in ventriculo impa&ti sunt, atque adeo agrē reuellantur, auxiliū affert: eos namque sine molestia extrahit. Confert etiam iis qui suffusorum imaginationes, aut symptomata ex stomachi affectu patiuntur. Præterea quibus adstricta est, & mulieribus, quæ non probē purgantur. Compositionis auctor est Galenus Sanitatis tuendæ libro sexto. Nos in hydropotem pseudomedicum de picra hiera hæc obieciimus:

*Inuidi mens torques sensus, animumque valentem,*

*Ingenium nullis cedat imaginibus*

*Si Celsum, Largumve sequor: pro teste Galenū*

*Expono, Hippocratem laudis amore peto!*

*Hydropotem medicum cileis minus esse Galenū:*

*Hippocratem, Celsū, Scriboniumque patet.*

*Myrcor Auicennas, sic myrcor Auicennas infertur*

*Vinosus Mesues, Bachioquusque Razer.*

*Scilicet hos omnes dudum voluisse fateri,*

*Hauris aquam sed in his frugis at ipse nihil.*

*Subuertensque probi, tractas mendacia, formas*

*Authoris: methodo complacēdūque tuæ.*

*Enomir in picram, iccori, stomachoque nocere.*

*Subuersis facis hæc sola sed ipsa, referi.*

*Omnia si nunc scis, nec scis quid picra vocetur:*

*Nec quibus in morbis tota petenda memor.*

*Subuertens picram, quotiesque medeberis agris,*

*Subuersum toties ventriculum ipse vomas:*

*Picra* τικρά, cichorium amarum, sylvestreque est: quod aliquibus heliotropium appellati placeat, sed ab ipso longē differt. Quære dict. Cichorium, & Heliotropium.

*Pinus* πικρα, à picea, & abiete arbor diuersa: estque nōtū vulgaris: sed pinus masculina ἀνδρική, Græcis vocatur, ab arbore autem pinu fructus pinea nux πικρός, ὀπωγία, appellata est. Quære dict. Nux pinea.

*Pica* ἡ πικρα, avis cuius nota, humanas quæ effingit voces: Persius poeta.

*Picas* quis docuit verba nostra conari? magister artis, ingenique largitor veniet, negat sequi voces. De huius avis carne ad ciborum vsum nemo fuerit appetēs, neque sollicitus: nam canibus rabidis dicata augurantur.

*Pica* ἡ πικρα, malū est quod mulieres vitiosis resectis humoribus infestare consuevit, grauidas præsertim: appetūt enim maxime per hoc acida, & acerba, non unquam atria etiam interdum vel cymoliam terram, vel testas, vel extinctos carbones aceto maceratos, aut alios huiusmodi cibos absurdos. A varietate plurimarum picæ avis, vel quod hæc ipsa sæpenumero hoc vitio laboret, morbus hienomen accepit.

*Picus* μαρτίος, seu cubitus, vel vlna, fossile maius appellatur: quo etiā nomine pars hæc tota dicitur Brachium Celsō. nam cereis seu radius, fossile minus est, & constat brachium ossibus duobus, vlna videlicet, & radio compositum: sed cubiti, id est, vlnæ tubus seu caput, ossis adiutorij annexum, oleocranium appellatur.

*Piper* τικρι, discernitur triplex sub genere eodem, nigrum, album, & magnum: quod peruenit ad maturitatem, sit colore nigrum: quod nondum maturuit, sed maturefcit, colorem album seruat postquam immaturum carptum est: longum autem, piperis fruticis, vt in corylo arbore, flos dependens, prius fructum, quàm concipiat, colligitur. Diosc. li. ii. cap. cli.

*Piper* aquaticum ὕδροπικρον: & piperapium. ἡ ἀκορὰ Apuleio appellatur quoniam a pes suspensa à lueariis earum herba, examinibus non diffugiant. Quære dict. Hydropiper: & Acorus.

*Piperis* τριπύρις, siliquastrum, hoc est, costus hortensis Ruell. suspicatur: cuius scriptum neque probat, neque improbat Gesnerus: quāquam pseudocostus siliquastrum esse non verisimile est. Siliquastrum enim piper. pedemontanum est, ubi que frequens. Quare dicit. Siliquastrum.

*Florum palpebræ* inuersio. τριχίσις, est ubi pili inuales, & oculis pungentes, in palpebris nascuntur: quemadmodum δυπριχίσις est cum sub naturali ordine pilorum, palpebræ, alius ordo successit. Nequāb his λόγῃ quidē παλαγγίσις, palsio, in qua pilorum subnascitū duplex, triplexque acies, vel in superiore, vel in inferiore palpebra provenit. Hoc fit, cum cilium intropsectat, pilorum acie simul cum eo inuersa.

*Pissasphaltum* plerisque medicinarum authoribus Mumia est interpretatum: neque etiam ignorandū Serapionis Arabis Mumiam Pissasphaltum Dioscoridis esse, si authoris verba vires, & locus in quo reperitur inter se conferantur, cum picis, & asphalti vires representent. Quare dicit. Asphaltum. Diosc. li. i. cap. lxxxiij.

*Pistacia* τριδάκτυλος officinarum vulgus histicos vocat. Est pistacium fructus strobulo proximus, qui ex Syria copiose affertur. Nicander vocat pistacia, quæ nuci Græcæ, hoc est, amygdalo nostrati figura quadanteaus responderet. Diosc. lib. j. cap. cxli.

*Pistolechia* τριπόλον χαλκ, Aristolochia species quarta, quæ clematidis existimatur: tenuior cæteris, densis radices capillamentis, iunci plenioris crassitudine. hanc quidā polyrrhiliū cognominat. odor omniū medicatus, hæc ex Theophrasto Ruell. li. iij. capit. iij.

*Pisum leuobos*, ad leguminū genus omne variū nomē hoc usurpatur, sed ad albū potius, quā ad cætera cōuertitur: hoc quod habetur cādidū, alimēti crassi, terrestrisque est, ad sanguinē crassū generandū offenditur: status gignit, & stomacho pōdus intollerandū. immaturū vtilius coctum, quā quod maturum meritur, & estur.

*Pinguedo* τριπύλη ab adipē seu sebo, quod τριπύλη nominatur, differt, quia crassior adeps est: ac propterea animantibus totam naturam terrosiorem habentibus seuum provenit, velut humidioribus pinguedo. Sunt qui omnem oleosam, & pinguem in animantibus substantiam adipem appellēt: sed & pinguedinem totum genus hoc nominare licet. Quare dicit. Adeps.

*Pityr* πύρις, picca arbor, & pini species: unde pityides, id est, strobili, pinearum nuclei internide quare vide plura in dict. Picea & strobili.

*Pyrysa* πυρυσσα, vulgō Esula, cuius radix Aquario Turpetum simpliciter est: & ad vñm eundem hodie vulgares Sepiasarij colligunt, turpetique vice medicamentis supponunt. Quare dicit. Esula, & Turpetum.

*Pix* densa vel arida πυρσα. ἔμφρ. πικραπύσσα, vulgus pharmacopolarum picem Græcam esse contendit: ex Ant. Musa Colophonica, & Hispana est. Cornarius tamen resinam frictam πυρσί, Græcis dictam absolutē, Colophoniam esse attestatur. Præterea pix liquida ὑγρὰ πυρσα, pix navalis officinis est, quæ ζόπυρσα differt, id est, resina ē marinis naubus cum cera detasa.

*Plegma* πλέγμα, humor frigidus, ac humidus, colore albus, concoctione in sanguinē mutatus: atque hac ratione cum sit veluti ex dimidio coctum nutrimentum, nullū quod eam expurgat propriū organum machinata est natura. At pituitæ sedes in fundo ventriculi, & membrorum iuncturis esse scribit Gal. in li. de Humor.

*Pituita* in ventriculo generata, fertur cum his quæ ex cibi, potūsque humoribus in iecur distribuuntur, cōcocta iam, sanguis euadit: quod autem pituitæ in venas fertur, animali etiā ex vñ est. Desiderat igitur non utique euacuari, sed in corpore manens alterari: quod verò in intestinis relinquitur, à bile ex iecinore in ea defluente abstersum, commodissimè, ac celestīmè per sedem eiicitur. Gal. li. v. de Vñ part.

*Pituita* efficit segnes, somnolentos, carnosos, cito canescentes, eius quoque vñs, ut articulorum motionem adiuvet, domineturque ab hora noctis tertia, vsque ad horam noctis nonam.

*Pituita* nō naturalis quatuor sunt species, vna siquidē eius species valdè frigida est, adeo ut si calido loco obstruitur, dolores maximos excitet: Galeno auctore li. ij.

de Differentia februm, cap. v. hic humor etiam vitreus appellatus est eodem Gal. li. ij. Locor. affect. cap. i.

*Pituita* species altera est, quæ acida expuentibus videtur, minùs, quàm vitrea, magis verò, quàm dulcis, frigida.

*Pituita* species tertia, est quæ cum creatu expuitur, sensilem obtinens dulcedinē, idcircoque duleis nominata: sed non ramen exquisitè frigida est. Species quarta, est sal-sa, videlicet aut ob partēdinem, aut ob falsæ serosæ humiditatis mixtionem.

*Pituita* etiam euacuatio, per medicamēta quæ in ore retinentur, & commanducantur, perficitur. Græcis δ' *ποφλημῆτιοι* vocatur, hoc est, à pituita quam ex capi-te trahunt. Sternutamenta quoque sub iis comprehenduntur, & cientia medicamen-ta, quæ per nares ipsas cerebrum euacuant.

*Plantago* δ' *προγλῆσσον*, latifolia, & nervalis Apulleio appellata est & minor plā-tago folio angusto, sed longiore, ad vsum quo superior quæritur: & præter hæc duo ge-nera, tertium est, folio rotundiore sessili, hirsuto, in vfu medicorum frequentissimū. Diosc. lib. j. cap. cxix. Gal. Simpl. lib. vj. & Compos. pharmaco. iij. Occurrit denique *Planrago* aquatica, de qua in dict. Alisma, & Arnoglossum.

*Platanus* δ' *πλάτωνος*, à foliorum latitudine arbor est appellata: similitudine, & fi-gura foliis vitium simillima cui congener in montium Segusiz iugla reperitur, fru-ctusque castaneæ parū simillimo, nec ingrato suibus impingandis colligitur. nam & apri fructu illo oblectantur vefcentes. Dioscorides fructū plarani pilulas appellat libro j. cap. xxi.

*Plenus* δ' *πλήνης*, ē mari palma palmulæ, id est, dactyli, sicut balani ē femina, proue-niunt, vt ex Polluce author Gesnerus est: vulgus sylvestres dactas existimat. Quære dict. Dactilus, & Palma.

*Plenitudo*, est quanto grauior videtur sibi homo, tantò etiam plenitudinem quæ ad vires dicitur, creuisse constat. Si verò actus fuerit tentionis sensus, ad auctam esse & alterā plenitudinem, quæ ad vasa nūneupatur, putandū erit. Plenitudinis qualitas, est quæ ex coloribus partim, partim ex iis, quæ humorum naturæ coniuncta sunt, agnoscitur.

*Pleuritis* δ' *πλευρίτις*, est membranæ intrinsecus costas succingentis inflammatio: quæ morbus lateralis dici potest. Fit ex sanguine copioso calido, vt aliz inflāmatio-nes ad membranas prædictas præter naturā confluent. Amerhodici duplicem falsò constituit: veram, quæ supra diaphragma ad costas veras: falsam, quæ infra diaphra-gma ad costas falsas ex inflammatione, generantur. Curationis est author Fuch. de Medend. morbis lib. ij. cap. v.

*Pleuritica* febris, est quæ ex membranæ succingentis costas inflammatione oritur: est igitur vena interna cubiti secāda: ac sine cunctatione sanguis secundum vires de-trahendus, aufertendusque, donec pro puro liuidus effluerit. Hipp. li. ij. Acutorum.

*Pogonia* δ' *πόγωνιά*, castaneæ barbatulæ dicuntur, quasi pubertatem ostentantes, nisi quis lanatas intelligat. Sunt etiam multæ pilis hirsutæ, quibus ostentatur Accu-sia Allobrogum inferior.

*Polemonia* seu polemonium *πόλεμωνιον*, herba est quam Myropolæ Beñ album vocant: eius radix candida, oblonga, tenuis, teresque, flos albus folliculo vasculi modo inclusus: folia polygoni multò maiora Ruell. saliniam erraticam existimat: aliqui her-bam Tunici: alij Rutam agrestem: nonnulli autem alij Rutam caprariam denomi-nant, vt I. Agricola scriptum reliquit. Diosc. li. iij. cap. vij.

*Plumbum* metalloꝝ vilissimum, sed ad medicamenta valde vtile: facultate sua frigidum & humidum, ob id liquor frigidus quiuis in mortario plumbeo ductus dū crassescat, se ipso frigidior euadit. Lamina plumbi in lumbis strata veneris insomnia sedat. hæc Syluius. Plumbum frigidum siccum, quia terreum facultate sua scribit Geberus. Plumbi medicamina docet Diosc. lib. v. cap. xlvij. Nā Plumbago Molyb-dena est: de qua loco scriptum inuenies.

*Poliū* δ' *πόλιον*, herba idem officinis seruans nomē: cuius ad multa remedia ve-nenato

*Polemonia* seu *Polemonium*  
est herba  
quædam.

uenatorum vsus probatur frequentissimus. Largus Tiniaria in appellari opinatus est. Constat montanum polium in vsu esse potissimum, in cuius summo capitellum habet, cano hominis capillo simile: quod cum Tripolio confundit Plinius. Polij duo genera facit Diosc. li. iij. cap. cv.

*Pondo*, ubi solum citra alterius ponderis nomen positum fuerit, vetbi causa, denarij librz, semuncie, vncie, &c. librā notari: pondo duo, libras duas: repondo, libras tres: verum si alteri ingatur, pondus ipsum signat vt pōdo selibram, quasi dicas pōdas selibrā: sic quoque pondo denarij.

*Tolenta* ἀλκυόν, ex hordeo madescto, deinde siccato, & tosto, fit. Preparatur autem hoc modo: Perfusum aqua hordeum siccant nocte vna, postero die frigunt, deinde molis frangunt, sermāntque in multos dies. Ruell. lib. ij. cap. xvj.

*Tollutio* nocturna, que in somnij est, οὐρανῶμος, id est, libidinis in somno imaginatio, ac seminis per somnia profusio. Est denique inuoluntaria seminis quoque profusio, quæ Græcis γονορροία est: id est, seminis excretio præter voluntatem, citra pudendi tentiginem. Fuch. de Med. morb. lib. iij. cap. xlij.

*Polygonum* ἀνθισανθῆμον, herba Origano similis, surculosa, solio origani: caule, vt pulegij, geniculis multis intercepro, sine umbella, tenui tamē in cacumine corymbo, boni odoris, & actis, ad vrinæ stillicidia ruptaq; cū vino bibitur. Diosc. li. iij. cap. xc.

*Polygala* πολυγάλα, sic nominata herba, quod lactis vbertatē pollicetur: nea suspicatur, quæ herbariis vulgaribus Crucjata, florem candidū, femina, & florē luteum mas, odoris suauis representans, vocatur. Diosc. li. iij. cap. exxv. Quare dicit Galien.

*Polypodium*, siue filicula πολυπόδιον, palmi altitudine, filici similis, subhirsuta, non tenui perinde diuisura, nascitur. Radix pilosa, in qua continetur cirri, seu polyporum, crassitudine digiri minimi, coloris intus herbacei, gustu subdulcis, purgandi a trahiliōsi sanguinis vim per paucā habet. Diosc. li. iij. cap. clxvj. Gal. Simpl. li. viij.

*Polycriton* πολυκριτόν, καὶ πολυκρίπον Hippocrati, est quod Dioscoridi fidelius κραττογονον: apud Latinos adhuc nomen hoc retinuit. Theophrasto Cratægon. Quare dicit Cratægonon.

*Polyrus* πολυρῦς, tumor est præter naturā natus in naribus, polypodis carni iuxta substantiæ proprietatē assimilis: cui affinis σαρκώμα, hoc est, carnis præter naturā in naribus incrementū. atq; affinis quoq; huic μυζα, siue humor ex naribus fluēs: qui mucus & pituita improprie nariū dicitur. Gal. lib. Secundū locos κατὰ τοὺς, iij.

*Polyrus* πολυρῦς, piscis, qui à pedū multitudine nomē inuenit: ex molliū genere est, pedibus octonis constans, per quos acetabula quædam dispersa habet: quibus quod apprehenderet, ita retinet vt auelli nequeat. Cæterum etsi ex mollibus est piscibus, tamen vt scribit Galenus, duram carnem habet, & concoctu difficilē. Aristoteles de Historia animalium lib. iij. Athenæus Dipnosophist. li. viij.

*Polygonatum* mas πολυγονάτον ἀρρῖν, geniculata radice herba, herbariis vulgaribus Sigillum Salomonis, appellatum. Est quoque polygonatum femina, officinis Liliū conuallium: vulgò Musquetum maius nomen retinens.

*Polygonum* mas πολυγονον ἀρρῖν, vulgò Cétinodia, Lingua passerina, & sanguinaria herba, quod sanguinē fluentē coërceat: & corrigiola, q̄repat humi, appellata: Apuleio autē Proserpinaca: cuius vires in lide re herbaria describit innumeras. Est & Polygonū femina πολυγονον θήλυ, Equisetum Latinis nominata herba, siue cauda equina. Rura Caballinā, & Pressam dicūt. Hæc ab radice numerosos gignit ramusculos: tenues, asperos, genicularos, coloris herbacei: sed radix nigra est. Verū polygonū femina fruticat vno caule, arūdini teneri simili, dēsis geniculis, & in se tubarū modo factis. articulos in orbem cingunt apices, foliolis piceæ similes, nascitur in riguis, vt equisetum: cuiusq; viribus pollet, paulō tamen mitioribus Diosc. li. iij. cap. iij.

*Polygonum* agreste, πολυγονον ἀγρίον, genus tertium adiecit Plinius, quod scribit pene simile arboris frutice esse, radice lignosa, stirpe cedri tubicunda, ramis sparti, binum palmorum, nigris, geniculorum ternis quaternisq; articulis: cuius sapor mali cotonei est. Hæc planta non inter herbas, sed frutices adscribenda est: quod arbusculorum

lorum minatur altitudinem, si pite & ramis sparti, id est, alterius genistæ, acro virore infectis, ternis rutæ foliis ex intervallo fufis, sapore indomito, radice lignosa. Ex ramulis dependent siliquulæ ternæ & quaternæ simul compactæ, ab eodem germine, teretes: in quibus sinapis semen haud ab simile. Vulgus genistulam, & trifolium lignosum vocat.

*Polypremum* τὸ λυπρῆμος, herba Theophrasto cuius succus caudicibus arborum illitus, arbores à noxa defendere traditur, & copiosiore edere fructum. An ea Sedum maius sit, dubitat Ruell. cuius succus eodem remedio aduersus bestiolas vsus est Democritus.

*Polytrichon* τὸ λυτρίχον, Adiantum album est, quod officinis Capillus veneris sicut trichomanes Adiantum nigrum effigiatur, altera capilli veneris species. De quibus capita speciatim fecit Dioslib. iij. cap. cxx. & cap. cxxj. Quare dict. Adiantum.

*Poli*, qui & cardines, & vertices dicuntur, sunt puncta axem terminantia. Omnis enim linea duobus finitur punctis: poli itaque duo sunt, Arcticus, & Antarcticus: alter Borealis, & Aquilonius, ac Septentrionalis: hic qui opponitur alteri, Antarcticus, & Noticus, siue meridionalis, à nobis nunquam videtur, sed ab Antipodibus: quos esse certum est. Poli utriusque sic descripsit Ouidius: utramque videlicet vrsam intellegens:

*Magna, minorque fera: quarum tenet altera Graias:*

*Altera Sydonias, utraque sicca, rates.*

*Pomum* δ' πῶρον, duntaxat fructus grandiusculus, eo nimirum quo veseimur, dictus: ut cerasum, prunum, pyrum, mespilum, appellatione poni veniunt: ab hoc quoque quod indigent potu, poma dici putat posse ex Varrone Gesnerus. Sunt præterea poma Serica, siue Syrica Columellæ, & Galeni ziziphæprovinciales Guyndolas vocat. Officinæ Iniubas.

*Pompholyx* τὸ μῦρ λυξ Græcorum, est quod isto seculo à Myropolis Nil appellatur: specie sola, non genere à Spodio, distat: Siquidem spodium nigricat, & plerumque ponderosius est, palearum pilorumque plenum: Pompholyx verò pinguis est, & candida, usque ad eod levis, ut in auras euolare possit: Cuius duo fluxerunt genera, vnum ad æris colorem vergens, subpingue: alterum magnopere candidum, summamque lenitatem natum. Dioslib. v. cap. xij.

*Populus* alba λευκή, altera nigra ἡ γαίρος. Albæ populi primus in folia germinis partus in vnguentum cum oleo, pingui & hyosciami succo, adito pingui, cogitur ad pleaque valde vtile: nigrae verò folia cum aceto illita vtilitate doloribus podagricis illinuntur. Resinam fundit coniectore Dioscoride, quæ in malagmata additur. Semen potum, quod neutiquam mihi visum est, ex aceto comitialibus vtile est. Quare plura in dict. Eleæti. Dioscorides lib. i. cap. xcij.

*Porri* ποτύριασις, est tenuium, ac fursuracearum squamularum ex capitis superficie, citra vlcerationem, resolutio. Barbaris Methodicis Furfur appellatur. hoc malum à pituita falsa mixta vitellina gignitur cholera.

*Portum* capitatum πορδὸν κεφαλῶν, & sectium, quod est aricinum, uti denique Tarentinum dictum κατὰ ἑνὸς γυθιδίου portum namque agreste, siue vineale ἡ μπελὸν πορδόν est: stomacho magis aduersatur, quam satium, & plus exalfacit, vrinam, & menses vehementius ciet: & contra serpentum morsus esse conuenit. Dioslib. ij. cap. cxlij. Quare dict. Ampeloprasum.

*Portulaca* ἡ ἑραχμή, Serenus pulli pedem vocat: sed portulacas sylvestres tres vocati auctores scribunt: vna, quæ ayzoi species, quibusdam telephyon, id est, faba inuersa: altera scrophulariæ: tertia peplion. Quare dict. Peplis.

*Potio* ποσιλία, potio est quæ fit ex aqua & aceto Græcis ὀξυκράτων denominata & refrigerationis vires sortitur. Sed ut Aëtius author est, si simplici ratione construa tur, refrigerat, & humectat: condita tamen & calorē sibi, & siccitatem adsciscit. Consuluntque medici Græci posteriores ea potione abstinendum, quod faciliè putrilaginem concipiat qui ex eo contrahitur humor: item propter noxam quam nervis infert.



fert. Ruell. lib. j. capit. centesimoquadragesimoquarto.

*Potamogetum* ποταμογενος, folium betæ simile habet, hirsutum, paululum supereminens extra aquam: ea creditur esse herba, quæ in vadis fluminum frequens emicat, betæ foliis, sed minoribus, super aquam expansis. Castor radice sanabat strumas, & duritias: quæ eius descriptione videtur Equisetum, non Diosc. potamogetum lib. iij. cap. lxxvi. Ruell. lib. iij. cap. cxxj.

*Poterium* ποτρυγιον, καὶ νύμφας, spinosus frutex, lanugine spissus, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus: foliis parvis, torundis: flore exiguo, candidi coloris: semine nullius usus, sed gustu acuto, & odorato. Nasceitur in aquis, & collibus. Galeus sub hoc nomine Neuras Poterium intellexit: utrumque tamen distinxit AEGyneta. Diosc. lib. iij. cap. xv. Ruell. lib. iij. cap. xv.

*Præcordia* πρεκορδια, humida & frigida, tum venæ pulsatiles, ac nervi frigidi, simul cum carne quadam spongiosa. At præcordiorum sanguis in mulierculis trāsire quodammodo in lac, sic dictum, succulentum. Quære dict. Hypochondria.

*Primula* veris, officinis herba paralytici in edulis, & acetariis non inutilis, neque ad medicinam insalubris. Quære dict. Phlomis, quoniam hæc ipsa est.

*Psalter* ψαλτος, flos duum generum, alterum hyacinthi flore: alterum sine colore candidum, quo sepulchra mortuorum olim coronabantur: quasi desideratis esse dictum, & à quo nomen. Floret æstate utrumque, diuturnius tamen candidum. hæc ex Theophrasto, & Plinio, Gesnerus. Ruell. lib. ij. cap. cxlv.

*Principium*, est quod cum non sit ex aliis, neque ex alterutris, ex seipso alia omnia fiunt, hoc est, res naturales omnes, Res autem naturalis, est quæ constitat ex naturis: sed rerum naturalium genera, sunt elementa, animalia, vegetabilia, mineralia, mixta, imperfecta.

*Principium* in morbis trifariâ sumitur, primum propriè, primus exquisitè insultus, seu prima morbi inuasio: quæ simplex est, & omni latitudine caret, appellatur. Secundò, principium, est quod latitudine obtinet, & ad tertium usque diè extenditur. Tertio, principium, est quod maximè à medicis intelligitur, totius morbi pars, quæ coctionis signis definitur: tunc enim primum finitur morbi principium, cum coctionis signa manifesta apparuerint. Quære dict. Augmentum.

*Præpissus* πρεπισσος, καὶ πρεπισσος, est pudendorum palpitatio, phlegmonosum quendam seminale vasorum affectu sequens, arriigente & intercedente se interim hominis genitali. Nomen huic malo secus prona in venerè Satyrorum inuenitur. *Præpion* πρεπιον, Marthubium album, sine odoratum est: frutex ab radice ramosus, candidus, subhirsutus, ramis quadrangularibus, folium pollicem æquat, subrotundum, hispidum, rogosum, gustu amaro, semen in caulibus, & interuallis. Flores verticillato ambitu, asperi, nascitur propter rudera, ruinas, & ædificia. Ex eo serapium ad stomacho malè habentes, & pleuriticis faciliatur. Diosc. lib. iij. cap. xcix. Quære dict. Marthubium.

*Prodromen* vinum, & προτροπον οἶνος πρεδρομος, καὶ πρεδρομος: è transmarinis in Lesbo nasci dulce scribit Athenæus. Galeno Lesbiu vinum, ut pote generosum semper laudatū, quod crediderim veditum vinum è creta, hodie Candia, ad nostras latum, nomine Maluaticum omnibus appellatum: non quale Maluense quod ad Rhodani umulos Allobrogum, & Arecomieorum vicinia, nascitur, & bibitur: haud maiore quidem ceteris deliciarum vel palato, vel spectaculo. Vini genera quæ sint docet Diosc. lib. v. cap. v. cum ceteris subsequentibus cap.

*Propago*, vetula vitis est, quæ per inflexos arcus suppressa obruitur, ut ex vva plures emergatur, id est, palmitū altera plantatio: siue ex vetere vite in novam reductio.

*Propolis* Largo, cera sacra est: nonnullis quoque prima iuuenum apum sectura: aliquibus tamen aluearis superficies, hoc est, ab ipsius ostio solo manas superfluous liquor: rusticis cera virginea appellata. Diosc. lib. ij. cap. lxxvij.

*Prunus* arbor, καὶ χερυιηδης, καὶ κοκευητος fructus: damascena item prunus, & sylvestris: cuius fructus austerus, & adstringens expetitur. Satiæ autem fructus stomachum malè habet. Diosc. lib. j. cap. cxxvij.



*Pruna* hordeacea priscorum, *Cereæ* esse suspicantur medicinarum peritioribus: atque genus occurrit aliud, minus cæteris, quod *Myxon* Græcis, & *Myxarium*: *Myropolis* nostratibus *Sebestem* appellatur. Quare dicta *Mixa* *Prunellus*, *Virgilio* *Spinum* dictum, est prunorum sylvestrium frutex, siue arbuscula, unde *seplasiarij* suâ desumunt *Acaciam*: de qua loco suo dictum satis. De pruno meliore cultura fructum mitiorem ferente hæc lusimus:

*Horrida Prunus eram vili neglecta colono,  
Cuius damna bat me quoque posteritas.  
Estrabunda malas inter remorata ruinas  
Degebam, depre: inter & ipsa graues.  
Eispidam sum fio, valuit quia pauperis hortis  
Improbæ vis fuerim cortice plena rugis.  
Carpebant passum caprea mea membra secacer:  
Carpebant humilem me comitesque ferae.  
Infecitque meos depasto germine partus  
Formica est peccis sed Scolopendra mibi.  
At bene successit dominis prosperata mei mora:  
Soleris alterius digna labore frui.  
Corporis hinc nostri parter diduxit inultat:  
Neglectam me me noluit esse diu.  
Sine erumpentes circum radice nepotes  
Perstrinxit, subrica fæce deinde secat.  
Atque loco transfert visa telluris, & aura:  
Sive seris facili me comitante manu.  
Quæ quondam fueram senio præcepta fugaci:  
Nunc iterum domino nascor a dulcia meo.  
Et pario celeres mira dulcedine fructus  
Gustanti, cuius strinxeras vlla manus.  
Deiectos stomacho reuocant, primumque palatum  
Restituunt, variis complacentque modis.  
Podagra seu arthritis apoplexis, mala eiusdem sunt speciei differunt itaque non toto genere: sed locis patientibus: in vitroque enim, articulorum est imbecillitas, & humor à natura alienus ad hos ipsos confluent. Quapropter si in pedibus constitierit hæc fluxio, podagra appellatur: si verò reliquos artus occuparit, Arthritis, id est, morbus articularis nominatur. Generant autem hoc malum cruditates, superflui rei venter usus, vini nimia portio: & his similia. Fuch. lib. de Medend. morbi. iij. cap. liij. Hoc quoque de podagra medicamentum emplasticum, ad Huguertum Solerium, vitum iudicio, & experientia candidum, post aliquot vna haud insuetas confabulationes, direxi:*

*Exui longævis fæctum pinguedine corpus  
Anseris, à pluma sepositumque sua.  
Iustissima dein neglecta è ventre renellis  
Impiger, has partes colluis inde fecæ.  
Pulmonis viscus, iecoris viscusque cruentum,  
Est caput, & latera protinus abde pedes.  
Infarcis vacuum vulpis de corpore ventrem  
Anseris: hoc primum est conscientis opus.  
Sic caro frustatim in scissa, in partemque minutat:  
Et cute diuisa quæque tenerenda, teris.  
Hinc maris adde salem, tanto cum pondere mellis,  
Metitis: fracta postpositaque fæba.  
Pondere sint æquo sagapenon, bdellion, opo,  
Terbynthi lacrima & pondere iuncta comes.  
Tingue recens misce Arabo cum thure suillum:*

*Veruccis in pingui propolidemque liquas.*  
*Et quos pinguis habet tellus putredine vermer:*  
*Et quod Castorium pharmacopola vocas.*  
*Fermentum tristici farrisque siliginis aequè*  
*Admifce: gummi conglomerasque pila:*  
*Conglomerat massam vulpis cum carne dolosa:*  
*Anser eris pleno denique ventre satur.*  
*Componis flammis redolentia ligna, foetumque*

*Es tereti figis dum docet ista veru:*

*Quod quoque destillas stagnato vase recundis:*

*Vngis & affectos molliter articulos.*

*Es quoscunque vider detentos saepe podagra:*

*Et quoscunque vider deperisse gelu.*

*Psyracis* *ψυράκις*, sunt exiles eminentiæ, & excrecentiæ pustulæ similes, in summa capitis cutis superficie erumpentes. Sic etiam *ἐξανθήματα*, capitis cutis sunt ulcerationes subrubicundæ, & asperæ. Manard. lib. vii. Epist. ij.

*Pseudanchusa* *ψευδοανθισσα*, doris est, anchusæ similis, lanuginosior, & minùs pinguis, tenuioribus foliis, radice succum rubrum fundente. in fabuletis provenit. Rura Orcanetam vocant, & lanarum insectores.

*Pseudocasia* *ψευδοκασία*, est, inquit Gesnerus, gustu, neque acris, neque odorato, corticibusque medullæ adhærentibus. Similior casia, quàm explicari possit, inuenitur: quæ gustu coarctatur, cum nec acris, nec odorata sit, hærentemque medullæ corticem habet. Diosc. lib. i. cap. xij. Quære dict. Casia.

*Pseudocinnamomum*, *ψευδοκιννάμωμον*, *καὶ καὶ καμύμωμον*, inualidi odoris, soluturumque virium, vocatur etiam zingiber, cum tamen sit xylo cinnamomum, præbens quandam cinnamomi faciem. Diosc. lib. i. cap. xij. Quære dict. Cinnamomum.

*Pseudobunium* *ψευδοβουνιον*, Bunij genus æmulum, foliis napi acris: palmi altitudine fruticat, agri gustu. Tormentum, atque stranguriam, laterumque dolores sanant quaterni eius rami poti in aqua: cum vino & sale strumas discutunt. Quære dict. Bunium. Diosc. lib. iij. cap. cix.

*Psilothrum* *ψιλοθρόν*, *καὶ ἀμπέλως λευκή*, id est, vitis alba, siue Bryonia. quandoque pro succo, siue spissamento Amerinæ salicis, cum nitri pari pondere psilothron est, id est, depillatorium. interdum pro eiusdem arboris semine vsurpatur. Quære dict. Bryonia.

*Psora* *ψώρα*, *πώρα*, aut à scabro herbe habitu, aut quod scabiei medeatur Aëtio dicitur: cuius vitæ arborum fumo erucæ moriantur, ea est quæ vulgò Scabiosa, ex Ruellio, & Gesnero, suspicatur: cum nomen idem prætereundum videatur. Inferiores Allobroges Abrotanium feminam Scabiosam vocant.

*Psora* *ψώρα*, *καὶ λέπρα*, passio utraque, summæ cutis asperitudo est, cum pruritu, & absorptione corporis. Lepa autem altius, circularibusque erosionibus cutem depascit, & piscium modo scamulas ex se remittit. Psora verò summam corporis cutem exedit, & varias habet figuras, sursumque magis ex se corpuscula edit. Larinis Scabies dicitur.

*Psyllium* *ψύλλιον*, pulicaria herba est, quod semen sit effigie pulicis: siue quod sua facultate pulices euocet, nominata est. Eius semen in mucaginem excipitur: cuius deinde vsus medicis frequentissimus. Diosc. lib. iij. cap. lx. & lib. vi. cap. x.

*Ptarmice* *πταρμίκη*, quod sternutamenta sicut, herba Sternutatoria dicta est: à quibusdam pyretum sylvestre notatum: aliis Tharco hortensis, siue Schargum à Ruellio, teclamante tamen Gesnero, existimata. Herba hæc mea quidem sententia veteribus indicta, quæ olitorum diligentia, & industria nobis in vsu venit: folio est hyssopi, longiori tamen, quod dum editur, saluam proquocat suæ caliditate. estur in acetariis cum sale, & oleo. hæc C. Stephanus.

*Pterygium* *πτερυγιον* Græcis, pinnaculum Latinis est medicis, hoc est, carnis in-

crementum circa vngues tum articularum pedum, tum digitorum manuum, partē eorundem operiens, quod in formam pinnæ euehatur: dissimileque paronichio est: cuius quære dict.

*Pteris ærepi's*, filix est: quæ duplex occurrit, mas videlicet, & femina: nomine alio Nympha, & geniorum fuga, quia spiritus nequam fugare suspicio est: sed fabule quære dict. Filix.

*Pthys*, inter aspidēs serpens refertur, de quo Plinius verba faciens ait: verum ex iis quæ referte fas sit, impubium puerorum contra saluas aspidum, quas pthyas vocant, quoniam venena in oculos hominum expunt: per quæ & mordendo etiam repente interficiant. Verum ante mortem cogitur percussus ad vomitum creberrimum, & convulsionem. Gal. in lib. Theriaces ad Pisonem.

*Ptisana* τριστανή, hordei cremor est, non autem repurgatum hordeum, & integrum ad edulium paratum. Est quoque cum aqua simplici ebullitio, de qua bibunt qui ægrotant febrientes cum quopiam serapio. Lege Hippocratem in lib. de ratione victus in Morbis acutis ubi ptisanæ faciendæ docet modum.

*Pueri* purgationibus planè inepti existunt, cum nondum iustam incrementi perfectiōnem consequuti sint. Si igitur eorum alius fuerit adstricta, mel cibo adiciendum aut resina terebinthina, quæ liquida est, qualis Segusiana, quæ ciceris quantitatem æquet, exhibenda. Vide Aegyptiam libro primo, capit. septimo. Puerilis item morbus, epilepsia est: quoniam sæpius in infantia, & pueritia, quam in alia ætate, corripiuntur.

*Pur* optimum est, quod candidum, corpulentum, minimèque sordidum: & ut optima urina habeat sedimentum candidum, æquale ac minimè sordidum: ex quibus quidē indicis febr. diaria cognoscitur. Gal. lib. j. de Diff. febr. cap. viij.

*Pudentorum* naturalium vlcera, sunt quæ quādoque citra inflammationem oboriuntur, interdum attritu ex longa continuāque equitatione cum inflammatione fiunt: ob id quæ mendicamentis indigent siccioribus, cuiusmodi sunt ex charta cōbusta, anethum vltum aridum, aloë arida, cuius præfens remedium est, & pistolochiæ radix. Curationis author Fuch. de Medend. morbis lib. iij. cap. xliij. Gal. de Locis affect. lib. vj. cap. vj. & ad Glaucl. lib. ij.

*Pugillar* medicorum, est id quod compitæhenſis alterius manus digitis complecti potest, differt quæ à manipulo, quo medici in formulis notandis simplicium, vtuntur: quoniam pro mensura stotū experimentorum, altero abutuntur medici posteriores.

*Pulegium* γλῆχον, fragrantis odoris herba, præsertim quæ montium iuga colit, atque interdum valles: quæ in mare purpureos habet flores, in femina flores albos producit: mare hæc efficacior ab authoribus traditum est. Vires, non formam docet Diofcorides lib. iij. cap. xxx. Est deniq; pulegiū sylvestre, Calaminthæ simile, sed maius, odor quæ haud absimile: vt lib. eodem Diof. docet, cap. autem xxxiiij.

*Pulicaria* ῥοδῶνα Græcorum est, Latini hodie idem nomen retinuerunt. pulicaria epota, corpori rotī strigus, & torporem cum exolutione, & morore quodam affert: ita vt animum despondeant. Cui antidota omnia quæ exhausto Coryano auxiliantur. Diof. lib. vj. cap. x.

*Pulmo* πνεύμων, cordi quatuor fibris, quæ λοβοί dicuntur, circumdatus est, duabus in dextra ipsius parte, duabus in sinistra. Præter has, quinta in dextra Thoracis parte exigua admodum apparet, quæ alterius veluti soboles est. de pulmonis affectibus, & in dyspnea, & in voce affecta petendus est Gal. locorum affect. libro quarto, capit. vij. & ix.

*Pulmo* πνεύμων, artetiosus ex lenibus, & asperis arteriis compositus, respirandi organum à natura confectum, cuius meatibus obturatis ab humoribus crassis, lentisq; suboriuntur varij morbi: ex quo ipsum corpus colliquatur miserè.

*Pulmonaria* διαπύπος consiligo, vel pata- Leonis, suspicatur: & Enneaphyllon Plinij Gesnero videtur. Nam pulmonaria, quæ aliqui Papanos vocatur, Buglos

g'losi folio albore maculato conspicitur, sed promisso magis, atque leuiori instar pulmonis notato, & flore cum rubedine purpureo apparente, inde nomen traxit. Valles colit humidus, & nemora.

*Pulmones*, secundum varia atque diuersa animantium genera, facultate sua operantur: vt marinus pulmo recens, tritus, & illitus, podagras, peruicacesque emendat. Suillus & agninus, vrinusque pulmo impositus, attritus à calcementis cōtractos, ab inflammatione tuetur. Vulpinus verò si a refectus bibatur, suspiriosos adiuuat. adeps quoque liquefactus, infususque, auris dolorem finit. Lupinus quoque hepaticos assus, eiisque emendat, quemadmodum rabiosi canis, rabiosos homines sanat vt gladiatoris quoque occisi iecur prodesse epilepticis scribit Largus.

*Pumex*, probabilior tofus, quàm lapis, cuius probatio, vt magnoperè leuis, spongiolosus, scissilis, nec arenosus, item teri facilis, & candidus: postquam operose crematus est, adstringit, gingiuas absterget, purgat cum calfactione, quæ caliginem pupillis offendunt. explet vlcera, & ad cicatricem perducit. excrecentia cohibet.

*Punica* malus, *ῥοζι*, *καὶ σιδῆ*, vulgò Granata arbor, & malum punici fructus: contractum à regione nomen. Punici mali differentie sunt, Apyrenum, *ἀπυρρον*, cui lignosus nucleus abest: communes nucleos habentium quinque species, dulcia, acrida, mixta, acida, & vinosa. Quære dist. Malum Punicum.

*Pulsus*, est qui in arteriis extremis membrorum partes occupantibus, per cystolem & dyastolem cordis motu inquieto discernitur, dignosciturque: à quo siue tandè temperies, siue intemperies prædicatur. Vel, pulsus, est cordis motus, & arteriarum, sensilem, quò attolluntur, & submittuntur, demonstrans effectum.

*Pulsus* duplex est vsus, sublatione seu dilatatione, quæ *ἀναβολή* est: aër frigidus attrahitur, qui vitale robor, vnde spiritus quoque animalis gignitur, excitat, & recreat. Submissio autem, seu contractione arterie, *συγβολή* nominatur. Galenus in lib. de Vsu pulsuum: & de Pulsibus.

*Pulsuum* genera ex Galeno secundum ordinem sequentem, comprehensis etiam differentiis, cognoscuntur. Primum ergo genus, est quod ex motionis tempore sumitur, & tam in sublatione, quàm submissione consideratur. Diuiditur autem in celerem, tardum, & mediocrem: pulsus celer, est cum modico tempore mouetur arteria: tardus, contrà: qui longo tempore modico mouetur intervallo: vel, qui multo tempore finit motum.

*Pulsus* mediocris, est qui quod ad motum attinet, quodà modo medio se habet.

*Pulsus* genus secundum, à quantitate sublimationis, hoc est, dyastoles, sumitur. nam quælibet arteria tanquam corpus tria sortitur intervalia, longum, latum, & profundum.

*Pulsus* longus, est qui longitudine naturali pulsu maior inuenitur. Latus, est qui latitudine notatur: altus verò profunditate. contrariis his, brevis, angustus, & humilis, magnus, qui longitudine, latitudine, & profunditate, auctus apprehenditur. parvus contrà, qui apparet imminutus.

*Pulsuum* tertium genus, à robore virtutis desumitur: cuius tres differentie sunt, vehemens, languidus, & mediocris. Vehemens, est qui tangentis medici manum valdè pulsatur, feritque languidus, est qui inualidior, atque imbecillior perspicitur. medius, qui quandam proportionem seruat ad vtrunque.

*Pulsuum* genus quartum, in arterie consistit corpore, atque substantia: diffunditur autem differentias tres, durus, mollis, & mediocris. Durus, est cum siccus, coriique modo rigidus in occursum apparet arteria. mollis, cum carnosus, spongiosusvè apparet. mediocris, qui inter medium se habet.

*Pulsus* genus quintum, est quod ex quantitate infusionis, seu plenitudinis arterie pendet: à quo pulsus plenus, vacuus, mediocrisque. Plenus, qui arteriam pleniorè ostendit, & submissione eius succo impeditam. Vacuus, qui bullæ modo sublationem efficit. mediocris, cum arteria mediocriter plena est.

*Pulsuum* genus sextum, à qualitate caloris qui in corde habetur, & in arteria quo-

dam modo magis euidenter apparet, defumitur: cuius tres sunt differentie, calidus, & frigidus, mediocrisque.

*Pulsuum* septimum genus, in tempore consistit, cuius differentie tres sunt: creber, rarus, & mediocris. Creber, frequens seu densus est, cui breue quietis, hoc est, interualli tempus est. Rarus, cui longum quietis tempus est. Mediocris, cui mediocre.

*Pulsuum* octauum genus, secundum rhythmum est. Rhythmus uero, est proportio temporis ad tempus: cuius differentie tres occurrunt, pararhythmus, heterorhythmus, echrymus.

*Pulsuum* genus nonum, quod in omnibus predictis generibus iuxta æqualitatē, & inæqualitatem inuenitur. Pulsus æqualis absolute, est ubi omnino pares sunt differentie pulsuum: inæqualis autem, contra.

*Pulsus* deficiens, est quando non solum in vno, aut etiam pluribus magnis, vnus minor apparet: sed totus nonnunquam quoque motus aboletur. hinc est, quod non solum ad duas, sed ad tres, pluresque percussiones, immobilis manet arteria.

*Pulsus* intercidens, est cum expectata quiete in medio tãquam superuacua aliqua percussio intercidit: & est deficiente contrarius. Pulsus mutillus, seu decurtatus, *μειωμένος* Græcis, est quando primo pulsu secundus paulò minor fit: & tertius secundo, quartusque tertio pari modis: & deinceps, vsque ad plures.

*Pulsus* desinens, *ἐκασπών μὴ οὖρος*, est qui perpetuò diminueitur, neque vnquam decretere cessat, in immobilitatem, ac quietem prorsus finit: atque in se agit varia differentia.

*Pulsus* caprilians, est cum aliquantulum intercisus videtur, deinceps multò citior apparet: dictus à caprarum saltatione.

*Pulsus* vndosus *κυματώδης*, fit quando non simul vniuersa materia dilatatur, attolliturque, sed primò pars eius prima, deinde secunda, mox tertia, ab hac quarta, motu continuo manente, in modum vndarum sese eleuantium: sic quidem vt altera vnda semper priorem excipiat.

*Pulsus* vermiculans *σχιλλοειδής*, est quando vndosus in paruitatem desinit, ac immutatur: ita formicis pulsus hunc sequitur, qui fit cum motibus multis amissis in vnum, cumque prorsus exiguum desierit. Huic adhæret pulsus hecticus, qui semper cum febre hectica sui similis manet.

*Pulsus* conuulsivus, est qui vtrunque ab extremis retractus, conuulsus videtur. Turbulentus uero, est in quo nihil tale cum cæteris reperitur.

*Pulsus* serratus, est *ἐμπριών* cum alia pars arterie dilatata, alia minùs, ob ipsius duritiem esse videtur.

*Pulsuum* decimum genus, ex inæqualitate profectum, ex ordine, & inordinatione nascitur. Pulsus æqualis, est omnino etiam ordinatus: inæqualis, etiam inordinatus existimatur.

*Pulsus* iræ, est qui magnus, vehemens, celer, & creber sentitur. pulsus lætitiæ, est qui magnus, rarus, & tardus: ac vehementia à superiore differt nihil. Pulsus tristiitiæ, est paruus, languidus, tardus, & rarus quoque deprehenditur. Pulsus timoris recetis, & vehementis, est celer, vibratus, inordinatus, inæqualisque: sed inueteratus, iam Tristiitiæ habet similem. Galenus librorum quatuor, de Pulsuum different. & de vsu pulsum est voluendus: & Fuch. Comp. medic. lib. cap. vltimo.

*Turgatio*, est humorum qui in sua qualitate molestant, euacuatio. neque enim hic per qualitatem intelligenda est caliditas, frigiditas, humiditas, aut siccitas: sic enim alteratio citra vacationem sufficeret: sed qualitas hoc in loco nihil aliud significat, quàm genus humorum vacuandorum, & corpus molestantium. Itaque humorum vacuandorum qualitas perpendenda est, vt quod genus humoris seu qualis vacuandus. Obseruandum denique Hippocratis dictum sic iniquientis: Inspicere oportet regionem, tempus, ætatem, & morbos, in quibus conueniat, aut non. Gale. lib. j. Aphorif Hippoc. parte ij.

*Punctura*, seu punctio, affectus est cum ab acuto, ac gracili caro vulnerata est: si uero

verò à graui, còtusio, aut concussio dicitur. Quod ab erosione oſi còtingit, *τῆρσις*, id est, caries: in alijs partibus, vlcus appellatur. quin & alio modo nuncupare licet. Gal. Constit. Artis.

*Pupilla*, alioqui *vnea*, foramen est quo oculi acies notatur: atque in eo hæc sunt palsiones, vt *μυδρμασις*, quando pupilla colore nihil euariat, sed multò-quàm còsueuit, latior fit: vt interdum iridis circulo appropinquet. Latinis pupillæ dilatatio & effusio dicitur *φθίσις*, contrarium planè malum est: in eo enim pupilla angustior, obsecurior, rugosiorque fit: Latinis diminutio, & tabes pupillæ nominatur. *ὀπ' ἡχουσις*, καὶ *ὀπ' ὀχυμα*, est vbi humor lentus, & glaciæ modo inter corneam, & crystalloïdè concretus circa pupillam subit. Vulgus medicorum *Cataram* vocat. Fuch. Comp. medic. lib. i. cap. xxvij.

*Pustula* seu vesicæ oculi *φλύκταιναι*, sunt exiguæ bullæ quædam supra corneam eminentes: quales iis potissimum accidunt qui exanthematis affliguntur: ab ebullitione, & seruire, quasi *ἀπὸ τοῦ φλύειν*, sic dicitur. Gal. in lib. de Oculis Theorem. vi. cap. x. in quo tractat de Oculorum vulneribus, scabie, & vngue cum curatione.

*Pustula* nocturnæ *ἐπὶ ὀφθαλμοῖς*, vlcuscula sunt sponte nascentia, pustularum figura, subrubra: quibus disruptis sanies eruenta defluit. Nomen hinc acceperunt, quòd interdiu quidem non multum infestent, noctu verò grauiore dolore torqueant. Sunt & *φλυκτῖδες*, καὶ *φλυκταίναι*, paruæ pustulæ veluti bullæ, similes iis quæ in corpore à seruida aqua torrefacto, contingunt. Hippoc. *φλυκτῖδες* dicuntur.

*Purulenta* excreatio *ἐμπύημα*, καὶ *ἐμπίκοι*, est suppuratio, hoc est, suppurati seu purulenti qui vocantur. Fit quando abscessus in mēbrana interiuscostas succingente: aut aliqua alia thoracis factus aceruatim rumpitur, & in vacuum thoracis locum effunditur inter pulmonem, & membranam costas succingentem. Interdum propter sanguinis eruptionem vlcere ad cicatricem non perducto, aut cum fluxum ex capite illuc manantem, vt in angina: & qui ea liberatur, huius ad pulmonem vertitur. Curationem docet Fuch. Medendor. motb. lib. ij. cap. viij.

*Phyllitis*, vnum ex nominibus est phyllitidis: cui vulgare lingua ceruina contigit: quoniam verò vmbrosis in locis, sed non omnibus nascitur. Quære Phyllitis.

*Pylorus* *πυλорός*, chirurgis portonarius, exitus fundi, id est, sedis: post quem sequitur *γαστρὴς*, καὶ *κερσος*, deinde leinum intestinum, &c. Quære dict. Intestina.

*Pyronocides*, vertebræ secundæ ceruicis processus imaginatur, dictusque: quia turbinata figura est: sursum autem spectat, atque ab anterioribus vertebræ secundæ partibus proficiscens, valido quodam rotundòque ligamento capiti alligatur: eiq; summa vertebræ locum cui aptè ac tutò inuitatur, præbet: in eadēque transuersum quoddam ligamentum oritur, quod illi intus aduoluitur. Hunc ipsum processum Anathomici à dentis similitudine odontocide vocant. Hippocrates autem totam secundam vertebram, dentem denominauit. Vide plura apud Gal. in lib. de Oſibus.

*Pycnocomon* *πύκνομον*, coniectoribus Dioscoride, & Plinio, ea herba est, quæ vulgi sententia Barba capræ vocatur. hæc habet Erucæ folia, crassiora tamē, & acriora radicem rotundam, lutei coloris, terram redolentem: caulem quadrangulum: florē Ocimi paruum, tenuemque. hæc lo. Agricola.

*Pyrethrum* *πύρετρον*, à seruido sapore herba dicta: vulgaribus per-Alexandri-nus, ab ignea, causticāque, necnon adurente vi, dictum: qua mansu potentius, quàm pro caloris modo elicit: vnde & Saliuaris quoque Latinis dicitur. Diosc. li. iij. cap. lxxix. Galenus Simpl. lib. viij.

*Pyrastrum* *πύραστρον*, syluestre pyri genus, quod tardissimè matureſcit: folia salicis vulgaris simillima habet, decidua, albicantia: fructum intus & extra herbaceū quod ad maturitatem non peruenit. strangulat edentem. Ad pagum Pontis aquosi Montis argiui viciniam me semel pyrastrum cum fructu vidisse, & gustasse fructum, memini, non sine meo & comitibus periculo, Dioscorides libro primo, capit. cxxxij. alia atque diuersa descriptio est.

*Pyrina*, *πύρινα*, officinis Berberis: rusticis spina vineta: de qua plura in dict.

Spina acuta, & Oxiacantha leges.

*Pyrites* lapis, de quo *as* perficitur: Marquisita *as* dicta quibusdam putatur. postquam pyrites lapis adustus est, & in calcem redactus, nonnullis diphryges appellatur. Tam erudi, quàm vsti vis est, excalfacere, abstergere, offusam caliginem expurgare, duritias concoquere, & concoctas discutere, resina exceptus extrescentia in carne cohibet. Diof. lib. v. cap. lxxxix. Galenus Simpl. lib. ix. Geberus Metamorphoseos metallor. lib. j. ij. & iij.

*Pyritis* Galeno *πυρις*, Nardus montana videtur, & Neris, aliud quàm Nerion simplex. Descriptionem habes in dict. Nardus.

*Pyrus* arbor, *πυρ* à *πῦρ*: pyrum pro fructu à *πῦρ*, *ο* *χῆν*: sylvestre autem pyrum *πυρ* τὸ α' *γῆν*, id est, à strangulatione dictum: quod quidem pyrastrum dicimus; & pyrafter quoque *α* *χῆρ*. Sicut Itali, & Romani pyris sua indiderunt nomina, ut constat ex Columella, sic etiam Galli, ceteræque orbis gentes, à figura, sapore, odore, & interdum loco, regione, & ferentibus nomina suis fixerunt arboribus, præsertim pomis, & pyris: hic memorare superuacuum duxi Diof. lib. j. cap. cxxxij.

*Pyropus* *πυρπῦρος* lapillus, officinis Rubinus: plurimus in insula maris Indici, dicta Zaylon, Ludouico Romano Patritio referente. hic inter gemmarum lapidum, vè fragmenta, Arabibus maximè medicis adnumeratur, & vsui recipitur.

*Tyxos* *πύξος*, Buxus arbor nostras, pyxidas componentibus ad medicamentam reponenda vsui quotidiano à Myropolis, per familiaris. vnde

Alabastrum omne in quod odorata, & exquisita re-

conduntur, cuiuscunque materiz sit, Pyxis

appellatur. Arbor, producit semen

humores egregiè per inferna

ad drach. duarū. p. euas-

cuans. Quare

dict. Buxum.



*Delise*





## De licera Q.



*Quadrans*, assis quarta pars est, hoc est, vnciæ tres: quoties autem de numaria sermo est, quadrans, æreus numulus est, qui & triuncis, à tribus vnciis, vocatur. Vt enim sestertius quarta pars denarii est: ita quadrans assis quarta pars. Quadrans, cum de mensuris in re medica loquimur, quarta pars Romani sextarii, hoc est, cyathi, vel vnciæ tres. Quadrans pedis, digitorum quatuor mensura est, quam etiam palmum minorem vocamus. Vide plura in Cosmographia P. Apiani, cum Appendic. Frisij.

*Qualitas* nō *in* *se*, est secundum quam quales dicimur: quæ in variis, diuersisq; disfunditur per elementorum facultates, quibus omne viuens diducitur: nā tantam varietatem, ab his qualitatibus primis, scilicet calore, frigore, humiditate, & siccitate mundi machinam gubernari Deus voluit. Has qualitates tanquam metas actionum constituit, & earum actiones monstrauit, vt inde iudicari causæ possint multarum in corporibus mutationum.

*Qualitas* vacuæ abundantia citra humorem est vel caloris, vel frigoris, vel humoris, vel siccitatis etiam excessus: quod in dict. Abundantia demonstratum fuit.

*Qualitates* contrariæ in eodem corpore vnā consistere non possunt, vt calidum simul & frigidum: statuuntur tamen omnes quatuor, vt ipse agere inuicem, patique possunt. itaque qualitates primæ omnes actiue sunt, calor nāq; & frigiditas actiue qualitates dicuntur: cæteræ verò, vt humiditas & siccitas passiuæ: ideo oppositiones duæ existunt, altera in qua calidū frigidū aduersatur: altera, in qua humidū pugnat cum siccō. Qualitates autem sinceræ quæcunq; corpora suscipiūt, ea calida humida, frigida sicca prorsus exactæque sunt, Gal. de Temperament. lib. j.

*Qualitates* temporum anni sunt: ver calidum humidum, vt est sanguis in nobis: estas calida sicca, vt cholera: autūnus frigidus siccus, vt bilis atra: hyems frigida humida, vt phlegma in nobis. Sanguis à natuitate ad xxv. annum dominatur: cholera à xxv. ad xxxv. annum atq; tum ibi caloris in venis, arteriisq; principium, bilisq; corpori vniverso imperat. Deinde sequitur senectus, quam virilem tamen ætatem Galeus esse dicit, in melancholia versatur, frigida sicca, ad quadragimum quintum circiter annum: incipiuntq; ab hoc humore cæteri cum suo natiuo colore immixti: bi- que cum phlegmate occurrit decrepita senectus.

*Quantitas*, est quæ non solum molem, & mensuram, verum etiam facultatis ordinem, ac gradum & numerum adhibendorum medicamentorum continet: hæc omnia definiunt magnitudo affectus, propria corporis natura, virium robur, partis cōditio. Quæ Acaciam ad Glauc. Galeni, lib. j.

*Quantitatis* abundantia, est vel cibi, vel potus, vel humorum in vasis exuperantium plenitudo. Repete dict. Abundantia, & Plenitudo.

*Quartana* febris intermitiens, est quæ ab atra bile extra vasa putrescente, oritur. Sic accepit nomen, quod duos intermitat dies, & quarto reuertatur: quod copiosius in dict. Quotidiana exquisita explanatur. Gale. idē author est li. ij. de Diff. febr. cap. v.

*Quartana* exquisita alterum genus febrium intermittentium est, quæ solo atræ bilis humore putrescente generatur. hæc quidem non primo statim die cum rigore inquadit vehementi, sed talis est, qualis iis qui vehementi gelu frigescent: progrediente autem ipsa atque aucta, vnā etiam rigor augetur, inualefcitque quotidie vsque ad totius morbi incrementum, sensusque eius non pungentis, stimulantis vè cutem, sicut in tertiana, verum vehementem algorem inducentis, & tanquam ossa fragentis est. Cætera ex Fuch. de Morb. medend. lib. iiii. cap. viii. petes.

*Quartana* sanè si longissima est, accessiones breuiores, puriores, & longiore intervallo repentes habet, minus, quam quotidiana, periculum adfert: quia nonnunquam morbos alios hæc tēporis diurnitate parit deteriores: vt lienis tumores, hy-

dropas, & alia id genus mala. Cæterùm quartana febris vagis febribus ferè succedit: nam diuturnitate corporis habitum reficcant, ac humores adurūt, propter pituitam. Phlegma enim non aqueam serosamque humiditatem, sed siccam, ac retorridam, crassamque pituitam significat. Inarescit enim ac crassescit hæc febrium longitudine, quales erraticæ, vagæque sunt. Vagas, ac erraticas vocat Galenus libr. j. ad Glauco. quæ incerto tempore, ac non eodem modo repetunt.

*Quaternarij circuitus* ἐ' τετταρίδι, καὶ θ' ὁρηται, hoc est, indices, & contemplabiles dierum circuitus, quod in iis scilicet quales futuri sunt dies proximi indicatorij, contemplari liceat: atque adeo quod sequentes dies decretorios indicent. Quartus siquidem dies septimi, vnde decimus decimi quartus: trigessimus septimus quadragessimus index est: & sic deinceps vsque ad centesimum. Etiam hebdomadæ hoc modo numerantur. Igitur dies vigesimus tertij septenarij nouissimus erit, perinde atque sexti septenarij quadrag. dies, & minimè decimus quintus, & vigesimus primus: quæadmodum nonnulli post Hippocratem, falsò opinati sunt.

*Quies*, est quæ morui, & labori exercitatori opponitur: est autem vbi conueniēs esse possit vsus, tum videlicet vbi ex multa motione corpus defatigatum fuerit. cuius rei certè auctor Hippocrates, sic inquit: In omnis corporis motu vbi quispiam ceperit laborare, quies statim lassitudinem aufert. Lib. ij. Aphorif. xlvij. Aph.

*Quercus* δρῦς ἡ ὕψις, id est, veteribus Galliz philosophis, arbor placida: differt tamen quercus à robore. Glandes autem, gallas, & viscum, quod Græcis ἰξος, dicitur. Adstrictioris facultatis tota arbor, cum frondibus, & glande expertur. Diosco. lib. j. cap. cxxj.

*Querendula*, quæ sturdo paulò maior auis est: vulgus Gallicum Strona nominis appellationem dedit, retinetque. Neque ea est, quæ à Varrone de Rustica lib. iij. vt Scholiastes putat. inter eas aues, quæ non contentæ solùm terra sunt, sed aquam quoque requirunt vt Anseres, Anates, Mergi, & Olores: sed inter Sturdos qui mortem visco vescentes sibi cecant, numeratur: cuius caro stomacho optimè conficitur. perdis etiam carne suauior.

*Quinquifolium* πενταφύλλον, idem Septasiasiis nomen retinet, quam nonnulli ab hexaphyllo herba, vulgò Tormentilla, distinguendam volunt: sed foliorum tantùm numero, minimè viribus: quoniam variatum propter natiuitatis, tum fertilitatis locum, esse non eandem ignari contendunt. Gal. lib. v. Comp. pharmac. Eupatorium etiam quinque folia habere scribit, interpretibus Leoniceno, Manardo, & Ruellio. Aduersus venenata, & pestilentes affectus radix efficax habetur. Dioscorides lib. iij. cap. xxij.

*Quincunx*, recipit vncias quinque. Vnde Vncia.

*Quisquiliū* κόκκος, granum Illicis aquifoliz: vnde quisquillata vestis, vulgò escharlata, & vermillon. Hos κόκκοις officinæ grana tinctorum hodie vocant. Aduertat etiam diligenter candidus lector Illicem apud Vergilium pro robore quandoque accipi, & Robur pro Quercu vulgaris atque ex genere diuerso facultates dissimiles quoque adesse, cum Quercus aliud, quàm Illex sit: omnibus describitur. Ruell. lib. iij. cap. xviij. Quære dicit. Granum tinctorum: & Coccum Cnidion.

*Quotidiana* continua febris, cum quotidiana exquisita, quod scilicet diebus singulis accessionem faciat, deprehenditur. Quartana continua intermittente, quia quarto quouis die accessionem habeat: quæ tamen ad inuicem differunt: vt suprà paulò scriptum reliquimus.

*Quotidiana* exquisita, quam Græci ἀ' μ' α' μ' α' π' λ' ο' ν vocant, sit pituita dulci extra vasa putrescente: & sic appellata quidem est, quod diebus singulis redeat. Non temerè quidem adieci dulcis pituita, Fuch. authorem grauissimum sequutus: nam si vitrea pituita modicè putrescit Epialon febrem inducit: de qua Gale. in lib. de Inaquali interperje. Quære dicit. Epialos.

## De litera R.



*Acemus*. ὄγκυρος καὶ ἀνὺ παχυρὸν τοῦ βότρυος, id est, quibusdam proprie scapus, vulgo grappa, appellatur: et si plerumque cum vva confunditur. Ceterum quot genera vini experiuntur, tot racemi ex vuis diuersis locorum sunt constitutione. diuersitatem autem docet Dioscorides.

*Rais* mas, ὁ βατος, καὶ ἡ βατὶς, piscis vulgò Raya, hoc autem nomine βατος appellatus est, quod eius tota spinis cauda horrescat. Piscis hic, vt cartilaginea omnia, carnem mollem, & concoctū facilem habet, vt est author Galenus quod edentibus coniciere licet.

*Radicula* ῥοῦθον, Saponaria herba, & fullonia, quòd saponis vires ostendet, deinceps nominata est. Præterea est & radícula, Rauonella, & Rafortis, lingua rustica, appellataque ex sale & oleo cum aceti momēto, vel solo etiā garo, estur: inde inter acetaria gulosis adnumerata est, hanc quidā remerē Raphanum crediderunt. Renium, vteratarum, & vesicæ calculos fractu contumaces terendo expellit: copiosam necnon urinam euocat. Quære Struthium, & Raphanus.

*Radix* ῥαφῆνος ἢ raphanus, Celsus radícula vertit. Ceterum raphanus apud veteres simplicium medicamentorum scriptores Græcos, & Latinos, pro Brastica etiam vsurparunt: caule assurgit vno, serè arboreo, vt in sinapi cernitur: Græcis quoque nonnullis Dendrolachana, quasi olus arboreescens, appellata est. Tantum illud notandum est, Radiculas alias esse dulces, alias subacris, alias omnium acertimas: quarum succo cum oxymelite, Galenus vsus est ad vomitum excitandum. exalfacit, flarus gignit, ori suavis est, sed stomacho aduersatur, inctus ciet. Diosc. lib. ii. cap. cv.

*Radix* sylvæstris altera, ῥεφῆ, apud Theophrastum nominata: quæ rapasylvæstris a diudicatur, aliquibus quoque armoracia suspicata: folia satino raphano similia, sed magis Lampsanam imitatur, radix, tenera, subacris, in cibo cum folio radix ipsa minorior est facultatis. Quære dict. Armoracia, & Lampfana, & Struthion.

*Radix* sylvæstris tertia ἀπὸς ἡ, καὶ ἡ σῆδς: quibusdam eam esse placet radicem, quæ raphanus sylvæstris appellatur Syluio coniectore. Est & nigra radix Hippocrati ῥ' ῥα μελαίνη, ἀπὸ πικρὰς: atque ab eodem ῥ' ῥα λευκή, id est, radix alba: Galeno dracontij, hoc est, serpentariæ radix. Quære dict. Apios.

*Radicis* Cynthiæ ῥ' ῥις κυνθίς, apud Hippocratem in fouendis sceminarum locis, mentio est: verum quænam hæc sit, nisi fortassis Diosc. Izopyron, adhuc incertus hæreo. Ruel. lib. iij. cap. xcvi.

*Radix* ῥ' ῥα Hippoc. dici vult Gal. quoddam genus sativæ, sine flore, sine semine: tribus tantum foliis, sed oblongis, & in terra stratis, duorum digitorum magnitudine, similib. Anchusæ, radice purgandi viribus exilibus. Diosc. Onosma Gelseo videtur mihi Doris, vulgò Lupi lingua. Quære dict. Onosma, & Anchusa.

*Ramex*, C. Celso authore, herniæ vitium, continens sub se parocelam, quæ cum ex abcessu aliquo circa scrotorum materia induruit: Sarcocelam, quum in ipso scroto cōcreuit caro: Cirsocelam, quum venæ intumuerunt, ex quibus testiculi dependent: Bubonocelam, quum ipsi testiculi intumuerunt, & ex inflammatione dolorem inferunt. Celsus Artium lib. vii. cap. xxiii.

*Raphanus* ἢ ῥαφῆνος, radix: veteribus Græcis brastica, ῥαφῆς, nam raphanus sylvæstris χῆρνα, id est, armoracia dicta est, hodie rapistrum. Quære dict. Armoracia.

*Ramex* intestinorum ἢ περιτοκίλη, sit peritoneo rupto cum intestina in scrotum labuntur. Inguinalis ramex βουκοτοκίλη, est vbi supra intestina in inguinibus hærent. Aquosus ramex ὕδρακίλη, si humor aliquis in scroto parte colligitur. Carnosus σαρκωκίλη, cum caro dura intra testium tunicas increscit. Omenti ramex

ramex ἐπιπλοκὴν, quum omentum in fetotum deuoluitur. Sic ubi venæ ultra modum repletæ, & dilatatæ glomerantur, κῦρσοκὴν, hoc est ramex, cum C. Celso, varicosus, nominatur. Curationem docet Fuchsius Medend. morbor. libro tertio, cap. xliiij.

*Ranunculus* βάτραχιον, flore luteo, interdum purpureo, herba: cuius quoque radix tuberculosa inuenitur, officinis Apium. risus, corui pes, viceraria, Apulcio scelerata, & verticillum, appellata est. Est & genus alterum lanuginosius, pluribus foliorum incisuris, altiore caule, gustus acerrimi, quod priuatim Apium rusticū. & Risus apium nomināt. Hæc ex Plinio Ruel. Sardonias etiam herba à Sardinia insula in qua plurima frequentissimāq; nascitur: poëtis, & historicis celebratissima: de qua olim toxicici genus Hispanos consensisse Strabo author est, cuius haustu vrgepte vi maiore citra dolorem ipsi sibi mortem consenscebant. Diosc. li. ij. cap. clxviiij.

*Rapum* siue napum, aut rapa ῥάγγυλις, genus oleris in vsu frequentissimum, præsertim in cōdiendis iusculis. Sunt enim napi ipsi rapis congenes: ceterū vtriūque varietates sunt species, olitoribus perfamiliæ. Radix rapi alit: inflationem parit: humentem ac fluxam carnem creat: venæ stimulat: decocto podagræ, perionis, & que fouentur, & contrito impositoque iuuantur. Semen antidotis, & theriacis idoneum est. Radix quoque napi inflat: modicum alit, flatus vehementer creat, turbulentiæque alium reddit. Semen eius potum venenorum vires hebetat. Diosc. li. ij. cap. ciiij. Theophr. li. vij. cap. iiij. Plin. li. xvij. cap. xiiij. & xix.

*Rapum* syluestre ῥάγγυλις ἀγρία, hodie rapunculum vt docuit Ruel. Describitur enim cubitali altitudine assurgere, fruticosum, in cacuminibus leue, folio glabro, longitudine digitali, aut interdū maiore. Fructum fert in siliquis calyculatis, dūq; seminum inuolucra dehiscunt, alia intus continetur siliqua, in qua paruula semina concipiuntur, foris nigra, intus candicantia. ex Ruel. hæc Gesnerus. Est præterea rapum terræ κίχλας, officinis panis porcinus. Quære Cyclaminem.

*Ranula* βάτραχος, tu more phlegmonodes, sub lingua consistens, maximè in pueris. Linguz proprium quid euenit ἀνελυγλυσσων Aegyneta vocat: sub hoc breuior fieri lingua videtur, duratis, diminutisq; membranis linguam continentibus, aut duriore cicatrice ex vlcere derelicta: quam sequitur linguz inflammatio, quæ nomine vulgari Ranula, vt diximus, nominatur. Eidem alijs quoque affectus accidunt, resolutio videlicet, conuulsio, excellens magnitudo, vsitio, prominentia, rhagada, & tumorum genera omnia: de quibus in dist. Lingua tractatur speciatim.

*Rafesciens*, est quod poros cutis dilatat, calidum modicè, sicum minimū, tenuium partium: vt chamæmelum, althæa, malua, viola, parietaria, melilotus, & huiusmodi: cui contrarium densans probatur.

*Raucedo* βράγχος, est ubi ad guttur, & asperam arteriam humor destillat. Tres sunt in genere diuersæ destillationes: vna κατὰ π' οὐς, fit Galeno teste lib. iij. de Symptom. causis, ubi ad os, ac fauces humor delabitur: altera κῶρυζα, id est, grauedo: fit dum ad nares decumbit humortertia βράγχος, id est raucedo Latinis atque ob varias causas accidere solet. Fuch. li. j. de Medend. morbor. cap. xxiiij.

*Regar*, in genere est arcenici, in iisdemq; sodinis inuentū gruitur: vires quoq; nō habet dissimiles, verū paulō imbecilliores, lætales tamen. Quære dist. Sandaraca.

*Regius* morbus, siue ex Celso aurigo, bilis modō flauæ, modō atræ per vniuersum corpus effusio. Græcis ῥαγίς, Latinis verò Regia, & arcata passio vocatur. Fit interdum iecore nihil patiente bilis effusio ad cutem in morborum indicationibus: nonnunquam ubi citra febrem sanguis ab extranea aliqua occasione corrūpitur, ac biliosus efficitur, sicut à venenatarum bestiarum moribus contingere consuevit. Quin & fieri potest propter inflammationem, aut naturalis tēperiei iecinoris, aut lēnis permutationē: aut ob imbecillitatem vesicæ bilis, aut ob obstructionem, aut debilitatem vasorum, quorum ora ex ea ad iecur deferuntur, biliosum humorem non attrahit, atque adeo iæcteron efficit. Euch. li. iij. de Medend. morbis. cap. xxi.

*Remedium* medicinæ, est auxiliorum medicinalium compositio, & victus ratio, in qui

in quibus recte operationis occasione, & temporis obseruatione opitulatur laborantibus medicus, arte & experientia prædictus.

*Renes νεφροί*, ex utraque parte paululum sub iecinore, cauz venæ adjacent ex caua vena rami omnium eorum qui inde propagantur maximi, singuli in singulos renes subiectos mittuntur, quos meatus attractorios, vel venas emulgentes, aut venas sanguinis serum deferentes, nominant. Renes enim calidi & humidi sunt, naturæ sicæ proximis quibus sanguinis serum est.

*Renibus* quoddam peculiare corpus est ex fibris & carne constitutum, quod cum alia parte nulla comune habent, & caro hæc dēsa est, ne sanguis ad ipsos qui deferretur facili momento defluat, fundatur, abeatque cum vrina. Sed & carnea hæc substantia, non paucas habet inuolutiones, in quibus quoniā si gillatim per substantiam lapides plerūque generantur, sunt in renibus grauissimi dolores. hæc Gal. in li. de Renum affectibus.

*Renum* palsio, est in qua sanguinis serum mingitur, quæ accidit propter ipsorum imbecillitatem, vrinam subinde fecernere to à sanguine nequeunt, aut propter amplitudinem osculorum, ex vena caua vrinam ad renes excolantium.

*Renum* vlcera, sunt quæ accidunt in iis propter venarum rupturam, aut suppurationem inflammationis, & acres, ac mordaces humores huic delatos. Renum affectus describuntur à Gal. Locorum affect. lib. vi. cap. iij.

*Repercussiens* medicamentū, succos occurrentes in altum repellit, frigidū est, crassum partium: quod si etiam adstringit, multo magis repellit, vt a cerba, austera.

*Renes* non naturales sex sunt medicorum neotericorum sententiam causæ conseruatrices ad eandem naturam hæc administrare referuntur. Quære dict. Causæ cōseruat.

*Respiratio ἀναπνοή*, est aeris in animante reciprocatio, neque composita actio, vt quibusdam placuit, partim ex arbitrio, partim sponte proueniens, sed planè animalis & voluntaria, quemadmodum docet Galenus in li. de Causis respirat. & li. ij. de Musculorum motu. Siquidem ab electione atque ab anima sit respiratio, retinereque ad arbitrium potest.

*Resolutio ανιπαλυσίς*, est vbi alterum latus, aut dexterum, aut sinistrum sensum & motum perdit. Resolutio propria ανιπαλυσία, est quæ sequitur apoplexiam: proinde paralytis generalius nomen est, quàm paraplegia, quod hæc solam eam quæ ex apoplexia fit, illa verò omnem resolutionem ex quacunque occasione factam, significet. Est quoque oculi resolutio ανιπαλυσίς, vbi obliquæ motiones, & quæ sursum atque deorsum fiunt, expediti non possunt. Gal. li. iij. Locor. affect. cap. x. & li. j. de Sympto. causis: & li. iij. Vietus Acutorum, cap. xxij.

*Retentrix* facultas, est quæ conceptam Idæam, attractamque memoria retinet, eousque per neruos in partes omnes animales diffundatur: altera quoque retentrix facultas est, quæ videlicet attractum succum retinet, donec alteratrix eum in naturam partis quæ putritur, mutauerit. hæc alteratrici facultati ministrat.

*Ratiocinatrix* item facultas λογιστική, est quæ sensum & motū per vnuersum corpus, ac intellectū, fouet: cuius animalis facultas distributio est. Quære dict. Facultas.

*Reticularis* plexus δικτυοειδής αγγεια, rete mirabile vulgus medicorum vocat, ex iis quæ veniūt in caput arteriis cōfiscitur, cum primū caluariam transgressæ, ad ipsam cerebri basim seu fundamentum concurrerint: ibi enim nō exigua regionem natura quasi thalamum, seu cauernā quandam modicam à crassiore cerebri membrana circumdata, reticulatū huic plexui præparauit. In quæ quidem locū ab arteriis Carotidibus appellatis, non parua quædam portio, vno scilicet ex utraque parte ramo promisso, peruenit, quæ postea in multiplicem sobolem discissæ, retis formam cancellantis fibræ conficiunt.

*Rete* enim ex aëre, & igne, cuiusmodi piscatorum nassæ sunt, contextuit natura: piscatorum nassas Græcis χύτρον, quas nisi quis prius conspexerit, Platonem consequi mente non poterit. hæc Gal. super Timæo Plat.

*Retractio* vacationis ἀνασπασίς, quæ vbi humor adhuc in fluxu est, & vbi locum iam obidet, deriuationem vbi pars fluit, iam locum obidet utroque remedio, nempe retractione, & deriuatione.

*Resina lentiscina* *μαγνη*, omnium iure præstantissima, & laudatissima, fulgore quodam ignis splendida, candore ceræ Tyrthenicæ. detrior est viridis, & nigra Aegyptia dicta, aut Pontica, bitumini nigredini similis. Gal. li. viij. Simpl. & lib. j. & ij. Compos. pharmac. Quæte dict. Mastiche.

*Resina terebinthi* *τερεβινθίνη*, vulgò Tormentina: huius vice hodie Peücina, vel Laricea vititur. Aëtius autem Lariceam resinam ad omnia esse accommodabilem scribit, ad quæ Terebinthina. Diosc. lib. j. cap. lxxv. & lxxvij. Quæte dict. Lentiscus, & Larix.

*Resina p'ntin*, ex variis arboribus lachrima, siue liquor, qui destillat, vt Larice, pinu, picæque, sumitur.

*Rha Ponticum*, radix Pontica Celso dicitur. Gal. lib. vij. Compos. medic. vocat *ρ'ον τ'οντορον*: Aëtius *βαλσαμικον ρ'ον*, καὶ τ'οντορον, καὶ τ'οντορον.

*Rha*, Rheon, & Rhacoma *ρ'α*, καὶ *ρ'ον*, Rha Ponticum aliquibus interpretarum, quod hodie Rhabarbarum dicitur. Sanè veterum scriptorum Rha. Ponticum Cérarium maius est: longèque à Rhabarbari radice differt, ignota veteribus Græcis & Latinis. Quæte dict. Centaurium maius.

*Rhamnus p'auris*, frutex spinosus, griseolus aliquibus falsò interpretantibus. Est item Rhamni genus alterum quod Burga-spina, vel Neprus vocatur, fructu myrti, foris nigro, intus viridi: ob id ad colorem tingentibus idoneo. Cortex arbori subniger, & nitidus quasi cerasus: intus virens, post luteus: lignum extra candidum, interior medulla rubet. Ea arbore validos arcus Helvetij, & Rhei fabricant. Ex Dioscoride Itali spinam ceruleam in hunc diem vocant, ab eotempore quo fub Marco Antonio & Regina Cleopatra, in Italia & Aegypto, militabat. Dioscor. libro primo cap. cii.

*Rhamnus* præterea alius est *ῥ'ος, ρ'αυον ῥ'ηρι*, id est, species tertia Rhamni, in afflatu maris nascens, frutice nonnunquam arborecente, prælongis ramulis, qui rigidis spinis armantur, aculei mucrone sœuientibus, bacca folliculari specie, vertici illata: primùm cædida, post maturitatem rubescens, foris flauida, intus vliginosa, quam pastores pecorum pabulo decutunt. Videtur Rhamnus hic, quo ludæi vecordes & infani Iesù Christo, generis humani redemptori, coronam rigidis spinis in mucronem aculeatis, manitum texuerunt, & capiti violenter affixerunt illudentes: hæc ex Ruell. Gesnerus.

*Rhyptica*, sunt quæ speciatim sordem à cute, & vlcerebus tantum tergent, non etiam obstructa liberant, quia sunt amaris imbecilliora, falsa scilicet, & dulcia: vt sal, mel, hordeum, faba, amygdalum dulce, quibus contraria sunt emphratica.

*Rhodia* radix *ρ'οδι*, *ρ'οδι*, nascitur in Macedonia, non dissimilis Costo, minoris modò ponderis, inæquali cute, odorem rosæ cum tetitur reddens. Vtilis capitis doloribus, si madefacta fronti, & temporibus imponatur. hæc Gesnerus. Hæc aliter describit Fuch. atque aliam facit longè à Rhodia radice differentem, & à Gesnero diuersam. Sed authoris vtriusque diligentiam candidus lector perpendat, veritatem nimirum nomini præponens.

*Rhododendron* *ρ'οδοδένδρον*, quod florem rosæ similem habeat, vulgarem sumpsit denominationem, quam subinde retinuit, Rosago: Dioscoridi Nerion, & Rhododapne scribitur: frutex notuæ vulgaris, longioribus, quàm amygdala folijs, asperioribusque flore in rosam conformato: fructu nuci græcæ simili, corniculato, qui patefactus quandam lanosam naturam ostendit, spinarum pappos representantem: radice longa, gustanti salsa nascitur in amœnis, maritimis, & secus amnes. flores, & folia animabus plerisque venena sunt: sed hominibus contra venenata præsentaneum remedium cum vino pota. Quæte dict. Nerion.

*Rhododaphne*, rhododendron *ρ'οδοδάφνη*, *ρ'οδοδένδρον*, est quibusdam rhodonia, & nerion, siue Oleander, rosaginéque. Est & Rhodonia *ρ'οδωνία*, rosæ planta, & rosarium eiusque flos *ρ'οδόν*, id est rosa: vti rhododendrum *ρ'οδοδένδρον* ipsum rosariû.

*Rhæa* *ρ'οις*, familiare segetibus papauer est, folio oblongo, coacto, per ambitum disiecto

dissecto flore sarniceo in purpuram vergente: in calice semen postquam maturuit nigrum est, & gustu subamarum, flos in potu cum vino pleuriticis principio morbi auxilio est: sed tota herba inutilis. Quare dicit Papauer.

*Rhus*, arboris pumile fructus racemosus, est cortice acido, adstringente, repellente, nunc medicamentarius tantum: olim etiam culinaris, stomacho valde idoneus fructus perhibetur. Arbuscula est in petris nascens, binum cubitorum altitudine, foliis oblongis, subrubensibus, in ambitu serratis, acino vuarum gracilium, denso, magnitudine terebinthi, quadamtenus lato. facultatis adstrictior tota est. Viorna arboris genus hoc vulgò suspicatur.

*Rhus p'ous dypsis*, sylvestris herba, foliis myrti, cauliculis brevioribus, quæ tinea, & venena pellit: cuius officinis succus Sumach appellatur. *Rhus* Plinio, vocata *Erythros*, qui & *Syriacus*, dictus videtur: & *Magiricus*, quod obsoniis aspergeretur: differt quæ a *Byrsodepico*, hæc Gesnerus.

*Rhombus* piscis *ρ'ουβός*, vulgus piscatorium *Turbot* vocat: intra nomina passeris piscis ab Aristotele comprehenditur.

*Rhombus* autem vox Græca, propriè figuram quadratam, & solidam significat, cuius latera æqualia habentur, anguli verò omnes obliqui ad quam sanè figuram piscis hic efficitur est. Constat Matrialem in hoc versu exametrico

*Quæ nunc Thessalico lunam deducere Rhombo*, intellexisse de figura mathematica, quæ mulieres veneficæ, & sortilegæ, in magisteriis sæpenumero ad Lunam deducendam, utebantur: non autem de Rhombo pisce, quāvis epithetum addiderit, carminis causa. Thessalico. Tibullus:

*Hanc ego de celo ducentem Sydera vidi.* Scholiastæ paulò aliter.

*Ricinus* *ρ'ουδν*, id est, cici officinis cataputia maior, palma Christi, Arabibus *Kerua*: vnde Myropolis oleum de *Kerua* nominatum: Græcis autem *Cicinum* *ρ'ιχινον*. Herba hæc parvæ fici altitudine arborefcit, folio platani, maiore, leuiore, & nigriore, ramis caulibusque cauis, in arundinis morem: semine in vuis asperis, quod cornibus exutum, ricinū, vulgò lachon, in bobus, animal repræsentat, ex quo oleum nomine *ricinor*, exprimitur, cibis scdum, lucernis, emplastrisque vtile. semen hoc ad gr. triginta, purgatorium est. Diosc. lib. iij. cap. cxlv.

*Rigor*, vt Galenus fuit, est motus multus, circus, & densus: id est, numerosas habes motiones, cum impetu, breue quoque habens quietis tempus. quod horror quidem omnia hæc habet, sed remissiora, frigus verò sine villo motu in cute sentitur. *Acakia* super Gal. ad Glau. lib. i.

*Rhabarbarum*, radix temporibus nostris vsui medicinæ familiaris, minimè quoque operosa apud Scenitas Arabiæ legitur: vnde *Rha Sceniticum* *A Egynetz*, & *Actuario* si cognitum, ita quoque appellatum, flauæ bilis purgandæ vim obtinet.

*Rhacodes* seu abscessus in pus versio *ρ'αχωδός*, est quando cutis ita à pure sinus eroditur, vt attritæ vesti similis reddatur, vt postea medicamenti vis coalescat. *Huius* est interpret *Acakia* lib. ij. ad Glau.

*Rhinenchiter*, cornu est quo caput rebus infusis per nares purgatur: vt hederæ succo per se, vel betæ succo cum exiguo flore aris, vel cyclamini succo mixto laetis momento, & huiusmodi.

*Ribes* Arabibus, Groselarius nostras, cuius fructus racemosus est, acidus, acerbus, frigidus siccus secundo ordine, sitim extinguens. Frutex Gallis Celticis *Poterium rubrum* est: occurrit quæ genus alterum, *Rhamnum* esse quidam volunt: quod *Poterium* fructu albo, est. Neque *Serapionis* tamen *Ribes* cum planta nostra topiaria conuenit: fruticosa siquidem & racemosa *ribes* nostra apparet: *Serapionis* verò herbacea imaginatur, & adhuc incognita nobis delitescit: at quæ nostras inter frutices vsui est ad seruanda de cuius etiam fructu *Rhus*, in consueendis *Sirupis*, atque aliis præterea conditis elicitur.

*Rima sedis* *ρ'αχιδός*, sunt quæ in musculo anum claudente, *Sphinterem* nominant, aut in circulo, & extrema corona ani sūt, similes iis, quæ in labiis ob *Boreæ* fla-



tum asperiores, accidunt aut ob acrium humorū defluxum, aut inflammationem, aut condylomatū, hoc est, rugarum, reduplicatis anī corpusculis, præter naturam in surgetibus, in extensione eueniunt. Curatio. author est Fuch. li. iij. de Med. mor. cap. xvi.

*Robus* ῥόδος, tritici genus pondere, & nitore præstans: sitque ex eo grano panis candidissimus, & cibo pergratus. ὁ κάλιος τῷ ῥόδῳ, ὁ δὲ ῥόδος, ὃν εἶδός αὐτοῦ τί.

*Robur* ῥύς ἀγρία ἀλυσκοῖος, quercus durissimæ genus est, cuius glans, quàm vulgaris quercus gravior creditur: arbor foliis nunquam decidua, sed viridis semper prospieitur. hac arbore abundat Narbonensis Gallia.

*Rodera* Gallis appellata herba, scriptore Gesnero, nuspia apud Græcos, & Latī nos autores tradita posteritati: quæ iuxta populos infrugifera nascitur, caule instar ficulnæ virgæ articulatæ, foliis vitice in medio albo quopiam macularis, quæ processu temporis tota rubent, flore argenteo: præcipua contra tumores, feruorēsq, & collectiones, per se, vel cum vetere axungia tusa imposita.

*Roratio* siue niuatio ῥόδος apud Theophrastum scribitur, quoties acini racemis desluunt: vulgus vinearum colluram & racemorum, iam flore excusso, dicit.

*Rosa* ῥόδον, flos, & rosalia, coronæ ex rosa, & rosarium, siue roserum ῥόδωνλα, locus rosæ cōsitus. Verūm rosa canina κύνοῦ ῥόδον, frutex, & Græca, λυγρίς. quidā interpretatur Rhodon insulam à rosa sumplisse nomen, poetarum figmēta, pro historiis vsurpantes: quod August. Eugubinus in fine libri sui Cosmopœiæ aperte refellit.

*Rosa* canina κύνοῦ ῥόδον, rubus vnguentariis Euglenterius appellatus: distinguiturque d. κύνοῦ ῥόδον spongiæ non producente: quas hic pro re medica gignit. Rubi canini species altera etiam inuenitur, quæ canina aliqui sentis, humi fortē repens, opinatur à qua quoque fructus, morus Celsi dictus colligi Myropolis solet.

*Rosula* seu patella ῥύλη, καὶ ἑπτοστάτης genu suprà eum contegens, nominatur: hæc vsū mouendi cruris, diducendique & vites ministrat: quoniam ea ablata mouendi ampliùs cruris siue genu ipsū spes tollitur.

*Rosmarinus* ῥίσαρις, frutex non ingrati odoris. Eum autem fruticem Plinius Libanotida ad Græcorum imitationem, vocat li. xix. cap. xij. his verbis Libanitis, inquit, locis purridis, & macris, ac roscidis feritur semine. Radicem habet olusarii, nihil à Thure differentem, vsus eius post annum stomacho saluberrimus. Dicitur itaque Libanotis à Thure, quod eius folia, & radix thus oleant maximè. Sunt autem species multæ Libanotidis: vna enim serax, quæ duplex est, mas & femina, folia habet Rosmarino nostro similia: sed vmbellam gerit quemadmodum Anethum, in qua vmbella, est Cachrys: cuiusmodi in canina rosa apparere solet, atque in ipso Cachrys semen complexum est. Cæterum hæc duæ Libanotidis species nobis sunt incognitissimæ. Est & alia Libanotis, quæ sterilis appellatur, eaque simplex: ramos sessiles habens, ac folia nostro Rosmarino similia: sed neque semen, neque semina gerit, passimque apud Pessularum Agatham reperitur. Est insuper alia Libanotis nobis cognitissima, Galeno lib. vij. Simpl. Coronaria vocata, quod ad coronas cōtexendas sit utilis, eamque, inquit, Romani Rosmarinum appellant. hæc C. Stephanus. Diosco. li. iij. cap. lxx. & lxxj. Quære Libanotis, & Cachrys.

*Rubia* λαινα ἢ ῥυβρίδιον, tinctoria radix officinis est, vulgò garancea: cuius fructus ad capitis defluxiones, & dolores continuos miros in adstringendo, & retinendo habet effectus. Est item sylvestris rubia, vulgus stellariam herbam vocat Diosco. lib. iii. cap. cxxxvij. Quære dict. Erithodanum, & Aparine.

*Rubigo* ῥί ἢ ῥυβίγη, morbus satorum è frigore & pruinis in vitibus carbunculus, in aliis plantis vredo, & rubigo vel robigo. hinc Varrone auctore libro j. Rei rusticæ, Robigo dea, & Robigus deus, quem veteres crediderunt robiginem amoliri.

*Rubus* βατός, frutex spinosus, Rura ronceam dicunt: Est denique rubi genus alterum χαμῆλατος, humile flagellis humi reptantibus, & crebro feradiantibus. Sunt & sentes inoperosi, vltis passim ronceas agricolis appellatas: & englenterius officinis vulgaribus herbariis, iterum caninus rubus est, κύνοῦ ῥόδον, quem Io. Agricola Cornum arborem existimauit. Quære dict. Cynos batos.

*Rubus* Idæus βαρύς Ἰδαία, vulgus Gallicum flābōysiam: Allobroges Ampoyam: suo more dicunt. Plinius locorum ob infrequentiam ignarus, in Ida Phrigiæ sylua nasci tantum putauit, Dioscoridis sententiam sequutus: sed iam hodie vbique luxuriat, ac passim frequens habetur. Iuga montium inter dumera colit, & amat: cæteris quoque Rubis aculeis mitior. nam terè viduus reperitur. Diosc. li. iiii. cap. xxix. & xxx.

*Rumex* ῥαπῆθῆρ, ῥῥαλῆς, dictus agnoscitur, quod succus eius acidus perinde seu ruma, id est, mamma ore exugatur. Oxalis tametsi ab hoc, cæterisque priuatim, nomine & facultate separatur, Rumicis genera suo loco distinximus in dictione Lapathum, & Oxalis.

*Ruscus* ῥυμψοῖν, Myropolis, & herbariis peregrinis vocatur Bruscus: Latini sylvestris Myrtus, siue Ruscum. folium producit myrti, latius in formam lanceæ mucronatum, bacce per maturitatem rubescunt, rotundæ à medio folio dependentes, osseo intus nucleo. ramuli cubitales, fractu contumaces. foliosi: radice graminis similis, acerbæ & subamaræ: qua vtuntur medici in decoctis vatis ad vrinæ stillicidia, & renum calculos. Diosc. li. iiii. cap. cxxix.

*Ruta* ῥῥῖνον, est & sylvestris ruta, satius viribus potentior: itaque audenter hortensia variis in antidotis quia mitior: & ad pestilentes affectus medicamentorum remedium primum. Sylvestris Ruta Moly, Bescanum, Bescasa, & ῥῥῖνον pharmacopolis, dicitur. Hermolaus Syrin protulit. Gal. lib. viij. Simpl. & li. Compos. pharmac. ix. Diosc. li. iij. cap. xliij.

*Ruta* muralis, nostris etiam medicis hodie Salua vita, atque hæc ab iisdem inter Capillates adnumeratur. Sed quoniam frangendi in renibus calculum vires sufficientes habet, Saxifraga recto nomine appellanda venit.

*Rubor oculi* ῥῥαχῆς, est oculicum rubore humiditas, & calore præter naturam ex adnata membrana, non ex corpore, sed adueniente causa aliqua, veluti, fumo, sole, puluere, aut alio aliquo oborta. Aliquibus ophthalmia ὀφθαλμία nō vera, & perturbatio oculi nuncupatur.

*Rufa* vrina seu aurea, est quæ auro puro similis apparet. Græci χρυρῶν nominant: & subrufa paulò tensior est. Ea si sic colorata meitur, & concocta apparet, sanitatem portendit. Quare dicit. Subflaua vrina.

*Ruptura*, quæ ρῥυξις Græcis dicitur, in carnosis musculorum partibus ex distensione proueniens, appellata est: cum autem filamenta similiter tensa rumpuntur, conuulsio est. Galenus lib. de Constitut. Artis.

*Ruptura oculi* ρῥῆξις, est vel ab ictu, vel ab alia quapiam causa in alto integras membranas secans, vt humores etiam quibus administrandi visum facultas datur, effundat.

*Rarum*, densumque vocabula non perinde euidenter ipsos corporis affectus significant: duplex enim eorum nominum vsus obseruatur, alter eorum qui propriè loquuntur, alter aburètium. At tantum propriè dicimus quod poros magnos per totum obinet: sicuti contra, densum, quod paruos. per methaphoram autem hæc de laxo costoque dici audias.

Galenus de Sanitate tuenda  
libro secundo.

\*\*\*

T 2



## De litera S.



**S**abina βελβύ, potius frutex, quam herba, quæ ῥόδιστρος quoque Græcis cognominatur: duplex inuenitur, maius quæ fructum cyperi similem profert: & femina, quæ sterilis est: utriusque folia arida & in pollinem ducta antiqua vlcera sanant, nomas fistunt, collectiones illi-  
tu mitigant: & cum melle nigritias sordisque repurgant: fusileu fortus  
rtahunt. Diosco. li. j. cap. lxxviii.

*Sacchar σάκχαρ*, est velut liquor mellitus in arundinibus maritimis collectus, & spissamenti modo candidus, deinde arte ut concretus. Quod autem ad nos ex In-  
dia vehitur Sacchar, à regione Indum officinis nominatur, vi solis gutta extra can-  
nas extracta & densata. Similiter Atabum sacchar, quod Zucharam ipsi vocant, re  
ipsa esse apparet, solo differens compositionis modo perpositionem, & expressionem:  
Varroni Malsiliensi his versibus, qui eidem authori referuntur, cognito, dum ait:

*India non magna nimirum arbore crescit arundo,*

*Illius ex lentis premittur radicibus humor.*

*Dulci cui nequeant succo contendere mella.*

Dioscorides libro primo, capite septuagesimo quarto: Est & aliud concreti melli ge-  
nus, quod Sacchar nominatur. In India verò, & felici Arabia in arundinibus inueni-  
tur. salis modo coactum est, detribus, ut sal, fragile. alio idoneum, & stomacho utile, si  
aqua dilutum bibatur. vexatæ vesicæ, renibusque auxiliatur. hæc Dioscor. Repete di-  
ctionem Melaëtrium, vel Aërium mel.

*Sambucus αἰξάνη*, frutex qui arboreseit: cuius semen post maturitatem in tin-  
gendis telis, aptissimum: & acini qui intus inveniuntur ad aluum exonerandam pur-  
gandamque triti & potu mediocriter exhibiti iuuant. Est præterea Sambucus humi-  
lis ἄλυσανη Græcis, Ebulus Latinis: quæ facultates quas habet Sambuco æquat:  
nisi hæc fuerit acinis in purgando pronior, radicæque in medendi usu ob id etiam aua-  
ra manu admittenda est. Quære dict. Ebulus.

*Sacculi* sunt quæ veteribus fomenta arida appellabantur: componuntur autem  
ex radicibus, floribus, herbis, feminibus, quæ coquuntur ex aqua & vino, dein expres-  
sis siccis apponuntur sacculi. Quære dict. Fomenta.

*Sacer* morbus Epilepsia est, aliquibus conuulsio. Hippocrates sacrum quoque  
morbum magnum vocat, ut ardentem febrem, & pestilentem: quod Græcis nimi-  
rum sit magnos morbos, sacros. & res magnas, sacras: hoc est, execrables, vlitatum  
dicere. & apud Vergilium, *Auri sacra famas*. Quære dict. Epilepsia, & Conuulsio.

*Sagapenum σάγαπενον*, ferulaceæ herbæ succus Dioscoridi est, Galeno frutex fe-  
ruleus, ex quo is succus Sagapenum nomine, fuit, describente lib. viij. Simpl. Pli-  
nio verò quod in Italia gignitur, in totum transmarino alienatur: illud enim Am-  
moniaci lachrimæ simile, Sagapenum vocatur: Myropædis Serapium. Quære dict.  
Ammoniacum.

*Sal* Indus, Arabibus Zuchara est, quem Io. Agricola contra Leonicum Diosco.  
esse Sacchar contendit, non è genere salis, quod cibis admiscetur: sed mellis roris, vel  
aëtrij. Repete paulò supra dict. Sacchar.

*Sal αἰξ*, ut regionum profert diuersitas, sic cum denominatione, suas vires de-  
monstrat: sal enim fossilis efficacior est, cõmuniter, si est candidus, calculis vacans, &  
perspicuus, dësus, æquali cõpage. peculiariter Ammoniacus natione laudatur, si mo-  
dò fundi faciliè possit, & in recta segmenta diduci. In marino sale eligendus est, cãdi-  
dus æqualis, dësus. Salis natura in cõmune perquam utilis est, adstringit, absterget, ex-  
purgat, dissipat, reprimit, extenuat, & crustas inducit. sed hoc inter est, quod aliis alio  
sit prestantior. quin & à putredine vindicat, medicamentisque admiscetur.

*Sal* fofsitius, vulgò fal gēma, fal nitri, officinis fal petrae, fal Armeniacus, qui & fofsitius: fal alkali, id est, axungia vitri Aromatarius, quæ fex materiz, de qua vitra conflantur, cæteræque corpora dyaphanica, est: vulgò autem fal vitri. fal Ammoniacus similis schisto lapidi: & omnium laudatissimus fal marinus, qui in vfu frequentissimo hominibus habetur.

*Salis* fapor, terreus, calidus, hinc digerit, deterget: illinc cogit, contrahit, densat, vitroque siccatur, & falsa à putredine vindicat.

*Salar*, Trutta nostra vulgaris est: cui tergus guttis purpureis distinctus est, inter pisces Saxatiles concoctu facilissimus: ob id quoque delicatissimus mensis magnatum deprehenditur.

*Salis* flos, aliquibus maris, lacuum, & Nili fluminis spuma, quæ super his innatat, assumendus qui crocei coloris est, odore ingrato, seu gari. interdum longè magis virus olet, gustuque mordacior, & pinguitur lentus. qui syncerus non nisi oleo resoluitur, alioqui impurus notatur. Ad vlcera, quæ cacoëthe vocantur, & phagedænas, genitalium nomas, & purulentas aures, effica est. Diosc. li. v. cap. lxxvij. Galenus li. xj. Simpl. spumâ salis ab eiusdem flore distinguit, *ἄλως ἀρρός, καὶ ἄλως ἀ' ἡνι*, utrunque nominans.

*Salvia* nostras *ἡ ληνισφάκος*. quæ differt à Sphacelo Græcorum, quia folio maiore, squa lidiore, scabrioreque constat, Salvia agrestis existimata est: nostras verò breuiore, leuioreque folio est: atque ex Theophrasti verbis nostra Salvia francha Sphacelon exprimere videtur. Gal. lib. vj. Simpl.

*Salamandra* lacertæ genus est: iners, varium. quod frustra creditum ignibus non vri, hæc ad certum vsque terminum ab igne nihil patitur, vritur autem si longiore spatio igni sit admota. Gal. Temperament. li. iij.

*Sagitta* τὸ ἀμυδρότερον μέρος τοῦ χόλδον, καὶ ἀποῦ, purulentiorebus iusticiis, id est, nouissima pars furculi, sine qua longius à matre recessit, & quasi ecurit, atque profiliuit: seu quia cacumine attenuata predicti teli speciem gerit, vocata est. hæc Gesnerus.

*Salmaris* herba *ἐν πηδόν*, quod salinam oris eliciente seruire ciet, appellata: officinis pes Alexandrinus, hortis Gallicis familiaris. Stargónque olitoribus, quod nimirum esu saluam moueat, dicta: & acetariis non parum commendata. Diosc. lib. iij. cap. lxxix. Quære dict. Pyrethrum.

*Salinucam* Gesnerus Nardum Celticam, vel Gallicam, *ἡ ἑρπύλη καὶ ῥόδον*, existimat: quam Satureiam Columellæ & Cunilam, eandem esse herbam, vel plantam facit. Dioscorides libro primo, capite septimo, duo scribit genera: vnum nascitur in Liguriæ Alpibus, Salinuca patrio nomine appellatum, iucundi odoris. alterum montanum, quod ab aliquibus Niris appellatur. neque caulem, neque fructum, neque florem profert: atque ad eandem ad quæ Celticum effica. Quære dict. Cunila, Neris, & Nardus Celtica, siue Gallica.

*Salix* arbor *ἡ ῥέα*, neque infrugifera, cum ad multa remedia folijs viridibus,omento, & semine utilis experiatur. Est & Amerina salix, cuius tradidimus rationem loco suo descriptam. Diosc. lib. i. cap. cxvij.

*Salmo*, piscis ex mari fluuiatilis, squamosus, carne firma, vt boum, rñbra, tibi delicatissimi quibus facit ad palatum, existimata. Frequens est hic piscis in Liguriæ ad Rhodanum vicum, oris, vt copia chartis Lugdunum Galliarum urbem longè mobilem, recens vcharur.

*Salpa* ἡ σαλπη, piscis ab Aristot. li. v. de historia animalium, & ab Athenzo Dioposophist. li. vij. descriptus: sed cuius temperamenti, facultatibusque sit, aut magnitudinis, & figuræ adhuc me nescire fateor. Quære Gillium de Piscium Gallie notitiâ.

*Salicæstrum* *ἡ ἑρπύλη καὶ ῥόδον*, id est, species vitis agrestis, in salicis quæ nascitur similis viti syluestri caustica: recentioribus, scāmula Iouis appellata. hæc Gesnerus.

*Salubr*, & mortis signa alterius generis in morbis sunt, quæ nimirum cum vrina, alui excrementis, spurisque excernuntur: facilis spiratio, leuis tolerantia, bonitas pulsum, facilis somnus, facies simillima sanis, decens decubitus, sudor, & his contraria:

quæ singula ex Hippocrate in præfagiorum libris sunt petenda. Tertij generis indicatoria signa dicuntur *αποκριμμένα*, & horum quidem natura duplex est: aliqua enim tanquam causæ & signa sunt, ut vomitus, excrementa alui, & huiusmodi. Aliqua verò tanquam signa solum habentur, ut delirium, vigilæ, & huius generis alia: quæ omnia indicatoria signa, & *αποκριμμένα* appellantur. Secundum verò eorum propriam substantiam considerata, quatenus scilicet morbus sequuntur, Symptomata indicatoria nominantur.

*Sandix*, color est qui fit ex cerussa, sed primum ex sandaracha vsta, & ex eadē tota cū æquali rubricæ parte in Sâdicem vertitur. quanquā ex Dios. Galeniq; lectione Sâdix statim ex Cerussa vsta redditur. Aëtius li. ij. cap. lix. Potuit quandoquidem fieri ut apud Vergil. Ægloga tertia pro Sâdice Scandix legeretur: cū de herba minimeque de colore certaret. quæ propter deceptus fortè Plinius lib. xvj. cap. xvj. Vergilianæ lectione, plerisque cum Servio, errandi causam tradidit.

*Sandaracha*, non solis natalibus, sed etiam tota natura affinis, ut coctione sola nature videatur hæc arsenicum vincere id enim vstione Sandaracha fit, ut Cerussa trita, mora, probè vsta, in Sandaracham transir pictoriam. Vitru. lib. vij. authore. Ad hæc Sandaracha licet rubra sit, aqua tamen soluta luteum colorem intensum facit: flordum autem colorem luteum reddit Arsenicum: quod Chymistis absolutè est album naturale & fossicium. Vide necum Arabibus Sandaracham voces gummi juniperi, novè vires illius huic attribuas. his plura Syl. lib. j. de Medicamen. simplicium natura. Diosc. li. v. cap. lxxj. & li. vj. cap. xxix.

*Samarā* *ὁ τῆς ἐν τῇ ἀρχῇ καρπός*, hoc est, vlmī arboris semen, ut scriptū reliquit Gesnerus: verū Fraxini suspicandum, vlmus nostras in foliis ad vesicæ similitudinem poma profert, in quibus liquor continetur, referente hæc etiam Dioscoride, medicamentis utilissimus. semen præterea nullum animaduerti. Diosc. lib. j. cap. xcv.

*Sampfuchus*, & Sampfichum *σαμψύχον*, id est, amaracus, maiorana: Rura interdum Origanum maioranam lentiorē, sed abusiue, vocant: medicis aliquibus *Μαρόν*. Diosc. li. iij. cap. xliij. vbi Sampfuchus, Maiorana, & Amaracus pro plāta eadem usurpatur. Quære dicit, Maiorana, & Amaracus.

*Sanamunda* notitiz vulgaris herba est, quæ aliqui Garyophyllata, & pentaphyllon, herbarij posterioribus denominata: atque ab olitoribus, culinariisque in arteriorum venit vsū penè quotidianum. Quære dicit, Pentaphyllum.)

*Sanicula* herba, ex pentaphyllorum genere non est, quamvis sic voluerit Ruellius: quæ si præcis authoribus cognata non legitur, notum nomen agnoscat oportet: quale istud quod recenset à Gallis traditur. vulnera agglutinat tusa, & imposita pro a muleto mulierculis Parisinis suscipitur.

*Sanguis* purus ac syncerus, est calidus, humidus, & dulcis. sanguis namque intelligendus est animalis secundum naturam habentis: nam is verè sanguis est. Melancholicus, aut pterocholus, aut pituitosus, aut serosus, aut putridus, sanguis est mixtus ex sanguine vero, & succo, aut sanie illi permixta: Gal. lib. x. Simpl. medi.

*Sanguis* naturalis siquidem est, reliquis humoribus, qui illi commixti sunt, dominatur, & sanguis simpliciter dicitur: sed si præter naturam affectus fuerit, ipse ab uno, aut à pluribus sibi mixtis humoribus separatur, & non simpliciter, sed cum adiectione, vel sanguis biliosus, vel pituitosus, vel melancholicus, appellatur.

*Sanguis* naturalis, unus est qui in venæ sectione, & vulneribus vacuari videtur: hic quidem purus, & bilis versusque, à dominio sic appellatus, particeps est. Alter autem purus, & syncerus est, nec cum humoribus alijs mixtus.

*Sanguinis* naturalis eploz tuber est, & eius loci constitutio, vena, & arteriz: distat tamen sanguis, qui in arteriis est, ab eo qui in venis habetur: eo quod calidior, & magis tenuis, fluidior, que existat. Galeno teste, libro primo Locorum affect. capite primo, atque eiusdem sanguinis officina, ac primarium instrumentum iecur existit: auctore eodem Galeno lib. iij. de Vsu partium.

*Sanguis* facit moderatos, tidibundos blandos, venustos, ac floridissimos quoque vsus

vfus, vt puttiar, & dominatur ab hora noctis nona, vfque ad horam diei tertiam.

*Sanguinis* profluuium à naribus euacuationis genus quidem est, quod præcipue de  
cerebri obstructionibus, à capiteq; destillationibus confert, multoq; alios morbos indi-  
cat. Gal. de Crisibus lib. iij. Fuch. curationis author est de Meden. morb. li. j. cap. xxix.

*Sanguinis* profluuij narium signa sunt hec, splendores ante oculos ob humorem flauum apparentes, hebetudines, spontaneæ lachrimæ ob fluxus multitudinē: rubor in malis, & narijs apparet: hypocondriorum sine dolore reafio: spirandi difficultas: & capitis graues dolores, calidi & pulsantes.

*Sanguis* ex vesica eruptio, est quæ fit interdum vena in vesica rupta, & sanguinem foras mittit, partem intus in grumos densat : post verò æger pedecentim animo linquitur, ac pallefcit, pulsusque languidos habens mœrore refrigeratus angitur, & viribus destituitur.

*Sanitas*, de Symptomate. Gale. authore est naturalis affectus functionis effectrix; nec inter est, an affectum statum. vè, qui actionem efficiat, dicas, an actionis causam; similique modo nec si illud naturale auferes, quicquam refert.

*Sanitas, & quabilitas primorum quæ nobis infunt humorum, ex calido, frigido, humido, & sicco temperatis, symmetria instrumentalium verò partium ex commoda magnitudine, numero, forma, & situ consistit. Acakia super lib. j. Galen. ad Glauconem.*

*Sanguinaria* herba *πύλινος*, duplex ex Diō. lectione inuenitur: mas seu polygonum & scemina sine polygonatum: quarum suo loco ptes dist. Polygonum.

*Santalum lignum*, *Santalum triplex* officinis ostentatur, candidum, rubrum, & luteum, vulgò citrinum appellatum: quod quidem Aspalathi, quā sui generis ex nomine, lignū creditur: in quo etiam calida nō frigida facultas expерitur. Græci neoterici, qui de re medica scripserunt, eum Arabibus, posterioribus Latinis memorie prodiderunt: India ad nos vehitur. *Syl. de Medic. simpl. nar. lib. 4.*

*Sapa* <sup>¶</sup> *Ind.* xxi. *sapa* or, est quæ fit ex musto ad partem tertiam decocto: quod defrutum appellari tradit Pli. lib. xiiij. cap. ix. Quære dicit. Mustum.

*Sapor*, est ex quo medicamentorum temperatura, ut in variis cibiorum generibus, deprehenditur: ut qui vel adstringens, vel austerus, vel acerbus, vel acidus, vel dulcis, vel amarus, vel falsus, vel acris est. Adstringentia, austera, & acerba, atque acida ex-  
tè, hoc est, nulla sensu notabili alia qualitate participantia, omnia frigida sunt.

*Sapbaturum* a<sup>u</sup> Xūs est malum tenuius admodum foraminibus capitis cūrem per-  
forans, quibus glutinosa fānes exeerunt. hoc mali genus in pueris plerunq̃ fir-  
mū ē, & a tinea rum in vestibus similitudine, tinea capitis nomīatur.

— *Saphyrus*, preciosus lapis, qui potus idios a Scorpio iuuare creditur: inter illorum  
vicerationes potu emendar. Saphyrus melior ex caruleo, flauus seu caruleus ex pur-  
pureo puluere aureo interpersus, seu nubibus obscuris, & subtrubris ob id subobs-  
curus est melior perspicuo, Diofco, libro quinto, capit. nonagesimo tertio, Gal. Simpli.  
lib. nono.

*Sapinea στειλὴς ἐλάτης τὸ κατώτερον, ὁ μολῶν, καὶ χιόρκι ὁ ὤρεινός τῆς ἑλ-  
 τῆς, hoc est, inferior abietis pars, enodis. Virruuo ita scribens cecius pars superior  
 susterna appellata est.*

tuiteria appellata etc.

*Sarcocolla* σάρκοκολλα gumi genus arboris Perfice orbi nostro incognita. Diof-  
 phat. refert. Sarcocolla, lachrima est arboris in Perfide nascentis, pollini thuris similis.  
 rufa, gustu amara. emplastris inferitur. Galib. viij. Simpl.

*Sardonias* herba βαλάντιος ἢ ῥοδανθίδου, est, *Apiastrum* cuius genera plura ab Au-  
thoribus describuntur, sicuti a doctis in diuersis. *Ranunculus* reliquimus.

-111. *Saryrian* *enrupi* or quod & triphyllon officinae (sub testiculo sacerdotis adnume-  
rant. est & erythronium) *pugon* or saryrij genus, lini semine maiusculo, & firmior

quàm viticis, nitido, ac leui: ex Plinio fertur in montium iugis inueniri. Satyrion ierum Indicum sub Bucheidis nomine, & sub Syri herba: cuius notitiam nondum legi. Ex Theoph. & Ruellio plura recensuit Gesnerus.

*Satyrj* genus est tertium, *βασιλίδιον* ὀν ὀν ὀν ὀν ita Græci vocant. Latini officinæ Christi palmam, foliis nigra plumbagine maculosis, reliqua superficie cynosotchi similis: cuius radix instar mannis effigie ramosa foditur. Galliarum Mysopolæ Cicum, id est, Keruam herbam, Latini Ricinum, à folij figura eam palmam Christi nominant.

*Satureia* τὴν ἰσχυρὰν, rura fauoream, & sarrietaam, plebeij autem maioranam Anglicam, vocant. Descripta est in dict. Cunila.

*Saxifragum* σαξίφραγον Dioscoridis, iudicatur Ruellea, quæ nostro seculo Salvia vita, vulgò parietaria, vocatur: multis tamen, & recentioribus herbarum scriptoribus plures eodem nomine insigniuntur. *σαξίφραγον* Græcorum à nostra vulgari Saxifraga diuersum est, tamen vtrunque calculos confringere certissimum: quod esse Betoniam siue Cestum ex Diosc. & Galeno affirmat Sylius: quineriam à castro Betoniam lib. v. Sanitatis ruendæ videtur separare Galenus.

*Satietas* τὸ πολὺ φάγειν, ex cibi abundantia est: quæ duplex describitur sic à Galeno Aphor. lib. ij. comment. xvij. vna ad vasorum amplam capacitatem, vt hinc distendi ventriculum contingat altera ad virtutem, vbi scilicet plus cibi ingeritur quàm natura, aut facultas corpus nostrum gubernans superare possit.

*Sarda*, & Sardinæ ex hoc dictas Galenus putat, quòd ex Sardinia importentur, vt conicit Scholiastes: verum quo argumento ductus, tacet: cum genus hoc pisciculorum in mari Mafiliorico venetis copiosissimum. Recens concoctu facilis hic quidam piscis est: qui sale conditur, difficilior.

*Scirpus* ὁ χοῖρος ἰσχυρὸς, id est, iuncus palustris & enodis: cuius genus multiplex enumeratur: vnum *χοῖρος ἰσχυρὸς*, id est, iuncus odoratus à flore: officinis palea Chamelotum appellatus. Quære dict. Iuncus.

*Scammonium* σκαμμονίον, καὶ διακρύδιον, herbæ Scammoniz succus, appellatur: aliquibus verò lachryma, heque tamen arboreus frutex, sed in totum herbæ plāta est: à teros radice vulnerata primum lachryma, deinde confusa succus exprimitur, noménque postea herbæ retinuit: vt tandem Scammonium, & diacrydion idem dicatur. Diosc. lib. iij. cap. cllj.

*Sarcoticum*, id est, carnem gignens in cauo vlcere, est siccum gradu primo, detergens modicè & sine morbo, non adstringens: vt hotdei farina, thus, & quæ plurima lib. Methodi à Galeno describuntur, & Simpl. li. v.

*Scandix* σκάνδις, in genere syluestrium olerum est Græcis, gyngidio, id est Cheryphyllo, similis: amara, subactis in cibos cocta vel cruda admittitur, est utque. Inter segetes sub nomine Acus pastoris, & peccen venerit, quod in vertice corniculato acus aut peccenis representet effigiem, appellatur. Diosc. li. ij. cap. xxxij.

*Scabiosa* σκαβία. Aetij quibusdam imaginatur, non autem Storbæ antiquorum, officinis Iudaica herba nominata Ruell. li. ij. cap. xliij.

*Scapus* καυδὸς ὁ φθίδας, caulis Latinis dicitur, vulgò grappa racemi, & à Nostris fructu corymbantiū, si in styli modū sursum prorepat, aut in altum feratur.

*Scarificatio* τραχυντὶς, est quæ quoties in aliqua corporis parte inter cutem & carnem sanguinē impitū, cutē penè dissecta culto rasorio, id est, nouacula, & cucurbitula loco affixa, quantum par est, detrahimus: quam laudat plurimum Galen lib. de sanguinis missione per venas. Quære dict. Syrsimus.

*Scariola* seu seriola, Sonchi species minus spinosa Manardo videtur: a liis à seride, id est, Cichorio nomen, deprauatum. Vtue est, inquit Sylius, cum hæc omnia cichorij sint differentiz vitibus affines, vnum pro reliquis sumi potest.

*Scincus* Diosc. descriptione li. ij. cap. lix. Crocodillus terrestris, non Niliacus, est: quod vulgus officinarum Scincum vocat, & Lacertam aquarum: quoniam Scincum esse opihator: deceptique ea pro Scineo vtuntur.



*Scissus*, Galeno Composit, pharmaco. lib. iij. lapis est, Hematites lapidis vim persimilem, sed infirmiore habens. Diosc. lib. v. cap. xci.

*Scylle* σχοῖνος bulbi genus vnum Hipp. sic nominatum, vt interpres est Galenus: nam Scylla σχύλλα, quæ Varroni Squilla dicta est, retinuit apud posteros nomē: alijs Cepa marina, quia ibi frequentissima, hoc est ad maris ripas, nascitur, & ad multa vitilis remedia colligitur, vim acrem atque feruentem habens. Diosc. lib. ij. cap. clxiiij. Quære dict. Pancratium.

*Scitale*, serpentis genus, varietate tanta tergoris notarum gratia præfulget, vt ipsum se videntes ab itinere retardet: calidus adeo exuius non vt ad ver, aut autumnum, quemadmodum serpentes cæteri, sed hyeme deponat. Lucanus poeta:

*Et Scitæ: sparsis etiam nunc sola primis*

*Eximias postura suas. &c.*

*Scabies* seu pruritus palpebræ ῥοδόφυλλα, pruriginosa palpebrarum scabies: σκλίφοφυλλα, verò dutities est, & difficilis cū dolore & rubore citra humiditatē oculi motio: ῥοδόφυλλα autem, est pruriginosus sine fluore palpebrarum affectus, qui lippitudo arida dici quidem potest.

*Scapula* seu scoptula, ὠμοπλάττω, post thoracem operitur, sitz sunt: atque ipsarū proceßus superior, & vertex ἀντιπρόσωπον, quasi summus humeris, nominatur. Ceruix seu collum scapulæ est quod in acetabulum definit. Sceletos σκῆλετος, est humani corporis ossium inuicem coherentium vniuersa compactio. Gal. in lib. de Ossibus.

*Scientia*, est habitus præceptionum, opinionem firmam, & immutabilem sub orationis forma apprehendens, & nunquam à ratione aberrans, vel, Scientia, est conueniens, firma, & nunquam à ratione declinans, cognitio: vt est author Gal.

*Scirrbus* σκίρρως, tumor est præter naturam doloris expers & durus, sed non sine sensu, nisi exquisitus omnino sit. Gal. ad Glaucon. lib. ij. & lib. v. de Simpl. medic. facult.

*Scelopendrium* σκολοπένδριον, ἀσπληνός, asplenium, vulgò cetera chrefes Sche niliæ vermis villosi imaginem, Græcis σκολοπένδριον nominata, herba subinde nomē retinuit. Scrib. Largus herbam σκολοπένδριον Calciphragam est interpretatus, capit. clad calculos expectam. Quære dict. Asplenium.

*Scosymus* σκόλυμος, catduus syluestris, vt Cinar altilis: sed Diosc. à Cinar Scolymum diuidit subdiuersis capitibus. vide quæ restant in dict. Atractilis, & Caucalis.

*Scombus* ὁ σκόμβος, ex genere lacertorum est: qui & Lacertus aliquibus mare incolentibus: alijs Auriolus: Lurecianis verò populis Macareus est appellatus: boni succi, plurimique alimenti esse creditur. ob id etiam ἐύχυλόν Hiccius apud Athenæum appellat. hæc Scholia stes.

*Scopa* regia βούρβω, est caule quadrangulo, apij folio, flore anethi, semine odorato: quam violam flammæam, & sideritim, quæ latissimo est folio, appellauit Plinius. Gallis Carpentariam existimat Ruellius dictam, quod Carpentariis ad vulnera curanda expectatur. Scopa regia Scrib. Largo oxymyrcine, id est, Rufcus, interpretatur.

*Scoria*, est metallorum omnium spurcicia, recrementumque, & velut ferri ster-cus, cæterorumque metallorum: Rubigo ferri, sicut scoria plumbi propriè dicitur. Restringit rubigo, sistitque sceminarum profluvia admota: potiusque præstat ne cōcipiant. Diosc. lib. v. cap. xlvj.

*Scordion* σκορδιόν, Latinis Trifago, & quercula palustris, vocatur: ex Myrteßo Fuch sie scribit, Herbula est Scordium virgulas mittens quadratas, rectas, oblongas, folia adstringentia, florem rubicundum. scordium dictum est ab odore, & acrimonia Scorodi, hoc est, allij satiu, & segetalis. Est & Scordiotis, quasi Alliaria herba dixeris, cuius folia cū primū emicant, circinatæ sunt rotunditatis, violæ nigre similitudine, verū adulta in angulos exeunt, allij odoratu cū teruntur. Trita herba adeo allium redolet, vt iniurijs pro eo sustitui cœperit: inde nomen ei dederunt officinæ.

*Scorodum* σκοροδον, allium sativum, agrestique est: verumque notitiz vulgaris: differtque à Scorodopraso σκοροδοπρασον, alij porrique promiscuam naturā referens. coctum dulcescit, & porri modo estur. officinæ allium porrinum appellant.

*Scorpius* siue Nepa σκορπιός, semen habet ad similitudinem caudæ Scorpij animalis, & folia pauca. Est alia denique nominis eiusdem, effectusque, sine foliis, asparagi caule, in fastigio aculeum habens: cui inde nomen. Est item Scorpioides, quæ differt à Scorpiuro, hoc est, helyotropio, ab effigie scorpij caudæ, quæ in floribus habetur: quanquam & hoc nomen Scorpioidi tribuitur. Iterum est Scorpiis, seu scorpidiū Nic. Myrepsio herba, quam nomine alio metipse Ceterach, vt Pharmacopolæ, herbariique vulgares, appellant. Quære dict. Nepa.

*Scrotum* ὁ σχιός, commune vtriusque testiculi, omniumque interiorum velamentum, quod rugosum apparet: & morbi qui in eo proueniunt, speciatim suis locis describuntur, sub differentiis hydropisis. Est & Scrotum animalculum, nomine alio Ricinus, cuius repete dict.

*Scotoma* σκότῳμα, malum est in quo obtenebrationes, hebetudinēque oculis obuerfantur, & omnia circumagi, & rotari videntur: nomine alio Vertigo hic morbus appellatus. Quære dict. Verrigo.

*Sebasti* σέβαστοι, καὶ μυζα, Romanis Myxaria in honorem Augusti dicta: retinuerunt quoque fructus & hi nomen Sebeste Myropolis. Quære dict. Myxa.

*Secale* σπυζα ex Galeno, est & quorundam recentium sententia, vna ex tritica litera, Secle, vulgaris notitiz triticum, à frumento nobili grano tamen diuersum: quamquam genus omne frumentationis, loco sarris sepe reposuit Cæsar Iulius in Commentariis Gallicis. Plinius paulò aliter granum hoc quàm posteritas, describit.

*Sella* δῦπτῑς, est dogmatum plurimorum ad sensus artificiosè compositorum, quæ ad finē vnum referri possunt: sed adeo inoleuit odiūque habetur hoc nomē hære sis isto seculo, vt suspectum veniat hominibus ignaris, minimè verò probatis, si de controuerſia quandoque certandum est.

*Seder* affecta partium corporis humani, & ipsius dispositio, qua via, & ratione sit, mul cognosci potest, tractat fusissimè Galenus libro secundo, de Loco affect. notitia, capit. tertio.

*Securidaca* ἡ δισκὸν, πέλλακος, hedyſarum scriptoribus nostris suspicatur: officinis faba lupina, herbum, & grana, nominum diuersitate appellata, confusa legitur, Diosc. lib. iij. cap. cxliij.

*Sedum* δ' ἐλζὼν μίζον, triplex est idem nomen retinens, id est, semper-viuum maius: alterum medium Thelephyon, id est, faba inuerſa, vt aliquibus placet: Gesnero vermicularis, & cauda muris vsurpara est. Intelligendum suspicor de minore Sedo, cuius vnum ex calſactriz facultaris, & alterum frigidæ, deprehenditur: tertium Sedi genus. Quære dict. Aizoon. Diosc. lib. iij. cap. lxxiiij.

*Secunda* seu secundina χαρίον, membrana tertia est, quæ extrinsecus circumposita est, tenuis quidem, verum fortis, toram integens vuluam interiorem.

*Selago* πῶς τῑς ὁ μοῖα βραθυ, id est, similis herbæ Sabinæ: hanc, inquit Ruell. contra omnem perniciem habendam prodidere Druydæ Gallorum, & contra omnia oculorum vitia finum eius prodesse.

*Seli* Hippocrati πῑσῑλῑ Græcis, & Latinis nominatur triplex reperitur, vnū Massiliense laudatissimum: alterum Aethiopicum: tertium Creticum. Diosc. libro iij. capit. quinquagesimo primo.

*Selinum* σελινόρι, apiū vulgare aliquibus est, quod petrapiiū, & petroselinū, id est, persillum vulgare peritioribus medicis deprehenditur. Quære dict. Hyposelinum.

*Semodur*, mensuræ genus, libras vigintri quatuor capit: selibra verò, id est, libræ pars dimidia, quæ & semis dicitur, scrupula habet centum quadraginta quatuor.

*Seitargum* seu starchon Indum, Lepidum vult esse Syluius: alij Iberidem malunt: sed viribus parum variant, vt etiam cardamomum, & cardamine pro his poni possint. Quære dict. Iberis.

*Semen σπέρμα*, est quod à cerebro, spina. dorsi, arteria & vena, excernitur, & per prolifica vasa in genitalia, vt elaboretur, demittitur: quod fit idem de muliebri: sed retentum vt in viris, non eiacularur, sicut auctor est Gal. in lib. de Semine.

*Semen* humanum gignentia & prouocantia, sunt calida, flatuosa, bene nutrientia, vt bulbi, fabz, scincus, Satyrion, eruca, gallinacei testes extinguentia verò, sunt refrigerantia, cortumpentia, deficcantia, omnibus substantiis contraria, vt nymphæa, Sic ruta, agnus-castus, qui est vitex, suo calore seminis substantiam consumunt: sed supprimunt frigida alimenta, & medicamenta sumpta, aut admota, vt lactuca, blitum, portulaca, cerasum acidum, & huiusmodi.

*Semini* profluuium γυνήσ' οἱ α, est excretio seminis præter voluntatem, citra pendendi tentiginem: sitque ob retentricis in vasis seminariis facultatis imbecillitatem, aut ob aliud malum, quod semina riorum vasorum partes eodem modo, quo expultrix secundum naturam facultas mouet, velut in comitialibus, & aliis violentioribus conuulsionibus, contingit.

*Semiteriana*, est febris continua quæ ad integritatem nunquam quidem deducitur: nec diuturnior febris est, quod Agathinus medicus putauit vt docet Gale. lib. ij. de Differen. febr. capite decimo, & vndecimo. Quære dict. Febres.

*Senecio ὁ πρῆστῆρ*, vulgaris notitiz herba est: cauliculo cubitali, subrubeo, foliis continuis, diuisura erucæ: luteis floribus, qui celeriter vaneſcunt in pappos. Tota herba cruda, coctavè & cibo sumpta suspiriosos adiuuat. Dioscorides libro quarto, capit. octogesimo secundo. Quære dict. Erigeron.

*Sensus*, est à nervis vicariis animæ affectus, qui res corporeas denunciat, & rerum creditarum sensorium rediens instrumentum: cui sensile obnoxium est. Hinc sensibile est quod visu, auditu, gustu, odoratu, tactu percipiuntur.

*Sensoria* autem instrumenta sunt, oculi, lingua, nares, & aures. Sensus, sunt visus, gustus, tactus, odoratus, & auditus: qui omnes à cerebro defluere, ab ipsoque septem nervorum syzigia coniugationesve oriri: à spinæ verò medulla reliquos, certum quidem est. Quære Galenum in libro de Oculis Theoremate secundo, capit. primo, & capit. iij.

*Sensus* communis, est vis ordinata in prima concauitate cerebri, recipiens per se ipsam formas omnes, quæ imprimuntur quinque sensibus: cuius obiectum est sensibile. Prima operatio, est iudicium sensibilis operationis: secunda, est ordinare sensata, diuerſorum sensuum.

*Imaginatiua*, est virtus retentiva eius quod impressum fuit in sensu communi: cuius obiectum est imaginabile similitudine spiritali, cuius actus est imaginari. Imaginari enim est cum volumus facere præ oculis aliquam imaginem, quæ adhuc præparat. imagines aliis potentiis operantibus in ipsa.

*Cogitativa*, est vis inquirens singularia decem prædicamentorum. AEstimatiua, est virtus apprehendens de sensato, quod non est sensatum, sicut quis in inicitiam lupi, cuius obiectum est illud quod non est sensatum. actus est determinare fugâ, vel imitationem propter conueniens, vel disconueniens.

*Fantasia*, est motus in potentia mota suscipiens à sensu specie sensibilè, cuius obiectum sunt imaginationes.

*Operatio*, est componere, & diuidere ad eliciendum conueniens, & fugiendū noxiū, cuius corruptio est, quoniam corrumpitur, vel disturbatur in caput.

*Memoria*, est conseruatix intentionum, quas apprehendit æstimatiua, & redit in rem per speciem apprehensam, & conseruatam: cuius obiectum est intentio rei illicita tempore præterito: cuius actus est per intentionē venire in imaginē, & per imaginem in rem prius acceptam.

*Reminiscencia*, est ingenium reuoluendi eius quod oblitum est: & habet coniunctum sibi actum rationis, & in quartum exigitur, scilicet actum rationis, principium determinatum à quo procedit: res determinanda in qua procedit, & tempus præteritum. Et hæc sunt Animæ, ac humani Cerebri facultates, & functiones.

*Septum* tranſuerſum δι' ἀφ' ὀφθαλμῶν, & σπένος, necnon à Plinio præcordia, quòd ſci-  
 licet cordi prætendantur, ſunt appellata. oritur veluti muſculus rotundus, & magnus,  
 vbi ſputæ coſtæ in amplam cartilaginem definiunt. vel: *Septum tranſuerſum*, eſt  
 membrana netuoſa continens, ac ſegregans quæ in ipſo comprehenduntur thorace:  
 ſubter illud autem viſcera. Galenns Septi tranſuerſi affectus docet lib. v. Locorum  
 affect. cap. iij.

*Sepia* ἢ σπινθίς a piſcis: de cuius natura, & figura cum facultate, lege plura in diſt.  
 Lolligo. Dioſc. lib. ij. cap. xix.

*Serapiar*, orchis altera eſt σπ' ὀρχιδας: aliqui canis teſticulum vocât. de qua re quæ  
 reſtant, quære in diſt. Orchis.

*Serica* σπινθίς, καὶ ζίζυφα, vulgus Iuinbas vocat. Quære diſt. Zizypha.

*Sericum* crûdum μὲν ἐστὶν ὠμὸν Actuario, cuius compositio diacoccum eſt, hoc eſt,  
 conſectum Alkelmes. Seticum arborum propriè quod arborum foliis Seres Sathyæ  
 populi depexebant ad veſtes, nunc ad ſerum, id eſt, bombicum verminum ſila tranſtu-  
 lerunt Græci recentiores.

*Serapium* ſeu ſyrupus, ſit. quando ſucci medicamentorum cum melle depurato,  
 vel ſacchare deſecato donec concreuerint, coquantur. In breue & longum diſtribui-  
 tur ſerapium: breue quod parum aquei humoris in ſe habet, & commune vocatur: lō-  
 gum, quod humoris aquei plurimum obtinet, & decoctum appellatur. Cæterum ſe-  
 rapia omnia cum ſtillatitiis liquoribus plantarum commiſcentur, ac ſic potâda præ-  
 bentur, ac quantitas vniuerſa vncias cum ſemice non tranſcendat à medicis pleriq;  
 nunc obſervatur. Apud Actuarium, Meſuem, Nicolaum, Fuchſium, & Syluium ha-  
 bes Serapiorum varietatem.

*Seriphum* ſiue Seriphium σερύφον, planta hæc relata eſt in Abſinthio: quanquam  
 etiam medicorum non pauci Barbotinam hanc eſſe contendunt, hoc eſt, Santonici  
 ſementis: verò Coralli ſemen.

*Seris* ſeu Intybus σερύς, καὶ κίχων, duûm genetur: altera ſylueſtris, quæ picris  
 & cichorium vocâtur: altera ſatiua, latioribus foliis conſtat: ſtomacho quàm horren-  
 ſis viſior. Quæ iterum in duas ſpecies digeritur, vna latiore folio prodir, lætucarû ſi-  
 millima: altera anguſtiore eſt folio, & gultu amaro. vtraque refrigerat, & adſtringit.  
 ſtomacho vtiliſſima. Dioſc. lib. ij. cap. cxxv. Quære diſt. Intybus, & Cichorium.

*Serpillum* hortenſe, & agreſte ἐ' πολλὰν κινεῖται, καὶ ἀ' γρῶν, oſtentatur, quod  
 hortenſe eſt odore ſampfuchum imitatur. folia & ramulos origani habet, in maceris  
 multò procerius aſſurgit. Sylueſtre Zygis appellatum, non ſerpit ſed in altitudine  
 increſcit, ramulos ædens tenues, ſurculosos, foliis reſertos longioribus quàm rutæ,  
 & durioribus; anguſtis. flores iucundè olent, guſtanti acres. Naſcitur in ſabuleis, &  
 petris, ſatiuo efficaciſ, & ad medendi vſum aptius. Dioſc. lib. iij. cap. xxxvij.

*Sertula* campana herba μὲν ἀλώτος, idem vulgò etiam melilotus: quibuſdam Re-  
 gia corona, & pratensis appellata: ſuauiſſimi odoris: maturus flos quem proſert, &  
 multo eſt aptus medicamentiſ. Dioſc. lib. iij. cap. xxxix. Quære diſt. Melilotus.

*Serpentaria* noſtras, Dracuncium, ſiue Dracuntea maior vulgò, Colubrea appel-  
 lata: quæ non eſt tormentillæ ſpecies altera, quæ Biſtorta nominata eſt, annuente I.  
 Agricola. Eſt & altera Serpentaria, nomine Aron, vulgus hominum Gertu, & vituli  
 pedem, dicitur: quæ ſuperiore multò eſt inferior. Quære diſt. Dracuntea, & Aron.

*Serum* lactis cuiuſcuſque, quod implicatum in lacte ipſo continetur: quod vbi diſ-  
 ceſſit ab eodem lacte, multò potentiſſimum ad purgationes redditur. Datur quibus  
 ſine acrimonia volumus deiectionem moliri, vt melancholicis, comitialibus, lepris,  
 elephantiaſi, & erumpentibus toto corpore papulis. Dioſcorides libro ſecundo, capit.  
 ſexageſimo tertio.

*Sesamum*, eſt Saſama σπ' ὁ σάμβον, ſemen eſt peregrinum, cuius nomen nondum exo-  
 lent: officinæ enim Siſamum vocant. cuius planta Milio ſimilis eſt, ſed ſemen Orizæ  
 ſimile. Eſt item Sesamum ſylueſtre σπ' ὁ σάμβον ἀ' γρῶν, cuius ſemen cici, & ricinus:  
 Ketur Arabibus appellatum. Nomen hoc Sesamum Heliotropio maiori aſcribi vult  
 Geſnerus. Repete diſt. Ricinus.

*Sesamoides* magnum σπῆσαιμόϊ δῖος, σπῆσαιμός, & helleborum Anticyrense, quod in Anticyra nascatur, appellatum. Est denique Sesamoides minus: de quibus lege Dioscoridem lib. iij. cap. xxxv.

*Septicum*, id est, putrefaciens medicamentum, etiam causticum & vrens, sed parum vehementer: est calidum siccum minus, essentia tamen renuioris, exiguu morfu & dolore, aut nullo: vt arsenicum, sandaracha, chrysocolia, aconitum, Galenus lib. v. Simpl.

*Septenarius* circuitus hic hebdomadis numerus non est, sed indicatorius, siue criticus: qui à circuitu quaternario diuiditur: Septenarium itaque circuitum validiorẽ quaternario esse, potestate autem secundum quaternarium Hippocrates, & Galenus asfirmarunt: & ab eodem futuram in septenariis circuitibus iudicari indicationẽ. Vide plura in dict. Quaternarij circuitus.

*Seseli* Malsiliense σῆ σελῖ μὲν σάλαϊ τῖχορ: officinis Siler esse creditur: herbariis aliquibus non vulgaribus, maior Saxifraga iudicatur. Est præterea Hethiopicum Seseli, quidam nonnulli Ambrosiam opinantur, à folij periclimeni similitudine. non ignoratur etiam Seseli Peloponnesiacum, vt Creticum. Quare Tordylium.

*Senioma lachon* σῆνιτομαλαχον, vulgaris notitia spanachium est, tum hortense, tum syluaticu. à spinis in semine productis appellatum. olus maluaceam betam referens: forte quod figura & denticulato seminis habitu betam, & mollitia maluã mētiatur. Nostri verò herbariis ab insigni spiculorum seminarium nota Spinachium totam plantam appellarunt. Quare dict. Atriplex.

*Sextans*, sexta libræ pars, vncias duas, scrupulos quadraginta octo, continens. Sextarius mensura, heminas duas, siue cotyle duo, pondere denarios centum & viginti, continet, nominatur etiam Triblion, quod libras quoque duas, aliquibus selibram, recipit. Sextarius Italicus, auctore Oribasio, mēsuræ vini, capit vncias viginti quatuor: in pondere libram, & bessem. Sextarius mellis, libras duas, & S. continet. Sextarius olei, vncias octodecim pendet. Sextuns, pars est dimidia libræ, & vna duodecima, id est, vncie septem: continet scrupula centum sexaginta octo. Sextula, sexta pars vncie est, id est, scrupulus additis drachmæ quaternus.

*Signorum* in morbis triplicium primi generis, sunt coctionis, & cruditatis signa, vt alui excrementa, vrinæ, & spura. Egestionem quidem ventris inferioris vel coctionem vel cruditatem denotant: vrinæ verò venosi generis, quemadmodu excretionem, & spura instrumentorum respirationi seruientium. Coctionis enim signa semper salutem, cruditatis autem vel omnino nullum futurum indicium, aut prauum, aut dolorem, aut diuturnitatem, aut mortem, aut recidiuum portendunt. Hippo. lib. ij. Epidem. Sectione secunda, & tertia. Quare dict. Salus.

*Singultus* λυγγῖος, est ventriculi motus conuulsorius, à re ipsa noxia excitatus: siue etiam partium ventriculi motu violento aggregataru contractio. vel, Singultus, est ventriculi motus, qui veluti eius conuulsio existit ab expultrice facultate noxia extrudere valentis affectus. Contingit vel ex plenitudine, vel euacuatione, aut ob humores acres, & mordaces, & medicata qualitate præditos, aut cibos acres & mordaces. Interdum propter frigiditatem, & alimenti corruptionem. Gal. lib. de Symp. dif. Hipp. Aphorif. lib. vij. cap. iij.

*Sinus* cordis sunt duo, dexter, & sinister, pro quibus auricula vtræque sub est cordis: quæ re scriptum reperies in dict. Cor sinus.

*Sinus* καλπός, est cum cutis vlceribus, quæ adiacet, multo spacio subiectis corporibus separata est, & vt agglutinari ei non possit. Sinus callosus deniq; seu fistula σπῆγξ, est magna ex parte ab abscessibus consistens: sic verò per translationem à fistulis ex arundine, aut alia quapiam materia confectis appellatur fistula. Curationis auctor Gal. lib. ij. ad Glaucos;

*Similacea* subsidentia in vrina, sit vbi febris obsessa profunditate longè latèq; substantiam incendit, adeoque pessima est: sanguinis enim assationem, vel solidaru partium collicationem significat. Si itaque candidæ, solidarum partium collicatione:

fin verò ruborē, sanguinis affationem monstrant. Dicitur Similacea à surfure: ſimile cribrato reſtimento.

*Sigillum Lemnium*, id eſt, terra ſigillata, aliud eſt, quàm *Aſter Samius*: hic quia renax, Lemnia verò terra parum: atque hac carere adhuc nos experimenti ipſius veritas docet. Itaque pro Lemnio gemino, Armenus bolus adulterinus offeritur.

*Sicula*, & *Sycia* σικυδι καὶ πυρρα, Betæ genus, à quo medici ſuccum experimentes eliciunt, colutoriiſq; clyſmaribus ad alui deiectiones excrementarias imponunt.

*Sicya* σικυδι, cucumis agreſtis eſt: nam *Sicya armetos* colocynthis affirmatur, quæ cucurbita ſyluatica, vulgò coloquintha, vocatur.

*Sicyr* σικυς, καὶ ἡ σικυς ἀγριοῦς, id eſt, cucumis ſylueſtris, & aſininus hodie appellatur: cuius ſuccus Elaterium tum ex radice, tum ex fructu nomen accipiens, elicitur.

*Sycis* σικυς, πικρὸν, eſt quod melonem, & peponem, cum differentia plerique imaginantur: quod Geſnerus etiam Cucumeris hortenſis ſpeciem eſſe voluit.

*Sida*, malus punica ῥ' οὐλ, id eſt, malus granata arbor paſſim frequentiſſima. Eſt & *Sida* planta paluſtris, papaveris ſimilis vaſculo mali amplitudine, roſeo flore, candidis membranis obduſto, ſemine inrus rubro, guſtu triticum æmulante. Caput & folia, vt vtraque *Nymphæa*, ſuper vndas emicant, ſed poſtquam tota ipſa emerſa eſt, ſemen ſpargit. Authores Theoph. Nicander, & Pli.

*Sideratio*, nunc per I. noſtrum, nunc γ. Græcum quæ ſcribitur, ἀπρόσολα, σφαχέλος Græcis: quando ſcilicet vaporum ſiccitate arbores moriuntur: ita membrorum partes humorum deſectu vt intereunt, in ipſis ſyderatio eſt, morbus ſterilitatē membri ſignificans. Plinio autem lib. xvij. cap. xxij. Carbunculatio in arboribus appellatur.

*Sideritis* σιδυρίτις, inter multas variâſque plantas hoc nomen aſignatur: nam prima *Sideritis* folio marubij veſtitur, quam vulgus officinarum *Tethrait* appellat: altera foliis filicis, & hanc Chymiſtæ Lunariam maiorem eſſe volunt, aliqui filicaſtrū: tertia, mille ſolium: foliis coryandri, in vineris, & maceris proveniens: quarta *Sideritis* ἀχιδανίς etiam Græcis nominatur. hæc quoque comprehenſa eſt ſub hoc nomine *Scopa* regia lato folio herba σιδυρίτις, quam Ruell. Carpentariam aſignat.

*Sidium* σιδιον, id eſt, malicorium, aſperum eſt mali punici putamen: vulgò mali granati cortex in fructu, non in arbore: quas *Cytinus* facultates, ſidium quoque poſſidet. Quære dict. *Cytinus*.

*Siliqua* menſuralis, χερατῶν, minimi ponderis menſura eſt, ſcrupuli ſextam partem, drachmæ verò decimam octavam, conſiciens: ſex itaq; ſiliquæ conſciunt ſcrupulum, ſcrupula autem tria, ſive octodecim ſiliquæ explent drachmam: ſextula autem, ſexta pars vnciæ eſt, vnde & nomen habet: continetq; ſcrupula quatuor, ſive ſiliquas viginti: quatuor continet itaque ſextula drachmam vnam, & tertiam eius partem. Repete Budeum de Aſſe.

*Siliqua* χε'ρατία, καὶ κερατῶν, Carrobea vulgò dicta: à qua *Siliquæ* vt in *Siliqua* Aegyptia arbore, caſſia ſiſtularis fructus, σὺλακέρατα κερατία. Verùm quæ *Ioniis* κα' ῥῶνα, appellata eſt, foliis ſemper comantibus, flore candido, cum vehementia odoris, pomo ſiliquæ: ob id nomen, longè alia eſt, quàm χε'ρατῶνα. Præterea *Siliqua* legumen eſt quod δολυχός appellatur: tum quoque pro granorum, & leguminum, & arborum, vt in caſſia ſiſtulari, carrubiâque, tegumento accipi ſolet: quoniam complures tum herbæ, tum frutices paſſim ſiliquantur.

*Siliquaſtrum* τρι' πετρῆς, id eſt, peurea pedemontana: & coſtus hortenſis Ruellio: ſed plerique tametiſi alii cardamomi genus ſuſpicatū eſt. Vide dict. *Piperitis*.

*Siligo* ὀλυρα, frumenti genus, quibusdā *Secale*, vulgò *seigle*, pro frumenti ſpecie uſurparū: quod etiā olim Gallis *Arinea*, primariū triticum eſſet, appellabatur.

*Siler* ἰτιάς, ἢ ὅς τι καυαί, ῥῶνδρ, frutex in aquoſis qui producitur nunquam, vel raro arboreſcens, quaſi pumila ſalix: cuius virgulta in calathis, cophiniſque texedis, colliguntur. Rura uſui commendant vincientiſ vitibus.

*Sinapismus*, veteribus ex sinapi cataplasma componebatur. & nomen retinuit: ex caticis pinguibus tepida materatis atque expressis iniecto sinapi polline, aut alterius, fiebat. Interdum ex oleis, costis, castorei, sinapis, euphorbij, ipsaque materia indita cū aceto & cera, componitur: secundum quas res benefacere visum fuerit. Aëtius lib. iij. cap. cxcj. Aëtuarius li. v. de Comp. medicamentis.

*Sinapi σινάπι*, cum herba semen nominatum, facultatis est causticæ, adurentisq; ob id eo medicamenta caustica fiunt, & sinapismi emplastica quoque nonnulla. duplex reperitur, album nempe, & subnigrum: album aliqui esse Thlaspi autumat: alij tylustrem Eruca: quibus omnibus facultas calida est.

*Sisarum*, & *Siser* herba σισάρι, id est, careum, vulgò Carnicuius radix, vt paltinaca, est: vt rināsque vt semen, prouocat, & status infarctos intestinis & vetriculi extremo dissipat. Columella li. x. piodidit Tyberio Cæsarem radicem hanc nobilitasse, eam flagrantem omnibus annis è Germania. Manardus rapa illa substaia Sisarò, se auctore esse credidit. Quære dict. Careon.

*Sison σισον*, semen exiguum est, apio simile, obnigrum, & molliter longum, feruētis essentia: nonnullis etiam medicis Amomum aromaticum semen pusillum, suspicatur: nisi oblongius a momo videretur.

*Sisymbrium σισυμβριον*, varium multiplexque passim reperitur: vñs, quod mentha rubra, vel aquatica: item Tymbræa vulgò cognita, verum quod sylvestre est, citra aquas prodit. Alterum Cardamine, à nasturtij sapore officinæ nasturtium aquaticum vocant: vulgus cretisionem: quæm Sium esse neque contendendum. Tertiū hortense, vulgò balzamitha: quæ in mentham odore degenerare creditur.

*Sium σιον* in Lauer siue Berula, & per contractionem Berla, degenerat: plerique etiam in Sisymbriū alterum, siue cardaminem, id est, cretisionem, a bire putant.

*Sitanium σιτανιον*, ex Galeno Triticum est instantis anni hoc quod vere feritur, & candidum esse dicitur. Latinis trimestre triticum: vulgaribus verò Martiū, quod martio mense feratur, & terno inde mēse maturescat, vocatum est. Sitos σιτος namque auctore Hippocrate, in li. de Fracturis, genus omne frumenti appellatum est.

*Sitir*, est quæ fit aut solo caliditatis excessu, citra humoris consumptionem, vt in hydropse: aut solo humiditatis defectu, citra caloris incrementum, vt in hydrophonia: aut in vitroque, vt in febre ardente, & tertiana exquisita: Gal. li. j. ad Glauco. cum explanatione Acac.

*Siris σιρις*, est inflammatio partium quæ circa cerebrum, & eius membranas, sunt: infantibusque accidit. Aëgyneta li. j. cap. xij.

*Sigillum Salomonis* vulgari nomenclatura, Dioscoridis Polygonatum est, nulla reclamante etiam nota: quod tamen Barbarus asserit à Græcis Sphragida nominari. Quære dict. Polygonatum.

*Sori*, Chalcytis, Myfi essentia consistētia, & situ differunt: nā Sori in fodina inhumū & crassissimū, scintillat friando, vt Myfi, olfactu & gustu virus olet, subpingue est. Myfi grumofum & frustulosum, auro simile, & stellæ modo splendet. Chalcytis situ & essentia est media, æri similis. Soreos pars extrema, & summa in Chalcytem, & chalcyteos partes extremæ in Myfi tandē transeunt: in metallica fodina, & quo loco feruntur, quomodo æri innascitur ærugō. Diosc. li. v. cap. lxxv. lxxvi. lxxvij. & lxxviii.

*Smagadur*, inter lapides preciosos numeratur, quò quoque virentior, eò mollior: exhilarat, libidine arcet, hemitricū iuuat, epilepsie resistit: ideo cardiacis admisceetur.

*Smilax* hortensis, σμιλαξ, id phasiolus hortensis est: Est & Smilax aspera, quæ spinis riget, & succum lacteum a uulvis foliis reddit: sed quæ spinis vidua, lonis appellatur. Item Smilax arbor, nomine alio Taxus dicta. Diosc. li. iij. cap. cxxvij. & cxxviii. item cap. lxxviii.

*Smyrnum σμύρνιον*, herba myrrham respiciens: ea existimatur, quam officinæ Lybisticum vocant. Largus olusari semen esse scribit: aliquibus petroselinum videtur: non differt foliis ab apio nostro vulgari. Diosc. lib. iij. cap. sexagesimotertio. Quære dict. Libisticum.



*Smiris lapis*, eo annularij sculptores expurgant suas gemmas: nunc in vitreatis sic quens vsus diuifuris. Emeri illi lapidi vulgare hodie nomen est.

*Solanum* hortense στρυχνος: officinis Salatrū, & morella est: Item vcllcarium solanum α' λυκιστος, id est, alkckengi, vulgò dictum. Soporiferum Solanum herba, quæ morella etiam marina solet appellari. Nam insanum, manicum, seu furiosum, herbarijs vulgaribus Solatrum mortale vocatur. Dioscor. lib. iij. cap. sexagesimoptimo, sexagesimosecundo, & sexagesimotercio.

*Solutio* vitæ seu continui est quæ simplex, & composita habetur: simplex in quinque differentiis distribuitur, quæ enim in ligamentis fit, anulsio vel diuulsio nominatur: Græcis autè α' π' απ'σµα: quæ verò in carnosa parte, vleus siue ε' λυδς: quæ in osse, κ' κ' γ' µα, vel fractura: quæ in neruis, conuulsio: seu σπασµος in carnosis verò partibus: vbi accidit ρ' ηγµα, & ruptio nuncupatur. Vide dict. Morbi compositi.

*Silphium* σιλϕ' ορ laserpitij siue laseris caulis est: radix, magudaris, & folia ipsius laseris, maspetum, totam hoc modo distinguentes, vocauere regionis suæ homines. Laser caule est ferulaceo, folijs apio similibus, lato semine. radix panaci haud dissimilis: quæ vulnerata illachrimat, id quod Laser est: Myropolis Bézoin appellatū. Quære dict. Laser. Diosc. lib. iij. cap. lxxvj.

*Soida*, κ' σπ' αλ' ηγ' α, capitis dolor, qui potissimum non inueteratus est, non curando a se per se accidat, aut alterius affectus symptoma sit. Capitis namque dolor ex humorum diuersorum quæ ualitate dominante plerumque contingit: ut ex calore, frigore, siccitate, plenitudine, biliosis humoribus, melancholicis, pituitosis: quorum curam exequitur Fuch. lib. primo de Meden. morbis, cap. iij. iij. v. vi. vii. & viij.

*Solæ* βουγλωσσόν Græcis, hoc est, bubula lingua: Varroni Lingulaca: Gallis, solle: piscis planè similis pasceri, de quo suo loco dictum est. carnem mollem, & concoctū facilem habet: nam sua lauitia perdix marina nomen obrinuit, ac postea retinuit.

*Solutiones* λυσεις, sunt ex quibus perspicuum sit, mutationes eas, quæ paulatim fiunt: vel scilicet virtute deiecta, vel morbo, non crises, sed simpliciter solutiones. Galenus de Diebus decret. lib. j.

*Somnifera* medicamenta ο' πτοτικά, ex eorum genere sunt, quæ soporem molientia, aut somnum conciliantia, appellantur. nam huiusmodi medicamentorum magni doloris, aut vigiliarum gratia uti consueuimus.

*Somnus* ο' π' τας, à fame, aut exercitio, non quidem omnis, & quocunque tempore factus: sed is duntaxat qui famesciente iam corpore, fit: qui etiam post matutinas deambulationes est factus, omnium maximè siccus: & qui à balneo est adhibitus. Hippoc. libro secundo, de Ratione victus: & Epidimia. libro sexto, parte quinta, Aphorismo. xxxj.

*Somnus* ο' π' νός, est animalium facultatum quies: vel, est sensuum impotentia ab humore cerebrum imbuente, ac aggrauante proueniens, ut si rectè adhibeatur, multa sunt commoda. Somnus enim cibum conficit, quod toto hoc tempore quo quis dormit, animalis facultas quiescat, naturalis verò validius agat: humores concoquit, animi ægritudines obliuione delet, memoris insaniam corrigit. Cæterum, tempus, duratio, forma decubitus, & insomnia sanis etiam corporibus veniunt consideranda. Tempus vespertinum, aut nocturnum somno conuenientissimum: interdiu nocentissimum est: quoniam verò interdiu vigilare, noctu sed quiescere oportet. Hippoc. Pronostic. lib. ij. ex & Epidimia. libro sexto, Aëtius libro nono, capit. trigesimo nono, vult à prandio deambulationibus indulgendum, & animi aliqua laxamenta adhibenda, somnolique diurnos noxios esse, nisi lassitudinis sensus adsit, aut præcedente nocte nihil aut parum admodum quis dormierit, scriptum reliquit.

*Sorder* aurium κ' σ' λ' α, κ' αλ' µ' σ' λ' α, quæ, quod meatus foraminulentos à summo cerebro prouenientes obstruunt, grauiorem auditum reddunt: ut interdum sordium reurgandarum pigritia, surdi signa.

*Soldanella*, vulgari appellatione apud officinas, ea est, quæ Brassica marina à Diosc.

Diofcoride nomen hætenus obtinuit. Quære dict. Brasica.

*Somphos σμυφός*, cucurbitæ genus, non nisi in saxosis proveniens: quæ quibuscumque sylvestris cucurbita, & marina appellata est. Noli putare genus hoc colocynthidæ esse, cucurbitarum omnium amarulentissimam.

*Sonchus σονχός* ἐδωδεμος, Myropolis, & herbariis vulgaribus, Rostrum porcinum: Rusticis, Lanceron: qui candidus, qui tener, esculentusque est. Hæc herbariis nonnullis Leporis pabulum dicitur: Apuleio Laïuca leporaria festiuitur est denominata. Huic, occurrit & alius Sonchus σονχός τράχυν, niger, spinosiorque est. Tertium iterum genus σονχός τρύφωδης, tenerum, arborefcens, latiore folio, in quo ramosum caulem folia interfecant: atque à soli fecunditate à Diofcoride, inquit Gesnerus, describitur.

*Sorbus δ' α, καὶ δ' η*, arbor noritiæ vulgaris: longèque differt à Corno frutice, qui interdum etiam arborefcit: cuius quidem fructus estur reprimendi alui fluxus causa: sic quoque edi solet Sorbi fructus, quod adstrictioris facultatis uterque deperit: sed profusum maturum, minimèque præcocium esse oportet. Quære dictione Corno.

*Sphacelus σφακελός*, Gangrena, & Syderatio est: de quo morbo fusi in dict. Gangrena retulimus: & in dict. Syderatio.

*Spadix σπαδίζ*, termes est eorum fructibus ab arbore auulsus, quod nomen in palmarum quoque fructibus colori est commune. Spadix namque siue phœniceus color expetanturum splendorèque demonstrat ruboris fructuum, non admodum Sole incocturum, quemadmodum in palmæ arboris fructu videtur.

*Spadonei σπαδονεῖα*, ἑκαστὸν, surculi sunt in vite, qui ætatis etiam teneritate, sicut in arboribus, & fructetis nihil dum attulerint, gettonos à radice provenientes, rura appellant, nam Gettonus, Latinis Surculus est: cuius peres dict. Est quoque Spadonia laurus εἰδος τὴν δαφνίαν, quæ sterilis, & infrugifera viuit supetstes.

*Sphagnos σφαγνός* καὶ βρύον, arborum, rupium, & maris generali nomine Muscus appellatur. Quære dict. Bryon.

*Sphacelos σφακελός*, differt à salua, quod sylvestrior est, folio breviori, & leuiori, ut ex Theophrasto Gesnerus retulit. Præterea Sphacelos σφακελός, καὶ ἀγροδία, tabido plantarum est, Latinè verò Syderatio, vulgò Tinea.

*Sphæritis* Αἰτίο σφαῖρις, pro cupressi, sabinæve herbæ pilulis accipi solet.

*Sphynster σφύντις*, extremum intestinum est, chirurgis monoculum: per hoc venæ hæmorrhoides tetrum sanguinem fundunt. Vide Intestina.

*Sphenocides σφενόιδης*, os est quod inter maxillæ alia ossa adnumeratur: quod ex omnibus tantummodo simplex, & coniugationis est expers.

*Sparganium σπάργανιον* καὶ ξυρδών, herba cum radice appellata, cuius folia gladioli sunt similia sed arctiora, & in tertiam proniora. in summo caule veluti pilulæ prominent, in quibus semen. Radice tantum ad venena vitimur. Quibusdam herbariis, ut refert Scholiastes, pro Tormentilla vulgari falsò usurpatum est Sparganium. Dictum est autem eo nomine, quod folium simile habeat fasciis, quibus in cunis infantes vinciuntur. τὸ σπάργανον enim fasciæ Latinis dicuntur. Officinæ Spathulam fœtidam ab odorata dirimunt odore tantum.

*Spanacia σπινάχιον* καὶ αἰνία siue spinachia, ab oleris raritate herba dicta: vel emendicato spinaceo nomine est: quæ ex genere Atriplicis, non Bliti. Quæ supra Sentlomalachum.

*Spartium σπαρτίον*, sine foliis frutex, quo vires in Italia vinciuntur, respondetque gentiæ gallicæ, si folio vidua non agnosceretur. dubitat etiam num Plinius Spartum gentianam interpretari liceat.

*Sperma σπέρμα* animantis semen: cuius facultas his comprehensa est versibus:  
Seminis est virtus animantis gignere nervos:

Qualiter ipsa caro nasci de sanguine fertur. Repete supra dict. Semen.

*Spica* in frugibus σπυγός, quod sul faciat putatur à Varrone dicta: sed spica muti-  
la σπυγός καλός ὁ μὴ ἔχων ἀσπείδος, quæ nulla armatur arista. nam absolute Spi-

ca, aromatica spica, seu Indica, seu nardi, significatur: Romana verò, Celtica est. Quære dict. Nardus.

*Spina* α' καρθα, pars est in plantis plerisque, pomis, prunis, mespillis, & præcipue pyris nondum furco implantatis, rigida, & mucrone suo vulverans.

*Spina* alba α' καρθα λευκη, foliis est nigro Chamelæzoni similibus, angustioribus tantum, candidioribusque: caule cubitos duos superante, echino florum purpureorum fastigiato. Quære dict. Chamelæzo albus.

*Spina* Aegyptia, vel Arabica, Syria α' καρθα α' πασινο, albæ spinæ videtur similis cuius geneta duo, candidum scilicet, & nigrum. arbor rota spinis horret præterquam caudice, semen tamen in siliquis est. flos medicamentis utilis, gummi profundit, non cortice, sed in vasculo: hæc ferè eadem de arbore Acaciam fundente. hæc Gesnetus.

*Spina* acuta ο' ξυκακισθη, frutex est, qui vulgò Berberis, & spina vinera appellari solet: ex cuius radice succus eruitur, qui Pœnica lingua Beugia vocatur. Quære dict. Ozyacantha.

*Spina* Ariana, vel Indica α' καρθα α' πασινο, lachrimam fundit myrrhæ similem. Est item Spina appendix, vulgi appellatione Alpepinus, quibusdam Palyurus Theophrasti lectione fultis.

*Spina* dorso, vertebrae quatuor & viginti constat: quæ si plures paucioresve sunt, sicut capita depreauata figuræ quæ fastigiato sunt vertice, præter naturam sunt. Vertebrae colli, sunt septem: metaphræni duodecim, costas totidem excipientes: lumborum sunt quinque, quibus subiacet os sacrum: & os pubis. Gal. cap. septimo, libri de Ossibus.

*Splen* σπλην, id est, lien, viscus in sinistra animantis parte, πιν' περχομα vocatum, ratum, laxumque spongiæ modo: ut faciliùs crassos humores ex epate, & venis cum alliciat, tum suscipiat: vnde scæter plerumque morbus nomine Arrabiliofus. Vide reliqua in dict. Lien.

*Splenion*, hemionitis σπληνιον ήμιονίτις, lingua ceruina vulgò dicta videtur: quæ quandoque falsò pro Scolopendra usurpata est. Quære Hemionitis.

*Spodium* σποδίο, id est, cinerula, quod in pavimento fornacum ærariarum recidit, albicans Pompholigi simile, sed grauius, & impurius intra corpus non sumendū. Ebur verò vitum, quod spodium Arabibus est, etiam sumitur, ac ex radicibus arundinum, myrto, lentiscovè vrisantispodia, id est, quæ pro spodio ponuntur.

*Spondilion*, vel Sphondilion σφονδύλιον, panacia sylvestris suspicatur, in mōte Iura supra lacum Lemanium proveniens: aliis pastinaca agrestis est, folio in caudicis extremitate ficum, platani mūdè representans. Quære Sphondilium.

*Spongia* cynorodi, id est, rosæ caninæ tuber: officinis autem Bedegar vocatur: ad malefica capitis, colliq; vlcera tuberosa medici plerique seculi nostri vtuntur. Spongiæ, veteribus authoribus, radiculæ altitium asparagorum dicuntur: α' σπαραγγον p' ήλας, id est, radices asparagorum.

*Subectio* καρδ' s, malum est sensuum, vniuersarumque motionum priuatio, spirandi facultate illæsa manente, quod consequitur. profunditate nanque somni correptos malum occupat, oculis perpetuò conuiuentibus, sentiendi facultate nō a m illa. Quære dict. Carus.

*Substantia*, est quæ rei nulli inhærere apparet, accidens autem è contra: mirum quod substantia per se subsistat, accidens verò atrepi inhæreat.

*Substantiæ* resolutio, est, maior, aut minor pro affectionis magnitudine, quæ intèpetiè sequitur: quæ si levis sit, imbecillitatem: si verò magna, non hanc solum, sed & morbum affert. Gal. de Inæquali intemperie, & lib. i. ad Glauc.

*Succus* medicatus seu Rob, est qui primùm defecatur, subinde verò solis, vel ignis calore sic densatur, ut longiore tempore citra corruptionem asseruari queat. Ex hoc genere Mina est, quæ fit ex succo fructuum eousque decocto, ut sapor, aut mellis consistantiam accipiat. Mesue, & Nicolaus authores.

*Sudor*, est defecatio, & superfluitas humiditatis tenuis, & serosi in sanguine: qui secund

secundum morborum, & laborum diuersitates in affectis, varius quidem depræhenditur. vniuersalis sudor in morbis acutis, calidus, temperatúsque, maximè salubris. at frigidus contra, præsertim si tantum caput, aut thorax infudat, omnium sudorum pelsimus.

*Suffocatio*, est cum vniuersus sanguis ad principium confluat, deferiturque, differt etiam ab extinctione: est enim extinctio, ob perturbationis quæ à refrigeratione oritur, naturam fit. Quære dict. Extinctio.

*Suffimentum* seu suffitus, incensavè *βύμνημα*, sunt medicamenta quæ incenduntur, aut ignitis carbonibus ad odorem gratum conciliandum, iniiciuntur: faciuntque ad alios plerosque diuersos capitis affectus naribus admotis. Textuntur ex castorio, ladano, chure, calamintha, styrace, mastiche, tusilaginis radice, stacte, ex oleo quopiam exquisito. Aëtarius li. v. Compos. medie.

*Suffusio*, siue catarracta *ὕποχλως καὶ ὑποχύμα*, est vbi humor lentus & glaciemodo inter corneam, & crystalloidem concretus circa pupillam subit.

*Sumen* ἑπυγαστρίον, mēbrana catnosa quæ subiacer vmbilico, est, vt supra relatum fuit in Epigastrio. Quære dict. Abdomen.

*Succinum* ἰνδακτῶν, lachryma defluens ex arboribus pinei generis: vulgus Ambrum dicit. Quære dict. Elæctum.

*Suffraginem*, inquit Gesnerus) quia suffringitur, & exputatur, vt transferri aliò possit, Rustici nominant in vite virgas, quæ à radicibus, aut caudicis lateribus eiet, quasi partu nepotū grauida doctiores, vt Columella, Plin. & Varro, sobolem dicunt. Idque videtur significare post scissionem ramorum in arbore dum crescit, quod vmblicum repræsentet.

*Supercilium* veneris α' χιλλίος, Sideritis altera, siue Millefoliū cōiectoris plerisque sicut supercilium terre α' δωάκρον, vulgò veneris capilli. Vtrumque simplex suo loco repositum legitur.

*Surculus* τῆδος βλαστὸς, quod ex ramis simplex ac dimidium oritur, quale præsertim germen apparet, quod ex sutculis nasci Pomp. Festus est author: vnde Germanos dici tradit, eadem stirpe genitos. hæc Gesnerus.

*Spiritus* τὸν ὑμα, est substantia subtilis, ærea, dilucida, ex tenuissima quaq; sanguinis parte producta, vt deferatur virtus à partibus principatum obtinentibus ad reliquas, ac proprias ædere actiones, possint. Spiritus, medicorum sententia, triplex creditur, animalis nimirum, vitalis, & naturalis. Quære dict. Animalis spiritus.

*Spirandi* difficultas δύσπνοια, ea est difficultas spirandi, quæ propter crassos & viscosos humores bronchia pulmonis obstruentes accidit. Cuius explanationis Gal. author est li. vij. Comp. med. κατὰ τὸ πρῶτον, cap. vltimo. Pluta in dict. Asthma.

*Subrubea* vrina flauam sequitur, quæ colorem similem bolo armeno, obtinet: postquam & rubea, hoc est *ῥυθρόν*, quod cerasis, quæ rubecum præ se ferunt colorem, similis sit. Petenda est dict. Vinosa vrina.

*Subflaua* vrina, est quæ rufam colore sequitur: aut similis floribus cartami, siue attritulis: quam etiam flaua sequitur vrina, & ξανθὴ Græcis. Aëtarius autem croceam, à corycij croci similitudine, nominat.

*Subsidentia* orobea, est quæ eruo ex corticato apparet similis, & vniuersi corporis, vel tenū tantū coliquationem portendit. Quod si sic appareat, vniuersum corpus, sin citra febrem, tenes duntaxat liquefcere denotat. Repete Fursuream vrinam.

*Succus* χυλός, propriè est humor qui ex tota materia, partevè eius aliqua conscissa aut tusa, tum manibus, tum coreulari, aut igne, exprimitur. χυλόν Græci interpretantur ὑγρὸν ἢ κεννοῦμ. Manardus li. xv. Epistola v.

*Sudor*, sextū genus eorum est, quæ corpus nostrū euacuāt: cuius quidē prouocatio tū potissimum vtilis, & necessaria existit, quādo humor aliquis noxius circa corporis interiora versatur: vt in febribus, & præsertim pestilentibus, contingit: qui modis variis elicitur. Hippoc. li. iij. Aphor. xxxvj. additis Gal. commentariis.

*Sudoris* notæ sunt, cum potissimum febres ardētes solvuntur: quod si crisi iam im-

minuē prae rationem alius, vel urina supprimitur, rigorem expectare oportet. Si vero ambobus suppressis rigor factus est, plurimus sudor necessario consequitur.

*Suppurantia*, sunt quae in pus vertunt humorem rufefacientem & caruem confusam: sunt calida quantum pars suppuranda, ita ut essentiam caloris augeant, qualitatem non intendant, nec obrundant: humida sunt & emplastica. Syluius lib. ij. Medic. comp. ratione.

*Substantia*, quoniam per se subsistat, accidentibus praebere fundamentum dicitur, quod sine illa subsistere non possunt: magno argumento in animantibus, & plantis. Atque ad alia pleraque transfertur hoc nomen Substantia, ut ad ea quibus alimenta sumuntur, ex herbis nempe fructibus, fruticibus, arboribus: seminibus ferealibus, ut tritico, chodte, id est, frumēto barbato, olyra, id est, siligine, hordeo, zea, id est, speltha, auena, milio, panico, & oriza: ex leguminibus, ut lēre, vicia, fabis, piso, cicore, cicercula, eruo, lupino, phascolo. Ex herbarum fructibus, ut cucurbita, cucumere, pepone, citrullo: arborum, malo, pyro, pruno, vua, moro, Sorbo, cornio, melpilo, nucibus, dactylis, id est, palmulis, atque huiusmodi innumeris. Ex floribus, ut buglosso utroque cappare, genista, brassica, cynara, cichorio utroque, viola, & persico malo: foliis etiam cum reliqua planta, ut lactuca, cichorii cuiusvis, buglosi similiter, brassicae, betae, portulacae, oxalidis utriusque, atriplicis cuiusvis, maluae cuiusvis, apij, id est, petroselinii vulgaris, & similium: radicibus, ut rapi, napi, pastinacae, carei, panacis, raphani, asphodeli, ari, dracontae, caepae, capulae, allij, & porri. Etiam alimenta ex pedestribus sumuntur animantibus, ut boue, suae, oue, caprae, damiae, ceruo, lepore, apro, vriso, caprae, glire, cuniculo, testudinae syluatica, id est, quae gementis est. Ex volatilibus, ut struthio, oloce, anser, grue, mergo, ardea utraque, anate, hydrocorace, gallina, gallinagine, atagena, perdea, phasianus, merula, sturdo, passeris, cassita, galetita, palumbe, turture, ibide, id est, cyconia, coruina. Aquatilibus, ut balena, id est, Cete magnū, thonno, delphine, mullo, cane, congrio, gobione, perca, ymbra, asello, ostreis, purpura, bucinis, cancris, locusta, polypode, loligine, asello, carpione, barbarulo, lucio, rana, anguilla, trutta, perca, stinca, alece, rhombo. Alimenta alia ex aliis animantium partibus similiter sumuntur, ut rostro, pede, ala, auricula, ventriculo, intestinis, utero, carnibus, lingua, pulmone, hepate, liene, renibus, sanguine, adipe, lacte, glandulis testibus, cerebro, spina medullari, ouis, quae auium tantum sunt, & testudinis syluaticae: mel autem plantis, & animalibus velut agnatum est, sed manna ex rore coelesti gignitur: sacchar autem arundinum succus est. Sal marinum videlicet condimentum potius, quam alimentum est, quia cum sale, & amaris nullum animal nutritur. Caetera ex Galeni libris, & Orisabasi de Alimentis hauries.

*Suffocatio* ὀφθαλμοῖς, hoc est, extinctio altera: nam ὀφθαλμοῖς iidē etiam, propterea quod thoracis figurā penitus rectā seruare coguntur ob suffocationis meritū, dicuntur.

*Suffusio* seu cataracta ὕ' ποχυμὴ καὶ ὕ' ποχυσις, est ubi humor lentus & glaciei modo concretus, inter corneam, & crystalloidem circa pupillam subit, quo visus eatenus saltem impeditur, ut non possit discretas rerum species, & colores oculus apprehendere. Aegyneta lib. vi. cap. xxi.

*Succus* Syriacus, est qui ex Lasere planta colligitur: neque succus, neque gummi, sed lachrima defluens: quae Dioscoridi lib. iij. cap. lxxxv. liquor Syriacus, & Medicus, & Synacus esse asseritur: quamvis Plinius à Syriaco Medicum differe faciat. Ropere dicit. Benzoin, & Asa odorata.

*Sumach* seu Rhus ρ'ός. officinis Rob Arabum more, & succus medicatus: apud Dioscor. verò Rhus Syriacus legitur, & apud C. Celsum lib. vi. cap. xj. cui Plinius scribit nondum Latinum habere nomen. Vide dicit. Rhus.

*Sutura*, compositio quaedam est ad confuturum rerum, utpote quae in capitis ossibus habentur, similitudinem nam duae capitis futurae sunt, una obelea, id est, recta altera sagittalis, id est, transversalis.

*Sulphur* nobilissimum est α' πυρὸς, id est, ignem non expertum: quod virentius, oleosius

oleosus, pinguis, eo melius nam & tale medicamento sum apud Diosc. & Galenum legitur: quoniam aliud deterius est. Geberus sulphur spiritum non materiam esse affirmat, & Chymistis vfitatissimum.

*Supercilia* ο' *οπίς*, vbi frons à superioribus descendens desinit, tanquā termini emi-  
nentes, & pilis cōstiti eam excipiunt. eius morbus depilatio, & interdū pediculatio est.

*Spuma* niri ab Aphronitro differt, illa enim alba est satine triticeae similis, eius-  
dem cum niro facultatis, & naturae, sed essentia tenuioris. Quare dicitur. Nitrum.

*Sputum*, est quo existit, vacuatio siccuius tum potius, quam vsus est, cum thorax,  
& alia instrumenta respiratori serulencia expurgantur. Quapropter vbi sputum  
fuerit exquisitè simile illi quod secundum naturam est, integram sanitatem instru-  
mentorum, quibus spiratio ipsa perficitur, significat: si verò impediatur, recesserit-  
que à naturali habitu, lesas partes esse demonstrat. Hipp. Pronost. lib. ij. xliij. Galenus  
lib. j. de Crisibus, cap. vi.

*Sputum* absolute concoctionis, est leue, album, æquale, neque consistantia liqui-  
dum, neque crassum. Si tenue, non arum, languidæ concoctionis indicium est.

*Sputum* liuidum, aut æruginosum, aut atrum, summam perniciem ostendit, nam  
si faciliè educatur, constat esse salubres contrarium verò, malum. Hipp. Pronost. lib. ij.

*Sputum* summæ cruditaris, est quod si ne quicquam expuitur, nisi prauum quod  
videatur: si humida educi incipiunt, sed exactè cruda, subobscura adhuc, inconstans  
est transmutatio: desinitque tunc prima morbi pars, quæ principium dicitur.

*Sputum* maturum est, vbi pauca & matura exuantur: continuoque subinde plura  
& facilius educuntur, tum morbi incrementum iustit, sed exactè maturum, cum pluri-  
ma, ac facillimè excreantur, ad vigorem morbum peruenisse iudicandum est.

*Sputum* sanitatem representans, est si natura facillimè, sed pauciora, educantur,  
a moto etiam dolore, ægèrque faciliè spiret, leniterque morbum serat: tunc cerebissima  
morbi declinatio est.

*Sputum* sublauum, subrufum, leuiter spumans, & tenue, solam cruditatem: ma-  
lum verò nullum in signe demonstrat. Sincerè flauum, rufum, spumosum, viride, vi-  
scidum, torundum, atque iis adhuc magis nigrum, prauum est.

*Sputum* cruetum sanguineū, mediocriter est: flauæ verò bilis, aut nigrae, difficile.  
Nam præter sanguinem, quicumque reliquorum humorum syncerus fuerit, prauam  
ostendit dispositionem, à calore inflāmato generatam. Gale. Loco affect. li. iij. cap. vi.

*Sphæra* σφαῖρα, est solida & corporea figura, vna quidem cōnexa superficie con-  
tenta, in cuius medio pūctus est, à quo omnes rectæ lineæ, ad circumferentiā educuntur,  
in vicem sunt æquales. hæc Theodosius in lib. de Sphæris, aliter: Sphæra, est quando  
semicirculi manente diuidentem, circū ductus semicirculus in seipsum rursus reuol-  
uitur, vnde incipit circumassumpta figura. & hæc definitio causalis, & imaginaria  
est: vt est author Euclides Elementorum li. xij. altera autē sphære definitio, propria est.

*Stachys* σταχὺς, herba marthubio simili, paulò longioribus tamen foliis, pluri-  
busque, modicè hirsutis, & duris, iucundi quidem odoris, virgulis ab vna radice per-  
rouleis, quàm marthubii candidioribus. Apud officinas nullum habere nomen pecu-  
liare Ruell. suspicatus est, quam tamen Ambrosiam appellari vult Gesnerus. Ruta  
mollem Saluam montanā huc, etiam erraticam, vocant.

*Stacte* στακτή, liquor myrtiæ expressus: Myropolis liquidum storax appellatur.  
Syracis nāq; vna calamitytha, altera liquida habetur: quæ verò liquida, ferè ex cala my-  
tha odorata est. Quare dicitur. Myrrha, & Stryax. Diosc. lib. j. cap. lxx.

*Stamina* σταμνί, ἢ σταμνί, ἐν μιστῷ ἀνθῶν, storum sunt, quæ veluti fila mētra ab in-  
timo floris sinu profiliūt, id est parua capilla mētra crocea in floris medio proueniētia.

*Staphis* ἀγρία σταφίς ἢ σταφύλη, id est, vna taminia, cuius semine Septa  
fiari videntur, etiam nōm sub hoc nomine, herba pedicularis, quod pediculos enecat,  
vt est author Largus. Plinius vnam Taminiam, & interdum Labruscam, vocat. C.  
Celsus lib. iij. cap. xxi. Vnam Taminiam Staphida agriam Græcis dicit appellari  
Diosc. lib. iij. cap. cxxxvij.

*Staphylo dendrum* *σταφυλὸν δένδρον*, arbor simillima aceri, alba in materia, ferr si-  
liquas, & in iis nucleos sapore queis auellanz. hæc in transalpinis montibus inuenitur.  
vt author est Plinius. Contendunt nonnulli Theophrasti colyceam videri. Repete di-  
ctionem Colyceæ, & Acer.

*Staphylinus* *σταφυλίνος*, pastinaca est, quam vulgò vocant, Schatrotam & ruben-  
tem intus, & flauescentem alteram. vide plura in dict. Pastinacæ.

*Statere* *στατῆρῖς*, asses signatos duos pendet, scrupula duodecim.

*Stelis* *στέλις*, id est, quod in Larice, & abiete pullular, dictum Hyphear Arcadibus,  
non viscum. Quære dict. Viscum.

*Sternum*, est pectoris siue thoracis os, totum ex cartilla ginæ cōpositum, in se con-  
stans diuisuris septem, quibus costæ verè excipiuntur. Vide dict. Costæ.

*Stiche* *στήχη*, odorata herba Galeæ, quæ longè differt ab ea, quæ Scabiosa her-  
bariis vulgaribus nominata est. Gal. li. j. de Antidotis. Vide Phleon.

*Stechas* vel *Stichas* *στήχας*, duum generum est, vna citrina, quæ pro Agerato ac-  
cipitur: altera Arabica officinis vocitata: quæ quia in Stechadibus insulis frequen-  
tissima, accepit nomen. Diosc. li. iij. cap. xxvij.

*Statur* seu vigor *στάχυς*, est tertium & vehementissimum totius morbi tempus.  
Quære dict. Declinatio.

*Stedoma* *στέδομα*, abscessus est in quo veluti pingue quiddā seu adeps subest:  
cui non dissimilis apparet *sthepeuma* idem abscessus, in quo pulsi similis humor cō-  
rinetur. Curatio est apud Gal. lib. iij. ad Glauc.

*Stenotismus*, id est, eadem ora constipans, & contra hens, si frigidum, astringens,  
et si calidum patitur, non aere, vt bolus Armenica, & terrenorum corporum magna  
portio.

*Sterilitas*, est quæ aut viro, aut mulieris ratione, aut vtriusque interdum accidit:  
cū in viro semen est, vel seculum, vel frigidum, tenue, aquosum, languidum, vel  
crassius, quā oportet, vel mentula breuitate in recessum vuluæ semen iaculari ne-  
queat: in muliere, quod vterum habeat vel igneum, vel frigidum, & squalentem, aut  
humidum, vel aridum, densumque.

*Sterilitatis* auferendæ curatio est ampla apud Fuch. de Medend. mor. li. iij. cap. ij.

*Stimmi*, id est, stibium, vulgò Antimonium: fositium quidem est. Gal. lib. ix. Sim-  
pl. & Sanitatis tuendæ, vj. Diosc. lib. v. cap. xlix.

*Stomatica* medicamenta, ea sunt quæ ad vix, faucium, & otis totius tumorem be-  
nefice creduntur: stomatica verò ad ventriculi oris, stomachique imbecillitatem  
subueniunt.

*Stigmata* *στήγματα*, sunt maculæ quantitate & forma hominis cutem & superfi-  
ciem decolorantes ac variantes: quibus etiam *staphylomata*, hoc est, tumores sponte in  
cute florentes, à crasis & cuti impactis humoribus nati.

*Stomachus* *στόμαχος*, est osculū & os ventris, vulgò orificium stomachi: in eo vis  
appetendi, & deglutiendi, veteres & id *καρδία*, hoc est, cor, vocabant teste Galeno,  
vnde est etiam cardiaca passio, & cardiaalgia, quam Plautus cordiolum interpre-  
tatur est.

*Stomachi vitium* a *στόμαχος* Græcis dictum, est quod cum siccitate, & ardore eius,  
& inquietabili, inextinguibili que siti consistit: ab eo quod exsiccet omnem stomachi  
humorem, cuius curationem apud Se. Largum petes, cap. cv. in Diacolocynth.

*Stomachus* sub est faucibus, in quo plura lingua vitia incidere consueverunt. Nā  
modò ingens calor, modò hunc inflatio, modò inflammatio, modò exulceratio a ffi-  
citur interdum pituita, frequensissimumque est eius malum, quo resoluitur: neque vl-  
la re magis aut afficitur, aut corpus a fficit. Vt diuersa autem vitia eius, sic etiam re-  
media sunt. Vide plura apud C. Celsum lib. iij. cap. v.

*Stryx* arboris *Στρυγ* lachrima, flaua, pinguis, resinosa, albicantibus grumide-  
rior nigra, surfuriosa, cano siccū obdureta. Gal. lib. viij. Simpl. & primo Antidot. Dio-  
scor. lib. j. cap. lxvij.



*Stranguria* ἐπ' ἀγγούριον, est cum per intervalla & guttatim urina destillat, ac assiduum ad mingendum irritationem efficit : atque urinx stillicidium appellari potest. Vide in dict. Urinx stillicidium.

*Strangulatus* seu prouocatio vteri πρὸς τὸ ὑπερίκεν, est vteri ad superiora recursus in consensum agens principalissimas partes, veluti carotidas, arterias, cor, & cerebri membranas. Quare dict. Vteri suffocatio.

*Stolones* τὰ παρὰ τὰς ῥιζὰς, καὶ τὰ παρὰ τὰς ῥίζας, illa cauliculorum soboles, inutilis siue radicibus fructicatione : qui auulsi etiam arboribus, viuunt, plantanturque. In vite soboles est, quæ in ipsarum & arborum radicibus attolluntur.

*Stratiotes* aquaticæ, ἐπαριωτὴς ὁ ἐπὶ ὕδατι. Stratiotes Diosc. li. iiii. cap. xcviii. Millefolium nostrum lo. Agricola esse contendit, quod per omnia respondet historiz. Quanquam autem & alia occurrit planta libri eiusdem Diosc. cap. cxx. descripta sub nomine Myriophyllon: cuius dict. petes.

*Stria* τὸ ῥυτίδιον, in plantis partes quædam sunt protuberantes, sicuti cana, canaeu lique hinc coles striatos, id est, stris præditos appellare visum est, quasi striaturis exasperatos. hæc ex Ruell. Gesnerus.

*Strobilus* ἐπὶ ῥόδου, καὶ ῥόδου, nux pinea, & globosus cynaræ vertex, à cynæ similitudine. Pinæ arbores Italiam Strobili etiam appellantur Plinio referente. Pityides autem ῥιζῶν earum sunt nuclei.

*Strobilus* ἐπὶ ῥόδου, arbor imaginatur apud Carminianos populos, quæ ad odoris suffimenta fragrantia expocitur: & si Strobon Ladanum neotericis medicis affirmatur.

*Struthium* ἐπὶ ῥόδου, lanaria herba est, vulgò saponaria, vel fulkonia: quam Diosc. Reticulam appellat. Nonnulli docent apud officinas Conditi voce barbara appellari. Diosc. lib. ij. cap. clij.

*Struthia* mala ἐπὶ ῥόδου, Cydonia mala, siue mala Cotonea agrestia sunt: magna quidem habetur Struthia mala, sed minùs vtilia, iis quæ rotunda forma, parua, & odorata sunt. Quare dict. Cydonia mala, & Cotonea.

*Strychnon* ἐπὶ ῥόδου, pro Salano hortensi, hoc est, Salatro vulgari vsurpauit Manardus: verù quia multiplex ubiq; locorù nascitur, Quare diuersitatem in dict. Solanù.

*Strygis* ἐπὶ ῥόδου Hippocrati, frumenti species, sed tritico nobili grano lenior est, quæ plus etiam ventrem soluit. Granum hoc neque Tragus est, non tamen à spelthâ degenerat videlicet niuorenæ apud Helueticos pagos spelthæ duùm generum agnoscitur, ob id quoque Strygem speltham minorem esse coniiciendum est.

*Sturma* χοιρῶδες, glandulæ sunt induratae, quæ in collo, alis, & inguinibus serè generantur, ubi glandulæ vasis substratæ collocantur. Methodici vulgares Scrophulas, à suis multiparis animalibus, & eo malo frequenter laborantibus, mutuato nomine, appellant. Cutatio petenda est ex Gal. lib. ij. ad Glauc. & ex AEGynera lib. iij.

*Strutiocamelus* avis, à figura Cameli animatis proceri nominis habet compositionem: Austrix etià nomine peculiari appellatur. Gale. autè affirmat ἐπὶ ῥόδου καὶ ῥόδου, non esse vocem veteribus consuetam, qui eam auem μεγὰλὴν ἐπὶ ῥόδου, semper vocauerunt. huius caro excrementitia est, & concoctu difficilis ob idque inusui est.

*Sturro*, vt Scholiastes coniicit, à vulgo vox est excogitata, ad significationem maioris piscis: Gallis *Esturgeon*, omnium lautissimus. & mari mediterraneo valde frequens. Caro eius quæ drupedis veriùs carnem repræsentat, quàm piscis: piscis quoque scriptoribus Silurus reputatus, vt scriptum reliquit Paulus Iouius, reclamante Massario: quorum Commentarios legens non nauseaberis.

*Sturnus*, & Sturdus ὁ ἰσάρος, avis quæ nomine etiam vulgari Gryua dicitur, differtq; à Turdo gregaria aue notissima: cuius caro amara edètibz adeo est, vt veniat in contemptum: at alterius suavis & sumentibus laudatissima, quàm Merulæ etiam avis caro. Sed plura in dict. Quercedula.

*Suber* ἢ ἡ ἰσὶς καὶ ὁ ῥόδου, arbor glandifera Gesnero, tamen Ruellij sententia: quæ quoque Lygium, vt eius cortex, vulgò venit in appellationem.

*Sura* τὸ πορὶ, cruris minns os nūcupatur: maius verò os κνήμη, tibia & ceteri nomē est. Nam

Nam tota hæc pars, vt etiam tibia, ira & crus dicitur: vt in cubito. cuius petes dicit.

*Syce* & *Sycas* συκή, καὶ συκάς, συκώ, ficus arbor, & sycon pomum, *Sycada* tamen Polluci placet nouellam sicū intelligi. Est & *syce*, peplos, συκή, τὸ πᾶλος, id est, Esula rotunda: de qua impetiti medici pro Turpeto, medicamenta pernicioſa popularim effingunt.

*Sycomoros* σύκομορος, arbor in Aegypto peculiaris, vtriusque parentis nomen retinet ficus videlicet, & mori. Est etiam *Sycaminos*, siue *sycaminea* σύκαμος, σύκαμινος, καὶ μορέα pro fructu, atque pro ipsa arbore appellatio habetur. Officinarum mora Celsi arboris quidem fructum esse appellatione, & re volūt. Gal. li. ij. Alimento, dicit posse reponi in medio mororū ac ficuum: vnde huic nomen est etiā impositum.

*Sycasmos* σύκασιμος ἐρασιμός, caprificatio à Plinio vocatur in arboribus, quoties per ver cortex cultello finditur, vt cōmodius prorumpant atque crescant similitudine caprifici, quæ ruptis muris intumescens exit. sunt tamen qui hoc scarificationem malint appellare.

*Symphona* σύμφων, alternis viridibus roseisque foliis secundum caulem herba quæ visitur: eaque in posca sanguinem reicientibus mederi opinio est. Apud olimos *Genesia* herba, & *helesina*, vocari cepit: heræ similitudine, nisi quod singula folia bicoloria sunt, partim rubra, partim herbacea.

*Symphoniaca* Apuleio υῶσσις, καὶ σύμφωνίζων, id est, herba Apollinaris, vel hyosciamus: quæ & *Symphoniaca* habet nomen: officinis corruptè *lusquiamus*, *Quere* dicit. Altercum, & *Hyosciamus*.

*Symphytum* σύμφυτον, quatuor generum depræhenduntur: magnum, alioqui consolidæ Enulæ campanæ quæ solia habet: radicem extra nigram: intus verò albam glutinosam, pollicis crassitudine altera, inferior multo atque in totum differt: *Butalmus* βούταλιος, siue *Bouis oculus* communiter nominatur: tertia, nomine alio *Belis*, vulgò *Margarita pratensis*, & *hortensis* dicta, ob floris pulchritudinem: nullius tamen odoris, quæ pulchrè conuenit in puellarum coronis: sed & quarta, *Consolida pectrea* dicta: & *Symphytum pectreum*: Dioscoridi *Aluscius* vide dicit.

*Symphysis* σύμφυσις, est quæ quasi cōlita vnitur in duos processus in coronem videlicet, quæ in acutum tendit, ac in ceruicem tantum definit. Nam processus sunt apophysis ἀποφυσις, καὶ ὑποφυσις. *Symphysis*, id est, cōlita, tres sunt differentię, quæ priscis nominibus carent: recentioribus ea ab intermediis, hoc est, à cartilagine συγχόνδρῳ, à neruis σὺννυρῳ, à carne autem σὺνσάρκατι, appellari licebit, *Synathroseos*, triplex species est, *Sutura*, *Gomphosis*, & *Armonia*: suis locis reposita.

*Stypium* στυπίον καὶ στυπτήριον, *Phocionis* grammati descriptione, generis *Linii* stuppæ est: quia *lini* stypula postquam per maturitatem vulla est, concutitur, & quasi tota in stuppam conuertitur: est quæ adurentis facultatis semen verò mucosum, & facultatis emollientis. *Stypium* igitur *Gnaphalium* non est.

*Syringias* σὺγγίαις καλάμος, totus concavus calamus est, quia verò fistulis apertissimus ita dictus, quod nimirum ei carnis sit nihil, atque cartilaginis, vt *Plinius* existimat. *Diosc.* non huic, sed alterum, cartilagine crassa, & carne, descripsit. Reliqua distulimus in dict. *Calamus*, & *Arundo*.

*Syderatio* σφάκωσις, gangrena est, à qua post magnas enim inflammationes aliquoties sequitur affectus, qui necrosis, vel *Sphacelus* Græcis, Latinis verò extinctio, vel *syderatio*, vbi scilicet pars priuatur vita, vocatur: vel similiter gangrena dicitur, cum videlicet pars nondum mortua est, nec sensu priuata, sed emoritur, ad extensionemque tendit. Author curationis est *Galenus* secundo libro ad *Glauconem*: cuius interpretes *Acakia*.

*Symptoma* σύμπτωμα, est accidens, seu etiam in morbo accessio ipsius: Sed symptoma generatim sumptum, est quicquid præter naturam animanti accidit: sic & morbi, & eorum cause internæ, symptomatica dici possunt. Speciatim verò acceptum quicquid præter naturam se habet, exceptis morbis, & causis, denotat. Sic sumptum sym

symptoma nihil aliud est, quàm affectus præter naturam, qui velut umbra morbum sequitur: hinc est quòd à non paucis medicis alio nomine ἐπὶ πρῶτον, id est, succedens, appelleretur. Gal. li. j. de Sympt. diff. Symptomata speciatim accepta trifariam distinguuntur: de quibus suo ordine fit explanatio, uti diligens lector animaduertet.

*Synanche* συνανχὴ, inflammatio est quæ in interioribus faucium musculus oritur: τὰ ῥα συνανχὴν verò, quæ in exterioribus eorundem fit musculis: ut relatum est in dict. Angina.

*Syncope* σύγκοπη καὶ διακοπή, est præceps, seu affatim factus vitio cordis virium lapsus, vel, est vniuersarum virium præceps, subitæque ruina, hoc est, κατὰ πτωσὶς ὕψους, καὶ ἀσπρῶς, θύραμῶς, quæ contingit, & interceptis sensibus, & liberis: quam animi defectus sæpe antecedit, aliquando comitatur: aliquando verò solus affligit. Author Acakia super li. ad Glauco.

*Syncope* stomachica σύγκοπη ἐσθμαχία, est animi deliquiū, seu virium lapsus, vitio oris ventriculi malè affecti emineas. Fit ob plurimam sanguinis, aut ventris excretionem, morum vehementem, dolorem ingentem, vigilias, omnem immoderatam inanitionem, timorem, terrorem, & alias animi perturbationes: ob crudorum denique humorum copiam, inflammationis magnitudinem, vitiosos & erodentes humores, aut æq: fetidæ perspirationem. Curatio integra est apud Fuch. li. ij. de Morb. cap. xj.

*Sylibis* & sylibon συλῖβος, spina est lata, foliis chameleonti albæ similibus, quæ recens nata coquitur cum radice, & cum oleo, sale & aceto iniecto manditur: Rura bonum carduum vocant. Canarorum verò monticolæ caucalim esse suspicantur, rapiforma, ritu vè in eduliis edentes.

*Syndrome* seu concursus σύδρομη, est quando concursio signorum plenitudinis humorum non apparet, nec vlla est suspicio comprehensionis, aut duritie instrumenti, cordisq: intemperiei, certum est pulsus inæquabilitatem, aut interceptionem ab obstructione profectam esse. Redi ad Acakiam super lib. j. ad Glauco.

*Synochus* συνοχος, febris ea est, in qua vna accessio ab initio ad finem perpetuò manens in multos dies porrigitur, vel, est quæ omni mutatione magna vsq: ad indicationem earet: & hæc continens febris dici potest: cuius natura est duplex, quædam namque notam putredinis prorsus nullam habet, & hæc in diariis est. Quædam autem manifestam putredinis notam, & hæc putrida Synochus est: cuius curationem docet Fuch. de Med. morbis lib. iij. cap. iij.

*Synochus* duplex est, quædam namque earum manifestam habent putredinis notam: quædam verò prorsus non habent, quas ex Diariarum febrium genere esse suffisimè docet Gal. Method. medend. li. ix. & de Diff. febr. li. j. cap. ix.

*Synochi* febrium tres sunt iterum differentiæ, illarum quædam à principio ad finem æquali magnitudine ac vehementia perdurant: vel sunt in eodem vigore permanentes, hæc Græci ὁ μοτονός καὶ ἀκμαστικός vocant. Quædam autem semper augentur & exiguum aliquid diiciunt, incrementum quoque suscipientes, aut inualescentes ἀναλαστικούς, καὶ ἐπακμαστικούς Græcis appellantur. Alij generis tertij Synochorum sunt, quæ paulatim diminuuntur, ac decrescunt: ideoque τὰ ῥα φακμαστικούς, siue decrescentes nuncupantur. Plura lætus in dict. Febris continua.

*Systole* σύστολη, est contractio sedis spirituum sensum non mouens, sed ratione & consequentia depræhenduntur: cuius contrarium, διαστολή est, ut per arteriarum agitationem cor motu suo continuo, tam pulmonum motu, quàm sua facultate omnibus in animantibus experitur. Vide Cor affectum.

*Syrupus* aut simplex est, ut zupiorum species, vel ex multis compositus, obfecta & plurima, & maxima, ut apozematum, hoc est, maiorum syruporum, formæ. Item Syruporum aliqui sunt species oximellitidis: alij denique aromata recipiunt. Actua rius, Mesue, Nicolaus, Fuchsius, & Syluius horum compositionis sunt auctores.

## De lictia T.



*Abes* φθις, etsi omnem corporis maciē & diminutionē denotet, tamen eam extenuationem significat, quæ pulmonis insanabilia consequitur vlcera. Fit namque propter humoris acris, & erodentis à capite in pulmones defluxum, & cum puris, aut sanguinis eruptio in suppuratis, perineumonici, & pleuriticis cohibetur. Est & pupillæ tabes φθις dilatationi in oculo malum: in eo enim pupilla angustior, obscurior, & rugosior fit.

*Tafus*, est index certus mollis, duri & asperi, lenis: molle est, quod cedit nostræ carni: durum contrà, cui nostra caro cedit: illud quoque faciliè patitur, aliteratur, corrigitur: hoc difficulter. Asperum quoque à siccitate, est lene ab humiditate: ob idque medicamenta purgantia, præsertim virium violentarum, sunt lenia, sunt salubria, & alia similiter, quibus præsertim & lenibus & asperis in eodem genere esse contingit: aspera, contrà. Tactiles namque actiones, sunt durities, tensio, ariditas, flacciditas, & cutis senum rugositas.

*Talus* ἄσπραγδα, malleolus, & clauicula, tibiz pars infima & extrema, vt recitat Gal. in lib. de Ossibus. Vide quod est reliquum in dict. Astragallus.

*Talchum*, terræ materia, quæ præ se fert Samiz terræ similitudinē. Diosc. & Gal. Aster Samius à stellæ nota, vel etià à stellæ splendore, appellata videtur. Ex Germania ad alias regionum orbis plagas, quia verò illic copiosa foditur, referente I. Agricola, & defertur. Quære dict. Aster Samius.

*Tamar* Indicum, vulgaribus medicis, & officinis Tamarindi, Indice dactili siue palmulæ syluestres, qui fructus Arabum diligentia ad posteriores medicinæ professores magno cum beneficio perueniunt. Hos prisca Græcorum, Latinorūque medicina ad Actuariū vsque ignorauit, nobis modò vsu quidem frequentes. distinguuntur à Myrobalanis, quod dactilos quidam appellant, quod hi nucleis sint expertes, illi verò fulciantur. Repete dict. Dactili.

*Tamarix* μύρρα, Myrica Vergilio: vulgus Tamariscū vocat: cuius duæ offeruntur species, quæ nostras sterilis est: sed quæ aliena nobis est, gallæ fructus profert similes. Gal. lib. vij. Simpl. Diosc. lib. i. cap. xcix. Vide præterea dict. Myrica.

*Tanacetum* & Tanasia, vulgus Matricariā: sed rectus cū Græcis Latini, Partheniū vocant: Artemisiā, coniectore Othone, aut secundā Parthenij speciem asserentes volunt etiam aliqui inter Ambrosia adnumerari habes plura in dict. Parthenium.

*Tarchon* τάρχων, vt ex Ruell. Draco hortensis, suspicatur Gesnerus: atque ex quodam Symeonis interprete, huius nominis suspicionem affert haud vndique reiiciendam. Turba Parthisorum hanc herbam *Estargon* vocat: Allobroges omnes cum Segusianis, id est, Bellicinis, Peuream, id est, piperitim ob quandam secum acrimoniam in acetariis mandendo representantem, peculiariter nominant.

*Tarda* ὠρίς, καὶ οὐρίς, vulgò *outarde*: Latini huic aui vt scribit Scholiastes, nomē à tardo volatu indiderūt, huius caro inter grues, olores, ibides, & anseres, media est.

*Tarrhaxacon*, Brassauolus Serim interpretatur, siue Seridem syluestrem: quæ apud Dioscoridem amara describitur, cichoriūque appellari dicit: quæ quoque Allobrogibus literarum metathesi Soltornea, id est, Solsequia vocata, siue Seris sylvestris, siue Cichorium Diosc. Tarrhaxacon reputatur. Vide dict. Cicerbita.

*Taron* τάρπη, Aëtius Agalochon ἁγιάδωρον, καὶ ξυλαδωρον, id est, lignum aloes, exponit quod officinis pariter quoque solet nominari. De hoc ligno vide Agalochon.

*Taxus* σμιλὰς, καὶ ταξός, arbor tota facultatis vi venenū, & ab eius etiam nomine toxicum referens appellatum: atque qui de ea arbore gustauerunt, celerrimè nocere corripiuntur: quando & umbra letalis. In pyreneis Galliz montibus frequens locorumque

rúmque incolæ Iphzam, & Iph. nominant. Diosc. li. iiii. cap. lxxvij. & li. vi. cap. xij.

*Telephion* *τῆλεφίων*, malignitatis tantæ vlcus est, vt salutem Achillis manum requirat: à rege Myliorum Thelepho dictum, quòd in eo nulla remedij spe nimirum conueniret.

*Telephion* *τῆλεφίων*, vel sedum medium, vulgò faba inuersa, vel Séper-vium medium, officinis Scrofularia maior, est appellatum. Diosc. lib. j. cap. clxxvij.

*Telis* *τῆλεις*, buceras & cerastris, quod scœnum græcum est: Hippocrati *τῆλεφίδες*, quoniam fructum corniculis similem habeat: vnde Siliquam nonnulli appellant. Plinius Siliciam, & Varro Siliculam. Vide Fœnum-græcum.

*Temperamentum* *χρῆσις*, ex calido, frigido, humido, & sicco mixtura est: vnde à temperamento naturæ facultas expetitur. Temperamentorum differentiarum in vniuersum sunt nouem: téperata quidē vna, non téperata octo: quarum quatuor simplices sunt, humida, sicca, calida, frigida: quatuor compositæ, humida simul & calida, sicca pariter & calida, frigida simul & humida, frigida simul & sicca.

*Temperatum* *ἐνκρατὸν*, duplex est, vnum quidem téperatum simpliciter dictum: alterū autem téperatum in singulis generibus. Téperatum simpliciter, hoc est, ad vniuersam substantiā, vel respectu totius naturæ, est in qua prorsus æqua elementorum portio existit: quòd cogitatione quidem vsurpatur, quā vt solidè subsistat.

*Temperatum* in singulis generibus, est in quo ea contrariorum elementorū mediocritas existit: quæ cum animantis, tum stirpis naturæ maximè conuenit. Hippoc. in lib. de Natura humana: Gal. de Temperamentis lib. j.

*Temperatura* æqualis duplex est, vna ad pondus, in qua par pondus elementorū cōmixtorum spectatur mōles, quam nosquā inueniri medici contendunt: altera ad iustitiā, in qua nimirū sic cōmixta sunt elementa, vt medioeritas illa quæ horū mixturam sequitur, naturæ animantis, ac plantæ conueniat.

*Tēpus*, est numerus primi motus secundū prius, & posterius: primus motus, is est, qui est primi mobilis, mobilia hoc ordine sunt sira, altera, aqua, terra, ær, ignis, cælū Lunæ, Mercurij, veneris, Solis, martis, Iouis, Saturni, Firmamentū, primū mobile. Esse in tēpore, est mensurari tēpore: ea verò mesurantur tēpore, quorum duratio tempus est: aut quæ incipiunt, & desinunt in tempore.

*Tempora* anni sunt quatuor, ver, æstas, autumnus, hyems in téperamentis sunt statuenda, vt facillè cognoscitur. horum siquidem quodlibet ex suapte estimatū natura, non ex alterius cōparatione calidum, frigidum, humidū, siccū, vt debet nominari. Et si formā scribendi Hipp. & Gal. spectes, apparebit tibi ver esse omnium excessus planè in medio: itā quoque de cæteris anni tēporibus in excessus medio coniectandū. Ver tamen si calidū & humidū, dici non potest, quòd nimirū calidum esse ac téperatum inter se pugnent. Hipp. Aphor. lib. iij. sect. ix. & ipsius Gal. interpretæ necnon Tépera ment. lib. ij. & iij.

*Tempus* anni præsens in ventre subducendo considerandū, quoniā verò tempus quoddā anni purgationē minùs sustinet, desideratque: atque ob id porrigere temerariū. Tempus autem anni partes quatuor intelligendæ sunt. Hippocr. Aphor. lib. iij. sectione quinta & sexta, cum cōmentariis Gal. Sic quoque morborum tēpora quatuor numerantur, principium, incrementum, vigor, & inclinatio. cuius quidem rei meminimus in dict. Morbi principium.

*Tembulum* *τὸ μολύλον ἴδιος φυλλοῦ ἢ μολοβᾶτρου*, quæ quidem malobatti species altera est: sicut vsurpauit Aëtius Sim. pl. lib. j.

*Tendo*, est qui ex nervosis propaginibus, musculorum constituiturque capitibus: vt Gal. author est ij. li. ad Glauc. cuius curationis explanator Acaia super eodē lib.

*Tenuis vrina*, est quæ innati caloris imbecillitatem, & frigiditatem dominantem, crudelitatem, iccoris, renūque obstructionem significat: cuiusmodi vrina tennis suo loco descripta est: nempe quæ tenuis vrina est & alba, vt aqua: aut imbecillitatem vitæ, aut obstructionem renum, aut iccoris denotat: & in ardentibus quoque febribus phrenitim. Melancholici siquidem humores obstruentes crassitie sua meatus, huiusmodi vrinæ efficiunt.

*Tenuis* vrina & rufa, alba quidem melior est, quod ad colorem, cruda tamen si substantiam spectes. Tenuis & flaua vrina, non solum malam coctionem, sed etiam alimentum defectum, indicat interdum ostendit calorem multum in profundo biliosum succu gignere, vt in febre tertiana. Morrore etiam, curam, vigilias, solis aestum, atque laborem.

*Tergentia* medicamenta, sunt quae pilos extenuant, vt nitrumustum, niteri spuma, fictile, testex, pumex, ostreorum omnium testex vltex sic ossa sepię etiam non vltex, struthionix dracontix, aristolochix radix, vera terra, beta, luxurium.

*Terminthus* *τῆρμινθος*, ex Aegyptia, Orisasio quatuor est praeter naturam, seu enascentia nigri coloris, in tibiis maxime consistens. Sic dictus, quod similitudinem in figura, colore atque magnitudine cum terebinthi fructibus habeat.

*Terminthus* praeterea tuberculi species alia est, cui pustula nigra supra infraque adiacet: qua rupta id quod adiacet desquamato simile apparet, quo quidem dissecto, pus deprehenditur. Diosc. autem Alexandrenus, quem recitat Fuch. ait terminthum esse eminentiam in cute consistentem, rotundam, nigro viridem, terebinthi fructum referentem.

*Terra Samia* à Samo insula nominata: Graecis authoribus *αἴγρις* est, vt Cels. & Largus referunt. Terra omnis, inquit Diosc. ad medicum usum recepta, summam vim & primam habet refrigerandi, meatibusque obducendi, ocludendi que. sed specie distat, cum adiunctis quibusdam ad alia sit utilis. Samia praefertur candida, levis, tangenti linguae glutinis modo adhaerescens, mollis, succosa, stabiilis, cuiusmodi est quam aliqui collyrion vocant alia Aster appellatur, et ustacea, & cotis modo praedicta. Quae Diosc. li. v. cap. xciiij. Gal. de Tertia differ. li. ix. Aetius quoque legendus in integro lib. ij.

*Terra* merita vulgariter officinis appellata, Ciperus Indicus est, zingiberis effigie, quod manducatum croci vim reddit, gustu amaro sentitur, & illicum praesentem philorhri vim exhibet philorhon namque Bryonia siue vitis alba, est: vt in suo loco retulimus.

*Terra* sigillata, Lemnia tellus, & Sigillu Lenium, est, quo profecto caret tota apud Gallias pharmacoepiana pro hac tellure impostura sigilli emendicata, bolu Armenicum ostentant officinae. Repete Sigillum Lemnium, & Bolus Armenus.

*Tertiana* febris continua, est quae cum tertiana exquisita intermittente, quod perinde atque illa tertio quoque die accessione obrinet. Quod superest, tepete in dict. Sinochus.

*Tertiana* notha, fit quando bilis maxima ex parte pituita miscetur: hinc est quod non singula signa, vt in exquisita putat bilis natura praefertant.

*Tertiana* exquisita, fit cum flava bilis extra vasa putrescit: sic dicta, quod vnum diem intermittat, & tertio redeat. Gal. curationis author est lib. ix. Meth. & lib. i. ad Glauc. Fuch. de Medend. morb. lib. iij. cap. iij. vj. & vij. *de diff. feb. cap. li. a.*

*Tertiana*, & quotidianae quatuor sunt complicationes, vna quidem, quando tertiana & quotidiana commiscentur altera, cum tertiana intermittens quotidianae continue coniungitur: & haec *ἡ μίττριτος* vocatur: quod scilicet tota eius natura, dimidia parte alterutra praedictarum febrium habeat. Tertia, quando quotidiana intermittens tertianae continue miscetur: quarta, vbi quotidiana continua, tertianae continue coniungitur. Item febres eiusdem generis cum aliis eiusdem generis complicantur: vt continue cum continuis intermitteutes, cum intermittentes. Rursus aliae cum aliis speciei eiusdem. Gal. lib. ij. de Differ. febr. cap. vij. Item. de Crisibus lib. ij.

*Testudo* *ἡ χελώνη*, quae torpedo quoque dici potest, si Largu sequimur: ex eorum genere est, quae *οφρακοδριμα* dicuntur, & oua patiunt, ponuntque. Sexus utriusque est testudo, maris, & foeminae, aqua terramque incolentium: maris notae habentur à concha lata per medium concaua, totam partem incubentem velans: super aqua etiam graditur, neque se ouiparus vt foemina: cuius oua colobi magnitudinem complent, illis tamen si longiora habentur, discernitur quoque à mare, quod haec parulosior cum capite breuiore, & minuiore. Ex sero domesticu fit hoc animal nutritu pasum deprehendit atque ex Lacertorum genere suspicatur. Aristot. testudines in aqua versantes appellat *αἰμυδεις*: sed quae terrestres sunt in deliciis hodie praefervuntur, quonia cibis stomacho optimè conficitur, praefertim prodest astmaticis, tabeque confectis medicorum celebrum sententia.

*Testes*

*Testes* qui & didymi, siue testiculi, virorum ornamentum à natura expetitū, officina seminis: Græcis διδυμοί, καὶ ὄρχις: absolunt enim semen in suis meatibus: humidi & calidi, in partēsq; minutas valde secti: quorum secretū inuolucrum est, & περιδιδυμὸς dictū Græcis: in hoc venæ feminariæ in rebus, & ad rta vena ductæ: quas iidem Græci ποροὺς vocant, implicantur.

*Tetanus* τέντωσις, est extēsiō & suffocatio omniū corporis musculorū & neruorū, cū in rectū aut obliquum collum contrahitur, & maxillæ & dentes stridore cōcutiuntur, neque collum nuere, neque renuere potest qui detinetur. Quære dict. Conuulsiō.

*Teinēsmus* τεινισμός, est assidua & quæ differri ac deuitari non potest eger ēdi cupiditas: Sic dictus Græcis ἀπο τοῦ τεινίσθαι, quod conari significat. Affectus hic fit vel propter frigiditatem extrinsecus occurrentē, humores acres, biliosos, aut pituitā saliam, vlcus, aut inflāmatio ē in intestino recto obortā aut stercoris in intestino cæco cōadū obstructio teinēsmū efficit. Curatio est apud Fuch. li. iij. de Med. mor. cap. xj.

*Terebinthus* τέρπεσθος, arbor resinā fundens in Syria, & oriente picem: fructum profert cui aptū nisi stomacho aduersaretur: exalfacit, urinā mouet, venerē excitat.

*Teucrium* τέυκριον, oculus catti officinis Brassauolo videtur pimpinellæ descriptione sua faciem iestari. Ego verō pimpinellā inter syderitides, aut saxifragas, & teucrium inter calamynthas, adnumerarim dissidentem tenes Plinio, qui teucrium hemionitidem facit. Diosc. li. iij. cap. cij. Teucrium est, inquit, herba ferulea, trixagini similis, tenui folio ciceris figura: quæ vulgò oculus catti nominata apparet.

*Thalictrum* θαλικρόν, herbariis nostratibus Ruellij quidem arbitrato Argenti-  
na est, sed Gesnero, coryla fortida notatur. Diosc. li. iij. cap. lxxxij. Thaliectrum dixit, cuius folia coryandri sunt, pinguiora paulò: caulem rutæ in quo folia: quæ trita, illitu antiqua vlcera ad cicatricem perducunt. nascitur maximè in præruptis & campestribus.

*Thallia* Pompeio Festo, cepæ folliculum interpretatur, quod θαλός in olea dicitur. Est & in olea thallia summi ramorum cauliculi teneriores, nec à foliis sua mollicie magno opere diuersi. hæc Gesnerus.

*Thapsia* θαψία, vetus adhuc nomen retinet: ab antiquis Latinis Ferulago dicebatur. liquor herbæ ferulaceæ cum larga humiditate, ob quam citò corrūpitur. Primū in Thapso insula inuenta est, vnde illi nomen. Gal. lib. i. compos. pharmac. κατὰ το-  
ποῦς, ait, Tapsiam exulcerationes in cute excitare, & omnino quosdā inflamma-  
tos tumores. Diosc. lib. iij. cap. exxxvij.

*Thelycrania* θαλυκρανία, Cornus fœmina, arbor fruticosior, quàm mas, minùs tamen fructuosa. Præcox cornus circa æstiuā solstitia fructum reddit: Serotina, quā aliqui fœminam nominant, post Autumnum, bacis perquam acerbis, & cunctis animantibus gustu intactis. Cætera in dict. Cornus.

*Therionarica* θέριοναρικά, alia, inquit Plinius, existimatur, quàm magica, in nostro orbe nascens, fruticosa, subuiridibus foliis, flore roseo. nomen inuenit, quòd serpenti-  
bus torporem inferat: & scorpiis ad mota, torpore ipsos afficit. hæc à Delphinio dis-  
fert plurimum.

*Thlaspi* θλασπί, nasturtium erraticum officinis est, non autem sinapi syluestre, vt quibusdam affirmare placuit: ignotum adhuc nobis existimat Manardus, quod pascum quidem in semitis frequens, vt apertè Diosc. docet, quale nostrum reperitur: vulgatissimūque quibusuis colligitur. acre, ac mordax semē est, & vires habet cau-  
sticæ: misceturque in Theriacis veneno quouis profligando idoneis.

*Thryallis* θρυαλλίς, καὶ λυχνίτις, verbasci species tertia, quam Parthisini populi Boullionum, Allobroges thedariam, quòd ex eius videlicet stolone resina pingui vè quopiam iniuncto, pro thedis vtantur, appellāt. Gaza apud Theophrast. Thryallim trāsferre Pimpinellam ausus est: sed Diosc. lectione herbas esse differentes agnosces. Vide dict. Verbascum.

*Thuyum* θυιον, rura Bellicensium in Segusia etiam Thuyam, quæ Throgetes est, arborem communi vocabulo appellant. huic proximum lignum est, quod Gallis Ma-  
darum & Madrum, vocatur.



*Thuris* λιβανός, est lachrima Arabicæ arboris nomine Libani, cuius cortex insigniter adstringit: miana verò Thuris mica multa ex magnis fasciculis concussu elisa colligitur, estque ipsius thuris purgamentum. Primum teneat in thuris genere masculinum Aëuari: nam & ei incensum nomen est.

*Theligonum* θελιγόνον, καὶ φυλλόν, καὶ ἐλαιοφυλλόν, scemina est, in saxosis nascitur, vuas habet: floribus oleæ similes, pallidiores tamē. foliis itidem oliuæ: est caule tenui, breui: radice exili. florē albū profert, semē papaueris maiusculū. potu scemine sexus facere partus creditur. Diof. li. iij. cap. cxx. Repete dict. Arthenogonū, & Foliū.

*Thracias* lapis, vis ei gagatē: traditur aqua accendi & oleo restinguī, quod in bitumine accidit. Diof. li. v. cap. xcij.

*Thummi*, ex eeteracorū genere est, cuius caro, quam omotharicon vocāt, sumpra iis auxiliatur, quos vipera nomine Prestet momorderit: sed oportet vinū quāmplurimum subinde cogantur bibere, ita ut vomitione reddatur. contra actimonias elisatorum maximē valet, canum moribus vtilissimē illinitur. hæc Dioscorides.

*Thylacitis* θυλάκεις, satium papauer flore albicante, semen etiam album profundens sublongo capitis verticillo inclusum. Est denique thylacitis Nardus montana, quæ Neris quoque dicitur. Quære dict. Papauer, & Neris.

*Thymelæa* θυμέλαια, Leo terræ herbariis neotericis, & Linum sylvestre, siue Oliella cognominatur: nonnullis tamē aliis Mesues verū esse Mezetcon: Granū gnidiū ex ea colligitur. quā viriū hæc sit, legentes Diof. lib. iij. cap. cliij. faciliē agnosceret.

*Thymra* θυμρᾶ, herba nomine Satureia, quæ Sarrieta, & Sauorea populari lingua, siue gēilitia, vocata est: hæc nāque à thymo differre videtur. Est & thymra capitata, id est, Cunila. Iē Thymbræum, sifymbrium sylvestre appellatum: de quarū herbarum differentia in dict. Satureia, Cunila, & Sifymbriū paulō plura retulimus.

*Thymus* θυμός, aliquibus vulgi opinionem sequentibus, maiorana Anglica, olitoribus, & mulierculis, Thymra: in duo fastigia, albi scilicet, & nigri diuiditur: sed Thymbram, & Thymum plantam eandem esse suspicor.

*Thymus* θυμός, carnosa est excrescentia nunc in glāde, nūc in præputio, nunc in ipsa consistens sede. Sic sanē morbus dictus, quod corymbis Thymi similis sit. Thymorū autē alij mites, alij maligni: sed qui mites, exigui sunt, scabri, candidi, dolore carentes: maligni autem ampliores, scabriores, liuidi, & dolorosi.

*Thymia ma* θυμιάμα, καὶ αἰμυμνάκον, hoc est, ex gūmi hoc, & thymo medicamentum olim quod odoratissimum, compositum erat: quale hodie fieri desitum est. Quære dict. Ammoniacum.

*Tilia* τὴ φύλη, arbor ingens, & patula: quæ sexu inter marem, & sceminā distinguitur. Veris medio floret: utraque flore minuto colore sublauro, & languēte, sed benè odorato: producit baccas corimbis similes, intus nucleum post maturitatē habentes, ex quibus liquor quidam velut oleum elicitor, podagricis, & arthriticis vtilissimum siue potum, siue iunctum: nec de hac re nisi experti hīc loquimur. Existimaui e Cordus Ligustrum, siue oleastrū, Diof. Tiliam esse, quia simili apud eundem Diosc. depingitur historia: quæ plurimū disconuenit à Tilia nobis vulgari. Apud Theophrastum Tiliæ materia fabricæ expetitur, & ex mēbrana ligno proxima funes, & restes texuntur in Gallia, & Germania: quæ nostra Tilia est. Diof. lib. i. cap. cvij.

*Timor*, est qui & spiritū, & sanguinem intro, & ad scatebram, suam reducit, contrahitque: quod fit ut partes in superficie positæ algeant. Quinetiam cordis, & arteriarum pulsationes, & minimē, & perquam debiles apparent in patientibus timorem. Reliquum est in dict. Ira.

*Tiniaria* τινιάρη, Græcis est, sicut suis in compositionibus scriptum reliquit Largus. Vide Polium.

*Theorema* θεῶρημα, seu speculatio, est res vniuersalis medicinæ fini accommodata: & axioma vniuersale, & totā cōplectens medicinā: cuius contrariū amphydoxū est.

*Thyrser* θυρσός, caulis in virgulæ modum, vel teli rectitudinem consurgens, scapus a liocni appellatus. cuius dict. petes.

*Tithymallus* τὴ θυμᾶλλος, par alios, & veteribus lactuca marina dictus: tithymalus

lus mas *χαίρακας*, quasi vallis: idē amygdaloides. tithymallus femina *μύρκοιτης* myrtites, vel caryites. tithymallus paraliōs *παλῖ παλῖς*, id est, maritimus. idem tithymallis, tithymallus *ἡ λισσὸς πρὸς* quasi solsequens. tithymallus *καὶ παρῖ σσιας*, id est, solis cyparissio æmulus. tithymallus *δένδρως δῖος*, vel petrophyes. Est præterea post hos omnes Tithymallus *παλῖ τυφυλλῖς*, id est, latifolia: quorum omnium varietatē suo loco petes.

*Thorax* *θώραξ*, Græcis pariter vt Latinis, est hoc quod post ceruicē sequitur. Sic quidem vocare consueuerunt medici totū hoc spaciū quod à costis vtrinque circumscribitur. Thoracis affectus discuntur ex Gal. lib. v. Loco, affect. cap. ij.

*Titillatio* penis siue mētulæ *παρῖ ἀπισμῖς*, est cum genitale mēbrū & in longitudine, & in latitudine totū augetur, nullo stimulatē ad libidinē aut desiderio, aut æqui sūto calore. Vulgus medicorū nostro seculo à priapismo passionē hāc deducit.

*Titillatio* item, est risus præcordiorum ratione, quæ neruis quibusdam subit: nam solus homo titillatum sentit inter animalia, quod cutis tenuitate euenit: vnde solus animalium homo ridet. Lege Arist. lib. iij. de Partib. animalium, cap. x.

*Tonsille* seu amygdalæ *παρῖ ρισθῖ α, καὶ ἀρτιαδῖς* Græci appellant, sunt glādulæ spongiosæ similes, carnosæ quæ ad linguæ radicem vtrinque appositæ.

*Tonsille* aliz *παρῖ ρισθῖ α*, non solum faucium partem denotant, sed eiusdem etiā inflammationem: quod locus ille cui adiacent, qui veluti isthmus quispian angustus est, cum inflammatione tumēt, multo quā antea angustior fiat. Itaque *ἀρτιαδῖς* Græcis nomine alio dicuntur Gal. lib. vj. Compos. medic. secundum locos, cap. iij.

*Tapiarium*, intelligitur opus quod ex arbore, frutice, vel herba ad decorem testudinū, camerarum vè mote in hortis cōponitur. Vide C. Stephanū in li. de Re hortēsi.

*Tormentilla* notitiæ peculiaris, quinque solum videtur: nisi quis Imperatoriam esse malit. Quære Pentaphyllum.

*Tordylon*, & Tortile *τόρδυλον*, Sefeli Creticū AEGyneta *γόρδυλον καὶ γόρδυνον* aliquibus semē Sefelis esse visum est: aliiis herba tātūm, quæ & Sireō vocatur: quæ planē Tordyllo Diosc. repræsentatur. Eius semen Amomo simile videtur.

*Tori*, sunt prominentes partium calli, & in se pulparum modo collecti, id est, crassities arborum, herbarum vè, canosa in tumorem quandam eleuata ad radices quæ prospicitur. Sic multæ radices torosæ depinguntur.

*Toxicum* τὸ ἔκρον, venenum, quo sagittæ tinguntur: quod ab arbore Taxo duxisse nomen videtur. Repete supra dict. Taxus, & Aconitum.

*Torpedo* ἡ ναρκή, vulgus Rampā vocat, ab effectu, quod efficiat leuem quandam torporē tangētī, inductiq; mēbrū in dormitionē somnicatē: ob idque i Torpedo nomen inditū. Piscis nomine Torpedo, ex cartillagineorū genere est, carnēque mollē, iucundā ori, vt scribit Galenus, & coctū minimē difficilem. Lege Atbenzū Dipnosophist. li. vij. vbi à Galeni sententia dissidet. Require supra dict. Testudo.

*Tragacantha* *τραγάκανθα*, frutex exoticus spinæ candidæ non dissimilis: eius gūmi, qui barbarē loquuntur, Dragagantum vocant. Diosc. li. iij. cap. xxj. Tragacanthā tradit gummi naturam habere, propriē tamen gummi non videtur, & si recentiores hoc illi tribuāt, sit antem ex Diosc. lectione, per radices incisionem: Theophrastus tamen sponte emanare retulit, qui succus in lachrimam subinde coalescit. & Tragacantha nominatur. Est & Tragacanthæ fructus Gal. lib. x. Compos. pharmaco. auctor: & Tragacantha alba Actuario: Item Gal. lib. vij. comp. pharmac.

*Tragium* *τραγῖον*, in Crææ tantūm in solis maritimis nascitur, folio, ramis, & semine Lentisco similis, sed minore omnium amplitudine. Plinius ad Luniperum nō ad Lentiscum retulit. Succum producit lacteū, qui gummi modo coit. Est item Tragion alterum, scolopendrio similia habens folia, radice m tenuem, candidam, armoraciæ similem: cuius odor hircinum virus olet. Autumnouidēque appellatio nascitur in montium angustiis, & præcipitiis. Diosc. lib. iij. cap. xl.

*Tragos* *τραγὸς*, frutex pusillus in maritimis nascens, oblongus, semipedalis, aut altior paulo, sine foliis, ramos habens in quibus velut racemi pusilli insunt, grano frumenti, acuto capite, copiosūque, gustu vehementer spissante. Tragon her-

batiis perhibent in mari litoribus inueniri iunco marino similem : à quo & multum iuncum marinum appellant, cuius adstringens est facultas. Ruellius.

*Tragopogon* τρῶγον, id est, hirci barbula, & barba hircina officinis, quæ in aruis, & herbosis locis frequentissima inuenitur. radice oblōga, subdulci, & flaccida, folio, & flore croci longiore, caule nonnunquam cubitū æquāte, super quem calix latus & barbula, quæ in summo vertice circa senium inæana funditur, vnde ei nomen. Quæ verò altitulis in hortis crescit, folio est latiusculo, flore purpureo: radices in altum agit, quæ hybernis diebus acetaria sua dulcedine commendat. Nos cætera in dict. Gerontopodion. Quinetiam Galenus Ladanū α' ποτραγονῶνα nominauit, quod ab hircorum barbis colligeretur. Quæte dict. Ladanum.

*Tragoriganum* τρῶριγον, duū generū ex Dios, vel, vt Plinio placuit, ex Heracleio est: hanc herbam Gallis mastichinam dici suspicatur Ruell. quoniā lentore quodam interdum madescit, iucundūque spiret Mastiches odorem, in cuius umbella propendunt cani hircorum villi: vnde ei tale redditum nomen. Qui velit scire qualis herba Tragoriganum sit, semini lini semen in cepa prius madefactum maceratumque, inde tibi succrescet Tragoriganum, vt ex authoribus tradit. Io. Agricola: Diosc. lib. iij. cap. xxix.

*Tragus* cerealis τράγος, vt ab herba distingatur, frumenti genus, cuius granum compluribus glumis vestiti retulit Galenus, vulgò frumentum Turcicum appellatur. Diosc. lib. ij. cap. lxxxv.

*Trigla* ἡ τριγλᾶ piscis patrio nomine Rogetus est apud Parthienses, Romani Barbatulum, Malsilienfes voce corrupta Trigant dicunt, Phocenium Græcorum nomē redolens. Plura leges in dict. Mulus.

*Tribulus* terrestris τριβῶλος χε'ρσῶδης, Plinio Calcitrapa, cuius vulgus officinarū nomē retinuit: producit fructū modicū, echinatū, spinisque modicis fultū, tota herba repithumi. Est & Tribulus marinus, siue aquaticus τριβῶλος ἐνυδρὸς, qui in aquis stagnantibus nascitur, paritque fructum spinosis, aculeatisque cornibus ornatū, quo vescuntur incolæ Brannonicū, id est, in Bressia degentium, & castaneæ cornulas more suo appellant. Ruell. lib. iij. cap. lxxxiiij. Diosc. lib. iij. cap. xij.

*Tribomanes* τριχομανῆς, polytrichō nostataribus isto seculo vocatur: & vulgatus capillus veneris videtur, qui Adiantho vires easdem habeat: itaque pro altero quiuis sumi licentius solet. Diosc. lib. iij. cap. cxxj. Vide in dict. Filicula.

*Tritura*, est quæ medicamenti admodū confert, multa quidē crasis, pauca verò tenuibus, & texturæ debilis, & virtute cito exhalabili præditis, mediocri denique amborum mediis, quantōque medicamenti essentia crassior, tanto parciore. Vide plura apud Mesuem, Syluij beneficio restitutum, Theoremate secundo.

*Tritocci* τρικοκκὺς μέσπιδος, id est, triū granorū, vel ofsculorū in fructu mespilus arbor, & fructus mespilū, libuit appellari. Vide dict. Mespilus. Est quoque τρικοκκον ἡλιοτροπιόν, follequij species: quam quidam Scorpiuron sunt suspicari.

*Trifolium* τριαῖον καὶ τριφύλλον, cytissus, sed Trifolium minus λευτὸς ἡ γρῶς, id est, lotus pratensis, siue erraticus: trifoliū odoratū, μηδὲν est: & est trifolium acutū, quod δ' ἐν τριφυλλῷ Græci vocant, cuius descriptionem pleniorē habes ex Largo, cap. elxiii, ad serpentem ictus, morsusque, Diosc. lib. iij. cap. ciiij. Est item Trifolium τριφυλλὸν, atboris species: cuius folium trifolio pratensis herbe respondet. Græcis Menyanthos μενυάνθος: cuius quare dict.

*Tremor* τρέμεις, palpitatio, seu eleuatio, & submissio corporis cedentis, & non restitens est: quæ à spiritu fix certis quibusdam temporibus, non autem semper, accidit: hoc relatum quidem est in dict. Palpitatio.

*Triens*, tertia libræ portio, id est, vnciæ quatuor, drachmæ triginta duæ, scrupula verò centum & viginti.

*Triorebis* τριόρχις, centaurij genus tertium ex Theophrasto Plinius scriptum retulit: de quo quidem Centaurio suo loco abundè à nobis tractatum est.

*Tripolium* τριπολίον, Turbith Atabum putatur, retulitque nomen tripolium, quod eius flores ter die muscet, candidi mane, purpurei meridie, punice in occasu huius

huius folia Ifatidis sunt arida, sed crassiora, caule palmeo, in mucrone diuiso. Nas-  
citur in maritimis ubi alludit vnda, iterumque retro com meat. Aëtuarius Alipum siue  
alipiam Turpethum album exponit, diuersumque facit differentia alterius: Pityusa  
verò radicem, quæ officinis Esula est, Turpethum, quasi alterius coloris, facultatis vè  
esse voluit. Ex Ruell: paulò aliter apud Gesnerum reperies descriptionem. Iterum A-  
rabum Turbith ex Serapione, Dioscoridis Tripolium est: Turbith vel Turpeihū A-  
ëtuarij, quod duplex facit, Dioscoridis Alipum, & Pityusa est: quam etiam Turpeth  
à Barbatis vocari scribit: proximum à veritate Leonici super ipso Dioscoride. Tur-  
bith autè Mesues quibusdam videtur secunda Tithymalli species. Nos propriis locis  
has omnes plantas per nominū seriem quanta potuimus diligentia, distinximus.

*Trislepi* τρισελεις. *Dysped.*, inter arbores dicuntur pinus, robur, abies, nā solæ ger-  
minationem corptam intermittunt, idèoque turgent ter, & terna ædunt germina: in-  
termittunturque dici Latinis posse videntur. hæc Ruell.

*Trisago* χαυμολ σπυς duplex, vna terrestris, quam vulgus Gelandram vocat:  
altera palustris, quæ Scordion Græcis appellatur. De vtraque quod iustū visum fuit,  
in dict. Trisago, retulimus.

*Triticum* τριψιδ, & plures & varias includit differēcias, vt frumentum, robū, filigi-  
nē, citanū, idèoque cū frumento generalius nomen assumpsit. Nam syluestre triticū,  
cultu feritate mitigata in cereale mansuecit. Ponticū colore album est, quod ex cor-  
rupto semine nasci putauit Theophrastus. Vide quod superest, in dict. Siligo.

*Tromus* τριψιδος, passio est quæ duobus perficitur motibus: vno dū cogitur pars ob  
motū atque gravitatem ad inferiora reperere: altero, dum sursum à facultate fertur.

*Troxima* τριψιδος, plerisque Endinia putatur. Didimus feris genera dixit appel-  
lari, quoniam in cibum veniant. Sic & vna troximos, id est, edulis.

*Tuber*, inquit ex Martiale in hoc versu Gesnerus, Non tibi de Lybicis tuberes, &  
oporina ramis, priore sillaba correpta, arboris genus, & arboris fructus est.

Tuber terræ τριψιδος Cyclaminus, officinis Cyclamen, & panis porcinus: A-  
rabibus Artanita. Vide dict. Cyclaminus.

*Tubera* τριψιδ, Tuffera patrio more appellata: tellus in se gignit solo vndique cir-  
cūdata, nigro inclusa cortice, sine foliis, sine radice, sine caule, & sine semine: solo hor-  
ridi tōpitris motu telluræ concussa tantum, vt retulit Plinius, nascuntur. vere & au-  
tumno fodiuntur, quorum edentibus, vel potius vefcentibus frugalius inest a popu-  
liam, & epilepsiam mouere facultas.

*Tusilago* τριψιδος, vulgus vngulam caballinam profert: siue Asininam: de qua in  
dict. Bechium quæ oportuit, diximus.

*Tragemata* τριψιδος, bellaria sunt quæ secundis mensis apponuntur: condita  
nimirum saccharē, aut coperta, nunc in longitudinem, ex citri, vel arancij cortice nūc  
rotunda, vt anesi, vel coryandri præparati semine: nonnunquam etiam ponticarum  
nucum, græcæ tūque nucleis deplumatis parantur.

*Trochilus* siue Regulus τριψιδος, quasi auium præses ab Aristotele dicitur, vulgò  
Royletelus: estque auium minima, sed in cōfringendis renum calculis efficacissima.

*Trotta* & Trotta, piscis saxatilis, qui inter rupiū ex fontibus amnes degit: flu-  
uiosque palustres refugit. estque piscium optimus. Quære dict. Amia, & Salar.

*Troglodites* τριψιδος, auis, populari denominatione Cauda tremula: & Mota-  
silla quod caudā semper moueat, dicta. Est autè, vt inquit Aëgyneta, hæc passerulo-  
rū inter auiculas omnes minima, solo eo, cui nomē est Regulus, dēpto: minima nam-  
que auicula cū sit, hæc sola maior, & colore cōpar ac similis, inter cineritium & vi-  
ridem medio, tenuis parūque rostri, parietibus, sepimentisque maximè agens: quæ  
sale tota condita, & cruda fugiter esca, concretos iam calculos lotio expellit, atq; dein-  
ceps ne renascantur, prohibet. Cremata item hæc tota, & in cinerem viua subacta, &  
per se pota cum quopiam cremore liquido, ad eadem facit. hæc Aëgyneta lib. iij. cap.  
de Renum calculis: à quo omnia de Troglodite passerulo mutuatus est Aëtius li-  
bror. suorum Sermone xi. cap. xi.

*Tuberculum* σὺχος, in ano est vlcerosum, rotundum, subdum, rubicundum, & quod dolor comitatur: atque hæc tuberculorum genera fici Latinis dicuntur: vt telatum fuit in dict. Ficus.

*Tumor* veteri induratus, μῦλος: est interim in vuluæ ostiolo, interim in toto vtero ipso pronuens. Vel, caro informis in vtero consistens, quod mulieres in conceptu quandoque decipit: ab ipsis quoque Mola vocitata. Gal. Metho. med. lib. xiiij.

*Tunici* herba, officinarum vocabulum est, plebis verò Gyrophila, Latinis Britanica, Dioscoridi βέτρον: plurimum quoque differt à Betonica, nomine alio Cestrū appellata. Diosc. lib. iij. cap. ij.

*Turdus* ὁ κρυλὸς auis inter turmas miliaris: aucupes suo more *Esomnean* vocant: quanquam Sturdum, vulgò Gryuam diuersi tamen generis, eundem Turdum esse voluit: Caro turdi, gustantibus amara est & implacida, nec cibo etiam digna, quoniam difficillimè conficitur. Sturdi verò palato conuenit, stomachoque prodest, vtriusque Sturdorum generis. Quære dict. Quercedula.

*Turtur* τίττυς, ex genere colombarum est, tamen peregrina: dum vere ad nos aduolat, autumno autem meridionalem plagam, vt Coturnix, & Hyrundo, repetit. Nomen Græcis, & Latinis à sono ei inditum est: cæterarum auium caro temperatior, ægris, vt sanis laudabiliórque iudicata semper visa est.

*Tussis*, est frigida intemperies respirationis causa instrumentorum motus continui effectus. Humor etiam à capite in asperam arteriam destillans, & sola asperitas membranæ asperam arteriam intus ambientis, tussim irritant. qui præterlabuntur etiam cibi firim, caro potus, mouent. Lombrici, & acris humor, stomachum in festantes, tussim proritant. Curationem habes apud Fuch. de Meden. morbis, cap. iij.

*Tympanides* τυμπανία, καὶ τυμπανίτης, sit vbi flatus ac spiritus copiosus in iisdem ventris locis congregatur: & hoc nomine infirmitas appellata est: quoniā si pulsatur venter inferior, instar Tympani sonum ædit. Nam & hæc hydropis secunda species est. Curationis Fuch. author est de Medend. morb. lib. iij. cap. xxv.

*Typha* cerealis τυφή, siligini specie non dissimilis, simplici culmo assurgens, grano copioso, multiplicique, radice numerosa, tritico perquam similis traditur. Ex Ruellio, hæc Gesnerus.

*Typha* τυφή, ex Theophrasto, aquaticus frutex est nec radice numerosa coherens, sine geniculis, & folio scirpi modo profliens, parte radici proxima, esu præcipuè pueris tenera. Diosc. lib. iij. cap. ex iij.

*Typhoides* τυφώδης, febris nomine alio Erysypelas: ea enim quæ membranæ succingentis costas inflammatione oritur, pleuritica: quæ ex pulmonis, peripneumonica: quæ ex pulmonis, ventriculi, aut iecoris erysipilatibus accidit, τυφώδης, hoc est, succedens nominatur, Aëtio lib. v. capit. lxxviiij. auctore Gale. lib. ij. de Crisibus, capit. vij. καὶ κοίτης καὶ σόβος.

*Typice* febres, sunt in quibus accessio, & remissio stasis vicibus accidunt: atque his erraticæ planè contrariæ sunt, neque enim statum tempus, neque vllum ordinem accessionum & remissionum seruant: sicut sunt hæ quæ ex atrabile, quæ in quibusdā partibus mouetur, in quibusdā immota manet, in aliis putrescit, aut feruere incipit, auctore Gal. lib. iij. Pronost. commenta. xxix. oriuntur.

*Typus*, est intentionum, remissionum vè temporis pulsionis, quod ad accessionem & intermissionem fieri contingit, statuta percussio.



## Delicera V.



*Vaccinium* ὁ ἀκινθός, crescit enim in pratis vñā cum saryrio, sed odoratissimum stotem gerit: propemodum similem violæ altili, sed vehementiorem: & colore ac foliorum ordine differt à saryrio, estque radice bulbosa, folia bulbo similia: dodrantalem caulē, herbacci coloris: comam procumbentem, florum purpureorū plenam, incuruam: quæ omnino aliud est à nostra vulgari gyropblea.

Dicitur o. libro quarto, capit. quinquagesimo tertio.

*Valeriana* φού, quod Nardus sylvestris aliquibus est, folio olusatri, aut elaphoboli circaule cubitali, aut altiore, leui, cauo, molli, in purpuram vergente, geniculis, intercepto, floribus ex albicante purpureis: radice ad minoris digiti crassitudinem, in iunci odorati formam, cum quadam odoris grauitate, & suauitate nardum æmulantibus. Excalcit radix, vrinamque mouet, si sicca potui detur. Diosc. lib. i. cap. x. Quæ describenda relinquuntur, repetes in dist. Phu.

*Valnoli*, leguminum in siliquis follioli, præsertim fabarum, sunt appellati, quasi valinoli, quia vallo grana excutiantur.

*Vboluma* ὁ ὕδατος, arbor in Libya familiaris, sic gentilitio nomine ab incolis dicta, ἡλατὸς ὡσπερ ὕδατος Græcis, quasi Vuolea dixeris, id est, vitis oleam habens insertam, non vvas modò, sed & oliuas quoque pariens. Marius Maximus eius fructu degustato, negauit vnquam se quicquā comedis, quod magis oleam, vnamque resperet: tam exaithē vtriusque saporem simul linguæ representari, hæc Plinius.

*Veneris* labrum ἡ δελφινός, officinis virga pastoria, carduus a liouo fullonius, in lanis pectendis, pannisque idoneus: & clysmis ipsius decoctum emolliens, & temperamentum sustinens. Plura in dist. Diptacus.

*Veneris* λουγχιτρίς, ἡ ἀκρότης, id est, acorus palustris Apuleio: dicta radix, quod ad venerem edentes condita melle, vel facere, stimulet, mouetque vrinas, & stomachum roborat. Vide dist. Acorus, & Lonchitis.

*Veneris* pectē, radice candida, cauliculis semipedalibus, foliis pastinacæ, sed tenuioribus, flore albo, exili, dependentibus summatis compluribus rostellis in mucronē turbinatis, & pectinatim serie quadam inter se disiunctis. In maceritiis, & inter segetes præcipua nascitur: decocta cum suauitate quadam estur, & vesicam ab vrina exonerat. Quære dist. Pecten Veneris.

*Veneris* vmbilicus κοτυληδών, Largo campanella descripta est, sed proprium nomen ab officinis retinuit. Primæ speciei plantæ huius frequenti vñā marem concipit: quemadmodum secundæ speciei sceminam, Hippocrates scriptum reliquit. quod an verum sit, cum Veneris vmbilicum genere varium esse adhuc non legi, viderit Simplicius. Scholiastes. Reliquum habes in dist. Cotyledon.

*Vepres* ἀκαθαί, βαμνοί, ἀκαθώδεις, vel sunt aculeati frutices, vel spinis interdū vidui, de quibus maturi carpuntur fructus, medicamentis idonei. Rura spinas, & Rōsas peculiariter nominant. Vide dist. Sentes.

*Veratrum* vtrunque, album scilicet, & nigrum ἑλλαβόρος: nigrum tamen à Melampode pasture inuentore, Melampodium postea nomen retinuit. De vtroque sanè copiosius suo loco diximus.

*Verbascum* φλομὸς μέλας, καὶ λευκός, ἢ ὁ ῥ' ὕν, καὶ θήλυς, id est, alterū folio albò, alterum nigro. Candidum rursus in marem & sceminam secernitur. Est & sylvestre verbascum: officinis Tapsus barbatus. Diosc. lib. iiii. cap. lxxxix.

*Verbasculum* φλόμυρ, folio rotundo est, minimè hirsuto, subpalescente: officinis primula Veris appellatur. Alterū verbasculum est, cuius folium nigrescat inutile. Verbascū lychnitis λυχνίτης, καὶ θ' ὕδατος, foliis ternis aut quaternis, aut etiam plusculis, crassis, pinguibus, plumosis, ad lumina lucernarum vtilibus.

Vacuus

*Vacuatio*, est qua materia educitur, retrahitur, deriuatur: vel qua simul retrahitur, ac deriuatur. Vacuatio simplex, quæ fit incisa parte affecta, inueteratis inflammationibus, in quibus remissus dolor est, & fluxio resistit. Lege Acaciam super lib. ij. Gal. ad Glauconem.

*Vacuum*, est locus non repletus corpore, natus tamen repleri: cùm enim inter superficies latera non interiacet corpus quando interiacere natum esset, ea superficies vacua diceretur.

*Vari faciei* ἰ' ὀφθί, sunt tumores duri in facie & exigui, sic dicti, quod instar simi faciem conspurcent, ac maculis sordent. Est & Lentigo, siue lenticula in facie, Græcis φακὶς dicta, quæ faciei macula est nigra, lentis similitudinem obtinens. hanc quoque sequitur ἑ' φαλλίς, id est, aspredo, & nigrities in facie ex solis ardore prognata.

*Variole*, dicuntur latæ & humiliores papulæ à frigidityte humoris crassioris quæ oriuntur, neque pruritus concitant. Hippocrates ἑ' χθιματὶ appellauit: Plinius vero papulas, & piruitæ eruptiones, de quibus fusius in dict. Papulæ.

*Varix* χυρὸς σ, χαλὶ ἰ' ἔλ, tumor est seu dilatio venæ aliquando in temporibus, aliquando in ima ventris parte sub vmbilico: nonnunquam etiam circa testes, sed maxime crura consistens.

*Vasa seminaria*, sunt geminæ venæ, & totidem arteriæ, singulæ vtraque parte magnæ venæ, magnæque arteriæ propagines, per ilia deorsum in testes sanguinem deferentes: qui Græcis δίδυμοι, quod gemini sint, appellantur. Pars quæ capiti testiculorū incumbit ἑ' πιδιδύμης habet nomen. Epididymi sunt vasa quæ sanguinem & spiritum testibus deferunt, anfractuosis circunvolutionibus ad hærentia in vnum meatum seminarium longissimum desinunt, qui geniturâ ex Epididymide transsumens ad pendendi exortum effert, varicosum prorsus iuxta vesicæ ceruicem: unde Græcis τὸ δ' παρὰ τῆς χυρὸς σ, τῶν δῖς, dicitur.

*Vena*, est vas sanguinis & ex sanguine temperati spiritus naturalis, neruis cõstat humida & calida, minimòque sensu prædita.

*Vena caua* καὶ δὲ, ex gibba iecinoris parte omnium totius corporis venarum prodit maxima, quam ob magnitudinem cauam medici nominarunt: per hanc sanguis in instrumentis iecinoris generatus, nutriendi causa per vniuersum corpus diltribuitur.

*Vena porta*, siue ramalis, id est, manus iecinoris: hæc ex ventriculo & intestinis per varias venulas chylum transsumit, & in splenem melancholicum succum expurgat. Venæ namque emulgentes seu serosæ in Renum descriptione relatæ sunt: vti in dict. Cordis intus sinus, quænam sit Vena arteriosa, explicauimus.

*Venæ sectio* duplex est, vna quæ κατὰ ἰ' ἔλ, hoc est, secundum rectum, aut è directo fit altera, quæ in opposito similiter fit: diligenter animaduertendum ne temerè in iis deligendis aberremus, vt plerique nostri seculi faciunt.

*Venæ sectio altera* est, qua principio consideratur plenitudinis tum quantitas, tum qualitas, potissimum eius quæ ad vasa nominatur, conuenientissimum remedium. Repete dict. Plenitudo.

*Venæ sectio alia* est, quæ prodest minime non solum cùm adest plenitudo, siue ea vt ad vires sit, siue ad vasorum humores continentium capacitatem, verum etiam citra plenitudinem initio inflammationis, quæ aut propter istum, aut propter dolorè, aut partium debilitatem promouet. Sed vena quæ sit incidenda in sanguine mittendo vnicè considerandum, quoniam plerumque venæ sectio temerè adhibetur. Celsus lib. suæ Artis iij.

*Venæ tres* sunt in cubito, ex quibus sanguis emittitur, interior nimirum, quæ iecoraria, & lienaris, axillarisque, vulgus medicorum basilicam vocat: iis secanda erit quibus partes collo inferiores patinuntur. Exterior verò, quæ humoralem, & cephalicam vocat, iis incidenda venit quibus partes supra ceruicem, vt est facies, aut caput laborans. Media, quæ nomine alio communis, nigra, funis brachij, & mediana vocata est, cum secunda erit, vbi vena parti patienti propria obscurior fuerit: nā ab vtrisque



que iam dictis venis deducitur. Cæterùm quemadmodum partes omnes prædictæ in cubito sc̃cta vena iuuantur, sic quæ iis inferiores, illis quæ per poplites, aut malleolos decurrunt, auxilium ferunt. Gale. in lib. de sanguinis missione, & sc̃ctione venæ auctor est.

*Venter* κοιλία, καὶ γαστήρ, post thoracem sequitur, & ab ipsius thoracis inferioris parte incipit, & ad pudenda vsque protenditur. Huius tegumentum, sicut reliquarum omnium partium corporis διρμια, id est, cutis appellatur. extima eius superficies summa cuticula vel ἑπίδερμις, dicitur.

*Ventris* deiectionio, est qua corpus à recrementis per inferna euacuatur, & in cacochymia, atque adeo vbi corpus vitiosis humoribus repletum fuerit, vsus erit: qua propter sanus, quandoquidem vitiosorum humorum abundantia minimè premuntur, medicamenta purgantia non sunt propinanda Hippo. Aphorif. lib. ij. a phorif. xxxvj. & lib. iij. aphorif. xvj. Gal. lib. xiiij. Methodi med. Item Locor. affect. lib. iij. cap. ix. Sic Gal. diligenter corporis per aluum curationem ex Hipp. monstrat, τὸ δὲ ἐπανδρῆν δυναμένοις τὸ κατὰ φύσιν ἀλλοίωσι, το μὲν παχὺ καὶ γλωκρὸν λεπτοῦντα, τὸ δὲ λεπτὸν παχύνοντα, hoc est, quod in naturalem statum redire potest, per cōtraria alterate oportet: crassum quidem & viscosum attenuando, tenue verò in crassando.

*Ventriculus* appetitui, & deglutioni ciborum velut instrumentum accommodatus, non dissimilis feruenti ollæ, dum chilum molitur, vnde & succus generatur ipsi iecinori, hinc sanguis deriuatur ad reliquas corporis partes. Cætera lecturus in dict. Stomachus.

*Ventriculi* fundus, Græcis πύθμη γαστρός, hoc est, ventris rarioris osculum inferius, quod cibo in ventre nondum oclusum est, concocto verò per se patescit: & vergit in latus dextrum sub iecinoris gibbarum altera.

*Ventriculi* seu oris stomachi imbecillitas, est quæ ex quacunque intemperie oboritur, nullis humoribus vitiatis. Oritur etiam ex humore in ipso sinu ventriculi contento, qui aut calfaciendi, aut perfrigerandi, aut humectandi, aut siccandi, aut etiam hora aliqua per coniugationem efficiendi naturam obtinet, vel in ipsas ventriculi tunicas imbibito & impaeto. Quære curationem apud Fuch. lib. iij. de Meden. morb. cap. j. Affectus præterea scribuntur à Gal. locor. Affect. lib. v. cap. v.

*Ventriculi* inflammatio, est quæ haud secus quàm in aliis corporis partibus fit, à cōfluxu sanguinis copiosi, & calidi: quam testantur dolo immensus, afsiduus, & qui nullis medicamentis ad motis mitigari potest, tumor, æstus qui tactu iudicari possit, febris, gra uitas, & nausea. Curatio. docet Fuch. lib. iij. de Meden. morb. cap. ij.

*Ventriculi* inflatio, est ex humoribus in ipso pituitosis, aut ex cibis in vapores per mediocrem caliditatem resolutis: perfecta enim frigidity hoc nomine, quod extenuare ac dissoluere non sit idonea, nullos flatus procreat. Vehemens caliditas discutendo flatus generationem impedit: mediocris verò non tantum perfectè. Stomachi affectus docet Gal. Locor. affect. lib. v. cap. v. & vj.

*Ventriculus* cordis dexter, qui nam sit, & vbi situs: similiter quoque ventriculi sinistri eiusdem cordis vbi positio: explanatum est in dict. Cordis intus.

*Venera* vrina, est cuius color ex puro albo atque nigro aqua ratibus confusus, natus est. Vrina hæc superficiem solum melancholicum humorem significat: idque si tenuis simul fuerit: versus verò crassitudinem tendens, multam frigiditatem. Mortificationem autem monstrat, cum à prauis coloribus ad peiores transmutatur. Vide qui sit Color Veneris.

*Veneris*, est cuius vsus aliquid erit, si moderata fuerit: corpus enim auctum, virile, & agile reddit, durum etiam corporis habitum emendat, mollit enim instrumenta, meatus dilata, atque à pituita expurgat: & quod ad animum pertinet, rationis vim impedit soluit, ingentes iras remittit: idcirco delirantibus, tristibus, melancholicis, homines odio habentibus, & iracundis, maximum præsidium est. Cæterum veneris immodicus vsus beneficiis superioribus contrarius occurrit. Hipp. Epidimia. lib. vj. Aëtius lib. iij. cap. viij. AEGyneta lib. j. cap. xxxv. Gal. Artis medi. cap. lxxxvij. Cælius lib. xiiij. cap. lxj. Lectio. antiq.

ni *Ventus*, est exhalatio calida sicca, lateraliter circa terram mora: cuius efficiēs causa Sol est, & Astra: materia verò exhalatio, quæ dum in sublime, partim Astrorū vi, partim natura tollitur, obstaculū inuenit mediā regionem aeris frigidam, & ab se repellentem calidum. Ideoque retruditur exhalatio, meatque in obliquum circa terram. Ventus distribuitur in Boream, Eurus, Austrum, & Zephyrum: atque horū in tres quilibet diuiditur, & duodecim numerantur.

*Ventorum* suauissimi Boreas, siue Aquilo, Subsolanus: pestiferi Austus, & Chorus: tonitruosi, & fulminosi Boreas, Circius, Chorus. Zephytus pruinas soluit, & frigus.

*Vermicularis*, id est, Semper viuum minus vulgare, duplex occurrit in petris & parietinis nascens, necnon scrobibus, & opacis: vnum cōstat cauliculis multis, tenuibus: exilibus foliis rotundis, crassis, pinguibus: & in caulis apice umbellam, in qua flos albus apparet. Est tota frigida facultatis herba. Alterum genus, Illecebram Apuleius vocat, pusillis, crassioribusque foliis, hirsutis, portulacæ proximis, in cuius umbella flos prodit luteus, vis ei excalectoria, acris, exulcerans: illata cum axungia strumas discutit. Diosc. lib. iiii. cap. lxxvij.

*Verbenaca* & verbenā *ῥιπιδίων ὑπτιος*. Est & verbenaca supina, Apuleio herbacea appellata *ἰσολότμη*, quæ Gesnero Cōsolida media videtur. Diosc. lib. iiii. c. l.

*Verticillum*, siue verucaria, *ἡ λιοπρόπιος*, & herba cæci, vt suspicatur Gesnerus, Apuleio Ranunculus est, qui officinis Apūtis effertur. habes dicit. Ranunculus.

*Vesicaria* siue halicabab *ἀλκαβάβος* Dioscoridi, officinis Alkekengi, medicis Solanum: cuius petes dicit.

*Verecundia*, est animalis facultas in primis quidem ad interiora morio, sed rursus affatim redit ad exteriora: quod si non redierit, iam non verecundia, sed timor scacciari debet. Quippe verecundia repente fit, animali facultate nihil mali sperante. Vide dicit. Animi perturbatio.

*Vergilæ* seu pleiades, sunt quæ in Tauri celestis Syderis dorso videtur apparere, quæ medio etiam Vere cū Sole oriuntur: ædem medio Autumno, cū Sol est in Scorpio, occidunt: hoc est, ab æquinoctio Autumnali diebus fere quinquaginta. Est enim Scorpis Tauro, in quo ipse sunt, ex aduerso locatus. Gal. super lib. j. Epidimias. Hipp. & super lib. j. ad Glauc. Gal. Acacia.

*Vertebra*, *σπονδοί*, καὶ *σπονδοί*, agricultori Columellæ inter conchas adnumeratur: constat autem duabus Conchis, atque ex posteriori parte vertebris quibusdam continetur, vnde nomen inuenit. Malsiliensibus Hostia est.

*Vertebra* *σπονδύλα*, quæ spinam dorsii constituunt, quatuor & viginti numerantur: harum contextus omnis, in ceruicem, dorsum, lumbos, & sacrum os diuiditur: nam colli sunt septem, metaphteni duodecim costas duodecim excipientes: lumborū sunt quinque, quibus subiacent os sacrum, & os pubis.

*Verruca* pensilis *ἡ χροκορδύς*, est quæ angustiorum loci basim obtinet, & formicæ contraria, vt chordæ nexu suspensa esse videatur. Vide in dicit. Formica.

*Vertigo* *σχορδύς*, est vbi obtenebrationes heberudinesque oculis obuersiones, & omnia circumagi & rotari videtur. Oritur interdum cerebro primogenia passione laborante: interdum cū ori ventriculi consentit: cerebrum autem patitur, cū crassus ac lentus humor ipsum occupat, a quo vaporosus spiritus ab imbecilli calore resolutus, in cerebri partibus inordinatè mouetur. Interdum etiam ventriculi ori consentit Gale. Locorum affect. lib. iij. cap. viij.

*Vespertilio* *ἡ νυκτερίς*, medix cuiusdam speciei inter auem & foricem est, vt Sorex latus dici possit: Ex volueribus solus vespertilio parit, & lac suis ex matris duabus præbet. Dicitur autem Vespertilio, quod vespere se ad volandum proferat: aliqui medicorum ad rei medendæ vsum vtuntur.

*Vesica* fellis *κυστὶς χοληδοχῆ*, est quæ procedit ex maiore iecoris fibra parte caui canalibus exiguis, qui bilem in vesicam sibi appendulam deriuat, qui in principium ieiuni intestini pertinet, paulò infra pylorū. Sunt hi meatus bilis in iecinore priores, quàm venæ alimentum excipientes, vt commodò ipsorum situ, purgatum iam sanguinem caua vena excipiat. Sed plura in dicit. Iecur.

*Vesica* vrinae  $\chi\upsilon\tau\iota's$ , receptaculum lotij per venas albas  $\delta' \upsilon\pi\eta\tau\eta\pi\alpha\varsigma$  dictas, ea parte vrinam recipit, qua duplici membrana testā est: & enim in hanc renes veluti in lagenam reponunt, idque per meatus  $\delta' \upsilon\pi\eta\tau\eta\pi\alpha\varsigma$ . Ceruix ipsius prope meatum seminarium est, qui ex epidimide in pudendum prodit.

*Vesicae* vlcus, & eius ceruicis, est aut propter abscessum, aut ob tuberculum quod processit, aut ex ruptura, aut ob fluxionis erosionem, aut aliam similem causam: quorum dolor acutus vesicæ omni quidem tempore comitatur, maximè verò tempore mictionis, & excretionis puris. Fuch. lib. iij. de Med. morb. cap. x.

*Vesicae* inflammatio, est morborum qui circa ipsam oboriuntur, grauitissimus: & maximè mortalis inflammatio existit: quòd febris acuta infestet, & vigiliz, & delirium, & vomitio biliosa pura sine vrinae egestione. Tales affectus tractat Gal. locorum affect. lib. vi. cap. iiii.

*Vesicae* calculus, generatur in vesica pueris frequentius, quàm ætate prouectis, cōuertiturque quando copiosus redundat in grandes lapides. Voraces enim sunt pueri, & perpetui motus, & cibis vtunque oblati & nocinis vtuntur: & neque horam capiē di cibum obseruant, quòd digestionis perturbatio est.

*Vettonica* coronaria,  $\beta\epsilon\tau\tau\omicron\iota\kappa\eta$   $\eta\epsilon\iota\phi\alpha\tau\iota\kappa\eta$ ,  $\kappa\alpha\iota\beta\epsilon\tau\tau\omicron\iota\kappa\eta$ , seu vettonicum altile, flores caryophyllos, vulgò gyrophleas, siue Tunicis dictos, ex Ruell. putat Gesnerus. Est denique Largo Vettonica herba, quæ verbenaca supina, siue herba sacra existimata est quam Sylius cestrum explicauit. Item alia est, quæ nomine alio Vibones  $\alpha\iota\upsilon\beta\iota\varsigma$   $\beta\epsilon\tau\tau\omicron\iota\kappa\eta$ , id est, flos Britannicæ. Occurrit & erraticæ Vettonica Myropolis Tunicis nominata, cuius apud Methodicos aucthores in re medica frequens legitur. Quære dict. Britannica.

*Viburnum*  $\alpha\iota\mu\pi\epsilon\lambda\omicron\varsigma$   $\mu\epsilon\lambda\alpha\iota\tau\alpha$ , vulgò Viorna, strutex lentus, & ad vinciendo rantes aptus: cuius membrana interior caustica virtute pollet. Chirurgis vulgar. Flammula est. Vitis nigra videtur.

*Vigilia*, est à principe parte animæ ad membra omnia corporis intentio & applicatio: cui somnus à naturalis animæ inclinatione contrarius est.

*Vigiliae* mentis, à morum perturbationibus, & lassitudine à laboribus, teste Terentio in Eunuchis, vix tollerabiles, superueniunt: quare earum ratio habēda est, vnicūque cauendum, ne immodicæ sint. Si enim modum excesserint, cerebri bonam temperaturam corrumpunt, sensus debilitant, virtutem deniciunt, & cruditatem efficiunt. danda ergo opera est, vt neque somnus, neque vigiliz, modum excedant. Hipp. Aphor. lib. ii. aph. iij. Somnus æque vigiliz, vtraque si modum excesserint, malum.

*Vicia*  $\alpha\iota\phi\alpha\kappa\eta$ , agrestis, & domesticum leguminis genus est, atque à vinciendo nomen retinuit: nam capreolis suis proxima quæque implicat. Est quæ lētis agrestis species, à nominis deductione, non verò vicia.

*Vinea* vrina, non vinacea, vt quibusdam placet, accepit nomen à vino nigriori, quàm rubro, cuiusque color existit iecinoris: quæ pascē vrina videtur. Vineæ autem vrina sanguineum humorem assati, atque vel in rufam, vel in nigrā bilem transmutari, denotat. Interdum etiam ex longo itinere, exercitio, & labore talis vrina apparere potest.

*Vinago*  $\delta\omicron\upsilon\tau\iota\varsigma$ , auis est ex genere columborum, de qua iam dictum in Palumbo. Vinaginem autem vel  $\delta\iota\alpha\delta\alpha$  arbitrantur dictam, quòd vindemiæ tēpore appareat: sed vt suspicandum magis est, quòd ex vuis racemorum liquorem iam matutū sugat, vel sorbeat, aut vuis ipsas depascatur. hæc auis hyeme estur cum Brasica.

*Vinum* protropium  $\pi\rho\tau\rho\pi\omicron\upsilon\mu$ , id est, quod ex vuis defluit, ante quàm calcenitur. sed ex musto cocto fit Sapa Gal. lib. vij. Composi. pharmac. auctore. Facultatum vini differentiz sunt permultæ: à substantia tenui, crassa, colore albo, fuluo, rubro, nigro, odore imbecillo, valenti, sapore vario, sumendæ. Gal. de Sanitate tuenda libro quarto, & quinto, & Methodi med. libro septimo, & duodecimo. Diosc. de Natura vini, & eius genere lib. v. cap. v.

*Vinum* generosum, nona parte oleo grauius est: nam integram ipsius mensuram

cum dodrante continet.

*Vmbra* ὁ σκιά. Græcis, piscis qui nomen Gallis *Vmbra* quoque dici solet, in deliciis quàm quiuis saxatiliū piscis laudatus, vt secundas apud Gallos obtineat.

*Virga* pastoris διστάκος, veneris labrum, carduus fullonius à pectendis eius papolanis hoc quoque retinuit nomen. Quæte dicit Dipsacus, & veneris labrum.

*Vinum* medicatum, est quod ex simplicium medicamentorum facultate fit, quale est vinum absinthites, ex salvia, hyssopo, mentha, rosmarino, & huiusmodi: quorū apud Catonem, Dioscoridem, Columellam, Plinium, Galenū, & cæteros posteriores.

*Vindicta* Romanis ἡ πικρὴ δὲ Græcis, trifolium odoratum dicitur: nascitur in opacis, saxosis: folia habens Seridis, caulem tricubicum, & in eo florem grandem, purpureum, rotundum, semine minuto ad imaginem cnici, radice semipedali, austera gustanti. Vide Medion.

*Viola* alba λευκοίον Dioscoridis, sub quo nomine etiam lutea, & cærulea, nigraque comprehenduntur. *viola* alba Theoph. radice bulbosa est, & prima florum Vernunciat, vt recitat Manardus lib. x. Epistola iiii.

*Viola* purpurea siue nigra ἡ σκία, est hæc *viola* martis, vel matronalisque aurem Græcis λίσχια dicuntur, cum his confundi minimè videntur. Dioscorid. libro iiii. cap. xi.

*Viola* autumnalis ἡ ὁπώρα, vt vertit Gesnerus, Calabianas Ruellius, Ancholias vulgus, officinis Angelica herba vocata est. Minuto est folio violæ albæ non dissimili, in totum sine odore, calathi similitudine, sed colore cæruleo, purpureoque hæc Ruellius.

*Viola* flammea φλογὶς, καὶ φλογίον, vulgo gyrophlea Arpinatum, quam Scopam regiam existimat Gesnerus: ramuli, & folia sunt odorata, flos inodorus, qui & plurimum durat: cerebrum olfactu, & mentem corripit. De qua leges plura apud Ruel.

*Vires*, sunt quæ per se non apparent, sed à suis producuntur actionibus: animalis quidem à monendo, sentiendo, apprehendendo, intelligendo, & memorando: vitalis ab arteriarum pulsatione: naturalis à concoctione: quam rursus excrementa patefaciunt. Explanator est Acaxia ad Glauc. lib. j. Gal.

*Vrina* vrina, est quæ colorem brassicæ, aut graminis candidioris, aut Smaragdi lapidis repræsentat. hæc vrina bilis pessimæ excessum, exauget quantitate, & qualitate, portenditque si perseverarit, sitisque assidua, & ætus adfuerint, metus haud exiguus est, ne conuulsio à siccitate ægrum corripiat.

*Viscum* ἡ ξύς, de planta & de eius granis intelligitur glutine expresso. Miratur Brasauolus viscum super falice proveniri: forsitan maiore quoque moueretur admiratione, super corylo, ligustro, & vite vinifera, si tanta naturæ portenta animaduertisset, quæ ego in Groleæ montibus.

*Visus* indigentia ἡ πρὸς ὁπώρας, est quando meatus à cerebro in oculum descendens, ex capitis ictu, concussione, casu, vel quopiam ab alto, disruptus est.

*Visus* netui obstructio ἀμυρωσις, est in qua omnimoda vel maxima ex parte visus interceptio, absque vlla manifesta causa circa oculum apparente, accidit: quamquam pura & incolumis vndique incolumis pupilla circumspicitur.

*Visus* netui obstructio alia τὴν ῥυμπτωσις, est vbi in meatus qui in oculum videndi facultatem affert, humor aliquis aperto vel rupto vase incidit, eundemque obturata, coincidentiaque fit huic σύμπτωσις propinqua est passio, cum nimirum meatus ille ex tæbe, vel ex imbecillitate fit arctior, conciditque: & adnatam & corneam membranas simul hæc infestant passiones.

*Vitis* alba ampeloleuce ἡ μετὰ λευκὴν, Bryonia est: alijs flamma à vi baccarum rubentium eius vrente, appellatur. Dicitur & psilothrum, quod ex eius acinis coria depilentur.

*Vitis* nigra, ἡ μετὰ ἰσὺς μελαινὰν, Viburnum, cuius fructus, & radices nigrescunt. Neque alia re, inquit Scholias, differt à vite alba, nisi quod hæc sit radice alba, & fructu rubente: illa radice, & fructu nigris sit.

*Vite* xgroantis seu mortis cognitio, est in specie morbi, magnitudine, more, & eiusdem motu. Specie quidem ex iis symptomatibus quæ propriam ipsius naturam complent, cognoscēs. Magnitudinis verò, ex eorundem symptomatum quantitate, ac vehementia. More autem, ex superuenientibus ei symptomatibus. Motu, ex tempore partium accessionis: quibus prædictis adiungenda est quoque temporis, anni, regionis, ætatis, & simulum, consideratio. Galenus de Crisibus libro tertio, capit. quarto.

*Vitalis* facultas, est quæ ex corde per arterias, seu canales quosdam, vitam vniuerso corpori imparetur: vocatur & irascibilis & animosa facultas, Græcis *θύμο ἰδύς*. Vnde deliquet cor insiti caloris esse veluti quemdam fontem.

*Vitalis* spiritus, est qui in corde continetur, & per arterias in corporis partes deferretur: cognati ac insiti nobis caloris causa existens. Generatur ex inspiratione, & sanguinis exhalatione. Hippocrates in libro de Alimentis *ἀρχὴ τῶν φύσιν τῶν ζώων* *πρῶτος, ὁ ἀπὸ τοῦ στόματος, καὶ ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ, καὶ ἀπὸ τοῦ ὅσπου, καὶ ἀπὸ τοῦ ὅσπου, καὶ ἀπὸ τοῦ ὅσπου*. hoc est, principium alimentii spiritus, nares, os, arteria, pulmo, & reliqua transpiratio. Cætera in dictione Spiritus.

*Vitex* ἀγρός, vulgus officinarum Agnum castum, cum nomen utrunque idem significet, vocant. duplex inuenitur, alter a borefcit, flore ex purpurea candido: minor verò ramulosus est, & flore magis purpureo. Quæ sequuntur, vide in dictio. Agnus castus.

*Vitis* vrbana, vinifera, varij generis vndique nascitur, ἀμπέλως ἡμετέρας, ἢ οἰκίας, καὶ ὁ ποσειδών: & locus in quo plantatur, vinetum est. Quæ illachrimar ex vite aqua post amputationem, prodest oculorum obscuritati, faciei quoque maculas delet: & serpigines sanat.

*Vitiligo* alba λεύκη, cutis vitium aliud est, cuius cutis color in candidius nescio quid mutatur, à viscosa, glutinosâque pituita contrahitur. Hæc passio nonnunquam tam altè in corpus penetrando radices agit, vt & pili in ea cani, & lanugini similes enascantur.

*Vitiliginis* ἀλφός, species altera est, cuius generatio cum Leuce modi eiusdem est, non tamen omnino in profundo in ea caro patitur, sed summa tantum cutis, & veluti squamulæ quædam vitilignes ipsæ infixæ adhærent: quæ quidem duplices sunt, albæ & nigre: albæ ex pituita, atque verò ex melancholico humore oriuntur. Vnde etiâ perspicuū sit Album esse duplicem, vnum album, alterū nigrū, quodd cutis colorem immutat. Morphæzā malū hoc barbari nomināt. Vide Aetiū Ser. m. xiiij. cap. cxxxij.

*Vitis* insana appellatur, quæ ad finem vsque nariuitatem fructus, perducit: insana quidem Phœnus rriseram vocat, quoniam in ea alia maturescit, alia floret.

*Vitis* sylvestris ἀμπέλως ἀγρία, soliis solani hortensis est.

*Vitis* alba ἀμπέλως λευκή. Brionia est.

*Vitis* nigra ἀμπέλως μέλαινα, Viburnum est.

*Vitis* sylvestris ὁ μῆζις, ὁ καρπὸς τῆς ἀμπέλους ἀγρίας ὁ ποσειδών. Est præterea vitis agrestis alia facultate quidem caustica.

*Vitis* nomen, à regionibus in quibus vitis luxuriat, sortita est: ideoque innumera apud veteres agriculturæ scriptores legitur, sibi quoque rum vini, tum sapore vario dissimilis, vt quæ Lesbica, quæ Rhodia, quæ Romana, Allobrogea, Maluarica, Celtica, in totum quæ vini ob loci saporem, & regionis, terræque differentiam, in se diserepant. Adde etiam solius regionis multorum locorum vicinitatem haud sibi facultates vinorum respondere: sed multum bibenti palato vel displicere, vel etiam placere.

*Viticula* κλυσματίς, vitis germen clauiculis se ad proxima iretinentis: vsurpatur de surculis aliarum etiam plantarum, quæ flexiles in longum se protendunt reptantes, vt in vitibus, probo, viciâque capreoli innascuntur, qui pro viticulo vsurpantur. Vitriolum Romanum Manardo libr. viij. Epistola prima, Chalcitis est: Chalcanthum namque, vt Gal. docet post longum tempus Chalciris efficitur. Iaque quotidie depræhendimus partem anteriorem Chalcanthi, id est, Vitrioli, dealbescere, & in crassitudi-

nem albescentem transire, hoc est, Chalcitis ex Chalcantho facta: quam vulgus officinarum Cupam-rosam denominat. Quare dicitur Chalcitis.

*Vini radix*  $\mu\acute{o}\sigma\chi\iota\sigma\mu\alpha$ , est planta quae cum radice seritur, quasi viuam radicem habens: intelligiturque de omni planta, cuius radix, licet & stipites tamen, nunquā siue nullo tempore moritur.

*Vlcus* malignum καὶ κοῖθῆ, in vniuersum inueterata, & antiqua maligna, & gerimēque cicatricem ducentia vlcera dicantur. Neque iisdem aliena θέρια δὴ vlcera sic dicta, quae asperius sēuunt.

*Vlcus* omne, est quod pro humoris qualitate variatur: vt Herpes miliaris ex dilutiore humore excedens crassiore sit bile. Cācer vlceratus, phagedæna, omniāque cacothē vlcera, ex crasso, feruidōque humore sūt. Gal. lib. ij. ad Glau. cum explanatione Acakiz.

*Vlcera* sinuosa ὁ πρὸς μὲν ἑλκῶ, sunt quae pluribus, transuersisq; in iteribus quasi canalibus per latitudinem putrescunt: ob id cuniculosa etiam vlcera appellari possunt, seu cauernosa.

*Vlula* ὁ ἀργαλιῶς avis, noctu pascitur, die verō nō apparet: hæc ab vlulādo, lupoꝝ more, vlula denominata est, nō experitur in re medica, quia nullius vsus.

*Vlmus* τελευά, arbor nocissima, sed quae in ea vires omnibus nō cognitz: eius folia, cortex, & rami vim habet spissandi folia trita ex aceto ad lepras efficaciter illinuntur, & vulnera glutinans, vt Tilix cortex. humor in folliculis prima germinis eruptione, cuti illius nitore inducit, facieq; splendidiorē præstat: cum terebinthina liquida, & oleo miscetur liquor ille siue humor, quibusuis arthriticis, & podagricis vtilissimus: nec medicamentum est quod non superet.

*Plurimum* α' φροσκόροδον, Columellæ genus Allij est: cuius vide diuersitatem in dict. Allium.

*Viopbonum* ixiaz, ο' υλοπόρον ἱζιάς, genus Chamæleonis venenati carduorū est, quasi viscarius dicatur: nā statim anni temporibus viscum collachrimat, effunditque veneno aptum.

*Vmbella* σκιάδιον, est floris, seminisve pedamentum, in plures digestum lōgiore pediculos, quasi simul ex fastigio eodem orti, in latius continuō radiantur, singulique florem vel semē sustinent in orbē circumactū. Trāslatio vocis, inquit Gesnerus, ducta est à muliebri umbella, qua vulvū à Sole vindicāt mulieres: est quoq; muscariū dictū.

*Vmbilicus* terra, κύκλωτρος, officinis rapum terræ, & Cyclamen: Arabibus Artanita vulgō Panis porcinus: de quo plura in dict. Cyclaminus.

*Vmbilicus* ο' μφελός, id est, quod in pomis vel prominet, vel cōditur. Est & Vmbilicus veneris κοτυλιδον, de quo voce versā paulō supra in dict. Veneris vmbilicus retulimus.

*Vmbilicus* ο' μφελός, ventris mediij concavum in animante est, cuius medium α' προμφελόν, nominatur: circumiecta vmbilico cutis γράμια, id est, anus appellatur, quoniam corrugata senectutis indicium est.

*Vnedo* ο' υνιδόν, Epimelidis fructus est, diuersus à memecylo, Arbuti fructu: sicut ex Cornario retulit Gesnerus. Quare dicitur Epimelis.

*Vncia*, est asis pars duodecima medicorū vsu, quae octo drachmas constituit: drachma scrupulos tres: scrupulus verō primū ponderis elementum, γράμμα appellatur: habet obolos duos. Obolus pender siliquis, hoc est, κραινα, tres: Siliquæ grana sex, scrupulum pendent: siliquæ verō granum vnum, leatis sex seminibus pondere respondet: quæ si sexies sumpseris, prodibunt in vniuersum triginta sex, quæ scrupulum constituent. Quæ cuncta suo loco distributa reperiuntur.

*Vnguenta*, sunt quæ ex odora mentis, oleis, speciebus quibuscūque, adipe, butyro, muciditate, gūmi, & cera pro arbitrio componentis, fiunt. Gal. lib. ij. Simpl. facultat. cap. vltim. De Compos. medic. secundum genera, & secundum locos. Actuarii libr. v. de Compos. medic. Fuch. lib. iij. cap. j. post Mesuem, & Nicolaum restitutos.

*Vnguis*, est articularū in suprema parte extremitatis: siccus & frigidus, ex osse & cartillagine concretus natura, atque sensus expertus, vt pili incrementum habens.

*Vnguis*

*Vnguis* seu vngula *ὀνυχίον*, nervosa adnatæ membranæ eminentia, quæ ab angulo maiori quidem orta, ad coronam vsque, seu irim oculi, progreditur: quæ quando augeatur, pupillam etiam obtegit.

*Vnguis* ex pure sub cornea membrana *πυδός, καὶ ὑποπίλος, καὶ ὄνυξ*, fit quando pus sub cornea nunc alciùs, nunc in summa superficie colligitur, vnguis humani specie: & sanies in Siphac à Barbaris dicitur.

*Vnguis* piscis, ab articulari figura etiam digitus appellatus: Est quoque vngis *ὄνυξ*, præciosus lapis, qui inter gemmas admiscetur. Quære dict. Onyx.

*Vnio* antiquis scriptoribus Cæpa erat, quæ à Gallis hætenus nomen *Onghion* retinuit: de quo bulbo plura in dict. Cæpa scripsimus.

*Vniones* seu Margaritæ, quas vulgus Perlas vocat, velluntur ex quodam Concharum genere lævi: minimos verò ex Mytilorū conchis extrahi. Vide dict. Margaritæ.

*Volubilis*, *κυύσσα, πέλος*, Cymbalaris, & campanella, quam, ut hanc & umbilicum veneris Largus vocat isto nomine: officinis Corrigiola. Dicitur autem volubilis, quòd se sepibus, plantis grandioribus inuoluat. eadem quoque quæ Cōuoluulus, ut suo loco scriptum reperies.

*Vomitur*, est tertium genus eorum quæ corpus nostrum euacuant, ex quo natura haud exiguum consequitur commodum. qui enim frequenter vomunt, neque assidue, magna ex parte semper sani esse consueverunt: nec enim bilem duntaxat, sed & pituitam vomitus educit, ut subinde ventriculus, & caput à malis humoribus non parum subleuentur. Hipp. de Ratione victus. & lib. Aphor. iiii. part. vi.

*Vomitur* notæ, sunt cordis morsus simul cum capitis dolore, vertigines, atque oculorum obtenebrationes, inferioris labri agitatio, plurimæ ac tenuis salinæ defluxus, & nausea. Hæc verò omnia accidunt, cum biliosus, & mordax humor ventre: & stomacho fuerit collectus.

*Vomitum* quæ eliciunt triplex medicamentorum ordo est, quædam enim leuiter inter simplicia, ut aqua calida, hordei decoctum primum & tepens, ficuum recentium multa comestio, & oleum demissum in guttur. Inter cōposita, Sirupus acidus, oximel, & hydromel, theriaca, & hierapicra. Alia mediocriter, ut anethi flos & semen, atriplicis, rapæ, & erucæ semen: raphani radix & semen: vehementer autem helleborus, agaricus, & syluestris cucumeris radix.

*Volubilis* *ὀλκός*, passio est intestinorum tenuium, grauissimos & letales dolores inferens. Contrahitur id vitij continua ciborum corruptione & cruditate, maximè autem à pinguioribus carnibus: oboritur etiam ex plagis, ac ictibus quibusdam, iis locis ubi tenuia intestina sita sunt, factis. Petes curationem ex Fuch. de Meden. mor. lib. iij. cap. xij.

*Vox*, est quæ fit vi ipsius principatus extensi, & simul extendentis spiritum per fauces & guttur, vsque ad pulmonem, & linguam, si vicinum aëtem reuerberans.

*Præputia* *ὁ ἐπὶ πρῶτης*, a vis cristis è capite exeuntibus galeata, accepitque sibi nomen à sœtore. Nam nidum suum hominis sterquilinio, luti loco illinit, ne homines ad pullos suos accedant. eius caro repudiata in cibis est, atque ob id tota negligitur: ad quos igitur usus utilis, nescio.

*Precolaris* *ἐλ' ἄλκω*, helxine, & vulgari nomine Parietaria dicta: quòd vtcei in ea extergeatur. Quidam, ut refert Scholiastes, nomen deduci *ἐπὶ τοῦ ἐλ' ἄλκω*, eo quòd asperitate sua tenaci nexu vestes, quibus hæserit, ad se trahat: quanquam aliud vocis huius etymon in voce Cissampelos scriptum legitur.

*Vetere* *δυσπτερὰ*, meatus quidam sunt urinæ à sanguine secretæ ad vesicam in renibus deferentes. Feruntur hi meatus urinarij ex renibus singuli, albicantes, validi, substantiæ vesicæ similes, anfractuosi circa vesicæ, cui inferuntur, initium. Sunt iterum venæ emulgentes hoc nomine dictæ, ex ambabus venis maioribus, toridèmq; arteriis duabus maioribus, in utrumque renem sanguinis serum deferentes. De quibus copiosius in Institutio. Anatom. Guinterius libro primo.



*Vreticum* seu diureticum, id est, urinas mouēs, meliores quidem eccatharticum, plurimas verò acrius, calidius, siccius medicamentum: vt semen apij, petroelinij, dāuci feniculi: & quæ lac augent, & menses cient. hæc Gal.

*Vredo* ἔκυστος, in vitibus carbunculus: in frugibus rubigo, frigoris causa tantum nascitur, aut ob rorem inustum, Sole acri vehementique. Vide Rubigo.

*Vrtica* κινδὺς, ἀ' καλὶ φν, herba ab vrendo dicta est: cuius genera duo habentur: syluestre asperum, latioribus, nigrioribusque foliis: semine lini, sed minore: alterum, folio mitiore, minuto semine. sed primum genus Vrtica Græca est, & caulica vi posset, vt virus aliquid percipiat. Est denique vrtica iners γαίλω ψēs, Lamium Latinis, vulgò Vrtica mortua.

*Vrtica* ἡ ἀκαλὸ φν, à Plinio numeratur inter ζώοντα, id est, quæ nec animalium, nec fruticum, sed ex utroque temperatam naturam habeat. Totus carncus hic piscis est, nullaque testa clauditur: tactuseius, vt terrenæ vrticæ, dolorem infert. Ligustici maris, Malsilioricique incolæ adhuc Vrticam piscem hunc vocant. hæc Scholiasies.

*Vua* φαρυλὶ, præcipuè in vite dicitur ab vuido, id est liquore contento. Est quoque vua passa, quæ Græcis φαρὶς ἀ' φαρὶς, & officinis nostris passula. Est item vua duracina, quæ acinos producit: & pensilis vua, quæ ad diuturnitatem suspenditur. Omnium quidem optima, est vua passa, ex Corintho ad nos allata, & ægrotis, valitudinarisquæ valde petita.

*Vua* δæmonum σφαγνός σφύον, idem est quod penis in ferro: de qua re in Pene retigimus. Vua taminia subsequitur, ἀ' μπελός μιλῶνα, id est, vitis nigra: de qua paulò suprà dictum fuit. Largus animeam vnam nominat, ruberrimam & in vepribus nascentem: cuius dictio Staphis agria.

*Vrina* ὑρὸς, est excrementum sanguinis in caua vena per tenet, & vrinarios meatus in vesicam delatum: in cuius quidem inspectione quatuor considerata veniunt, consistentia scilicet, calor, quantitas, & contenta.

*Vrina* optima est quæ secundum omnia hominis temperati, & in substantia mediocris, ac quantitate passioni quæ assumpta est, respondeat colore subrufa, & subblaua, sedimento albo, leui, & æquali.

*Vrina* consistētia, est aut tenuis, aut crassa, aut mediocris existit. Vrina mediocris consistentiæ, optima omnium est quæ apparet: quæ autem hac ipsa tenuior, aut crassior est, imperfectam concoctionem significat. siquidem tenuis nondum in humorem consistit: crassior verò adhuc perturbata est.

*Vrina* tenuis, est quæ pura excernitur, ac posthac semper talis remanet: altera quidem tenuis mingitur, & paulò post conturbatur: sed vtraque cruda est, & coctione caret. Differunt autem, quòd prior naturam nondum cœpisse coctionem, atque adeo extremam cruditatem significat: posterior verò iam primum incœpisse: conturbatur enim eo quòd flatuosi cuiusdam spiritus copia, seorsò liquori permiscetur: quapropter prauā etiam existit, quoniam longiori tempore, & virtute forti ad coctionem indiget: sicut tractatum fuit in dictione Tenuis vrina, quam peres.

*Vrina* crassa ac perturbata vna est, quæ cum crassa mingitur, paulò post resider ac tenuatur, & parum inæqualis turbulentia superesse demonstrat: altera verò, vt minora est crassa, ita subinde talis permanet. Prima bona est: quoniam morbum concoquendum significat: altera verò deterior, nimirum quia perturbationem indigestibilem portendit. Repete dict. Crassa vrina.

*Vrina* ὑρὸς, est quæ prouocatione perficitur euacuatio, cuius quidem tum præcipuus est vsus, cum obstructio, vel humorum habundantia circa iecur, eius potissimum gibba, renes & vesicam fuerit: quia si in cauo fuerit obstructio, tunc per aluum potius purgatio prodest. Galenus Metho. meden. libro septimo, & vndecimo: & ad Glauc. lib. ij. cap. vij.

*Vrina* alba, completitur sub se has colorum species, nèpe crystallinam, niueam & eam

& eam quæ ut aqua est pura, & ob id aquosa vocatur.

*Vrina* albedinis intēſæ, eſt quæ cruditatis ſummæ index eſt: à ſumma tamen albedine parum recedunt lactea, glauca, & charopa vocatæ vrinæ: ſicut ſcriptum habes in diſtione Lactea vrina.

*Vrina* plurima, eſt quæ ſex propter cauſas proſiuit proportionē reſpondente iis quæ bibuntur, & eduntur. Prima, eſt quia iſ qui cibis multis humoribus, atque longiore potu, vino præſertim aquoſo, vius eſt: altera, quia medicamenta quæ vrinam ciunt, hauſit: tertia, quòd intemperies quædam exauctæ caliditatis circa renes exiſtit, ut in diabete paſſione: quarta, quòd aliud natura ſicca ſit quinta, hydrops, præſertim a naſarca ſexta, quia reliquarum euacuationum corporis nulla proceſſit.

*Vrina* colores ſex exiſtunt, albus, pallidus, ruſus, flauus, ruber, & niger: nam reliqui omnes colores ſub his comprehenduntur.

*Vrina* contenta τὸν πυθμένα dicuntur, diſtribuunturque in locos tres: nam quod in fundum vaſis deſcendit, ὁ πυθμῶς eſt: quod in medio pendet, ὁ μεσῶς eſt: ſed quod in ſuprema ſuperficie vrinæ volitat, ὁ φῶς dicitur. Quære diſtione Contenta vrinæ.

*Vrina* ſuppreſſio, ὁ ὀχρὸς malum eſt, in quo ægris in totum vrina ſupprimitur, & cohibetur. Quod ſuper eſt, quære paulò ſuprà in diſt. Iſchuria.

*Vrina* ſecundum naturam, colore quidem ſubruſæ, & ſubſtantia mediocres: in quibus quod reſidet, candidum, lenæ, æquale eſt.

*Vrina* color in ſanis mutatur tribus de cauſis, prima eſt, cibus corpori oblatuſ, qui non probè tranſmutatur, nec in ſanguinem vertitur: atque adeo ſimilem ſibi vrinæ colorem reddit: id quod iis accidit qui præter naturam afficiuntur: atque iis, qui ſecundum naturam ſe habent: nonnunquam etiam propter medicamenta contingit.

*Vrina* altera cauſa color cur mutetur, eſt potio: quoniam quæ hauſimus in potione, magna ex parte colorem retinet vrina.

*Vrina* tertia cauſa mutationis coloris, eſt coliquatio eorum quæ in corpore ſunt: ut author eſt Hippocr. Epid. li. vij. Parr. v. aphoriſ. xv.

*Vrina* mutantur cauſis ab accidente factis, veluti exercitio, inedia, ſomno, vigilia, atque huiuſmodi aliis, quæ circa vrinæ inſpectionem medico conſideranda ſunt.

*Vrina* ſtillicidium τὸν γῆρυς, eſt cum guttatim, & paulatim vrina diſtillat, ac aſſiduum ad mingendum irritationem facit, aut ob acrimoniam, vel ardorem: aut ob exulcerationem veſicæ. Curarionis author eſt Fuch. de Medend. morb. libro tertio, cap. xxxvij.

*Vrina* difficultas δυσουρία, eſt malum in quo vrina ægrè & difficulter excernitur propter veſicæ imbecillitatem: atque adeo frigida meiuiſdem intēperiem, quæ illius actionem offēdit. Fuch. de Medendis morbis libro tertio, capite xxxvij. curatio nem docet.

*Vrinarum* optima, eſt cum apparet hypotaſis alba, lenis, & æqualis in omni hora quæ adiudicanda fuerit ægritudo: ſignificat enim nullam in ægritudine fallaciam futuram, & tempore modico finituram. Si verò deſecerit ut quandoque puram minxerit vrinam, ſubſideritque lenis & alba, longior efficitur ægritudo, ſed non fallax. Si verò vrina fuerit rubedini proxima, & hypotaſis rubicunda, & lenis, diuturnior reddetur morbus. Nubeculæ autem in vrinis albæ quidem bonæ, nigre verò prauæ: quando autem ignea fuerit, & ſubtilis, indigeſtam denotat ægritudinem: & ſi diuturnior, ad ægritudinis inclinationem, qui afficitur, non perueniet, ſed delinquetur. Gal. in lib. de cholera nigra, cap. vij.

*Vrinarum*, letales ſunt aquoſæ, ſætidæ, & nigre cum craſſiſ: ſunt autem viris nigre peſſimæ, pueris verò aquoſæ: qui autem vrinas ſubtiles, crudas ſed diurnas habent: ſi albam ut eſt euſurus, ſigna in regionibus diaphragmatis expectare oportet: & etæ ſuperſenatantes vituperandæ: collicarionis enim ſignum eſt: igitur nubes ſupernæ conſiderandæ veniunt.

*Vrinarum* differentia triplex eſt, nam cum tales miſtæ fuerint, paulò poſt reſident

dent, vel semper similes permanent, vel puræ quidem minguntur, tum postea cōturbantur: prava quidem ex dictis terra, bona autem prima: media verò inter utriusque secunda: quoniam quæ statim post residet, parum aliquid inæqualis turbulentæ superesse demonstrat. Quæ verò semper manet similis, vigens quæ est adhuc in sanguinis agitationem ostendit: quæ autem extra conturbatur, debet incipere concoqui, quare & in longiori tempore, & virtute forti indiget ad concoctionem. Quæ turbulenta meior, ita ut quæ hypostasim optimam habet, morbum concoquendum significat, & melior: medium tenet locum secunda. Nam ex ea quæ vigente fit conturbatione, quantum malicia differt ab ea, quæ adhuc futuram perturbationem significat, tantum superat eam quæ iam quiescentem obrinet: quæ verò ad summum incocta est, hæc omnia vincit: quæ aquosa, incocta, & venarum passionem significat. Vriarum itaque color niger atque in ipsis nebulis quæ supra vehuntur, calorem immoderatum, aut morrificationem ex refrigeratione vehementi refertur: omnis igitur urina denigrata est pessima: adeo ut paucos servatos videbis: minus perniciofa, si solum id quod subsidet, nigrum fuerit: atque adhuc minus, si solum id quod in medio pendet: ac multo quoque minus, si nebula, color verò viridis sit in transitu ad nigrum: & quoddam veluti principium nigri. Color autem lividus, est tantum frigiditatis effectus: odor verò gravis putrefactionis signum. Quod si veluti oleum mingatur, collicationis nota est. Tales quidem urinae omnes pravae sunt, & perniciem minantur. In viris & mulieribus nigrae, in pueris autem aquae similes, perniciose: nam in his magis consuetæ crassiores in perfectis autem, & adultis, magis rursus. Hæc ex Hippocrate Galenus.

*Vterus* seu vulva *μυτρη* καὶ *ὄσφρς*, inter vesicam & rectum intestinum sita est. Ab utraque fundi eius parte superiori, prorsus quosdam mammilares ad ilia, lombosve nutantes obrinet, quæ à figura semisecti circuli Cornua *κέρυαι*, nominantur. hæc primum sursum vergentia, postea deorsum inclinantia, paulatim fiunt angustiora, donec in fines exacte angustos definant, atque adeo venis assimilentur. Sinuositas itaque flexibus inferius delata interoenru vas seminario testibus inseruntur, qui à lateribus singuli ab utraque fundi parte, paulò superius ab ipsis cornibus abducti, siti sunt, deinde siquidem non in cervicem, sed in sinum uteri funduntur.

*Vteri suffocatio*, seu strangulatus *ὄσφρς* *πνιγ*, est vteri ad superiora eiusdem recursus, superiores ac principatum obtinentes partes in passionis concessum perduci, nempe carotidas, cor, cerebrique membranae: fit propter repleta menstrua, cohiberum semen, & coitus defectum. Gal. lib. vj. Locor. affect. cap. v.

*Vteri prædusio* *μωλις* *ὄσφρς*, est cum margines ostij in hoc malo muliebris coëunt, invicemque coniuunt. Præterea vteri cervicis aut osculi obturatio, & coactatio *φωβὸς* καὶ *φωβισ*, est ab ulceratione præcedente eveniens, qua ea loca tam angusta redduntur, ut non amplius semen admittant, sed si amiserint, neque retineant.

*Vteri procidentia*, est quando ita evertitur, ut exterius emineat: neque enim vterus à suis solutus propagibus totus decumbit: nam si ita procideret, restaurari minime posset. Sunt verò procidendi vteri cause multæ, quas cum curatione Fuchsius memorat li. iij. de Medend. morb. cap. xlvij.

*Vteri inflammatio*, est quæ fit ex ictu, mensium retentione, ab ortu, ulceratione, concubitu metas rationis excedente, longissima intensissimaque deambulatione, ætate & transpiratione propter frigus prohibita. Auctor curat. Fuchsius lib. ij. de Med. morb. cap. l.

*Vultur* ὁ *γυλ*, avis est carniuora: in hominum enim cadavera fertur infestissima, ac hominem ad moriendum vicinum, quando supremum vitæ diem agat diligenter observat. Expeditos etiam in bellum exercitus præfectione quadam consequitur, & quod omnis pugna, strages ædere solet, locum futurum bello septem ante dies, quàm pugna committatur, prævidet, in eamque partem & in qua alterutra pars succumbet, respicit. Quam ob rem Reges olim speculatores solebāt præmittere, qui renunciarent ad quam nam partem vultures oculos referrent. hæc Aelianus.

*Vulva*

*Vulva* *μυτρά*, est carnofa materies, fed intrinsecus carnofior, fortis receptaculū, cui fubfidet adnata veficula, in qua muliebres menfes digeruntur: quos etiam hæc oportuna, exterūm coalefcētes ex totius corporis inutili excremento, vtpote ipfius iecinoris, fele laxādo per ceruicem vuluæ, itaque difperfos eiicit, pars autem vuluæ exterior, quæ prominet, Cūnus appellata vulgariter eft.

*Vua* fiue *vuula* *τρυφύλλω*, non fignificat columellam, neque etiam eiufdem inflammationem, fed quandam illius palfionem, in qua tota collumella laxata, extrema fui parte maior eft, & liuida, fuperna verò tenuis, vt fimilitudinem fructus vuæ, vnde nomen accepit, præ fe ferat. Repete dict. Columella.

*Vuatio* *τρυφύλλωμα*, eft ab vuæ mēbranz procidentia, quæ fi ampliū, & eoufque fuccreuerit, vt vuæ acinum repræfentet, vuatio Latinis dicitur. Si ficut augetur, vt extra palpebras emineat, *μυλόν* nominatur: Methodici vualem ruptionem vocant, vbi verò obducta cicatrice obduruerit *κλός* nūcupatur.

Latinis Clauus, & claualis. Quæze diuifionem

Formicalis vua, feu ruptura.



*De litera*



## De litera X.



*Anthium* ἄνθιον, herbariis & officinis hodiernis Lappa minor, & lappa inuerſa: vulgus glateronem appellat. Nomen, inquit Ruel. ab effectu inditum, quod rufos reddat capillos. Dioſco, libro iiii. capite cxxij. Aëtius lib. xj. cap. v.

*Xiphium* ξίφιον, id eſt, Gladiolus, ſpatha ſætida, ſive ſegetalis. Plinius interdum Xiphium cum Cypiro confundit, quod Sphagnum non eſt aliquibus nominatum. Nomen inde accepit, quod folium gladij præbeat ſpeciem. Iridi ſimile erat, niſi minus, & anguſtius videretur, & gladij modo mucronatum, neruoſumque atque in colem exit cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinem digeſti, inter ſe diſtant: rotundo ſemine: radicibus geminis, vna, bulborum modo, ſuper alteram inſidente: quarum inferior gracilis eſt, ſuperna vberior, naſcitur in aruiſ, & montium vallibus. Dioſco. lib. iiii. cap. xvij.

*Xiphidium* ξίφιδιον, aliquibus Sparganium vocatur: folia habet gladioli, ſed ætiora, & in terram magis procumbentia. in ſummo caule veluti pilulæ prominent, in quibus ſemen. facultatis eiſdem cuius Xiphium.

*Xylon* ξύλον, frutex eſt exiguus, laniger, palmæ folio, ſimilem barbatæ nuci gignens fructum: cuius in exteriori bombice lanugo nequit in ſilum cãdidiffimum molliſſimumque, quod vulgò *Coton*, & quibuſdam Gofſipium, vocatur. hinc & lana xilina, & linum xilinum Tomentum accepit nomen.

*Xyloaloe* δ' ξυλοχόη, παρὰ τὴν ξυλόαλον, à nonnulla ſimilitudine coloris, & amaritudinis aloes, agalochon Græcis recetioribus appellatum eſt: inde officinis lignum aloes nomen retinuit. Lignum in vſu eſt duntaxat, quod nulli cariei eſſe obnoxium ſuſpicantur aromatarii peritiores.

*Xylobaſſamum*, ξυλόβαſſαμον, Baſſami lignum eſt, quod recens ad ſuffimenta, medicamenti à ſe probatur, ſarmento tenui, ſuluum, odoratum, quadaſi ipſius liquorem ſpitans. Neceſſarii etiam ſeminis etuſus: quare eligatur ſlauum, plenum, grande, ponderoſum, mordens guſtu, ſeruens in ore, modicè opobaſſamum olens. Dioſco. lib. i. cap. xviii.

*Xylocerata* ξυλοκεράτια, κέραιον Græcis recetioribus Ceratoniz arboris, id eſt, Siliquæ fructus. vulgus Carrobas. Vide diſt. Ceratium.

*Xylocinnamomum* ξυλοκιννάμωμον, arboris lignum, cuius quidem corticem Cinnamomum appellamus: vulgus autem Canellam: Latini, cum Græcis Caſiam, qua Cinnamomi loco, quod careamus, vtimur. Pete Caſiam.

*Xylomacer* ξυλομάκρη, lignum arboris macer corticem producentis. Verùm Macer aliud oſtentatur, quàm fruticis cortex, vt ſcriptum habes in diſt. Macer.

*Xyris* ξυρίς, Iris ſylueſtris: domeſticæ folia habens, latiora & in turbinem mucronata: quorum medio caulis erumpit, craſſus, cubitalis, ex quo ſiliquæ triangulares dependent, in quibus purpureus flos, in medio puniceus: ſemen in ſolliculis ſimile fabis, rotundum, rubrum, ætæ radix longa, geniculata, ruſa. Cætera Dioſco. docet lib. iiii. cap. xx.

*Xypoides* ξυφοίδης, ſeu enſiformis, eſt peſtoris, ſive thoracis extremum, & ventriculi, ſive oris ſtomachi principium: & cartillagini nomen inditum. Oſtaua namque thoracis ad radicem cartillaginis coſta, in peſtoris ſine in mucronem gladij modo exacuitur, conſiſtit: reliquæ omnes ſeptem thoracis compoſitionem conſtituunt anteriùs & poſteriùs.

Deſis

## De litera Z.



*Adura* ζαδούρα. Actuario, radix est teres, mordicans, odorata, sapore, & colore zingiberis: magis tamen aromatica, cardiacaque est: nam in theriacis pestilentem fugauitibus aërem venenūmq; miscetur. Officinæ Zedoariam dicunt.

*Zarnabum* ζα'ρναβον, Doronicum aliquibus videtur: ex herba radix foditur ad aromata condienda, & conficienda quæ vsurpatur. Scorpion animantis figura radix videtur haud dissimilis: tota in candidum herba-cæa colorem monstratur, quando recens ac nuper effusa est.

*Zea* ζεια, id est, Speltha, duūm generum offenditur, vnum simplex, alterum in geminis putaminibus grana bina iuncta gerit: ob id dicoecos appellatur. plusquam hordeum aliorum gratum vtrumque genus: sed minus, quàm triticum. Pete Gal. lib. primo de Alimentis.

*Zopyrum* ζι'οπυρον, à Zea & tritico, vt nomen duxit, ita mediam inter vtrumque naturam, & quasi ex ambobus conflatam sortitur.

*Zingiber* γινγίβρι, radix vt gramen repeus, folio atundinaceo, & sui generis planta, aromatica, facultatem piperis exaltantem habens atque ea vt frequens vti mur in speciebus. Xylocinna momum quoque Zingiber vocatur.

*Zirbus* omentum, ac rete est, quod Græcis veteribus ἐπιπλουν, καὶ ἐπιπλουῦν, Latinis omentum appellatum est. Quære dict. Omentum.

*Zizanium* αἰζα, Lolium infelix est Virgilio, quod non solum inter segetes, sed ex segetibus etiam ipsis, vt tritico præcipue in vlginosis, & hordeo, nascitur. panis cui hoc granum admiscetur, capitis dolorem cum graui sopore infert & febriculam edenti: nec nisi post somnum soluitur dolor. Diosc. quæ ad medicinam pertinent de lolio, docet lib. ij. cap. xcij.

*Zizypha* ζιζυφα, σπιγχα, duplex genus, rutilum & candidum vt author est Colu mella, flos est oleæ, sed odorator: cuius pomum bæcæ similis, quàm malo, quo amplius, & maturius, eò innocentius. Serica ea vocat Galenus, parui succi poma, nec concoctioni, nec stomacho vtilia, Officinæ isto seculo eum barbaris medicis Iniubas vocant.

*Zona* ζ'ονη, passio, fit quoties flaua bilis pura, nullūque humore alio mixto, excreta in aliqua parte consistit: quæ si substantia crassior fuerit, & acrior, totam eutem ad subiectam vsque carnem exulcerat, appellaturque ζ'ονης ἐσθιομενός, hoc est, herpes exedens. Si verò tenuis & minus acris, calidique fuerit, exiguas pustulas milio similes per summam cutem excitat, ob eamque similitudinē, Græcis κερχρεας ἐ'ρπονς, id est, miliaris herpes dicitur.

*Zona*, est spatium de superficie cæli, ac eadem quidem de proportione terræ, inter duos circulos minores comprehensum. Sunt autem Zone quinque sic ab Ouidio descriptæ:

*Vtque duæ dextra cælum, solidæque sinistra*

*Parte secant Zone. quinta est ardentior illis:*

*Sic onus inclusum numero distinxit eodem*

in medicina vsus, foco tantum aptum aridum lignum probatur.

*Zulapinum* Iulepum est, quod fit aut ex stillaticio plantarum liquore quopiam, aut è succis cum sacchar: mellevè, vt ex Aduario, Mesue, & Nicolao pater: eoque medici pro variis morbis, vtuntur.

*Zigoma*, vel *Συγώμα*, os est iugale, & paris os inter tempora & aures situm:

& præter has partes, nouem sunt in facie nominatæ, quæ ossa maxillæ superioris connectunt. Nam maxillæ inferioris ossa duo sunt

in mento diuisa: dentes xxxij. numero: molares

viginti, canini quatuor, incisores octo,

quæ omnia a pertius scripta ha-

bentur in dictione

Dentes.

F I N I S.





AD CANDIDOS MEDICI-  
nz Professores.

**S**ALVE TE o memores miserorum sepe laborum  
Perfunctos inter quos medicina beat.  
Largisque sua quicquid virtute paratur  
Prona est in vitam quisque superstes eat.  
Hec mones hic temerè non vos, qui incommoda prompti  
Tollitis egrotis, molliùs illa fluant.  
Scilicet ut fides fida versetur in arte  
Vobiscum illesa Pharmacopola manu.  
Segetat in vestris, conantem talia tantum,  
Præceptis, culpa est vestra, nec alterius.  
Vt eris & partum nomen celebrabitur ore  
Continuo, alterius non eris, huius eris.

PIGMENTARIORVM PERFI-  
dia Therapenticeum Medicus exerceat : ad Claud. Peron-  
zum Medicinæ doctor, eeleberrimum.

Mors erat humana studio seruare medendi  
Naturæ vires, doctæque facta sequi.  
Amplecti sanè tamque viam, qua quisque superstes  
Viueret in longas tempora fixa, moras.  
Ius dedit hoc medicis tantum Natura, negatum  
Cui fuit æternum viuere nempe diem.  
Quos vexat censura potens marcentis alumna.  
Inuidiæ domat hos incidiosa fides.  
Euertens formas, medici quoque dicta retractat  
Pigmentum laudans Pharmacopola suum.  
Hac omnes specie medici falluntur, & ægri  
Intereunt, medicis impropèrantque necem.  
Iandudum obruimur, multis nec deficit vsus  
Indomitus, primus corrigis ista tamen.  
Corrigis audaci, promptam simul arripis ansam  
Iudicio, & venia est nulla petenda tuis.  
Tu modò nam tecum fingis tua pharmaca, dictas  
Ipse domi : egrotis quid faciâtque, vides

VITA BREVIS, ARS LONGA,  
iudicium difficile, experimentum periculosum, quæ na-  
tura iutrice, vincit experientia : ad Petr. Areodum Me-  
dicinæ cultorem fidelissimum.

Principio proles genita est, (mortalis origo)  
Limosa de re, qua quoque vita breuit,  
Namque ubi nascuntur morbi, varique dolores,  
Quam miserrum est iuueni, quam graue deinde seni.

*Si quoque tentarint, medios remorantur in axes:  
 Utimus d' primo nec repetitus apex.  
 Sollicitas vitæ quæ sunt occasio præceps:  
 Cui menti, cui ratio, iudiciũque potest.  
 Ast ubi pernentum est quanta experientia prodest:  
 Aus noceat, nota est artificis que via.  
 Quid vetat argutum palam damnare periculum?  
 Difficili varium iudiciũque dare?  
 Omnibus hinc sese rebus præstari oportet  
 In vita cupiens hoc decus artificis.*

# OPIFICIS SVMMI NVTV, NON

fato, accidunt commoda & incommoda: ad Petrum To-  
 letum, naturæ amicum.

*Retum opifex postquam voluit sua pandere Mundo  
 Decreta, arbitrio contulit illa suo.  
 Intricem posuit sed tunc fecitque ministram  
 Naturam, medicus, dum solet, addit opem.  
 Omnia sint morti, & variis obnoxia morbis,  
 Dicere nec fato fata venire licet.*

# HVMORVM INVICEM CON-

gruentium, vitæ salubrioris, longiorisque tempera-  
 mentum.

*Humida ni fluere, in flammæ totus abirem:  
 Nis foret inde calor, mergerer imbre miser.  
 Imbribus & flamma totus conseruor eadem  
 Temperie, & vitam præbet utrumque mihi.*

# GRAVIDIS VENENVM MINI-

strare impium, & iureiurando vetitum, ad Perrinum de  
 suo Myropola.

*Si quibus in vacuis prona est natura locellis,  
 Hæreat & modico quæque puella ioco.  
 Sepenes in summa modo mente ferocius ardet:  
 Humanumque timet ne pereat de genus.  
 Dissoluens vires pares solata rogantis:  
 Hymen concipiens virginitate probat.  
 Hæc Vestalis erat, data cui non ulla mariti  
 Libertas: operis sed tamen illa fuit.  
 Effet ut ignotus multis cunctantibus error,  
 Aegrotam simulans dum peperisses onus.  
 Clam tamen adfertur mortis medicina duobus:  
 Clauseruntque suos talia fata dies.  
 Impius hanc texit fraudem Myropola, sed auro  
 Obductus: precio posposuitque Deum.*

# MEDICORVM ERRATA NON

regitte illis, sed facti sui sibi quisque conscius: ad Iaco-  
 bum Perrinum.

*Qui ius per leges, per sanctæque numina noris:  
 Et Perrine tuum nunc ubi iudicium?  
 En celerem retices mortem cecidisse nepotem:  
 Qui tibi præuisus mane valere tamen.*

*Accurris*

*Accurrit Myropola tuius, specumque locutus:  
 Ventris at interdum pondere laesus erat.  
 Callidus alludens egro medicamina profert,  
 Portexitque leni deinde bibenda manu.  
 Crastina lux sequitur, quasato soluitur aeger:  
 Improba quod dederis pharmaca nocte vaser.  
 M libus in cunctis similes exercet & artes:  
 Et tibi, qui fidis praeualitura parat:  
 Quales si tentas tecum peccabis & ille:  
 Denique tu secum: cuius & inde scelus?  
 Immunes vicij tegimur, scelerisque sepulti  
 Alterius: vniis cognita fama tamen.*

### MEDICVM EVM NON ESSE QVI

*simplicium, compositorumque facultatem nomina-  
 tim spreuerit, scireque neglexerit.*

*Struaturam quicunque demus cumulauerit, ante  
 Ars sibi quam nota est, pendis in arte nihil.  
 Artem si Latomus comprehendit, moenia & Urbis  
 Qui rudis, absoluit segnibus artis opus.  
 Indolitusque faber clauem formamque serandi  
 Nititur, elusus sitque labore labor.  
 Annulus argento formatur, & annulus auro  
 Fingitur: & nihil est si caret arte faber.  
 Dum pensam in filum deducit femina fuso,  
 Pelline & ignoto tela futura minus.  
 Si pariter plantas medicus ne scire fatetur:  
 Compositum, & simplex quod medicamen habes.  
 Iure quidem ignarus, medica nec dignus in arte  
 Dicitur, nihili scire sed ista foret.*

### MEDICOS NON INVIDIA, SED PERFICI- endi operis sui, ut sua in arte ceteri omnes, gloria laborare.

*In Medicis nulla est, nulla est Chyronis in arte  
 Inuidia: est omni rumor in arte tamen.  
 Si quid id est dicam, molitur fingere ad vnguem  
 Quoduis opus cupidus quisquis bonoris erit.  
 Gloria quae maior fortem quam auertere casum  
 Affertis, redeat saepe petita quies?  
 Orator causam vel agit, iucatur eandem,  
 Suppressum nomen nevé Clientis eris.  
 Scilicet oraret puroque Hortensius ore.  
 Damnares causas iudicioque Patrum.  
 Despretus Cicero haud tamen est, dulcedinis illud  
 Ceperat, inque ambas creditur isse Vices.  
 Qui quoque rixatur clamosa Rhetor arena  
 Laudem aduersanti comprobatur inuidia.*

PARENTVM, AFFINIVMQVE IN-  
solentia in medicos, quod mortales morte non eripiant,  
longiorēque vita non donent.

*Sedula quamprimum vitam diuertere fatis  
Gens omnis morbi mobilitate vigil  
Neu sua conuertant faciles ad fata sorores  
Stamina, neu luce in nox tenebrosa tegat.  
Omnigenas sed tum tētat pro potibus verbas:  
Nunc et odoratas viribus visa probat.  
Hinc medicum sortita probum cui talia cura,  
Exanimem orans discutiātque metus.  
Pendentis vitæ curam qui suscipit auctor  
Incumbens, fati desegū esse locum.  
Insinuat medico quorsum fortuna rotarit,  
Morsem forte alia non potuisse mori  
Gens ignara boni vitæ superaddere vitam  
Posse putat medicum, qui imperet ista Deo.  
Se nibil exerciet, morsem nec torqueat in nos  
Communem, dum nos scit quoque posse mori.*

VITAM QVÆ FACIUNT BEA-  
tam: ad Rheginum filium.

*Quæ sunt, quæ vitam faciunt (Rhegine) beatam  
Sollicitum te te vellet honoris amor.  
Vera loqui, et parem morum sapientia prima est:  
Sera seu liceat conseruisse iocus.  
Et quocunque parem laus est exollere amicum:  
Inconstantis et est impariter loqui,  
Flectere magnanimi est iram, emollire superbi  
Tum fastus clara fronte, peremue decus.  
Audiri pulchrum: vita est que beatior illa:  
Fama si parcis, se quis et inferior?  
Largiri crebras sed opes frugalis amicus est:  
Sic docet ingratum vincere gratus amor.  
Arridens vobis summi promissa Tonantis,  
Sanctius à quibus est, splendidiusque nihil.  
Hæc bene si spectes, cæcis perfectus, et orbe  
Iam sis, nec non, crede, beatus eris.*

ANDRÆ, ET ANTONII SEMON-  
norum Myropolitum: Eneonium.

*Lucida Tyndaride nunc sint æquanda duobus  
Fratribus, annosi sidera bina patris.  
Moribus, et fama plebi viuuntque, placētque.  
Ut cælo superent Tyndaridasque duos.*



## Typographus candido lectori S.

*En tibi (Benevole lector) absolvimus Artis Medices Exercitamenta, Opus sanè perquam elegans, & omnibus Medicina etiam Cādidatis Utile atque necessarium: in quo excudendo strenuam ac sedulam nos navasse operam asserimus: tamen si alicubi iniustis mēdis aliquibus cōpersum prodeat, unum hoc oro, ne incurse typographica id adscribas, (quandoque enim bonus dormitat Homerus) sed vitio Exemplaris minus accurate scripti & mutili, lectūque difficilis. Acceffit hoc etiam incommodum, Authoris scilicet absentia longis intervallis separati, cuius presentiam summo affectu desideratā, non adfuisse egretulimus. Nos alteram edicionem iam ab ipso auctore reuisam & bene augmentatam dare in publicum paramus. Hoc unicum te commonefactum volui. Bene vale.*

